

100 Candida albicans merupakan penyebab dari kondisi apa pada rongga mulut? Oral candidiasis	100 Apa fungsi bikarbonat dalam cairan pankreas? Menetralkan kimus yang asam	100 Apa fungsi kolon dalam penyerapan cairan? Menyerap air dan elektrolit	100 Apa fungsi empedu dalam pencernaan lemak? Membagi lemak menjadi bagian lebih kecil untuk memperluas permukaan enzim	100 Apa bentuk diet yang diberikan pada gastric ulcer? Diet cair atau blenderized
200 Berapa lama sebelum tidur pasien dengan peptic ulcer sebaiknya tidak makan? Setidaknya 2 jam	200 Sebutkan tiga bentuk diet yang dapat diberikan pada pasien oral candidiasis! Diet cair, blenderized, dan lunak	200 Berapa banyak jumlah serat yang direkomendasikan pada diet tinggi serat? 25 gram per hari	200 Hormon apa yang merangsang kontraksi kantung empedu? CCK (cholecystokinin)	200 Hormon apa yang disekresikan sebagai respons terhadap kimus asam yang belum dinetralkan? Sekretin
300 Sebutkan dua contoh bahan makanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan asupan serat. Biji-bijian utuh dan sayuran	300 Sebutkan tiga fungsi penting hati yang berkaitan dengan metabolisme dan nutrisi. • Membantu pencernaan dan absorpsi lipid melalui produksi empedu. • Menyimpan dan memetabolisme vitamin larut lemak. • Melakukan metabolisme/detoksifikasi obat dan xenobiotik.	300 Sebutkan tiga kondisi atau kebiasaan yang perlu diperhatikan dalam terapi gizi pasien GERD karena dapat menurunkan tekanan lower esophageal sphincter (LES). • Makanan tinggi lemak • Cokelat • Alkohol	300 Sebutkan tiga penyebab pankreatitis! Alkohol berlebihan, hipertrigliseridemia, dan sumbatan duktus pankreas.	300 Berapa lama pasien GERD sebaiknya tidak makan sebelum tidur? 3 Jam
400	400	400	400	400

Mengapa fast food atau gorengan perlu dihindari pada pasien GERD? Karena makanan tinggi lemak termasuk makanan yang perlu dihindari pada penyakit GERD	Apa yang dapat terjadi jika seseorang meningkatkan asupan serat terlalu cepat? Flatuensi, borborygmus, kram, dan diare	Apa perbedaan prinsip terapi gizi pada IBS ketika pasien mengalami diare dibandingkan ketika diare tidak terjadi? • Jika terjadi diare: diberikan diet cair dan parenteral nutrition sesuai materi. • Jika tidak terjadi diare: dapat diberikan blenderized diet dan soft diet.	Sebutkan empat prinsip pengaturan diet pada cholecystiasis kronis • Diet rendah lemak • Penurunan berat badan • Pembatasan makanan pembentuk gas • Suplementasi vitamin A, D, E, dan K.	Mengapa pasien GERD dianjurkan menghindari berbaring setelah makan dan makan menjelang tidur? Dan baiknya disarankan untuk melakukan apa? Karena posisi tersebut dapat memperburuk refluks isi lambung ke esofagus. Pasien disarankan untuk : • tetap dalam posisi tegak setelah makan; • tidak makan dalam 3 jam sebelum tidur; • tidak berbaring, mengangkat benda, atau membungkuk setidaknya 2 jam setelah makan.
500 Seorang pasien dengan penyakit kantung empedu mengonsumsi makanan tinggi lemak. Setelah lemak masuk ke usus, terjadi pelepasan hormon yang menyebabkan	500 Seorang pasien mengalami pankreatitis akut berat. Pada awal perawatan, pasien tidak diberikan makanan melalui oral dan mendapat hidrasi intravena.	500 Seorang pasien mengalami konstipasi. Ia memiliki pola makan rendah serat dan jarang melakukan aktivitas fisik. Dokter menyarankan peningkatan	500 Seorang pasien dengan peptic ulcer mengatakan bahwa setiap kali mengonsumsi makanan tertentu, ia mengalami ketidaknyamanan. Ia juga	500 Seorang pasien GERD sering makan malam kemudian langsung berbaring. Ia juga memiliki berat badan berlebih dan sering mengonsumsi makanan tinggi

kantung empedu berkontraksi. Dokter kemudian menganjurkan diet rendah lemak. Apa hormon tersebut dan mengapa pembatasan lemak digunakan pada kondisi tersebut? CCK; pembatasan lemak digunakan untuk mengurangi kontraksi kantung empedu.	Setelah 24 jam, pasien mulai dapat menerima asupan. Apa yang dapat diberikan berikutnya? Jika pankreatitis berat berlangsung lama, bentuk dukungan nutrisi apa yang dapat digunakan? Cairan jernih sesuai toleransi setelah 24–48 jam; pada pankreatitis berat yang berlangsung lama dapat diberikan TPN.	serat. Pasien kemudian meningkatkan serat secara drastis tetapi asupan cairannya tetap rendah. Apa masalah yang dapat terjadi dan apa yang perlu diperhatikan dalam pemberian serat? Dapat terjadi obstruksi lambung atau fecal impaction; peningkatan serat perlu dilakukan secara bertahap dan disertai cairan yang cukup	memiliki kebiasaan makan mendekati waktu tidur. Berdasarkan kondisi tersebut, apa dua hal utama yang perlu dilakukan dalam pengaturan makannya? Menghindari makanan yang menimbulkan ketidaknyamanan dan tidak makan setidaknya 2 jam sebelum tidur	lemak serta kopi. Sebutkan empat perubahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi faktor yang berkaitan dengan kondisi tersebut. Menurunkan berat badan, tidak makan 3 jam sebelum tidur, menghindari makanan tinggi lemak, dan mengurangi kopi.
---	---	---	---	---