


 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΓΑΛΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΜΟΣΧΑΡΙΑ

CALFPREMIUM 50'N'MORE

50 % SMP

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

22 % ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ

20 % ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΛΙΠΗ

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Πρωτεΐνες γάλακτος εξαιρετικά εύπεπτες: προσαρμοσμένες στην πρώτη φάση ανάπτυξης του ζώου.

Εξαιρετική απόδοση

Βιταμίνες και ιχνοστοιχεία

Για βέλτιστη ανάπτυξη και πλήρη διατροφή

Ασφαλής πέψη

Εφοδιάζει με το προβιοτικό (*Enterococcus Faecium*), που λειτουργεί σαν φράγμα στα παθογόνα του πεπτικού συστήματος

Ειδικά επιλεγμένα λίπη

Παρέχει ενέργεια και έτσι συνεισφέρει στην ανάπτυξη του ζώου

Υλικά αποξηραμένα με μέθοδο ξήρανσης με ψεκασμό

Γρήγορη ανάπτυξη και ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

Βελτιστοποίηση της ανάπτυξης μοσχίδων και μόσχων

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Υγρασία	5	%
Ακατέργαστες φυτικές ίνες	0.1	%
Τέφρα	7	%
Ασβέστιο	0.7	%
Νάτριο	0.5	%
Φώσφορος	0.7	%

ΠΡΟΣΘΕΤΑ

Βιταμίνες		
3a672a	A	25 000 UI/kg
3a671	D3	10 000 UI/kg
3a700	E	60 mg/kg
3a300	C	150 mg/kg
3a711	K3	4 mg/kg
3a820	B1	10 mg/kg

Ιχνοστοιχεία		
3b103	Σίδηρος (II) μονο-υδρικός θειϊκός	25 mg/kg
3b105	Σίδηρος (II) φουμαρικός	15 mg/kg
3b405	Πεντα-υδρικός θειϊκός χαλκός	10 mg/kg
3b605	Μονο-υδρικός θειϊκός ψευδάργυρος	65 mg/kg
3b503	Μονο-υδρικό θειϊκό Μαγγάνιο	60 mg/kg
3b202	Ανυδρίτης Ιοδιούχου ασβεστίου	0.3 mg/kg
3b801	Σεληνιώδες νάτριο	0.2 mg/kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Σακκί : 25 kg



ΣΥΝΘΕΣΗ

Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη - ορός γάλακτος σε σκόνη - φυτικά έλαια (φοίνικα, ελαιοκράμβης, ψίχας καρύδας) - γλουτένη σίτου - λακτόζη - άμυλο σίτου - μαλτοδεξτρίνες - όξινο φωσφορικό ασβέστιο - χλωριούχο νάτριο - θειικό μαγνήσιο - υδροξείδιο μαγνησίου - ανθρακικό ασβέστιο

ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ

Αναμείξτε το προϊόν με τον μισό όγκο του ζεστού νερού στους 50°C και συμπληρώστε με ζεστό νερό, ταιστέ στους 38°C - 40°C

**Για το χειροκίνητο ανακάτεμα σε ένα δοχείο, ανακατέψτε μέχρι να ομογενοποιηθεί*

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΑΙΣΤΡΑ

Προετοιμάστε φρέσκο γάλα για κάθε γεύμα
Ρυθμίστε τον θερμοστάτη ταισματος στους 38-40°C

**Ελέγξτε το βάρος της σκόνης τη στιγμή της κάθε παρασκευής (και ρυθμίστε την αυτόματη ταιστρα)*

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ

Μην προετοιμάζετε το υποκατάστατο γάλακτος απευθείας στον κάδο της θηλής

Το νερό που χρησιμοποιείτε για την παρασκευή πρέπει να είναι πόσιμο

Η υγιεινή είναι σημαντική – καθαρίστε όλα τα σκεύη μετά από κάθε σίτιση

Διατηρήστε τη σκόνη του υποκατάστατου γάλακτος φρέσκια, κλείστε τη σακούλα σφικτά τυλίγοντάς την και φυλάξτε την σε ξηρό και δροσερό μέρος.

Το χρονοδιάγραμμα σίτισης του υποκατάστατου γάλακτος πρέπει να καθιερωθεί σε τακτά χρονικά διαστήματα

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ στο ENTEPO

4B1708 ENTEROCOCCUS FAECIUM
NCIMB 11181 : 1.3*10⁹ UFC/KG

ΠΛΑΝΟ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΓΙΑ ΜΟΣΧΑΡΑΚΙΑ ΠΟΥ ΘΗΛΑΖΟΥΝ

	Αραίωση υποκατάστατου γάλακτος	2 ΓΕΥΜΑΤΑ/ ΜΕΡΑ (συστήνουμε) 1kg σκόνης+ 7L νερού = 8L γάλατος	1 ΓΕΥΜΑ/ ΜΕΡΑ από την 3η εβδομάδα 1kg σκόνη + 4L νερού = 5L γάλατος	Ad libitum. ΤΑΙΣΜΑ κατά βούληση
AGE	MEALS/DAY			
1η εβδομάδα:		Πρωτόγαλα από το 1ο τάισμα με σωληνάριο ή μπουκάλι θηλασμού		
Γέννηση < 6h	1 x 4L			
12h < 18h	1 x 2L			
2η Μέρα	2 x 3L	Πρωτόγαλα από 2ο & 3ο τάισμα από θηλή μαστο		
3η Μέρα	2 x 3L	½ Πλήρες αγελαδινό γάλα (χωρίς κύτταρα) + ½ Υποκατάστατο γάλατος		
Μέρες 4-7	2 x 3L	Υποκατάστατο Γάλατος (130 g/L)		
2η εβδομάδα	2 x 3L			
εβδομάδες 3-7	2 x 4L	Υποκατάστατο γάλατος (130 g/L)	1 X 4L	Υποκατάστο γάλατος (130 g/L)
8η εβδομάδα	2 x 3L		1 X 4L	
9η εβδομάδα	2 x 2L		1 x 4L	

Παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλειστικά για την Comerco

www.comerco.gr , comerco@otenet.gr , 210 3612 754 facebook: comerco zootech