Dentamet Ficha Técnica

Composición

Cobre (Cu) (como sulfato) soluble al agua: 2% p/p (25,6 g/L) Zinc (Zn) (como sulfato) soluble al agua: 4% p/p (51,2 g/L)

Formatos

Envases de 1 y 5 litros

Características

Abono inorgánico compuesto a base de micronutrientes. Cobre (Cu) 2% p/p (25,6 g/L) y zinc (Zn) 4% p/p (51,2 g/L). Dentamet es un formulado especial líquido a base de cobre y zinc, que permite una rápida y eficaz absorción de estos dos microelementos (Cu y Zn), fundamental para asegurar un óptimo funcionamiento de los procesos enzimáticos. Esto permite mejorar el estado fisiológico del cultivo y potenciar indirectamente la defensa natural de la planta. Dentamet puede ser empleado por vía foliar o radicular.

Recomendaciones de uso, dosis y modo de empleo

Dentamet se aplica, en líneas generales, a partir de la fase inicial de desarrollo. Repetir la aplicación 1-2 semanas antes de la floración. En función de las necesidades, es posible hacer 2-6 tratamientos distanciados 10-14 días durante todo el ciclo del cultivo.

Para aplicación foliar: Vid (de vino y de mesa) y Kiwi 200-300 cc/hl; Aguacate y otros cultivos arbóreos: 200-400 cc/hl; cultivos hortícolas: 200-600 cc/hl; cultivos industriales, ornamentales, césped y campos de golf: 200-600 cc/hl. Se puede añadir un mojante.

En fertirrigación: 3-8 l/ha.

Dentamet se emplea en los siguientes cultivos:
Cultivos arbóreos: Aguacate, Viña (de vino y de mesa), Kiwi, Manzana, Cítricos, Olivo, Nogal, Castaño, Granado, Frutal de hueso (especialmente antes de la caída de hojas y/o yema hinchada). Hortícolas: Tomate, Pepino, Berenjena, Melón, Sandía, Calabacín, Hortícolas de hoja (espinaca, lechuga, crucíferas...) Hortícolas de raíz (zanahoria), hortícolas de bulbo (ajo, cebolla), Espárrago, Alcachofa, Coles (de hoja, brócoli, coliflor), Fresa. Cultivos industriales: Patata, Soja, Girasol, remolacha de azúcar, Tabaco, Arroz, Trigo y otros cereales. Cultivos ornamentales: bulbosas de flor. Césped y campos de golf.

Ecoculture Biosciences SL
Rambla Obispo Orberá 11 1º- 4 04001 Almería, Spain
Tel: +34 950264981 info@ecoculturebs.com

Advertencias

Sobre pomáceas (especialmente pera) y uva de mesa, se recomienda no superar la concentración, respectivamente, de 0,25% y de 0,3% en los tratamientos en vegetación. Sobre viña no superar la concentración de 0,5% especialmente en la primera aplicación en primavera. Para los cultivos no indicados en la etiqueta, realizar previamente alguna prueba con antelación en superficies pequeñas. En cualquier caso, consultar con el técnico agrónomo de la zona. No mezclar con formulaciones de reacción alcalina. Respetar un intervalo de al menos 7 días después de la aplicación de aceite mineral o Dodina. Usar el producto en las horas más frescas del día.

Para información más específica consultar: **www.ecoculturebs.com**