CE

Zupra CZ

FERTILIZANTE COMPOSTO INORGÂNICO À BASE DE MICROELEMENTOS

Cobre (Cu) e Zinco (Zn)

EM SOLUÇÃO

Composição:

Cobre (Cu) sulfato hidrossolúvel	2	%
Zinco (Zn) sulfato hidrossolúvel	4	%

Ingredientes:

Ácido cítrico mono-hidratado (1) (CAS n°5949-29-2)

Sulfato de zinco (hepta-hidratado) (1) (CAS n° 7446-19-7)

Solfato de cobre penta-hidratado (1) (CAS n° 7758-99-8)

(1) CMC 1: Substâncias e misturas à base de matérias primas

Uso e dose:

CARACTERÍSTTICAS

Zupra CZ® é uma formulação líquida especial à base de cobre e zinco, que permite uma absorção rápida e eficaz destes dois microelementos (Cu e Zn), essenciais para garantir o funcionamento ideal dos processos enzimáticos. Melhora o estado fisiológico da cultura e aumenta indiretamente as defesas naturais da planta. ZUPRA CZ® pode ser usado para aplicações foliares e radiculares.

MÉTODO DE USO

Zupra CZ®é geralmente aplicado desde os estados iniciais de desenvolvimento, repetindo a aplicação 1-2 semanas antes da floração. Dependendo das diferentes necessidades, é possível realizar de 2 a 6 tratamentos espaçados de 10 a 14 dias durante todo o ciclo da cultura.

Zupra CZ® é utilizado nas seguintes culturas:

Culturas arbóreas: Vinhas e uva de mesa, Actinídea, Maçã, Pêra, Citrinos, Oliveira, Aveleira, Noz, Castanheiro, Romã; Frutos de caroço (apenas intervenções antes da queda das folhas e/ou botão inchado). Culturas Hortícolas: Tomate, Pimento, Beringela, Melão, Melancia, Courgette, Vegetais de folha (espinafres, alface, saladas, crucíferas,...), Tubérculos (cenoura), Bolbos (alho, cebola), Espargos, Alcachofras, Couve (folhosa, brócolos, couve-flor). Culturas industriais: Batata, Soja, Girassol, Beterraba, Tabaco, Arroz, Trigo e outros Cereais. Culturas ornamentais, plantas bulbosas com flores. Morango. Gramíneas e campos de golfe.

DOSES

A utilizar apenas em caso de reconhecida necessidade. Não exceda as doses apropriadas.

Para aplicação foliar: Vinha, uva de mesa e Actinídea 200-300 ml/hl; outras culturas arbóreas: 300-600 ml/hl; culturas hortícolas: 200-600 ml/hl; culturas industriais e ornamentais, gramíneas e campos de golfe: 200-600 ml/hl. É possível adicionar um agente humectante adesivo. Por fertirrigação: 4-8 L/ha.

AVISOS

Nas pomóideas, mas em particular na uva de mesa é aconselhável não ultrapassar a concentração, respetivamente, de 0,25% (250 ml/hl) e 0,3% (300 ml/hl) nos tratamentos sobre a vegetação. Na vinha não ultrapassar a concentração de 0,5% (500 ml/hl) sobretudo nas primeiras intervenções da primavera. Para culturas não indicadas expressamente no rótulo, primeiro faça testes preliminares em pequenas superfícies. Se necessário, consulte o técnico agrónomo da área. Não misture com formulações de reação alcalina. Respeite um intervalo de pelo menos 7 dias das aplicações com óleos minerais e dodina. Use o produto nas horas mais frescas do dia.

Condições de armazenamento: O NÚMERO DE EMBALAGENS EMPILHÁVEIS VARIA DE ACORDO COM O TAMANHO/PALETIZAÇÃO

Armazenar em local fechado com temperaturas entre 4° e 30°C e longe da chuva e do sol.



opp

Informações sobre segurança e meio ambiente (NB, CONSULTE A ATUALIZAÇÃO RECENTE DE SDS de 16/12/2022 ed. 2).

Rotulagem de acordo com o Regoalemnto CE n. 1271/2008 [CLP]

Pictograma de perigo (CLP) :



GHS05 GHS07 GHS09

Aviso (CLP) : Perigo

Contém : Sulfato de zinco hepta-hidratado; Ácido cítrico mono-hidratado; Sulfato de cobre penta-hidratado.

Indicação de perigo (CLP) : H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

: P260 - Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.
P264 - Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
P273 - Evitar a libertação para o ambiente.
P303+P361+P353+P310 - SE ENTRAR EM CONTACTO CO M A PELE (ou o cabelo): retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água [ou tomar um duche]. Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P501 - Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

NÃO DEVE SER VENDIDO A GRANEL
NÃO DESCARTE O RECIPIENTE NO MEIO AMBIENTE

Peso líquido: xx Kg

Lote:

Fabricante: **FABBRICANTE:** Diachem S.p.A. - Via Tonale, 15
24061 Albano S. Alessandro (BG), Italia - Tel. 0363 355611

DIAGRO marchio di DIACHEM S.p.A.

Distribuído por: Jovagro - Produtos Agrícolas, S.A.
Zona Industrial de Taboeira - Apartado 3132 EC
3801-101 Aveiro
(+351) 234 343 300/1

JOVAGRO