BROTOMAX®

MEZCLA LÍQUIDA DE MICRONUTRIENTES MINERALES

PYME INNOVADORA

DESDE 1986

RESPETA LA *FAUNA* AUXILIAR

SIN PLAZO DE SEGURIDAD

AGROMÉTODOS

BROTOMAX®

La equilibrada proporción de los microelementos cobre, manganeso y zinc, complejados, convierten **BROTOMAX®** en un nutriente alto en energía de fácil asimilación por las hojas, ramas y raíces de las plantas, con acción estimulante y dotado de una completa sistemia ascendente y descendente.

CONTENIDO DECLARADO

Cobre (Cu) total como sulfato soluble en agua: 1,8% p/p (2,2% p/v)
Cobre complejado por lignosulfonato: 1,8% p/p (2,2% p/v)
Manganeso (Mn) total como sulfato soluble en agua: 0,7% p/p (0,9% p/v)
Manganeso complejado por lignosulfonato: 0,7% p/p (0,9% p/v)
Zinc (Zn) total como sulfato soluble en agua: 0,5% p/p (0,6% p/v)
Zinc complejado por lignosulfonato: 0,5% p/p (0,6% p/v)
Agente complejante: Ácido lignosulfónico

Densidad: 1,23 gr/cc
pH: 8,4

CULTIVOS Y APLICACIONES RECOMENDADAS

BROTOMAX® puede aplicarse en cítricos (mandarino, naranjo, limón, etc.), olivar, uva de mesa y vid de vinificación, frutales de hueso (albaricoquero, melocotonero, nectarino, cerezo, etc.), frutales de pepita (manzano, peral, etc.), frutales subtropicales (aguacate, caqui, kiwi, mango, etc.), frutos secos (almendro, nogal, pistacho, etc.), hortícolas tanto en invernadero como al aire libre (ajo, brócoli, cebolla, calabacín, lechuga, melón, pepino, pimiento, tomate, sandía, etc.), fresal, frutos rojos y bayas del bosque, así como en cultivos industriales (algodón, arroz, maíz, remolacha, etc.), forestales, ornamentales y áreas verdes.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar **vía foliar** a la dosis de 300 cc a 500 cc por 100 litros de agua, realizando una buena cobertura de toda la planta, incluyendo el tronco en cultivos leñosos.
En frutales de hueso se recomienda la aplicación vía riego.
Aplicar **vía riego** a una dosis habitual entre 3 y 5 L/Ha por cada aplicación.
En árboles jóvenes o plantones se aplicará a las dosis de 5 ml/pie y de 10 ml/pie para árboles adultos, por cada aplicación.
Como norma general, se recomienda realizar entre dos y tres aplicaciones de **BROTOMAX®** por ciclo de cultivo, en los momentos de mayor actividad vegetativa o necesidad energética.
Póngase en contacto con Agrométodos, o su distribuidor habitual, o con su asesor técnico, para obtener recomendaciones más específicas.

INCOMPATIBILIDADES

BROTOMAX® es compatible con la mayoría de preparados fitosanitarios empleados normalmente. No utilizar mezclado con aceites. **En frutales de hueso** no debe mezclarse con captan ni aminoácidos.

© Copyright AGROMETODOS, S.A. 1998.
El texto de esta etiqueta está protegido en el Registro de la Propiedad Intelectual.
Prohibida su reproducción total o parcial.

Fabricante y Titular de la Inscripción:

AGROMÉTODOS

C/ Dublín, 1 (Edificio Sevilla)
28232 LAS ROZAS (Madrid)
Tel. 91 352 43 96
agrometodos@agrometodos.com

ADVERTENCIA

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener el producto en su envase original etiquetado y cerrado en lugar fresco, seco y ventilado. Evitar el contacto con oxidantes fuertes. Temperatura de almacenamiento: 4° C y 30° C. Por favor, consulte también la información proporcionada en la ficha de datos de seguridad de materiales (FDSM).

GESTIÓN DE ENVASES

Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador o al depósito del agua de riego destinada a fertirrigación. Una vez vacío, el usuario está obligado a entregar este envase en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.



PRECAUCIONES DE EMPLEO Y MANIPULACIÓN. CONSEJOS DE PRUDENCIA

Producto Clasificado según el Reglamento CE 1272/2008. Consulte la información de seguridad en el envase y en la Ficha de Datos de Seguridad.

UFI:1D40-Q0GA-200U-JCUX

H318: Provoca lesiones oculares graves.
H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H411: Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P102: Mantener fuera del alcance de los niños.
P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización.
P273: Evitar su liberación al medio ambiente.
P280: Llevar guantes/ropa de protección/equipo de protección para los ojos/la cara/los oídos/...
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/...
P391: Recoger el vertido.
P501: Eliminar el contenido o el recipiente de acuerdo con las normativas locales/regionales/ internacionales.

Contiene: Sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de zinc (hidratado) (mono-, hexa y heptahidratado), sulfato de manganeso (II) hidratado.
Bajo en cadmio (Cd).
Bajo en cloruro.

USO RESERVADO A AGRICULTORES Y APLICADORES PROFESIONALES. ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO, LÉASE DETENIDAMENTE ESTA ETIQUETA. UTILÍCESE SOLAMENTE EN CASO DE RECONOCIDA NECESIDAD. NO SOBREPASAR LAS DOSIS RECOMENDADAS. A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE, SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO RECOMENDADAS DE ESTE PRODUCTO FERTILIZANTE.

Fecha de Fabricación:
N° de Lote:
Véanse impresos en el envase

20 Litros