MRQ subscale	Overall N = 221[1]	Intervention N = 108[1]	Placebo N = 113[1]	Cramer's V	p-value	add_stat_1	q-value
Contact planning	3 (1·4%)	3 (2·8%)	0 (0%)	0·120	0·12		>0·99
Contact preparation	1 (0·5%)	1 (0·9%)	0 (0%)	0·069	0·49		>0·99
Urge for CSA	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)				
Urge for CSAM	2 (0·9%)	1 (0·9%)	1 (0·9%)	0·002	>0·99		>0·99
Sexual tension	8 (3·6%)	6 (5·6%)	2 (1·8%)	0·101	0·16		>0·99
Control of sexual thoughts and activity	2 (0·9%)	2 (1·9%)	0 (0%)	0·098	0·24		>0·99
Unable to cope with the mental burden	20 (9·0%)	11 (10%)	9 (8·0%)	0·039	0·64		>0·99
Suicidal ideations	4 (1·8%)	1 (0·9%)	3 (2·7%)	0·065	0·62		>0·99
Mental crisis	16 (7·2%)	11 (10%)	5 (4·4%)	0·111	0·12		>0·99
Very bad current mood	8 (3·6%)	5 (4·6%)	3 (2·7%)	0·053	0·49		>0·99

[1] n (%)

Abbreviation: q-value = Holm-Bonferroni adjusted p-value.

MRQ subscale	Overall N = 221[1]	Intervention N = 108[1]	Placebo N = 113[1]	Cramer's V	p-value	add_stat_1	q-value
Contact planning	3 (1·4%)	3 (2·8%)	0 (0%)	0·120	0·12		>0·99