



Relación entre test de morley-adam y apreciación clínica en el diagnóstico de disfunción sexual sobre los 40 años

Badilla, Sebastián¹; Iñigo, Miranda²; Salazar, Aníbal³; Juan, López³; Cortés, Miguel³; Orellana, Sebastián⁴

1 - Hospital DIPRECA, Chile

2 - Universidad Diego Portales


3 - Clínica UROMED

4 - Universidad Mayor

INTRODUCCION : La información disponible acerca del síndrome de deficiencia androgénica masculina es reducida. Tampoco existen estudios de carácter investigativos realizados en nuestro país, a pesar que al población presenta un incremento cada vez más pronunciado hacia el predominio de la vejez . Los instrumentos diagnósticos clínicos existentes se basan sólo en la apreciación clínica obtenida a través de la anamnesis subjetiva del tratante, existiendo solo algunos cuestionarios validados en español para su aplicación, la gran mayoría de ellos en relación a disfunción eréctil, dejando de lado las demás disfunciones sexuales que son mas prevalentes. Por estas razones se hace necesaria la búsqueda de un test de medición objetiva para la toma de decisiones. El Test de Morley es un cuestionario estructurado y creado a través de la recopilación de síntomas y signos más comunes que existen en los artículos publicados a la fecha sobre síndrome de deficiencia androgénica.

MATERIAL Y METODOS: Se recolectaron los datos de las fichas clínicas de 154 pacientes que consultaron entre los años 2010 y 2013 por problemas de disfunción sexual. Se utilizó para la realización del dg.de las disfunciones sexuales (disfunción eréctil, eyaculación precoz y bajo deseo)la clínica (anamnesis y examen físico) y como instrumento objetivo el resultado del Test Morley para deficiencia androgénica. Los datos fueron analizados con el programa Rcommander para efectos del análisis uni y multivariado, se utilizó el test ChiCuadrado considerando significancia estadística $p < 0,05$.

RESULTADOS: El promedio de edad de los pacientes estudiados fue de 53,5(23-88) años. De estos pacientes, 146(95%) presentaron a los menos una Disfunción Sexual, en los cuales al aplicar el Test de Morley, 149(96,8%) resultaron positivos, demostrándose una asociación estadísticamente significativa entre la presencia de un test positivo y padecer alguna disfunción sexual ($p < 0,001$).



CONCLUSIONES: La presencia clínica de Disfunción Sexual tiene una estrecha correlación con el resultado positivo del Test de Morley, lo que podría constituir un apoyo a la hora de tomar la decisión de solicitar exámenes complementarios como los niveles de testosterona total, testosterona libre y HSBG.