

## **CONDICIONAMIENTO Y ESTABILIDAD**

ALAN REYES-FIGUEROA  
MÉTODOS NUMÉRICOS II

(AULA 04) 14.JULIO.2022

# Condicionamiento

En abstracto, un problema numérico es una función  $f : X \rightarrow Y$  entre espacios normados. ( $X$  = espacio de datos,  $Y$  = espacio de soluciones).  $f$  es generalmente no lineal, pero la mayoría de las veces es continua. Nos interesa el comportamiento de un problema  $f$  en un punto de datos particular  $\mathbf{x} \in X$ . La combinación de un problema  $f$  con datos prescritos  $\mathbf{x}$  es llamada una **instancia** del problema.

## Definición

Un problema (instancia) **bien condicionado** es un problema con la propiedad de que toda pequeña perturbación de  $\mathbf{x}$  conduce sólo a pequeños cambios en  $f(\mathbf{x})$ . Un problema **mal condicionado** es un problema con la propiedad de que una pequeña perturbación de  $\mathbf{x}$  conduce a un gran cambio en  $f(\mathbf{x})$ .

## Definición

Sea  $\delta \mathbf{x}$  una pequeña perturbación de  $\mathbf{x}$  y sea  $\delta f = f(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{x})$ . El **número de condición absoluta**  $\hat{\kappa} = \hat{\kappa}(\mathbf{x})$  del problema  $f$  en  $\mathbf{x}$  se define como

$$\hat{\kappa}(\mathbf{x}) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{\|\delta \mathbf{x}\| < \delta} \frac{\|\delta f\|}{\|\delta \mathbf{x}\|}. \quad (1)$$

Generalmente escribiremos (1) como

$$\hat{\kappa}(\mathbf{x}) = \sup_{\delta \mathbf{x}} \frac{\|\delta f\|}{\|\delta \mathbf{x}\|}. \quad (2)$$

en el entendido de que  $\delta \mathbf{x}$  y  $\delta f$  son infinitesimales.

Si  $f$  es diferenciable, podemos evaluar el número de condición por medio de la derivada de  $f$ . La definición de la derivada nos da, en primer orden,  $\delta f \approx Df(\mathbf{x}) \delta \mathbf{x}$ , (igualdad en el límite  $\|\delta \mathbf{x}\| \rightarrow 0$ ). Así, el número de condición absoluta se convierte en  $\hat{\kappa}(\mathbf{x}) = \|Df(\mathbf{x})\|$ .

## Definición

Sea  $\delta \mathbf{x}$  una pequeña perturbación de  $\mathbf{x}$  y sea  $\delta f = f(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) - f(\mathbf{x})$ . El **número de condición relativa**  $\kappa = \kappa(\mathbf{x})$  del problema  $f$  en  $\mathbf{x}$  se define como

$$\kappa(\mathbf{x}) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{\|\delta \mathbf{x}\| < \delta} \left( \frac{\|\delta f\|}{\|f(\mathbf{x})\|} / \frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \right) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \sup_{\|\delta \mathbf{x}\| < \delta} \frac{\|\delta f\| \|\mathbf{x}\|}{\|f(\mathbf{x})\| \|\delta \mathbf{x}\|}. \quad (3)$$

o asumiendo nuevamente que  $\delta \mathbf{x}$  y  $\delta f$  son infinitesimales

$$\kappa(\mathbf{x}) = \sup_{\delta \mathbf{x}} \frac{\|\delta f\| \|\mathbf{x}\|}{\|f(\mathbf{x})\| \|\delta \mathbf{x}\|}. \quad (4)$$

Si  $f$  es diferenciable, esta cantidad se expresa como  $\kappa(\mathbf{x}) = \frac{\|Df(\mathbf{x})\|}{\|f(\mathbf{x})\|/\|\mathbf{x}\|}$ .

Con estas definiciones, ya podemos decir que un problema es bien condicionado si  $\kappa$  es pequeño (e.g., 1, 10,  $10^2$ ), o mal condicionado si  $\kappa$  es grande (e.g.,  $10^6$ ,  $10^{16}$ ).

# Condicionamiento

**Ejemplo:** Considere el problema de calcular  $\sqrt{x}$ , para  $x > 0$ . El jacobiano de  $f : x \rightarrow \sqrt{x}$  es la derivada  $Df(x) = f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ , por lo que tenemos

$$\kappa(x) = \frac{\|Df(x)\|}{\|f(x)\|/\|x\|} = \frac{1/2\sqrt{x}}{\sqrt{x}/x} = \frac{1}{2},$$

de modo que este es un problema bien condicionado.

**Ejemplo:** Considere ahora el problema de obtener el escalar  $f(\mathbf{x}) = x_1 - x_2$  del vector  $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^T \in \mathbb{R}^2$ . Para simplificar, usamos la norma  $\infty$  en el espacio de datos  $\mathbb{R}^2$ . El jacobiano de  $f$  es

$$Df(\mathbf{x}) = (1 \quad -1) \Rightarrow \|Df(\mathbf{x})\|_{\infty} = 2.$$

Entonces, el número de condición es

$$\kappa(\mathbf{x}) = \frac{\|Df(\mathbf{x})\|}{\|f(\mathbf{x})\|/\|\mathbf{x}\|} = \frac{2 \max\{|x_1|, |x_2|\}}{|x_1 - x_2|}.$$

Esta cantidad es grande si  $|x_1 - x_2| \approx 0 \Rightarrow$ , el problema mal condicionado si  $x_1 \approx x_2$ .

# Condicionamiento

Otros problemas mal condicionados:

- Calcular las raíces de un polinomio.
- Resolver un sistema de ecuaciones lineales.
- Hallar los autovalores de una matriz no simétrica.

## Ejemplo:

El problema de calcular los autovalores de una matriz no simétrica, es a menudo mal acondicionado. Consideremos las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1000 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad A' = \begin{pmatrix} 1 & 1000 \\ 0.001 & 1 \end{pmatrix}.$$

Los autovalores de  $A$  son  $\lambda = 1$  con multiplicidad 2. Los autovalores de  $A'$  son  $\lambda_1 = 0$  y  $\lambda_2 = 2$ .

# Condicionamiento

Se puede mostrar que si  $A$  es una matriz simétrica (o una matriz normal), entonces sus autovalores están bien condicionados.

Por otro lado, se puede demostrar que si  $\lambda$  y  $\lambda + \delta\lambda$  son los correspondientes autovalores de  $A$  y  $A + \delta A$ , entonces  $|\delta\lambda| < \|\delta A\|_2$ , con igualdad si  $\delta A$  es un múltiplo de la matriz identidad (ejercicio 26.3).

Por lo tanto, el número de condición absoluta del problema de valores propios simétricos es  $\hat{\kappa} = 1$ , si se miden las perturbaciones en la norma 2, y el número de condición relativa es  $\kappa = \|A\|_2/|\lambda|$ .

# Condicionamiento

## Condición del producto matriz-vector:

Sea  $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$  y considere el problema de calcular  $A\mathbf{x}$  para un vector  $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ . Vamos a determinar un número de condición correspondiente a perturbaciones de  $\mathbf{x}$  pero no de  $A$ . Sea  $\|\cdot\|$  una norma vectorial arbitraria, y su respectiva norma matricial inducida. Trabajando directamente con la definición de  $\kappa$ , entonces

$$\kappa(\mathbf{x}) = \sup_{\delta \mathbf{x}} \left( \frac{\|A(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) - A\mathbf{x}\|}{\|A\mathbf{x}\|} / \frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \right) = \sup_{\delta \mathbf{x}} \left( \frac{\|A(\delta \mathbf{x})\|}{\|\delta \mathbf{x}\|} / \frac{\|A\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \right).$$

Esto es

$$\kappa(\mathbf{x}) = \|A\| \frac{\|\mathbf{x}\|}{\|A\mathbf{x}\|}. \quad (5)$$

Suponga en el cálculo anterior que  $A$  es una matriz cuadrada y no singular. Entonces podemos usar el hecho de que  $\|\mathbf{x}\|/\|A\mathbf{x}\| \leq \|A^{-1}\|$  en (5) para hallar una cota para  $\kappa$ :

$$\kappa(\mathbf{x}) \leq \|A\| \|A^{-1}\|. \quad (6)$$



o escribir

$$\kappa(\mathbf{x}) = \alpha \|A\| \|A^{-1}\|, \quad \text{con } \alpha = \frac{\|\mathbf{x}\|}{\|A\mathbf{x}\|} \bigg/ \|A^{-1}\|. \quad (7)$$

Para ciertas elecciones de  $\mathbf{x}$ , se tiene  $\alpha = 1$  y, en consecuencia,  $\kappa = \|A\| \|A^{-1}\|$ . Por ejemplo, si  $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$ , esto ocurrirá siempre que  $\mathbf{x}$  sea múltiplo del mínimo vector singular derecho de  $A$ .

De hecho,  $A$  no tiene por qué ser cuadrada. Si  $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$  con  $m > n$ , es de rango completo, las ecuaciones (6) y (7) se mantienen con  $A^{-1}$  reemplazada por la pseudoinversa  $A^+$ .

¿Qué pasa con el problema inverso: dada  $A$ , calcular  $A^{-1}\mathbf{b}$  a partir de la entrada  $\mathbf{b}$ ? Es idéntico al problema que acabamos de considerar, excepto que  $A$  se reemplaza por  $A^{-1}$ .

Resumimos esto en el siguiente resultado.

# Condicionamiento

## Teorema

Sea  $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$  no singular y considere la ecuación  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ . El problema de calcular  $\mathbf{b}$ , dado  $\mathbf{x}$ , tiene número de condición

$$\kappa(\mathbf{x}) = \|A\| \frac{\|\mathbf{x}\|}{\|\mathbf{b}\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\|, \quad (8)$$

con respecto a las perturbaciones de  $\mathbf{x}$ .

El problema de calcular  $\mathbf{x}$ , dado  $\mathbf{b}$ , tiene número de condición

$$\kappa(\mathbf{b}) = \|A^{-1}\| \frac{\|\mathbf{b}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|A\| \|A^{-1}\|, \quad (9)$$

con respecto a las perturbaciones de  $\mathbf{b}$ .

Si  $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$ , entonces la igualdad se mantiene en (8) si  $\mathbf{x}$  es un múltiplo del mínimo vector singular derecho de  $A$ , y la igualdad se cumple en (9) si  $\mathbf{b}$  es un múltiplo del mayor vector singular izquierdo de  $A$ .

# Número de Condición

## Definición

El producto  $\kappa(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$  se llama el **número de condición** de la matriz  $A$ .

Cuando  $\kappa(A)$  es pequeño, se dice que  $A$  está **bien condicionada**; si  $\kappa(A)$  es grande, decimos que  $A$  está **mal condicionada**.

En el caso en que  $A$  es singular, escribimos  $\kappa(A) = \infty$ .

En el caso de la 2-norma  $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$ , entonces  $\|A\| = \sigma_1$  y  $\|A^{-1}\| = \frac{1}{\sigma_m}$ .  
Entonces

$$\kappa(A) = \frac{\sigma_1}{\sigma_m}. \quad (10)$$

en la 2-norma. La relación  $\sigma_1/\sigma_m$  puede interpretarse como la excentricidad de la hiperelipse que es la imagen de la esfera unitaria de  $S^1 \subset \mathbb{R}^n$  bajo  $A$ .

# Número de Condición

Para una matriz rectangular  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ,  $m > n$ , de rango completo, el número de condición se define en términos de la pseudoinversa:  $\kappa(A) = \|A\| \|A^+\|$ . Como  $A^+$  está motivado por problemas de mínimos cuadrados, esta definición es más útil en el caso  $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$ , donde tenemos

$$\kappa(A) = \frac{\sigma_1}{\sigma_n}. \quad (11)$$

**Pregunta:** En el teorema anterior, fijamos  $A$  y perturbamos los vectores  $\mathbf{x}$  o  $\mathbf{b}$ . ¿Qué ocurre si ahora perturbamos  $A$ ?

Dejamos fijo  $\mathbf{b}$  y consideramos el comportamiento del problema  $A \rightarrow \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ , cuando  $A$  se perturba por un infinitesimal  $\delta A$ . Entonces  $\mathbf{x}$  debe cambiar por un infinitesimal  $\delta \mathbf{x}$ , donde

$$(A + \delta A)(\mathbf{x} + \delta \mathbf{x}) = \mathbf{b}.$$

Usando la igualdad  $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$  y eliminando el término doblemente infinitesimal  $(\delta A)(\delta \mathbf{x})$ , obtenemos  $(\delta A)\mathbf{x} + A(\delta \mathbf{x}) = \mathbf{0}$ , es decir,  $\delta \mathbf{x} = -A^{-1}(\delta A)\mathbf{x}$ .

# Número de Condición

Esta ecuación implica que  $\|\delta \mathbf{x}\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta A\| \|\mathbf{x}\|$ , o equivalentemente

$$\frac{\|\delta \mathbf{x}\|}{\|\mathbf{x}\|} \bigg/ \frac{\|\delta A\|}{\|A\|} \leq \|A^{-1}\| \|A\| = \kappa(A).$$

La igualdad en esta cota se cumple siempre que  $\delta A$  sea tal que

$$\|A^{-1}(\delta A)\mathbf{x}\| = \|A^{-1}\| \|\delta A\| \|\mathbf{x}\|,$$

y se puede demostrar mediante el uso de normas duales (ejercicio 3.6) que para cualquier  $A$  y cualquier norma  $\|\cdot\|$ , tales perturbaciones  $\delta A$  existen. Esto nos lleva a lo siguiente resultado.

## Teorema

Sea  $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$  fijo y considere el problema de calcular  $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$ , donde  $A$  es cuadrada y no singular. El número de condición de este problema con respecto a las perturbaciones en  $A$  es

$$\kappa = \|A^{-1}\| \|A\| = \kappa(A).$$