


ESTADÍSTICOS

ALAN REYES-FIGUEROA
APRENDIZAJE ESTADÍSTICO

(AULA 03) 22.ENERO.2025



Resúmenes de distribuciones:

- localización (promedio, rango, soporte o dominio);
- variabilidad (desviación estándar, varianza, entropía);
- forma de la distribución (kurtosis, histogramas, diagramas de probabilidad PP o QQ);
- simetría (sesgo, coeficiente de asimetría);
- En el caso de más variables: nos interesa algo que mida el grado de relación entre ellas (covarianza, correlación, información mutua).

Estadísticos

Valores numéricos (o vectoriales) en términos de la variable aleatoria.
Resumen de una distribución.

Existen estadísticos con varios propósitos: localización, variabilidad, ...

Promedio: El **promedio** o **esperanza** (*expectativa, valor esperado*) de una variable aleatoria discreta X , $\mathbb{E}(X)$, se define como

$$\mathbb{E}(X) = \sum_x x \mathbb{P}(X = x).$$

en caso de que la suma exista.

Comentario: En la vida cotidiana usamos como promedio de $\{x_i\}_{i=1}^n$ a

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Esperanza

En general,

Definición

Dada una función $g(\cdot)$, se define la **esperanza** $\mathbb{E}(g(X))$ como:

$$\mathbb{E}(g(X)) = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x),$$

en caso de que la suma exista.

Proposición

1. (Linealidad) $\mathbb{E}(aX_1 + bX_2) = a\mathbb{E}(X_1) + b\mathbb{E}(X_2)$.
2. (Independencia) Si X_1, X_2 son independientes, entonces $\mathbb{E}(X_1X_2) = \mathbb{E}(X_1) \mathbb{E}(X_2)$.

Esperanza

Prueba:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(aX_1 + bX_2) &= \sum_{\omega} (aX_1 + bX_2)(\omega) \mathbb{P}(\omega) = a \sum_{\omega} X_1(\omega) \mathbb{P}(\omega) + b \sum_{\omega} X_2(\omega) \mathbb{P}(\omega) \\ &= a\mathbb{E}(X_1) + b\mathbb{E}(X_2).\end{aligned}$$

Como $X_1 \perp X_2$, entonces $\mathbb{P}(X_1 = x_1, X_2 = x_2) = \mathbb{P}(X_1 = x_1) \mathbb{P}(X_2 = x_2)$. Luego

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(X_1 X_2) &= \sum_{(x_1, x_2)} (X_1 X_2)(\omega) \mathbb{P}(X_1 = x_1, X_2 = x_2) \\ &= \sum_{(x_1, x_2)} X_1(x_1) X_2(x_2) \mathbb{P}(X_1 = x_1) \mathbb{P}(X_2 = x_2) \\ &= \left(\sum_{x_1} X_1(x_1) \mathbb{P}(x_1) \right) \left(\sum_{x_2} X_2(x_2) \mathbb{P}(x_2) \right) = \mathbb{E}(X_1) \mathbb{E}(X_2).\end{aligned}$$

Ejemplo

a) ¿Cuál es la esperanza de una v.a. constante?

b) Calcular $\mathbb{E}(3X + 2\mathbb{E}X)$.

Solución:

a) $\mathbb{E}(X) = \sum_x x \mathbb{P}(X = x) = c, \mathbb{P}(X = c) = c(1) = c.$

b) $\mathbb{E}(3X + 2\mathbb{E}X) = 3\mathbb{E}(X) + 2\mathbb{E}(\mathbb{E}X) = 3\mathbb{E}(X) + 2\mathbb{E}(X) = 5\mathbb{E}(X).$

Media, mediana y moda

Media: Sea una variable aleatoria discreta X con probabilidad \mathbb{P} . La **esperanza** (*expectativa, valor esperado*) de X se define como

$$\mathbb{E}(X) = \sum_x x \mathbb{P}(X = x).$$

Mediana: Una **mediana** de X es cualquier valor $t \in \mathbb{R}$ que satisface $F_X(t) = \frac{1}{2}$. Dicho de otra manera, son las preimágenes $F_X^{-1}(1/2)$.

Obs! F_X en general no es invertible!! Denotamos $Q_X : [0, 1] \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ a la *función de cuantiles*, la inversa generalizada de F_X :

$$Q_X(\alpha) = \sup\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) \leq \alpha\}, \quad \text{para } 0 < \alpha < 1.$$

Media, mediana y moda

Obs! Existen cuatro formas de definir la función de cuantiles. Para $0 < \alpha < 1$:

- $Q_X(\alpha) = \sup\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) \leq \alpha\}.$
- $Q_X(\alpha) = \sup\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) < \alpha\}.$
- $Q_X(\alpha) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) \geq \alpha\}.$
- $Q_X(\alpha) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F_X(x) > \alpha\}.$

En general, las cuatro definiciones dan resultados distintos (aunque pueden coincidir en función de las propiedades de la distribución y del punto en que se aplica).

Moda: Una **moda** de la distribución de X es cualquier máximo local de f_X .
(unimodal, bimodal, ...)

Centros y localización

El valor esperado $\mathbb{E}(X)$ tiene otra propiedad importante: es el valor constante que minimiza la suma de errores cuadrados. Dado $\{x_i\}_{i=1}^n$ la imagen de la v.a. X , sea $p_i = \mathbb{P}(X = x_i)$. Queremos

$$\text{minimizar } J(c) = \text{minimizar } \sum_{i=1}^n p_i (x_i - c)^2.$$

Solución: Derivando con respecto de c , obtenemos

$$J'(c) = 2 \sum_{i=1}^n p_i (x_i - c) = 0.$$

$$\text{Luego } \sum_{i=1}^n p_i x_i = c \sum_{i=1}^n p_i = c \Rightarrow c = \sum_{i=1}^n p_i x_i = \sum_{i=1}^n x_i \mathbb{P}(X = x_i) = \mathbb{E}(X).$$

- El valor que minimiza $\sum_{i=1}^n p_i |x_i - c|_1$ es: la *mediana* de X .
- El valor que minimiza $\sum_{i=1}^n p_i |x_i - c|_0$ es: la *moda* de X .

Esperanza condicional

Definición

Para la v.a. X y para un evento $A \in \mathcal{F}$, se define el **promedio condicional** (o **esperanza condicional**) de X dado A como

$$\mathbb{E}(X | A) = \sum_x x \mathbb{P}(X = x | A).$$

Definición

Para las v.a. X y Y , se define la **esperanza condicional** de X dado que Y es igual a un valor y , como

$$\mathbb{E}(X | Y = y) = \sum_x x \mathbb{P}(X = x | Y = y).$$

Esperanza condicional

En general, definimos $\mathbb{E}(g(X) \mid Y = y) = \sum_x g(x) \mathbb{P}(X = x \mid Y = y)$.

Proposición

Sean X, Y, Z v.a., $a, b \in \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

1. $\mathbb{E}(a \mid Y) = a$.
2. $\mathbb{E}(aX + bZ \mid Y) = a\mathbb{E}(X \mid Y) + b\mathbb{E}(Z \mid Y)$.
3. $\mathbb{E}(X \mid Y) \geq 0$ si $X \geq 0$.
4. $\mathbb{E}(X \mid Y) = \mathbb{E}(X)$ si X, Y son independientes.
5. $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid Y)) = \mathbb{E}(X)$.
6. $\mathbb{E}(Xg(Y) \mid Y) = g(Y)\mathbb{E}(X \mid Y)$. En particular, $\mathbb{E}(g(Y) \mid Y) = g(Y)$.
7. $\mathbb{E}(X \mid Y, g(Y)) = \mathbb{E}(X \mid Y)$.
8. $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X \mid Y, Z) \mid Y) = \mathbb{E}(X \mid Y)$.

Proposición (Ley de la probabilidad total para esperanzas)

Sean X, Y v.a. discretas, entonces

$$\mathbb{E}(X) = \sum_y \mathbb{E}(X \mid Y = y) \mathbb{P}(Y = y).$$

Ejemplo: Alguien anda perdido en la subterránea de Guanajuato. Está en un cruce con 3 opciones. Un camino le lleva a la salida en 10 minutos en promedio, un segundo camino le regresa a su lugar en promedio 15 minutos y un tercer camino le regresa a su lugar en promedio 5 minutos. Siempre elige alguna opción, independiente del pasado. ¿Cuánto va a tardar en promedio para salir?

Esperanza condicional

Solución:

- Opción 1: salida del subterráneo en 10m promedio.
- Opción 2: regresa al mismo lugar en 15m promedio.
- Opción 3: regresa al mismo lugar en 5m promedio.

Definimos E_i = elegir opción i , $i = 1, 2, 3$. T la v.a. = tiempo de salida.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(T) &= \sum_{i=1}^3 \mathbb{E}(T \mid E_i) \mathbb{P}(E_i) \\&= \mathbb{E}(T \mid E_1) \cdot \frac{1}{3} + \mathbb{E}(T \mid E_2) \cdot \frac{1}{3} + \mathbb{E}(T \mid E_3) \cdot \frac{1}{3} \\&= (10m) \cdot \frac{1}{3} + (15m + \mathbb{E}(T)) \cdot \frac{1}{3} + \mathbb{E}(5m + \mathbb{E}(T)) \cdot \frac{1}{3} \\&= \frac{10}{3}m + \frac{15}{3}m + \frac{5}{3}m + \frac{2}{3}\mathbb{E}(T).\end{aligned}$$

Luego, $\frac{1}{3}\mathbb{E}(T) = 10m \Rightarrow \mathbb{E}(T) = 30m$.

Definición

Sea X una v.a. en \mathbb{R} . Definimos su **varianza** como:

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)^2] = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2,$$

en caso de que este valor esperado exista.

Propiedades:

- $\text{Var}(X) \geq 0$.
- $\text{Var}(aX) = a^2 \text{Var}(X)$.
- Si X_1, X_2 son independientes, entonces

$$\text{Var}(aX_1 + bX_2) = a^2 \text{Var}(X_1) + b^2 \text{Var}(X_2).$$

Prueba:

-

$$Var(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}X)^2) = \sum_x (\cdot)^2 \mathbb{P}(\cdot) \geq 0,$$

por ser suma de términos no-negativos.

-

$$\begin{aligned} Var(aX) &= \mathbb{E}((aX - \mathbb{E}(aX))^2) = \mathbb{E}((aX - a\mathbb{E}X)^2) \\ &= \mathbb{E}(a^2(X - \mathbb{E}X)^2) = a^2\mathbb{E}((X - \mathbb{E}X)^2) \\ &= a^2Var(X). \end{aligned}$$

Prueba: Suponga que X_1, X_2 son independientes. Entonces,
 $\mathbb{E}(X_1 X_2) = \mathbb{E}(X_1) \mathbb{E}(X_2)$. Luego

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX_1 + bX_2) &= \mathbb{E}([(aX_1 + bX_2) - \mathbb{E}(aX_1 + bX_2)]^2) \\ &= \mathbb{E}([a(X_1 - \mathbb{E}X_1) + b(X_2 - \mathbb{E}X_2)]^2) \\ &= \mathbb{E}(a^2(X_1 - \mathbb{E}X_1)^2 + b^2(X_2 - \mathbb{E}X_2)^2 + 2ab(X_1 - \mathbb{E}X_1)(X_2 - \mathbb{E}X_2)) \\ &= a^2\mathbb{E}((X_1 - \mathbb{E}X_1)^2) + b^2\mathbb{E}((X_2 - \mathbb{E}X_2)^2) + 2ab\mathbb{E}((X_1 - \mathbb{E}X_1)(X_2 - \mathbb{E}X_2)) \\ &= a^2\text{Var}(X_1) + b^2\text{Var}(X_2) + 2ab\mathbb{E}(X_1X_2 - X_1\mathbb{E}X_2 - (X_2\mathbb{E}X_1 + (\mathbb{E}X_1)(\mathbb{E}X_2))) \\ &= a^2\text{Var}(X_1) + b^2\text{Var}(X_2) + 2ab(\mathbb{E}(X_1X_2) - (\mathbb{E}X_1)(\mathbb{E}X_2) - (\mathbb{E}X_1)(\mathbb{E}X_2) + (\mathbb{E}X_1)(\mathbb{E}X_2)) \\ &= a^2\text{Var}(X_1) + b^2\text{Var}(X_2) + 2ab(\mathbb{E}(X_1X_2) - (\mathbb{E}X_1)(\mathbb{E}X_2)) = a^2\text{Var}(X_1) + b^2\text{Var}(X_2). \end{aligned}$$

Definición

Dada dos variables aleatorias X, Y (definidas sobre el mismo espacio). Definimos su **covarianza** como:


$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}X)(Y - \mathbb{E}Y)],$$

en caso de que este valor esperado exista.

Propiedades:

- $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$.
- $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$.
- $\text{Cov}(aX, X) = a\text{Var}(X)$.
- Si X, Y son independientes, entonces $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

Covarianza



Definición

Dada dos variables aleatorias X, Y , definimos su **correlación** (o **coeficiente de correlación**) como:


$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X) \text{Var}(Y)}}.$$

Propiedades:

- $\rho(X, Y) = \rho(Y, X)$.
- $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$.
- $\rho(aX, bY) = \rho(X, Y)$.
- $\rho(aX, X) = \text{sign}(a)$.
- Si X, Y son independientes, entonces $\rho(X, Y) = 0$.

Correlación


Por ejemplo, para el caso de dos v.a. normales X y Y :



tenemos



Correlación



Entropía

Ya vimos que la varianza presenta limitaciones (igual que la covarianza).

Punto de partida: medir la sorpresa asociada el evento $X = x$, $I(x)$. La entropía es el valor esperado de esta sorpresa $\mathbb{E}(I(x))$.

¿Cómo medimos esta sorpresa o incerteza?

- Un evento que ocurre con alta probabilidad no genera sorpresa.
- Un evento que ocurre con baja probabilidad genera mayor sorpresa (más entre menor es \mathbb{P}).

¿Cómo definir $I(x)$? Tenemos varias alternativas simples

$$I(x) = \frac{1}{\mathbb{P}(X = x)}, \quad I(x) = 1 - \mathbb{P}(X = x), \quad I(x) = -\log \mathbb{P}(X = x).$$

Definición

Sea X una v.a. discreta. Definimos su **entropía de Shannon** como:

$$H(X) = - \sum_x \mathbb{P}(X = x) \log \mathbb{P}(X = x).$$

Comentario: Shannon definió la entropía en un contexto de teoría de la información (bits), usa \log_2 . Si $p = 0$, usualmente se define $p \log p = 0$.

Definición

Sea X una v.a. discreta. Definimos su **entropía de Gini o coeficiente de Gini** por:

$$G(X) = \sum_x \mathbb{P}(X = x) (1 - \mathbb{P}(X = x)) = 1 - \sum_x \mathbb{P}(X = x)^2.$$

1. Dibuja dos distribuciones o variables aleatorias (discretas) distintas, con mismo promedio y entropía, pero varianza diferentes.
2. Toma una v.a. $X \in \{0, 1\}$. Calcular la varianza y la entropía de Shannnon y de Gini en función de $p = \mathbb{P}(X = 1)$.
Compara la gráficas de $H(X)$ y $2G(X)$.
3. ¿Cuáles son los valores mínimo y máximo para $H(X)$ y $G(X)$?

Entropía condicional

Definición

Sean X, Y dos variables aleatorias, la **entropía condicional** de X dado Y es

$$H_Y(X) = \mathbb{E}H(X | Y) = - \sum_y \left(\sum_x \mathbb{P}(X = x | Y = y) \log \mathbb{P}(X = x | Y = y) \right) \mathbb{P}(Y = y).$$

Obs. No es simétrica: $H_Y(X) \neq H_X(Y)$.

Definición

Sean X, Y dos variables aleatorias, la **información mutua** de X y Y está dada por

$$I(X, Y) = H(X) - H_Y(X).$$

Proposición


$$I(X, Y) = I(Y, X).$$

Entropía

Definición

La **entropía conjunta** de X y Y es

$$H(X, Y) = - \sum_x \sum_y \mathbb{P}(x, y) \log \mathbb{P}(x, y).$$



Un diagrama de Venn que muestra relaciones aditivas y sustractivas entre varias medidas de información asociadas con las variables X y Y . El área contenida por ambos círculos es la entropía conjunta $H(X, Y)$. El círculo de la izquierda (rojo y violeta) es la entropía individual $H(X)$, siendo el rojo la entropía condicional $H_Y(X)$. El círculo de la derecha (azul y violeta) es $H(Y)$, y el azul es $H_X(Y)$. El violeta es la información mutua $I(X, Y)$.

Entropía

Definición

Sean P una distribución discreta de probabilidad, la **entropía** de P es

$$H(P) = - \sum_x P(x) \log P(x).$$

Definición

Sean P, Q dos distribuciones discretas de probabilidad, la **entropía cruzada** (cross-entropy) de P y Q es

$$H(P, Q) = - \sum_x P(x) \log Q(x).$$

Además, la **divergencia de Kullback-Leibler** de P y Q se define como

$$\begin{aligned} D_{KL}(P \parallel Q) &= - \sum_x P(x) \log \frac{Q(x)}{P(x)} \\ &= - \sum_x P(x) \log Q(x) + \sum_x P(x) \log P(x) = H(P, Q) - H(P). \end{aligned}$$

Distribuciones conjuntas

Cuando tenemos varias variables aleatorias (definida sobre el mismo espacio $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$), podemos estudiar la distribución conjunta de dichas variables, esto es, la distribución de (X, Y) .

Definición

La **distribución conjunta** de las v.a. X y Y se define por


$$F_{X,Y}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

En el caso que X y Y son v.a. discretas, su **probabilidad conjunta** es

$$\mathbb{P}_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

En el caso en que X y Y son continuas, su **densidad conjunta** es

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{X,Y}(x, y)}{\partial y \partial x}, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$



La normal bivariada es la distribución conjunta entre dos normales.

Distribuciones marginales

Cuando tenemos varias variables aleatorias y su distribución conjunta, podemos “regresar” a las distribuciones originales.

Definición

Dadas X y Y v.a. discretas y su distribución conjunta $\mathbb{P}_{X,Y}$, la **distribución marginal** para X y para Y son

$$\mathbb{P}_X(x) = \sum_y \mathbb{P}(x, y), \quad \mathbb{P}_Y(y) = \sum_x \mathbb{P}(x, y).$$

En el caso que X y Y son v.a. continuas, y $f_{x,y}$ es su densidad conjunta, la **densidad marginal** de X y de Y son

$$f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dy, \quad f_Y(y) = \int_{\mathbb{R}} f(x, y) dx.$$

Distribuciones marginales

Ahora, si X, Y toman valores en $[a, b] \times [c, d]$, la **distribución marginal** se calcula como

$$F_{X,Y}(x, y) = \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \int_a^x \int_b^y f_{X,Y}(s, t) ds dt.$$

luego $F_X(x) = F_{X,Y}(x, d)$, $F_Y(y) = F_{X,Y}(b, y)$, y en el caso $b = \infty$ ó $d = \infty$

$$F_X(x) = \lim_{d \rightarrow \infty} F_{X,Y}(x, d), \quad F_Y(y) = \lim_{b \rightarrow \infty} F_{X,Y}(b, y).$$

Distribuciones condicionales

Definición

Sean X, Y v.a. discretas tales que $\mathbb{P}(X = x) > 0$. La **probabilidad condicional** de Y dado $X = x$ es

$$\mathbb{P}_{Y|X}(y | x) = \mathbb{P}(Y = y | X = x) = \frac{\mathbb{P}(Y = y, X = x)}{\mathbb{P}(X = x)} = \frac{\mathbb{P}_{X,Y}(x, y)}{\mathbb{P}_X(x)}.$$

En el caso continuo, la **densidad condicional** de Y dado X es

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(x)}.$$

Podemos escribir

- $\mathbb{P}_X(x) = \sum_y \mathbb{P}_{X|Y}(x | y) \mathbb{P}_Y(y).$
- $f_X(x) = \int_{\mathbb{R}} f_{X|Y}(x | y) f_Y(y) dy.$

Independencia

Definimos la independencia de variables aleatorias de la siguiente manera:

Definición

*Dos variables aleatorias discretas X y Y definidas sobre el mismo espacio Ω son **independientes** si*

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x) \mathbb{P}(Y = y), \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

o equivalentemente, $\mathbb{P}_{X,Y} = \mathbb{P}_X \cdot \mathbb{P}_Y$.

*En general, las v.a. discretas X_1, \dots, X_n son **mutuamente independientes** si*

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i = x_i), \quad \forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}.$$

o equivalentemente, $\mathbb{P}_{X_1, \dots, X_n} = \mathbb{P}_{X_1} \cdot \mathbb{P}_{X_2} \cdot \dots \cdot \mathbb{P}_{X_n}$.

Independencia

Definición

Dos variables aleatorias continuas X y Y definidas sobre el mismo espacio Ω son **independientes** si

$$F_{X,Y}(x,y) = F_X(x) F_Y(y), \quad \forall x,y \in \mathbb{R}.$$

En general, las v.a. continuas X_1, \dots, X_n son **mutuamente independientes** si

$$F_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F_{X_i}(x_i), \quad \forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}.$$

Se puede mostrar que esto es equivalente a

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) f_Y(y), \quad \forall x,y \in \mathbb{R},$$

$$f_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f_{X_i}(x_i), \quad \forall x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}.$$

Independencia

Casi siempre, una condición necesaria para que las variables X y Y sean independientes es que el *soporte* de (X, Y) (la región de \mathbb{R}^2 donde $\mathbb{P}_{X,Y} > 0$) sea un dominio rectangular, o producto de uniones de intervalos:

Ejemplo:

¿Cuáles variables X y Y son independientes?

