

## **PROPIEDADES DE INTEGRABILIDAD**

ALAN REYES-FIGUEROA

TEORÍA DE LA MEDIDA E INTEGRACIÓN

(AULA 04) 23.ENERO.2023

# Modificación de la Integral

## Teorema (Modificación de la Integral)

Sean  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  limitadas. Si la derivada  $g'$  existe y es continua en  $(a, b)$ , y  $f$  es  $g$ -integrable en  $[a, b]$ , entonces el producto  $fg$  es Riemann-integrable en  $[a, b]$ , y

$$\int_a^b f dg = \int_a^b f(t) g'(t) dt.$$

**Prueba:** Como  $g'$  es continua en  $[a, b]$ , entonces  $g'$  es uniformemente continua.

Sea  $\varepsilon > 0$ , y tomemos una partición  $P = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$  de  $[a, b]$ , tal que si

$$\xi_i, \zeta_i \in [t_i, t_{i-1}] \quad \implies \quad |g'(\xi_i) - g'(\zeta_i)| < \frac{\varepsilon}{\|f\|(b-a)},$$

donde  $\|f\| = \sup f$  en  $[a, b]$ .

Consideramos la diferencia entre las sumas  $s(P, f, g)$  y  $s(P, fg')$ , usando los puntos  $\xi_i$  como representantes de  $P$ :

$$|s(P, f, g) - s(P, fg')| = \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) (g(t_i) - g(t_{i-1})) - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g'(\xi_i) (t_i - t_{i-1}) \right|.$$

Por el teorema del valor medio, existe  $\zeta_i \in (t_{i-1}, t_i)$  tal que  $g(t_i) - g(t_{i-1}) = g'(\zeta_i) (t_i - t_{i-1})$ . Luego,

$$\begin{aligned} |s(P, f, g) - s(P, fg')| &= \left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g'(\zeta_i) (t_i - t_{i-1}) - \sum_{i=1}^n f(\xi_i) g'(\xi_i) (t_i - t_{i-1}) \right| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)| |g'(\zeta_i) - g'(\xi_i)| (t_i - t_{i-1}) \\ &\leq \sum_{i=1}^n \|f\| \cdot \frac{\varepsilon}{\|f\|(b-a)} (t_i - t_{i-1}) = \varepsilon. \end{aligned}$$

# Propiedades

Del argumento anterior, para  $\varepsilon > 0$ , existe una partición  $P'$  de  $[a, b]$  tal que cualquier refinamiento  $P$  cumple

$$|s(P, f, g) - s(P, fg')| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Por otro lado, como  $f$  es  $g$ -integrable, existe una partición  $P''$  de  $[a, b]$ , tal que todos sus refinamientos  $P$  cumplen

$$\left| s(P, f, g) - \int_a^b f dg \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Tomando un refinamiento cualquiera de  $P' \cup P''$ , obtenemos que

$$\left| s(P, fg') - \int_a^b f dg \right| \leq |s(P, fg') - s(P, f, g)| + \left| s(P, f, g) - \int_a^b f dg \right| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

Portanto,  $\lim_{||P|| \rightarrow 0} s(P, fg')$  existe,  $fg'$  es Riemann-integrable y

$$\int_a^b f dg = \lim_{||P|| \rightarrow 0} s(P, fg') = \int_a^b f(t)g'(t) dt. \quad \square$$

# Ejemplos

**Ejemplo 1:** Calcular  $\int_0^{\pi/2} \sin t \, d \sin t$ .

**Ejemplo 2:** Calcular  $\int_0^N x^2 \, d(x - \lfloor x \rfloor)$ .

# Variación Limitada

## Definición

Sea  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  una función, y sea  $P = \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$  una partición de  $[a, b]$ . Definimos la **variación** de  $f$  respecto de  $P$  como

$$v_f(P) = \sum_{i=1}^n |f(t_i) - f(t_{i-1})|.$$

## Definición

Sean  $f$  y  $P$  como arriba. Decimos que la función  $f$  es **de variación limitada (de variación acotada)**, cuando el conjunto  $\{v_f(P) : P \text{ es partición de } [a, b]\}$  es limitado.

En ese caso, definimos la **variación total** de  $f$  en  $[a, b]$  por

$$V_f[a, b] = \sup\{v_f(P) : P \text{ es partición de } [a, b]\}.$$

Denotamos por **BV** $[a, b]$  al conjunto de las funciones de variación limitada en  $[a, b]$ .

## Teorema (Propiedades)

Sean  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $P, Q$  particiones de  $[a, b]$ . Entonces:

- i)  $P \subseteq Q \Rightarrow v_f(P) \leq v_f(Q)$ .
- ii) Si  $f$  es monótona no-decreciente, entonces  $v_f(P) = f(b) - f(a)$ . Si  $f$  es monótona no-creciente, entonces  $v_f(P) = f(a) - f(b)$ .  
En cualquiera de los dos casos,  $f$  es de variación limitada, y  $V_f[a, b] = |f(b) - f(a)|$ .
- iii) Si  $f$  es constante, entonces  $v_f(P) = 0$ . En este caso,  $f$  es de variación limitada y  $V_f[a, b] = 0$ .
- iv) Si  $f$  es Lipschitz, con constante  $L$ , entonces  $f$  es de variación limitada y  $V_f[a, b] \leq L(b - a)$ .
- v) Si  $f$  es diferenciable y tal que  $|f'(t)| \leq L$  en  $[a, b]$ , entonces  $f$  es de variación limitada y  $V_f[a, b] \leq L(b - a)$ .

# Variación Limitada

**Ejemplo:** Consideremos la función  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0; \\ \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0. \end{cases}$$

Mostramos que  $f$  no es de variación limitada en  $[0, 1]$ .



## Proposición

Sean  $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  funciones en  $BV[a, b]$ ,  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . Entonces, valen las siguientes propiedades:

- i)  $|f(x)| \leq |f(a)| + V_f[a, b]$ , para todo  $x \in [a, b]$ .
- ii)  $\alpha f \in BV[a, b]$  y  $V_{\alpha f}[a, b] = |\alpha| V_f[a, b]$ .
- iii)  $f + g \in BV[a, b]$  y  $V_{f+g}[a, b] \leq V_f[a, b] + V_g[a, b]$ .
- iv)  $fg \in BV[a, b]$  y  $V_{fg}[a, b] \leq \|g\| V_f[a, b] + \|f\| V_g[a, b]$ .
- v)  $BV[a, b]$  es un  $\mathbb{R}$ -espacio vectorial.
- vi) La función  $f \rightarrow V_f[a, b]$  no es una norma para  $BV[a, b]$ . Sin embargo,  $f \rightarrow \|f\|_{BV} = |f(a)| + V_f[a, b]$  sí lo es.

**Prueba:** Ejercicio!  $\square$