

Teoría de Números 2023

Lista 01

07.julio.2023

1. Muestre que el cubo de cualquier entero puede escribirse como diferencia de dos cuadrados.
(Sugerencia: observe que $n^3 = (1^3 + 2^3 + \dots + n^3) - (1^3 + 2^3 + \dots + (n-1)^3)$.)

2. Si la secuencia de números a_n está definida por $a_1 = 11$, $a_2 = 21$ y $a_n = 3a_{n-1} - 2a_{n-2}$, para todo $n \geq 3$, pruebe que


$$a_n = 5 \cdot 2^n + 1, \quad \forall n \geq 1.$$

3. Para $n \geq 1$, verificar que $1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2 = \binom{2n+1}{3}$.

4. **Números Triangulares.** Cada uno de los números

$$1 = 1, \quad 3 = 1 + 2, \quad 6 = 1 + 2 + 3, \quad 10 = 1 + 2 + 3 + 4, \quad \dots$$

representa el número de puntos que se pueden configurar en triángulos equiláteros



Esto llevó a los griegos a llamar a un número T_n *triangular* si es igual a la suma de enteros consecutivos, comenzando de 1. Esto es


$$T_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n.$$

Compruebe las siguientes afirmaciones relacionadas con números triangulares.

- a) Un número es triangular si, y sólo si, es de la forma $\frac{n(n+1)}{2}$, para algún $n \geq 1$. (Pitágoras, *circa* 550 B.C.)
 - b) El entero n es un número triangular si, y sólo si, $8n + 1$ es un cuadrado perfecto. (Plutarco, *circa* 100 A.D.)
 - c) La suma de dos números triangulares consecutivos es un cuadrado perfecto. (Nicománo, *circa* 100 A.D.)
 - d) Si n es un número triangular, también lo son $9n + 1$, $25n + 3$, y $49n + 6$. (Euler, 1775)
5. Pruebe que la suma de los recíprocos de los primeros n números triangulares es menor que 2; esto es

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{T_k} = \frac{1}{1} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{T_n} < 2, \quad \forall n \geq 1.$$

(Sugerencia: Observe que $\frac{2}{n(n+1)} = 2\left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right)$.)



6. **Números Pentagonales.** Cada uno de los números

$$1, \quad 5 = 1 + 4, \quad 12 = 1 + 4 + 7, \quad 22 = 1 + 4 + 7 + 10, \quad \dots$$

representa el número de puntos que pueden configurarse sobre un pentágono

Los antiguos griegos llamaron a éstos *números pentagonales*. Si p_n denota el n -ésimo número pentagonal, donde $p_1 = 1$ y $p_n = p_{n-1} + (3n - 2)$ para $n \geq 2$; pruebe que

$$p_n = \frac{n(3n - 1)}{2}, \quad \text{para todo } n \geq 1.$$

7. 99 estudiantes aburridos se turnan para caminar por un pasillo que contiene una fila de casilleros cerrados, numerados del 1 al 99. El primer estudiante abre todos los casilleros; el segundo alumno cierra todos los casilleros numerados 2, 4, 6, 8, \dots , 98; el tercer alumno opera en los casilleros numerados 3, 6, 9, \dots , 99: si un casillero estaba cerrado, lo abre, y si un casillero estaba abierto, lo cierra. Para el k -ésimo alumno, éste trabaja en los casilleros numerados por múltiplos de k : si un el casillero estaba cerrado, lo abre, y si estaba abierto, lo cierra.

¿Cuál es el número de casilleros que permanecen abiertos después de que todos los estudiantes terminan sus caminatas?

8. Encontrar todos los enteros positivos n para los cuales el número obtenido de n al borrar el último dígito, es un divisor de n .
