ISEP INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DO PORTO

App Móvel de CBT-I com Intervenção Inteligente no Sono

Pedro Costa

A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science, Specialisation Area of Software Engineering

Advisor: Professora Paula Escudeiro
Co-Advisor: Professora Raquel Almeida

Porto, October 29, 2026

Statement of Integrity

I hereby declare having conducted this academic work with integrity. I have not plagiarised or applied any form of undue use of information or falsification of results along the process leading to its elaboration. Therefore the work presented in this document is original and authored by me, having not previously been used for any other end. I further declare that I have fully acknowledged the Code of Ethical Conduct of P.PORTO. ISEP, Porto, October 29, 2026

Dedicatory

The dedicatory is optional. Below is an example of a humorous dedication.

"To my wife Marganit and my children Ella Rose and Daniel Adam without whom this book would have been completed two years earlier." in "An Introduction To Algebraic Topology" by Joseph J. Rotman.

Abstract

This document explains the main formatting rules to apply to a TMDEI Master Dissertation work for the MSc in Computer Engineering of the Computer Engineering Department (DEI) of the School of Engineering (ISEP) of the Polytechnic of Porto (IPP).

The rules here presented are a set of recommended good practices for formatting the disseration work. Please note that this document does not have definite hard rules, and the discussion of these and other aspects of the development of the work should be discussed with the respective supervisor(s).

This document builds on work prepared by Dr. Fátima Rodrigues.

The abstract should usually not exceed 200 words, or one page. When the work is written in Portuguese, it should have an abstract in English.

Please define up to 6 keywords that better describe your work, in the *THESIS INFORMATION* block of the `main.tex` file.

Keywords: Keyword1, ..., Keyword6

Resumo

Trabalhos escritos em língua Inglesa devem incluir um resumo alargado com cerca de 1000 palavras, ou duas páginas.

Se o trabalho estiver escrito em Português, este resumo deveria ser em língua Inglesa, com cerca de 200 palavras, ou uma página.

Para alterar a língua basta ir às configurações do documento no ficheiro **`main.tex`** e alterar para a língua desejada ('english' ou 'portuguese')[1]. Isto fará com que os cabeçalhos incluídos no template sejam traduzidos para a respetiva língua.

[1] Alterar a língua requer apagar alguns ficheiros temporários; O target **clean** do **Makefile** incluído pode ser utilizado para este propósito.

Acknowledgement

The optional Acknowledgment goes here... Below is an example of a humorous acknowledgment.

"I'd also like to thank the Van Allen belts for protecting us from the harmful solar wind, and the earth for being just the right distance from the sun for being conducive to life, and for the ability for water atoms to clump so efficiently, for pretty much the same reason. Finally, I'd like to thank every single one of my forebears for surviving long enough in this hostile world to procreate. Without any one of you, this book would not have been possible." in "The Woman Who Died a Lot" by Jasper Fforde.

Contents

List of Figures **xv**

List of Tables **xvii**

List of Algorithms **xix**

List of Source Code **xxi**

1 Introdução **1**
1.1 Contextualização . . . 1
1.2 Enquadramento do projeto . . . 1
1.3 Problema e motivação . . . 1
1.4 Objetivos . . . 1
1.5 Questões de investigação . . . 2
1.6 Abordagem geral e contributos esperados . . . 2
1.7 Organização do documento . . . 2

2 Fundamentação teórica **3**
2.1 Fundamentos do sono . . . 3
2.1.1 Funções do sono . . . 3
2.1.2 Arquitetura e fases do sono . . . 4
2.1.3 Regulação circadiana e homeostática . . . 4
2.1.4 Variabilidade individual . . . 5
2.2 Insónia e dificuldades de sono . . . 5
2.2.1 Conceito e manifestações da insónia . . . 6
2.2.2 Prevalência e relevância epidemiológica . . . 6
2.2.3 Fatores envolvidos no desenvolvimento e manutenção da insónia . 7
2.2.4 Distinção face a outras dificuldades e perturbações do sono . . . 7
2.2.5 Impacto no funcionamento diário e no bem-estar . . . 8
2.3 Avaliação e monitorização do sono . . . 8
2.3.1 Questionários de avaliação do sono e da insónia . . . 8
2.3.2 Diário de sono e indicadores de acompanhamento . . . 9
2.4 Terapia Cognitivo-Comportamental para a Insónia . . . 10
2.5 Intervenções digitais e personalização . . . 10

Appendix A Appendix Title Here **11**

List of Figures

List of Tables

List of Algorithms

List of Source Code

Chapter 1

Introdução

1.1 Contextualização

1.2 Enquadramento do projeto

1.3 Problema e motivação

A disponibilização de CBT-I através de aplicações móveis permite apoiar a execução de atividades terapêuticas e a monitorização do sono. Existem soluções digitais personalizadas e estudos que integram wearables; permanece, contudo, relevante investigar como combinar dados individuais de sono e contexto com uma política de notificação ao utilizador adaptativa, e qual o benefício adicional face a uma política predefinida. O problema deste projeto consiste em conceber e avaliar um mecanismo que selecione recomendações de um percurso terapêutico definido e identifique oportunidades adequadas para as disponibilizar. As decisões devem considerar o histórico e o contexto do utilizador, a qualidade e o instante de disponibilidade dos dados e a possibilidade de adiar ou não enviar uma intervenção. A deteção de necessidade, a disponibilidade do utilizador e o benefício terapêutico constituem dimensões distintas. Os dados do smartwatch serão complementados por um diário de sono e, quando pertinente, por avaliações breves de contexto. As estimativas dos wearables não serão assumidas como medições clínicas de referência.

1.4 Objetivos

Objetivo geral: desenvolver e avaliar um protótipo móvel de apoio à CBT-I que utilize dados de smartwatch e informação do utilizador para adaptar recomendações e o seu momento de entrega, investigando a fiabilidade técnica e o possível efeito na adesão e no sono.

Objetivos Específicos:

- Identificar os dados de sono e contexto relevantes e verificar a sua disponibilidade, qualidade e atraso de acesso no smartwatch e na plataforma selecionados;
- Definir, com apoio de especialistas, o percurso de CBT-I, os conteúdos elegíveis e os critérios para reconhecer oportunidades de intervenção;
- Desenvolver e comparar um mecanismo de IA para identificar essas oportunidades com uma referência simples baseada em regras explícitas;

- Implementar um sistema de recomendações que adapte a seleção e a entrega de conteúdos ao perfil, histórico e contexto do utilizador, respeitando as regras terapêuticas definidas;
- Construir um protótipo de aplicação móvel com diário de sono, recolha de dados, acompanhamento do progresso e notificações adaptativas, integrando o mecanismo de IA;
- Avaliar o desempenho técnico, a usabilidade e a viabilidade de utilização; se existirem condições, realizar um piloto comparativo para estudar adesão e alterações no sono;
- Analisar resultados, limitações e fatores que condicionam a personalização e o momento de entrega, propondo melhorias para trabalhos futuros.

1.5 Questões de investigação

Pergunta 1: Qual o efeito de recomendações de CBT-I personalizadas e entregues em momentos adaptados ao contexto do utilizador na qualidade do sono e na adesão ao tratamento, comparativamente a recomendações genéricas entregues em horários fixos?

Pergunta 2: Com que desempenho é possível identificar oportunidades de intervenção de CBT-I, previamente definidas, utilizando técnicas de inteligência artificial e dados de smartwatch disponíveis no momento da decisão?

1.6 Abordagem geral e contributos esperados

1.7 Organização do documento

Chapter 2

Fundamentação teórica

2.1 Fundamentos do sono

O sono apresenta-se como um processo biológico essencial à manutenção da saúde e ao funcionamento diário. Envolve um conjunto organizado de processos fisiológicos relacionados com o funcionamento cognitivo, a regulação emocional e a saúde física, contribuindo para o bem-estar e para o desempenho das atividades quotidianas (Grandner, 2022; Ramar et al., 2021; Roland, 2023).

A caracterização do sono compreende diferentes dimensões, incluindo a duração, a continuidade, a regularidade, o horário e a organização dos seus ciclos. Segundo Ramar et al. (2021), um sono saudável requer duração suficiente, uma qualidade adequada, um horário apropriado e ausência de perturbações do sono. A compreensão destas dimensões permite enquadrar tanto a avaliação dos padrões individuais como o desenvolvimento de intervenções destinadas à sua melhoria.

2.1.1 Funções do sono

Como foi referido acima, o sono participa na manutenção de funções cognitivas e fisiológicas necessárias ao funcionamento do organismo. No domínio cognitivo, apresenta uma relação importante com a aprendizagem e com a memória. A consolidação da memória corresponde ao processo através do qual a informação adquirida pode tornar-se mais estável após a aprendizagem. Num estudo experimental, Gais et al. (2006) observaram que dormir após a aprendizagem favoreceu a recordação posterior de informação declarativa, apoiando e reforçando a participação do sono na sua retenção.

No domínio fisiológico, o sono relaciona-se com o funcionamento cardiovascular, a regulação hormonal, o metabolismo e a atividade imunitária. Ao longo do episódio de sono, a atividade destes sistemas modifica-se em associação com os diferentes estados de sono e vigília. Por exemplo, durante o sono não REM (*Rapid Eye Movement*, a última fase do sono), a frequência cardíaca e a pressão arterial tendem a diminuir, apresentando um comportamento distinto durante o sono REM (National Heart, Lung, and Blood Institute [NHLBI]).

A importância do sono manifesta-se também no funcionamento durante a vigília. A obtenção de sono suficiente e de qualidade contribui para a atenção, a memória, o bem-estar emocional e a realização das atividades diárias, incluindo as tarefas profissionais e académicas. A segurança constitui igualmente uma dimensão relevante, nomeadamente no que respeita ao risco de acidentes de viação associado ao sono insuficiente (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 2024).

A duração insuficiente do sono encontra-se associada a consequências adversas para a saúde. Segundo Watson, Badr, et al. (2015), dormir regularmente menos de sete horas por noite na idade adulta está associado a hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular, acidente vascular cerebral e depressão, entre outros problemas de saúde. Os autores referem também associações com alterações do funcionamento imunitário, pior desempenho e maior risco de erros e acidentes. Estas associações reforçam a relevância da duração do sono para a saúde, mas não significam que todas estas consequências ocorram em cada indivíduo, nem que dormir menos de sete horas seja, por si só, equivalente a ter insónia.

Estas relações evidenciam a importância de considerar o sono na promoção da saúde e do bem-estar. A sua avaliação deve abranger o período de repouso e as repercussões no funcionamento diurno, atendendo às diferentes dimensões que caracterizam um sono saudável (Ramar et al., 2021).

2.1.2 Arquitetura e fases do sono

A arquitetura do sono corresponde à organização temporal dos seus estados e estádios ao longo de um episódio de sono. Os estádios são etapas do sono identificadas por características fisiológicas, como a atividade cerebral, os movimentos oculares e o tónus muscular.

Durante o sono, distinguem-se dois estados principais: o sono com movimentos oculares rápidos, designado por REM (Rapid Eye Movement), e o sono não REM, habitualmente identificado como NREM. Este último subdivide-se nos estádios N1, N2 e N3, diferenciados pelas características da atividade cerebral e por outros sinais fisiológicos (NHLBI, 2022; (Memar & Faradji, 2018; Patel et al., 2025).

O estádio N1 corresponde à transição entre a vigília e o sono, é um sono muito ligeiro. No estádio N2, o sono já encontra-se estabelecido, com padrões específicos de atividade cerebral, enquanto o estádio N3 corresponde ao sono profundo, também denominado sono de ondas lentas. Estes três estados são os estados NREM. O sono REM caracteriza-se por movimentos oculares rápidos, atividade cerebral elevada e uma redução marcada do tónus muscular, sendo frequentemente associado à ocorrência de sonhos (NHLBI, 2022).

Os estados NREM e REM alternam ao longo da noite em ciclos cuja composição varia. Em termos gerais, o sono N3 apresenta maior expressão na primeira parte da noite, enquanto os períodos de sono REM tendem a ser mais prolongados na parte final. Podem também ocorrer despertares breves entre ciclos. Assim, a arquitetura do sono apresenta uma organização dinâmica, com alterações na distribuição dos estádios ao longo do episódio de sono (NHLBI, 2022).

2.1.3 Regulação circadiana e homeostática

A regulação do sono pode ser enquadrada pelo modelo dos dois processos proposto por Borbély (1982). Este modelo descreve a interação entre um processo homeostático, denominado processo S, e um processo circadiano, denominado processo C. Ambos contribuem para a propensão para dormir e para a organização temporal dos períodos de sono e vigília.

O processo homeostático representa a necessidade de sono que aumenta durante a vigília e diminui durante o sono. Quanto maior o período de vigília, maior tende a ser a pressão para dormir. A atividade de ondas lentas durante o sono NREM constitui uma expressão

fisiológica relevante deste processo: apresenta valores mais elevados após privação de sono e diminui ao longo do episódio de sono (Borbély, 1982; Dijk & Czeisler, 1995).

O processo circadiano está associado a ritmos endógenos com um período próximo de 24 horas. Estes ritmos contribuem para organizar a distribuição temporal do sono, da vigília e de outras funções fisiológicas. A luz constitui um sinal ambiental importante para a sua sincronização. A informação luminosa recebida pelos olhos participa na regulação do relógio central, localizado no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, permitindo ajustar os ritmos internos ao ciclo ambiental de luz e escuridão (NHLBI).

A interação entre os processos homeostático e circadiano ajudam a explicar a variação da propensão para dormir ao longo do dia. Dijk e Czeisler (1995) demonstraram contributos distintos e interativos destes mecanismos para a estrutura e consolidação do sono. Deste modo, a interpretação de um padrão de sono deve considerar o histórico de sono e vigília e a sua relação com o momento do ciclo circadiano.

2.1.4 Variabilidade individual

As necessidades de sono variam ao longo da vida e entre indivíduos. As recomendações de duração refletem diferenças entre grupos etários: segundo o CDC (2024), são recomendadas 11 a 14 horas diárias para crianças entre um e dois anos e 10 a 13 horas entre os três e os cinco anos, incluindo sestas. Para crianças entre os seis e os doze anos, a recomendação é de 9 a 12 horas, enquanto para adolescentes entre os treze e os dezassete anos é de 8 a 10 horas. Nos adultos entre os dezoito e os sessenta anos, são recomendadas sete ou mais horas por noite. Estes intervalos constituem referências populacionais que devem ser interpretadas considerando as características individuais (Hirshkowitz et al., 2015; Watson, Badr, et al., 2015).

Outra dimensão da variabilidade individual é o cronótipo, relacionado com a expressão temporal dos ritmos circadianos e com a tendência para horários de sono e vigília mais precoces ou mais tardios. Esta variação distribui-se ao longo de um contínuo. Num estudo populacional, Fischer et al. (2017) identificaram diferenças de cronótipo associadas à idade e ao sexo, observando uma tendência para horários mais tardios durante a adolescência e mais precoces nas idades seguintes.

Os horários de sono observados resultam também da interação entre características biológicas e condições de vida, incluindo exigências profissionais, compromissos sociais e exposição à luz. Por conseguinte, o horário efetivamente praticado pode diferir da tendência temporal do indivíduo, tornando necessária a interpretação dos registos no respetivo contexto (Fischer et al., 2017; NHLBI).

No contexto desta dissertação, estes fundamentos orientam a consideração de múltiplas dimensões na caracterização do sono. A duração, a continuidade, a regularidade e o horário, articulados com as características e o contexto do utilizador, constituem elementos a explorar na análise dos padrões individuais e na conceção do sistema de apoio à intervenção.

2.2 Insónia e dificuldades de sono

As dificuldades de sono podem manifestar-se através de problemas em adormecer, despertares durante a noite, despertar precoce ou insatisfação com o sono obtido. Estas manifestações podem ocorrer pontualmente ou apresentar um padrão persistente. A sua

interpretação exige considerar a frequência, a duração, as circunstâncias em que surgem e as repercussões no funcionamento diário (Riemann et al., 2023).

Atualmente, existem várias perturbações que afetam a qualidade do sono, sendo a insónia, apneia obstrutiva do sono (AOS) e o síndrome das pernas inquietas (SPI) das mais comuns a nível mundial (McArdle et al., 2022).

2.2.1 Conceito e manifestações da insónia

A insónia caracteriza-se por dificuldades em iniciar ou manter o sono, ou por despertar antes do horário pretendido com dificuldade em voltar a adormecer. Estas dificuldades ocorrem apesar de existir oportunidade e condições adequadas para dormir e estão associadas a insatisfação com o sono e comprometimento do funcionamento diurno (Riemann et al., 2023).

A caracterização da insónia crónica considera a persistência das dificuldades noturnas e das consequências diurnas, com uma frequência de pelo menos três vezes por semana durante, pelo menos, três meses. Estes elementos integram uma avaliação clínica mais ampla, que considera outras condições capazes de explicar ou acompanhar as queixas (Riemann et al., 2023).

Podem também ocorrer dificuldades de curta duração, por exemplo devido a situações de elevado stress ou alterações de rotinas e dos horários. A existência de algumas noites de sono insatisfatórias não equivale, por si só, a uma perturbação de insónia crónica (NHLBI).

Importa igualmente distinguir insónia de sono insuficiente por falta de oportunidade para dormir. Uma pessoa pode dormir poucas horas devido aos seus compromissos, sem apresentar dificuldade em adormecer quando dispõe de oportunidade adequada. Por isso, a duração do sono, isoladamente, é insuficiente para caracterizar a insónia; devem ser consideradas as queixas, as condições de sono e as repercussões diurnas (Riemann et al., 2023).

2.2.2 Prevalência e relevância epidemiológica

A interpretação da prevalência da insónia exige atenção às definições e aos métodos utilizados. Estudos que avaliam sintomas ocasionais, resultados de questionários ou perturbações clinicamente caracterizadas podem produzir estimativas diferentes. Consequentemente, os valores devem ser apresentados em conjunto com a população e os critérios considerados.

Benjafield et al. (2025) estimaram uma prevalência global de insónia clinicamente relevante de 16,2% na população adulta, correspondente a aproximadamente 852 milhões de pessoas. A análise incluiu 18 estudos, com 262 582 participantes, e extrapolou estimativas para países sem dados nacionais adequados. O estudo identificou uma prevalência superior no sexo feminino. Estes resultados evidenciam a dimensão do problema, devendo ser interpretados à luz da heterogeneidade das definições e da disponibilidade desigual de dados entre países. Também cerca de 25% das crianças e 18% de adolescentes sofrem de insónia (Trosman & Ivanenko, 2021).

No contexto português, Oliveira et al. (2024) analisaram dados de 14 341 adultos provenientes do Inquérito Nacional de Saúde de 2019. Os autores identificaram uma prevalência de 42,9% de dificuldades de sono autorreportadas, superior nas mulheres. A medida

baseou-se numa pergunta sobre dificuldade em adormecer, dormir pouco ou dormir demasiado nas duas semanas anteriores. Este valor caracteriza um conjunto amplo de queixas e não corresponde à prevalência de insónia clinicamente diagnosticada.

2.2.3 Fatores envolvidos no desenvolvimento e manutenção da insónia

O desenvolvimento e a persistência da insónia podem ser compreendidos através do modelo dos três fatores, também conhecido como modelo dos 3P. Este enquadramento distingue fatores predisponentes, precipitantes e perpetuantes, permitindo organizar a influência de características individuais, acontecimentos desencadeantes e processos que mantêm as dificuldades ao longo do tempo (Spielman et al., 1987).

Os fatores predisponentes correspondem a características que aumentam a vulnerabilidade às dificuldades de sono. Os fatores precipitantes representam acontecimentos ou alterações que podem desencadear essas dificuldades, como situações de stress. Os fatores perpetuantes incluem comportamentos e processos cognitivos que contribuem para a sua manutenção, mesmo depois de o acontecimento inicial ter diminuído ou desaparecido (Spielman et al., 1987).

Neste enquadramento, estratégias adotadas para compensar noites insatisfatórias podem, em determinadas circunstâncias, contribuir para a persistência do problema. Um exemplo é o aumento excessivo do tempo passado na cama, que pode favorecer períodos prolongados de vigília nesse contexto. A preocupação com o sono e as associações estabelecidas entre a cama e a experiência de permanecer acordado constituem igualmente aspetos relevantes para compreender a manutenção das dificuldades (Spielman et al., 1987).

A identificação destes fatores constitui uma base conceptual importante para a **Terapia Cognitivo-Comportamental** para a Insónia, cuja intervenção incide particularmente nos processos que perpetuam o problema (Walker et al., 2022).

2.2.4 Distinção face a outras dificuldades e perturbações do sono

Algumas manifestações associadas à insónia podem também ocorrer noutras condições. A apneia obstrutiva do sono caracteriza-se por episódios de obstrução das vias aéreas superiores durante o sono, que reduzem ou interrompem o fluxo de ar. Pode acompanhar-se de ressonar, pausas respiratórias e sonolência diurna, comprometendo a continuidade e a qualidade do sono (NHLBI).

A síndrome das pernas inquietas caracteriza-se por uma necessidade intensa de mover as pernas, frequentemente acompanhada por sensações desagradáveis. Os sintomas surgem ou agravam-se em repouso, tendem a ser mais intensos ao final do dia ou durante a noite e são temporariamente aliviados pelo movimento. Estas manifestações podem dificultar o adormecimento e a continuidade do sono (National Institute of Neurological Disorders and Stroke [NINDS]).

As diferenças entre estas condições mostram que uma queixa de sono insatisfatório pode ter diferentes explicações. No contexto desta dissertação, a delimitação da população e das dificuldades abrangidas pela aplicação deverá refletir essa diversidade, articulando o apoio à CBT-I com critérios de avaliação e acompanhamento apropriados.

2.2.5 Impacto no funcionamento diário e no bem-estar

As consequências da insónia ultrapassam o período noturno. Podem incluir fadiga, dificuldades de atenção ou concentração, irritabilidade e redução da energia, afetando o desempenho das atividades quotidianas. A presença destas repercussões constitui uma dimensão importante da caracterização do problema e da avaliação das necessidades da pessoa (NHLBI; Walker et al., 2022).

Na perspetiva da terapia ocupacional, o sono integra o domínio das ocupações, entendidas como as atividades que fazem parte da vida quotidiana. A sua relação com o funcionamento diurno pode ser compreendida considerando as rotinas de autocuidado, o trabalho ou estudo, o lazer e a participação social. Ho e Siu (2018) salientam a importância de considerar conjuntamente a pessoa, o ambiente e a organização das atividades diárias na compreensão e intervenção sobre o sono.

Esta perspetiva permite enquadrar o sono na distribuição do tempo e das atividades ao longo do dia. Ho e Siu (2018) destacam a organização das rotinas e dos padrões de atividade como componentes relevantes da intervenção, atendendo à relação entre as atividades diurnas e o sono. Deste modo, compreender as dificuldades de sono implica considerar o contexto quotidiano em que ocorrem e as necessidades individuais de participação nas diferentes atividades.

A dimensão do bem-estar encontra-se igualmente refletida no estudo português de Oliveira et al. (2024), no qual as dificuldades de sono foram associadas a menor satisfação com a vida. Por se tratar de um estudo transversal, os resultados demonstram uma associação, sem estabelecer uma relação causal ou a sua direção.

Para esta dissertação, este enquadramento fundamenta uma avaliação que articule as manifestações noturnas com a experiência subjetiva e o funcionamento diurno. Além dos indicadores de sono, será pertinente considerar a fadiga percebida, a interferência das dificuldades de sono nas atividades quotidianas e a adesão às atividades propostas pela aplicação. Esta abordagem poderá contribuir para compreender a utilidade do sistema na perspetiva do utilizador, complementando a análise dos padrões de sono.

2.3 Avaliação e monitorização do sono

A avaliação do sono permite caracterizar as dificuldades apresentadas, compreender os padrões individuais e acompanhar alterações ao longo do tempo. No contexto da insónia, devem ser consideradas as manifestações noturnas, a satisfação com o sono e as repercussões no funcionamento diurno. A avaliação clínica pode ser apoiada por questionários, diários de sono e, quando indicado, métodos instrumentais, como a actigrafia e a polissonografia (Riemann et al., 2023).

Estes métodos fornecem informação de natureza distinta. Os instrumentos de autorrelato permitem conhecer a experiência percebida pela pessoa, enquanto os dispositivos recolhem sinais a partir dos quais podem ser medidos ou estimados parâmetros do sono. A interpretação deve, por isso, atender ao que cada método avalia e às suas limitações.

2.3.1 Questionários de avaliação do sono e da insónia

Os questionários permitem organizar e quantificar diferentes dimensões das dificuldades de sono. Entre os instrumentos utilizados encontram-se o Pittsburgh Sleep Quality Index

(PSQI), dirigido à qualidade do sono, e o Insomnia Severity Index (ISI), centrado na gravidade percebida da insónia.

O PSQI avalia a qualidade e as dificuldades de sono durante o mês anterior. Inclui 19 itens de autorresposta que originam sete componentes: qualidade subjetiva do sono, latência de adormecimento, duração, eficiência habitual, perturbações do sono, utilização de medicação para dormir e disfunção diurna. A pontuação global varia entre 0 e 21, correspondendo os valores mais elevados a maiores dificuldades (Buysse et al., 1989).

Este instrumento proporciona uma caracterização abrangente, mas não constitui uma medida específica da perturbação de insónia nem permite, isoladamente, estabelecer esse diagnóstico (Riemann et al., 2023).

O ISI constitui um instrumento breve desenvolvido para avaliar a gravidade da insónia e acompanhar os resultados do tratamento (Bastien et al., 2001). Integra sete itens relativos às dificuldades em iniciar e manter o sono, ao despertar precoce, à satisfação com o sono, à interferência no funcionamento diário, à perceção do problema por outras pessoas e à preocupação associada. O período habitual de referência corresponde às duas semanas anteriores. Cada item é pontuado entre 0 e 4, resultando numa pontuação global entre 0 e 28, com valores superiores a indicar maior gravidade percebida (Morin et al., 2011).

A escolha entre estes instrumentos depende da dimensão que se pretende avaliar. Para esta dissertação, o PSQI poderá apoiar a caracterização geral da qualidade do sono, enquanto o ISI poderá ser considerado para acompanhar a evolução dos sintomas de insónia. A calendarização das avaliações deverá respeitar os períodos de referência dos instrumentos, distinguindo-os dos registos diários.

2.3.2 Diário de sono e indicadores de acompanhamento

O diário de sono consiste no registo prospetivo de informação sobre cada episódio de sono. O Consensus Sleep Diary, apresentado por Carney et al. (2012), procura uniformizar os elementos recolhidos e as instruções de preenchimento, favorecendo a comparação dos registos. Inclui horários, estimativas de adormecimento e despertares, bem como uma apreciação subjetiva da qualidade do sono.

A orientação europeia recomenda que a avaliação da insónia seja apoiada por um diário preenchido durante um período de 7 a 14 dias (Riemann et al., 2023). A recolha de várias noites permite observar a variabilidade dos padrões, complementando uma apreciação global.

Entre os indicadores habitualmente considerados encontram-se os seguintes (Carney et al., 2012):

- Latência de adormecimento (SOL) - Tempo estimado entre a tentativa de adormecer e o início do sono;
- Vigília após o início do sono (WASO) - Tempo de vigília acumulado após o adormecimento, segundo a convenção adotada;
- Tempo total de sono (TST) - Duração total estimada do sono;
- Tempo na cama (TIB) - Intervalo passado na cama, segundo os horários registados;
- Eficiência do sono (SE) - Percentagem do tempo na cama que corresponde a sono;
- Qualidade subjetivo do sono - Apreciação da pessoa sobre o sono dessa noite.

A eficiência do sono pode ser expressa por:

$Eficiência do Sono(\%) = (\frac{TST}{TIB}) * 100$

2.4 Terapia Cognitivo-Comportamental para a Insónia

Na intervenção no sono, o papel da Terapia Ocupacional pode estar presente de diversas formas, tais como a adaptação do ambiente, estabelecer novas rotinas antes de dormir ou ainda a utilização de produtos de apoio (Faulkner, 2022; Ho & Siu, 2018). Para além disso, é importante destacar a Terapia Cognitivo-Comportamental para a Insônia (TCCi) como ferramenta de intervenção nesta área (Faulkner, 2022; Ho & Siu, 2018). Este método de intervenção procura atuar sobre comportamentos e fatores mal adaptativos impulsionadores da insônia, através de diferentes fases, como limitar o tempo passado na cama, evitar realizar atividades na cama que não estejam relacionadas com o sono, terapia cognitiva e educação terapêutica sobre higiene do sono. De notar que a TCCi apresenta uma eficácia tão elevada quanto a intervenção farmacológica, uma vez que é considerada o tratamento de primeira linha desta condição. Contudo, é importante referir que a eficácia da intervenção está condicionada pela colaboração e envolvimento do paciente (Faulkner, 2022; Ho & Siu, 2018; Walker et al., 2022).

2.5 Intervenções digitais e personalização

O avanço tecnológico atual levou a um aumento no uso diário de dispositivos eletrónicos, especialmente durante o período noturno, o que pode prejudicar o sono devido à exposição à luz desses dispositivos (Grotto et al., 2024; Roland, 2023). No entanto, apesar desta tendência negativa, tecnologias como aplicações móveis podem ser uma solução eficaz para melhorar a qualidade do sono, uma vez que facilitam o acesso a informações sobre hábitos saudáveis e oferecem estratégias para problemas de sono (Chang et al., 2015; Grandner, 2022; Grotto et al., 2024; Lancaster et al., 2023; Orzech et al., 2016; Roland, 2023). Deste modo, vários estudos sugerem o potencial do mHealth como forma de intervenção para problemas de sono e de provocar mudanças comportamentais nos seus utilizadores (Arroyo & Zawadzki, 2022; Grotto et al., 2024; Lancaster et al., 2023).

Appendix A

Appendix Title Here

Write your Appendix content here.