

1 Se celebra un casting televisivo en dos sedes, Madrid y Sevilla. En Madrid se seleccionan 20 chicos y 30 chicas, que reunimos en una sala. Allí se mezclan al azar y se colocan en fila india. Lo mismo hacemos en Sevilla, donde se han seleccionado 30 chicos y 50 chicas.

Lanzamos una moneda (equilibrada): si sale cara, llamamos a Sevilla y escogemos al candidato que ocupe la primera posición de la lista. Si sale cruz, hacemos lo mismo, pero en Madrid.

- (a) (0'5 puntos) ¿Cuál es la probabilidad de que el candidato elegido sea un chico?
- (b) (0'5 puntos) Juan González es uno de los seleccionados en Sevilla ¿Cuál es la probabilidad de que sea el candidato finalmente elegido?
- (c) (0'5 puntos) Se ha efectuado el proceso de elección del candidato final, que resulta ser una chica. ¿Con qué probabilidad será madrileña?
- (d) (1 punto) Ahora cambiamos el procedimiento: reunimos a todos los seleccionados en un hotel de Barcelona, los mezclamos y colocamos en fila india; y elegimos al candidato que ocupe la primera posición. La probabilidad de que Juan González haya sido el elegido ¿coincide con la del apartado (b)? Y la probabilidad de que el candidato sea chico ¿coincide con la del apartado (a)? Medita sobre el asunto

Solución: Llamamos

$M = \{\text{Se elige alguien de Madrid}\}$

$S = \{\text{Se elige alguien de Sevilla}\}$

$C_o = \{\text{Se elige un chico}\}$

$C_a = \{\text{Se elige una chica}\}$

$J = \{\text{Es elegido Juan González}\}$

Se tienen las probabilidades

$$P(M) = 1/2$$

$$P(S) = 1/2$$

$$P(C_o | M) = 2/5$$

$$P(C_o | S) = 3/8$$

$$P(C_a | M) = 3/5$$

$$P(C_a | S) = 5/8$$

$$(a) \ P(C_o) = P(M) P(C_o | M) + P(S) P(C_o | S) = 1/2 \cdot 2/5 + 1/2 \cdot 3/8 = 31/80 = 0'3875$$

$$(b) \ P(J) = P(M)P(J|M) + P(S)P(J|S) = 1/2 \cdot 0 + 1/2 \cdot 1/80 = 1/160 = 0'00625$$

(c)

$$P(M|C_a) = \frac{P(M \cap C_a)}{P(C_a)} = \frac{P(M)P(C_a|M)}{P(C_a)} = \frac{1/2 \cdot 3/5}{1 - 0'3875} = 0'4898$$

(d) Al estar todos los candidatos juntos, las probabilidades cambian; en efecto

$$(1) \ P(C_o) = 50/130 = 0'3846$$

$$(2) \ P(J) = 1/130 = 0'007692$$

El experimento es distinto, el espacio muestral otro y, en consecuencia, distintas las probabilidades.

2 Sea X una variable aleatoria discreta que denota el número de averías que un operario resuelve en una jornada de trabajo, con función de cuantía dada por

$$f(x) = \frac{k}{x+1}, \quad x \in \{0, 1, 2, 3\}$$

(a) (0'75 puntos) Calcular $P(X > 1)$ y $P(X > 0 | X < 3)$.

(b) (0'75 puntos) Calcula el número medio de averías que soluciona al día.

(c) (1 punto) Si su sueldo es de 60 euros por jornada laboral y si le pagan un plus de 20 euros por cada avería solucionada que exceda de una al día ¿cuál es el sueldo diario medio?

Solución: Tenemos que hallar el valor de k ; se obtiene sumando las probabilidades e igualando a 1

$$f(0) + f(1) + f(2) + f(3) = 1 \rightarrow \frac{k}{1} + \frac{k}{2} + \frac{k}{3} + \frac{k}{4} = 1$$

$$\frac{25k}{12} = 1 \rightarrow k = \frac{12}{25}.$$

La función de cuantía es, por tanto

X	0	1	2	3
$f(x)$	12/25	6/25	4/25	3/25

(a)

$$P(X > 1) = \frac{4}{25} + \frac{3}{25} = \frac{7}{25}$$

$$P(X > 0 | X < 3) = \frac{P(0 < X < 3)}{P(X < 3)} = \frac{6/25 + 4/25}{22/25} = \frac{10}{22} = \frac{5}{11}.$$

(b)

$$E(X) = 0 \cdot \frac{12}{25} + 1 \cdot \frac{6}{25} + 2 \cdot \frac{4}{25} + 3 \cdot \frac{3}{25} = \frac{23}{25}.$$

(c) La variable sueldo S tiene los valores

$$S = \begin{cases} 60 & \text{si } X \in \{0, 1\} \\ 80 & \text{si } X = 2 \\ 100 & \text{si } X = 3 \end{cases}$$

En consecuencia su cuantía es

S	60	80	100
f_S	18/25	4/25	3/25

$$\text{Luego } E(S) = 60 \cdot \frac{18}{25} + 80 \cdot \frac{4}{25} + 100 \cdot \frac{3}{25} = 68.$$

3 Se tiene la siguiente función de cuantía de una v.a. (X, Y)

Y				
3	0	3/8	3/8	0
1	1/8	0	0	1/8
	0	1	2	3
	X			

Hallad

(a) (1 punto) La covarianza $\text{Cov}(X, Y)$

(b) (1 punto) $E(X \mid Y = 1)$

(c) (0'5 puntos) ¿Son independientes? Razónese la respuesta

Solución:

(a) Se debe calcular $E(X)$, $E(Y)$ y $E(XY)$. Las distribuciones marginales son

X	0	1	2	3
f_1	1/8	3/8	3/8	1/8

Y	1	3
f_2	2/8	6/8

Calculando..

- $E(X) = 0 \cdot \frac{1}{8} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3}{2}$
- $E(Y) = 1 \cdot \frac{2}{8} + 3 \cdot \frac{6}{8} = \frac{5}{2}$
- $E(XY) = 1 \cdot 3 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot 3 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot 1 \cdot \frac{1}{8} = \frac{15}{4}$

Por tanto $\text{Cov}(X, Y) = \frac{15}{4} - \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} = 0$

(b) La distribución condicional es

$(X Y=1)$	0	3
$g_1(x 1)$	1/2	1/2

de donde $E(X | Y = 1) = \frac{3}{2}$

(c) Como no coinciden las cuantías $f_1(x)$ y $g_1(x|1)$, NO son independientes.

Otra prueba: $f(0, 1) = \frac{1}{8}$ mientras que $f_1(0) \cdot f_2(1) = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{8} = \frac{1}{32}$

4 (2'5 puntos) Un plaguicida se consigue con la mezcla de dos sustancias con concentraciones de insecticida que siguen las siguientes concentraciones normales

$$X_1 \sim N(200, 25), \quad X_2 \sim N(20, 5)$$

La mezcla se hace utilizando el doble de X_2 que de X_1 . Teniendo en cuenta que al fumigar con el plaguicida se produce una pérdida de parte de insecticida producida por diversas causas, cuya distribución X_3 es normal de media 50 y desviación 10, la concentración final de insecticida X queda de la siguiente manera

$$X = X_1 + 2X_2 - \frac{3}{2}X_3$$

¿Cuál es la probabilidad de que la concentración final de insecticida esté entre 150 y 175?

Solución: La distribución normal resultante es la combinación de las tres distribuciones normales: $X = X_1 + 2X_2 - \frac{3}{2}X_3$, por lo que lo único que hay que hacer es calcular los parámetros de la distribución resultante y la probabilidad pedida $P(150 \leq X \leq 175)$.

Primero se calcula la esperanza: $E(X) = E(X_1) + 2 \cdot E(X_2) - \frac{3}{2} \cdot E(X_3)$. Del enunciado sabemos que $E(X_1) = 200$, $E(X_2) = 20$ y $E(X_3) = 50$, por lo que:

$$E(X) = 200 + 2 \cdot 20 - \frac{3}{2} \cdot 50 = 200 + 40 - 75 = 165.$$

La varianza de la distribución resultante se calcula de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \text{Var}(X_1) + 2^2 \cdot \text{Var}(X_2) + \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot \text{Var}(X_3) \\ &= 25^2 + 2^2 \cdot 5^2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2 \cdot 10^2 \\ &= 625 + 100 + 225 = 950. \end{aligned}$$

Como necesitamos la desviación típica: $\sigma_X = \sqrt{950} \simeq 30.82$. Así pues,

$$X \sim N(165, 30.82).$$

Normalizando:

$$\begin{aligned} P(150 \leq X \leq 175) &= P\left(\frac{150 - 165}{30.82} \leq Z \leq \frac{175 - 165}{30.82}\right) \\ &= P(-0.49 \leq Z \leq 0.33) \\ &= \Phi(0.33) - \Phi(-0.49) \\ &= 0.6293 + 0.6879 - 1 = 0.3172. \end{aligned}$$