

La fonction $y(x)$ inverse de $f(x) = x^x$

par Pierre GERMAIN-LACOUR *

Résumé : Je me suis tout particulièrement intéressé à la fonction $y(x)$ qui est l'inverse de la fonction $f(x) = x^x$. Après l'énoncé des principales propriétés de $y(x)$, on montre son utilisation pour trouver les solutions de deux équations particulières.

La fonction $f(x) = x^x$ pour $x \geq 0$ et sa fonction inverse : $y(x)$.

Pour $x \geq 0$ la valeur de $f(x)$ est un nombre réel positif et on vérifie très facilement que pour $x \rightarrow 0$: $f(x) \rightarrow 1$.

Par définition : $f(y(x)) = x$ et $y(f(x)) = x$
 $f(0) = 1$ $f(1) = 1$ $f(2) = 4$ $f(3) = 27$ $f(4) = 256$ etc.
 $y(1) = 1$ $y(4) = 2$ $y(27) = 3$ $y(256) = 4$ etc.

On a : $f(x) = x^x = e^{(x \ln(x))}$
 $\Rightarrow f'(x) = (e^{(x \ln(x))})' = (e^{(x \ln(x))}) \cdot (x \ln(x))'$
 $f'(x) = (x^x) \cdot (\ln(x) + x \cdot (1/x)) = (x^x) \cdot (1 + \ln(x))$

$\Rightarrow f'(0) = -\infty$ $f'(x_m) = 0$ pour $x_m = 1/e = 0.3678794412$ $f'(1) = 1$
et $f_m = f(x_m) = (1/e)^{(1/e)} = e^{((1/e) \cdot (-1))} = e^{(-1/e)} = 0.6922006276$

$f''(x) = (x^x)' \cdot (1 + \ln(x)) + (x^x) \cdot (1 + \ln(x))'$
 $= (x^x) \cdot (1 + \ln(x)) \cdot (1 + \ln(x)) + (x^x) \cdot (1/x)$
 $= (x^x) \cdot (1/x + 1 + 2 \ln(x) + \ln(x)^2)$

$\Rightarrow f''(0) = \infty$ $f''(x_m) = f''(1/e) = 1.881596387$ $f''(1) = 2$

La fonction $y(x)$ inverse de $f(x)$ est telle que : $y^y = x$.

Pour x dans l'intervalle : $[f_m, 1]$ où : $f_m = e^{(-1/e)} = 0.6922006276$
il y a deux valeurs $0 < y_0(x) < x_m$ et $y(x) > x_m$ de y telles que $y^y = x$.
D'où :
pour $x < f_m = e^{(-1/e)}$ il n'y a aucune valeur de $y(x)$
pour $x = f_m = 0.6922006276$ on a une valeur double : $y = x_m = 1/e = 0.3678794412$
pour $x=0.725$ on a deux valeurs de y voisines de $a=0.1995$ et $b=0.5673$
pour $x=1$ on a $y = 0$ et $y = 1$ ($0^0=1$ et $1^1=1$)
pour $x > 1$ il y a une seule valeur de $y(x)$: $y(4)=2$ et $y(27)=3$ et $y(256)=4$...

Soient : $x = 0.725$ $a = 0.1995$ $b = 0.5673$
 $y_0(x) = y_0(0.725)$ voisin de $a = 0.1995$ car $a^a = 0.7250010049$ voisin de 0.725
 $y(x) = y(0.725)$ voisin de $b = 0.5673$ car $b^b = 0.7249999759$ voisin de 0.725

$f(3) = 3^3 = 27 \Rightarrow y(27) = 3 \Rightarrow f(y(27)) = 27 \Rightarrow y(f(3)) = 3$
 $f(1.8255) = 1.8255^{1.8255}$ voisin de $3.00021646 \Rightarrow y(3)$ voisin de 1.8255

On a : $y(2) = 1.559610470$ et $y(3) = 1.825455023$ et $y(5) = 2.129372482$

Par définition de la fonction $W(z)$ de Lambert : $w = W(z) \Leftrightarrow z = w \cdot e^w$

Si $y^y = x \Rightarrow \ln(x) = y \cdot \ln(y) = e^{(\ln(y))} \cdot \ln(y)$

Soient $w = \ln(y)$ et $z = \ln(x)$
 $\Rightarrow \ln(x) = \ln(y) \cdot e^{(\ln(y))} \Rightarrow z = w \cdot e^w \Rightarrow w = W(z) \Rightarrow \ln(y) = W(\ln(x))$
 $\Rightarrow y(x) = \ln(x) / \ln(y) = \ln(x) / W(\ln(x))$

Soit $a = e^x \Rightarrow y(a) = y(e^x) = \ln(a) / W(\ln(a)) = x / W(x)$
 $\Rightarrow W(x) = x / y(e^x)$

$W'(x) = W(x)/(x*(1+W(x))) \Rightarrow y'(x) = 1/(x*(1+W(\ln(x))))$
 $\Rightarrow y_0'(1) = 0$ et $y_0'(f_m) = -\infty$ et $y'(f_m) = \infty$ et $y'(1) = 1$

Calcul de la fonction $y'(x)$

Si $x > 1$: $W'(x) = W(x)/(x*(1+W(x)))$
 $y(x) = \ln(x)/W(\ln(x)) = (\ln(x))*(1/W(\ln(x)))$
 $y'(x) = (\ln(x))'*(1/W(\ln(x))) + \ln(x)*(1/W(\ln(x)))'$
 $y'(x) = (1/x)*(1/W(\ln(x))) + \ln(x)*(-1/((W(\ln(x))^2)*(W(\ln(x)))'$
 $y'(x) = 1/(x*W(\ln(x))) - (\ln(x)/((W(\ln(x))^2)*(W(\ln(x)))'$
 $y'(x) = 1/(x*W(\ln(x))) -$
 $(\ln(x)/((W(\ln(x))^2)*(W(\ln(x)))/(\ln(x)*(1+W(\ln(x)))*(ln(x))'))$
 $y'(x) = 1/(x*W(\ln(x))) - (\ln(x)/(W(\ln(x)))/((\ln(x)*(1+W(\ln(x)))*(ln(x))'))$
 $y'(x) = 1/(x*W(\ln(x))) - 1/(W(\ln(x))*(1+W(\ln(x)))*(ln(x))')$
 $y'(x) = 1/(x*W(\ln(x))) - 1/(x*W(\ln(x))*(1+W(\ln(x))))$
 $y'(x) = W(\ln(x))/(x*W(\ln(x))*(1+W(\ln(x))))$
 $y'(x) = 1/(x*(1+W(\ln(x))))$

Vérification avec Maple V

```

> y:=proc(x)
> evalf(ln(x)/LambertW(ln(x)));
> end;
    y := proc(x) evalf(ln(x)/LambertW(ln(x))) end
> yp:=proc(x)
> evalf(1/(x*(1+LambertW(ln(x)))));
> end;
    yp := proc(x) evalf(1/(x*(1 + LambertW(ln(x)))) end
> y(27);
    2.999999999
> yp(27);
    .01764834659
> evalf((y(27.1)-y(26.9))/0.2);
    .01764844

```

Trouver la ou les solutions de l'équation numéro 1 : $3^x = 2x + 2$

Par définitions : $w = W(z) \Leftrightarrow z = w*e^w$ et $a = y(b) \Leftrightarrow b = a^a$
 Quelque soit x : $W(x) = x/y(e^x)$ et $y(x) = \ln(x)/W(\ln(x))$

$3^x = 2x + 2$
 $1 = (2x+2)/(3^x)$
 $(x+1)*3^{(-x)} = 1/2$
 $(x+1)*3^{(-x-1)} = 1/6$
 $(-x-1)*3^{(-x-1)} = -1/6$
 $\ln(3)*(-x-1)*3^{(-x-1)} = -\ln(3)/6$
 $\ln(3)*(-x-1)*e^{(\ln(3)*(-x-1))} = -\ln(3)/6$
 $W(-\ln(3)/6) = \ln(3)*(-x-1)$
 $(x+1)*\ln(3) = -W(-\ln(3)/6)$
 $x = -1 -W(-\ln(3)/6)/\ln(3)$
 $x = -1 -(-\ln(3)/6)/y(e^{(-\ln(3)/6)})/\ln(3)$

Calcul : $e^{(-\ln(3)/6)} = 0.8326831776$

Cette valeur est dans l'intervalle où $y(x)$ a deux valeurs.

L'équation : $3^x = 2x+2$ a donc deux solutions qui sont les suivantes.

$x = -1 -(-\ln(3)/6)/y(e^{(-\ln(3)/6)})/\ln(3) = -0.7901100111$
 $x_0 = -1 -(-\ln(3)/6)/y_0(e^{(-\ln(3)/6)})/\ln(3) = 1.444561392$


Vérifications avec Maple V

```

> y:=proc(x)
> evalf(ln(x)/LambertW(ln(x)));
> end;
      y := proc(x) evalf(ln(x)/LambertW(ln(x))) end
> y0:=proc(x)
> evalf(ln(x)/LambertW(-1,ln(x)));
> end;
      y0 := proc(x) evalf(ln(x)/LambertW(-1, ln(x))) end
> evalf(exp(1)^(-ln(3)/6));
.8326831776
> y(0.8326831776);
.7940667757
> y0(0.8326831776);
.06817855640
> x := -1 -(-ln(3)/6)/y(exp(1)^(-ln(3)/6))/ln(3);
x := -.7901100111
> x0 := -1 -(-ln(3)/6)/y0(exp(1)^(-ln(3)/6))/ln(3);
x0 := 1.444561392
> evalf(3^x-(2*x+2));
0
> eval(3^x0-(2*x0+2));
-8
-.3 10

> plot({3^x,2*x+2},x=-1..2,0..6);

```



Trouver la ou les solutions de l'équation numéro 2 : $2^x = 5x$

Par définitions : $w = W(z) \iff z = w \cdot e^w$ et $a = y(b) \iff b = a^a$
 Quelque soit x : $W(x) = x/y(e^x)$ et $y(x) = \ln(x)/W(\ln(x))$

```

2^x = 5*x
1 = 5*x/2^x
1/5 = x/2^x
ln(2)/5 = ln(2)*x/2^x
-ln(2)/5 = -ln(2)*x*2^(-x) = -ln(2)*x*e^(ln(2)*(-x))
-ln(2)/5 = -ln(2)*x*e^(-ln(2)*x)
-ln(2)*5 = W(-ln(2)/5)
x = W(-ln(2)/5)/(-ln(2))
x = (-ln(2)/5)/y(e^(-ln(2)/5))/(-ln(2))

```

Calcul : $e^{(-\ln(2)/5)} = 0.8705505633$

Cette valeur est dans l'intervalle où $y(x)$ a deux valeurs.


L'équation : $2^x = 5^x$ a donc deux solutions qui sont les suivantes.

$$x = (-\ln(2)/5)/y(e^{(-\ln(2)/5)})/(-\ln(2)) = 0.2354557102$$

$$x_0 = (-\ln(2)/5)/y_0(e^{(-\ln(2)/5)})/(-\ln(2)) = 4.488001136$$

Vérifications avec Maple V

```
> evalf(exp(1)^(-ln(2)/5));  
  .8705505633  
> x := (-ln(2)/5)/y(exp(1)^(-ln(2)/5))/(-ln(2));  
  x := .2354557102  
> x0 := (-ln(2)/5)/y0(exp(1)^(-ln(2)/5))/(-ln(2));  
  x0 := 4.488001136  
> evalf(2^x-5*x);  
  -.1*10^(-8)  
> eval(2^x0-5*x0);  
  0  
  
> plot({2^x,5*x},x=0..5,0..25);
```



Conclusion

Le nom $y(x)$ de cette fonction inverse de la fonction $f(x) = x^x$ est provisoire. J'ai imaginé qu'on pourrait l'appeler $L(x)$ parce que le logarithme est l'inverse de l'exponentiation ou mieux parce que $y(x)$ est reliée à $W(x)$ de Jean-Henri Lambert.

On sait que $y(x) = \ln(x)/W(\ln(x))$. Ce qui pourrait faire dire que la fonction $y(x)$ est inutile puisqu'on peut la remplacer par $\ln(x)/W(\ln(x))$. Avec ce type d'affirmation, on pourrait aussi remplacer $\cos(x)$ par $\sin(x+\pi/2)$ et remplacer $\tan(x)$ par $\sin(x)/\sin(x+\pi/2)$. Cependant il est injuste d'affirmer que les fonctions $\cos(x)$ et $\tan(x)$ sont inutiles. C'est pourquoi, à mon avis, il est juste d'affirmer que les fonctions $W(x)$ et $y(x)$ sont utiles toutes les deux. Mais la fonction $W(x)$ est très connue et $y(x)$ semblait inconnue.

* <http://pgl10.chez.com/mathematiques.html>