
participant #5, means (black: plinko outcomes)
mean
observation
0
10
20
30
40
0
50
100
150
200

participant #5, st. deviations



std

10

5

0

0

50

100

150

200

observation


h for part. #5, stubbornness = 229
v
0
50
100
200
0
50
100
150
200
m
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


participant #5
Jansen−Shannon
Kantorovich
discrepancy
20
15
10
5
0
0
50
100
150
200
observation


participant #5, sqrt(robot−participant)
slot
10
20
30
40
50
100
150
200
observation
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0


participant #5, observation 1, KM = 0, JS = 0
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #5, observation 2, KM = 0.53, JS = 0.21
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #5, observation 3, KM = 3.8, JS = 0.35
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #5, observation 4, KM = 4.4, JS = 0.47
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot

participant #5, observation 99, KM = 1.7, JS = 0.22




participant #5, observation 100, KM = 1.7, JS = 0.22
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #5, observation 101, KM = 1.7, JS = 0.22
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #5, observation 102, KM = 1.7, JS = 0.22
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #5, observation 197, KM = 2.1, JS = 0.24
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #5, observation 198, KM = 2.1, JS = 0.24
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #5, observation 199, KM = 2.1, JS = 0.24
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #5, observation 200, KM = 2.1, JS = 0.34
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot