participant #32, means (black: plinko outcomes)



participant #32, st. deviations



std

10

5

0

0

50

100

150

200

observation


h for part. #32, stubbornness = 19.3
v
0
50
100
200
m
0
50
100
150
200
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


participant #32
Jansen−Shannon
Kantorovich
discrepancy
20
15
10
5
0
0
50
100
150
200
observation


participant #32, sqrt(robot−participant)
slot
10
20
30
40
50
100
150
200
observation
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0


participant #32, observation 1, KM = 0, JS = 0
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
probability
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #32, observation 2, KM = 6.1e−16, JS = 2.5e−17
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #32, observation 3, KM = 0.075, JS = 9e−05
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #32, observation 4, KM = 0.25, JS = 0.00045
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #32, observation 99, KM = 2, JS = 0.12
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #32, observation 100, KM = 2, JS = 0.12
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #32, observation 101, KM = 2, JS = 0.12
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #32, observation 102, KM = 2, JS = 0.12
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #32, observation 197, KM = 1.8, JS = 0.061
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #32, observation 198, KM = 1.8, JS = 0.061
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #32, observation 199, KM = 1.8, JS = 0.061
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #32, observation 200, KM = 1.8, JS = 0.062
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot