participant #1, means (black: plinko outcomes)



participant #1, st. deviations



std

10

5

0

0

50

100

150

200

observation


h for part. #1, stubbornness = 2.05
v
0
50
100
200
m
0
50
100
150
200
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0


participant #1
Jansen−Shannon
Kantorovich
discrepancy
observation
0
5
10
15
20
0
50
100
150
200


participant #1, sqrt(robot−participant)
slot
10
20
30
40
50
100
150
200
observation
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0


participant #1, observation 1, KM = 0, JS = 0
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #1, observation 2, KM = 3, JS = 0.091
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #1, observation 3, KM = 4.6, JS = 0.15
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #1, observation 4, KM = 5.7, JS = 0.17
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #1, observation 99, KM = 2, JS = 0.05
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #1, observation 100, KM = 2, JS = 0.051
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot

participant #1, observation 101, KM = 1.9, JS = 0.052




participant #1, observation 102, KM = 1.8, JS = 0.05
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #1, observation 197, KM = 1.6, JS = 0.041
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #1, observation 198, KM = 2.6, JS = 0.061
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #1, observation 199, KM = 2.5, JS = 0.061
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot


participant #1, observation 200, KM = 2.7, JS = 0.063
probability
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
1
5
10
15
20
25
30
35
40
slot