



Folkhälsomyndigheten

Program för workshop PGSI (preliminärt)

Datum 15 juni, kl. 14.45–17.00

Plats: Digitalt möte via Teams

Deltagare: Anders Håkansson, Johan Svensson, Ulla Romild, Håkan Wall, David Forsström, Magnus Johansson, Kristoffer Magnusson, Sara Scholtens, Pi Zetterquist, Jessika Svensson, David Ekstam

Program

12.45–13.15 Fohm inleder, introduktionsrunda

13.15–13.45 KI presenterar resultat från den psykometriska utvärderingen av PGSI

13.45–14.00 Frågestund

14.00–14.10 Paus

14.10–15.00 **Diskussionspass 1: PGSI**

Smågrupper 20 min, helgrupp 30 min. Se diskussionsfrågor nedan.

15.00–15.10 Paus

15.10–15.30 KI presenterar resultat från den psykometriska utvärderingen av kortversionen av PGSI

15.30–15.45 Frågestund

15.45–16.35 **Diskussionspass 2: kortversionen av PGSI**

Smågrupper 20 min, helgrupp 30 min. Se diskussionsfrågor nedan.

16.35–17.00 Summering av dagen och vägen framåt

Underlag för workshopen

Till detta dokument finns tre bilagor:

- Bilaga 1. KI:s rapport från psykometriska analyser av PGSI-9 och PGSI-4
- Bilaga 2. Underlag från kognitiva intervjuer (Fohm)
- Bilaga 3. Underlag från kvantitativ utvärdering av PGSI-4 (Fohm)

Diskussionsfrågor

Diskussionspass 1: PGSI

Analyserna i KI:s rapport visar på ett flertal brister med PGSI, först och främst:

- oordnade svars kategorier
- tvådimensionell struktur (en beteendedimension och en problemdimension)
- invarians över kön och ålder för ett flertal items.

I rapporten påpekas även att konstruktionen av item 7 är problematisk då frågan har dubbla och otydliga frågeställningar samt en villkorande bisats. Kognitiva intervjuer genomförda av Fohm (se bilaga 2) har vidare visat på tolkningsproblem med item 3 på grund av en inbyggd kausalitet.

Fråga 1. Givet problemen som har identifierats, tycker ni att det är befogat att göra ett utvecklingsarbete med PGSI inför framtida spelundersökningar?

Fråga 2. Om ja, vilka av problemen ser ni som viktigast att försöka åtgärda?

Fråga 3. Vilken extern variabel anser ni bör användas om vi ska utvärdera kriterievaliditeten hos ett reviderat mått?

Fråga 3. Vilka konsekvenser får en ändring för uppföljning av spelproblem i Sverige överlag?

Diskussionspass 2: kortversionen av PGSI

I Nationella folkhälsoenkäten (HLV) används en kortversion av PGSI, som består av item 1–4.¹ Syftet med kortversionen är att mäta viss risk för spelproblem (1–2 poäng) respektive problemspelande (3 poäng eller mer). Analyser genomförda av Fohm med data från Swelogs har dock visat att kortversionen är dålig på att identifiera personer inom dessa kategorier när PGSI används som referens (se bilaga 3).²

KI:s analyser av Swelogs-data visar att item 1–3 är de tre enklaste av alla items i PGSI, medan item 4 är ett av de svårare (se figur 44 i rapporten). Ett förslag som lyfts i rapporten är därför att byta ut item 4 mot item 5 eller 9 (vilka båda är relativt lätta) för att centrera måttet på den lägre delen av den latenta skalan.

Fråga 1. Bör kortversionen fokusera på att screena för en låg grad av problem eller bör det täcka in hela skalan av problem?

Fråga 2. Hur ser ni på att byta ut item 4 mot item 5 eller 9 i kortversionen?

Fråga 3. Vilken extern variabel anser ni bör användas om vi ska utvärdera kriterievaliditeten hos ett reviderat mått?

¹ Vi använder en kortversion i syfte att hålla nere uppgiftslämnarbördan i undersökningen.

² Fohm har därför valt att enbart redovisa andelen som har 1 poäng eller mer (vilket vi benämner ”riskabelt spelande”) från HLV.

Fråga 4. Vilka konsekvenser får en ändring för uppföljning av spelproblem i Sverige överlag