

<https://moodle.lmu.de> → Kurse suchen: 'Rechenmethoden'

## Blatt 02: Vektorräume, Euklidische Geometrie

### Lösung Beispielaufgabe 1: $\sqrt{1-x^2}$ -Integrale mittels trigonometrischer Substitution [3]

- (a) Da  $\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ , ist die Stammfunktion des Integranden bekannt, und wir können direkt folgern, dass  $I(z) = [\arcsin x]_0^z = \arcsin z$ .

Alternativ können wir das Integral mittels der Substitution  $x = \sin y$  berechnen, mit  $dx = dy \frac{dx}{dy} = dy \sin' y = dy \cos y$  und  $\sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\sin^2 y} = \cos y$ . Die neuen Integralgrenzen bestimmen wir durch Auswerten von  $y = \arcsin x$  bei  $x = 0$  und  $x = z$ :

$$I(z) = \int_0^z dx \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \int_{\arcsin 0}^{\arcsin z} dy \cos y \frac{1}{\cos y} = \int_0^{\arcsin z} dy = \boxed{\arcsin z}.$$

Kontrollerggebnis:  $I(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \arcsin(\frac{1}{\sqrt{2}}) = \frac{\pi}{4}$ , da  $\sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ . ✓

Überprüfung durch Ableitung:  $\frac{dI(z)}{dz} = \frac{d}{dz} \arcsin z = \boxed{\frac{1}{\sqrt{1-z^2}}}$ . ✓

- (b) Wir substituieren  $x = \frac{1}{a} \sin y$ , mit  $dx = dy \frac{dx}{dy} = dy \frac{1}{a} \cos y$  und  $\sqrt{1-a^2x^2} = \cos y$ :

$$I(z) = \int_0^z dx \sqrt{1-a^2x^2} = \frac{1}{a} \int_{\arcsin 0}^{\arcsin(az)} dy \cos y \cos y \equiv \frac{1}{a} \tilde{I}(b).$$

Wir berechnen das  $\cos^2 y$ -Integral, mit Obergrenze  $b = \arcsin(az)$ , mittels partieller Integration, mit  $u = \cos y$ ,  $v = \sin y$ ,  $u' = -\sin y$ ,  $v' = \cos y$ :

$$\tilde{I}(b) = \int_0^b dy \cos^u y \cos^v y \stackrel{uv-\int u'v}{=} \left[ \cos y \sin y \right]_0^b - \int_0^b dy \underbrace{[-\sin y] \sin y}_{\cos^2 y - 1}$$

$$= b + \cos b \sin b - \tilde{I}(b)$$

$$\Rightarrow \tilde{I}(b) = \frac{1}{2} [b + \sin b \cos b] = \frac{1}{2} [b + \sin b \sqrt{1 - \sin^2 b}].$$

Wir haben die rechte Seite durch  $\sin$  ausgedrückt, denn das Argument von  $\tilde{I}(b)$  ist  $b = \arcsin(az)$ .

$$\Rightarrow I(z) = \frac{1}{a} \tilde{I}(\arcsin(az)) = \boxed{\frac{1}{2a} [\arcsin(az) + az \sqrt{1-a^2z^2}]}$$

Kontrollerggebnis: für  $a = \frac{1}{2}$ ,  $I(\sqrt{2}) = \arcsin(\frac{1}{\sqrt{2}}) + \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$ . ✓

Überprüfung durch Ableitung:  $\frac{dI(z)}{dz} \stackrel{(a)}{=} \frac{1}{2} \left[ \frac{1}{\sqrt{1-a^2z^2}} + \sqrt{1-a^2z^2} + az \frac{-az}{\sqrt{1-a^2z^2}} \right] = \sqrt{1-a^2z^2}$ . ✓

## Lösung Beispielaufgabe 2: Vektorraumaxiome: rationale Zahlen [3]

(a) Zunächst zeigen wir, dass  $(\mathbb{Q}^2, +)$  eine Abelsche Gruppe ist.

(i) Abgeschlossenheit per Definition erfüllt. ✓

(ii) Assoziativität:

$$\begin{aligned} \left[ \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y^1 \\ y^2 \end{pmatrix} \right] + \begin{pmatrix} z^1 \\ z^2 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} x^1 + y^1 \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z^1 \\ z^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x^1 + y^1 + z^1 \\ x^2 + y^2 + z^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y^1 + z^1 \\ y^2 + z^2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} + \left[ \begin{pmatrix} y^1 \\ y^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z^1 \\ z^2 \end{pmatrix} \right]. \quad \checkmark \end{aligned}$$

(iii) Neutrales Element:  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  ist das neutrale Element. ✓

(iv) Additives Inverses:  $\begin{pmatrix} -x^1 \\ -x^2 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^2$  ist das additive Inverse von  $\begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} \in \mathbb{Q}^2$ . ✓

(v) Kommutativität: folgt (komponentenweise) aus der Kommutativität von  $\mathbb{Q}$ . ✓

Nun zeigen wir, dass die skalare Multiplikation,  $\cdot$ , ebenfalls die notwendigen Eigenschaften erfüllt, damit  $(\mathbb{Q}^2, +, \cdot)$  einen Vektorraum bildet. Da das Produkt zweier rationaler Zahlen immer rational ist  $\left( \frac{p_1}{q_1} \cdot \frac{p_2}{q_2} = \frac{(p_1 p_2)}{(q_1 q_2)} \right)$ , ist die Abgeschlossenheit per Definition erfüllt. Weiterhin:

(vi) Multiplikation einer Summe von Skalaren mit einem Vektor ist distributiv:

$$(\lambda + \mu) \cdot \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\lambda + \mu)x^1 \\ (\lambda + \mu)x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda x^1 + \mu x^1 \\ \lambda x^2 + \mu x^2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

(vii) Multiplikation eines Skalars mit einer Summe von Vektoren ist distributiv:

$$\lambda \cdot \left[ \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y^1 \\ y^2 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} \lambda x^1 + \lambda y^1 \\ \lambda x^2 + \lambda y^2 \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} y^1 \\ y^2 \end{pmatrix}. \quad \checkmark$$

(viii) Multiplikation eines Produkts von Skalaren mit einem Vektor ist assoziativ:

$$(\lambda \mu) \cdot \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda \mu x^1 \\ \lambda \mu x^2 \end{pmatrix} = \lambda \left[ \mu \cdot \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} \right]. \quad \checkmark$$

(ix) Neutrales Element:  $1 \cdot \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x^1 \\ x^2 \end{pmatrix}$ . ✓

Daher bildet das Tripel  $(\mathbb{Q}^2, +, \cdot)$  einen  $\mathbb{Q}$ -Vektorraum.

(b) Die Menge der ganzen Zahlen  $\mathbb{Z}$  ist kein Körper, da nicht für jedes  $a \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$  ein multiplikatives Inverses  $a^{-1} \in \mathbb{Z}$  existiert (z.B. hat die Gleichung  $2 \cdot a = 1$  innerhalb der ganzen Zahlen keine Lösung). Daher ist es auch *nicht* möglich, einen Vektorraum über den ganzen Zahlen zu konstruieren.

### Lösung Beispielaufgabe 3: Reeller Vektorraum mit unkonventionellen Verknüpfungsregeln [Bonus]

Zunächst zeigen wir, dass  $(V_a, \oplus)$  eine abelsche Gruppe bildet.

- (i) Abgeschlossenheit gilt per Definition. ✓
- (ii) Assoziativität:  $(\mathbf{v}_x \oplus \mathbf{v}_y) \oplus \mathbf{v}_z = \mathbf{v}_{x+y+a} \oplus \mathbf{v}_z = \mathbf{v}_{(x+y+a)+z+a} = \mathbf{v}_{x+y+z+2a}$   
 $= \mathbf{v}_{x+(y+z+a)+a} = \mathbf{v}_x \oplus \mathbf{v}_{y+z+a} = \mathbf{v}_x \oplus (\mathbf{v}_y \oplus \mathbf{v}_z) \cdot \checkmark$
- (iii) Neutrales Element:  $\mathbf{v}_x \oplus \mathbf{v}_{-a} = \mathbf{v}_{x+(-a)+a} = \mathbf{v}_x$ ,  $\Rightarrow \mathbf{0} = \mathbf{v}_{-a} \cdot \checkmark$
- (iv) Additive Inverse:  $\mathbf{v}_x \oplus \mathbf{v}_{-x-2a} = \mathbf{v}_{x+(-x-2a)+a} = \mathbf{v}_{-a} = \mathbf{0}$ ,  $\Rightarrow -\mathbf{v}_x = \mathbf{v}_{-x-2a} \cdot \checkmark$
- (v) Kommutativität:  $\mathbf{v}_x \oplus \mathbf{v}_y = \mathbf{v}_{x+y+a} = \mathbf{v}_{y+x+a} = \mathbf{v}_y \oplus \mathbf{v}_x \cdot \checkmark$

Auch die Multiplikation eines Vektors mit einem Skalar in  $(V_a, \oplus, \cdot)$  erfüllt alle für einen Vektorraum erforderlichen Eigenschaften. Abgeschlossenheit gilt per Definition. Ferner:

- (vi) Multiplikation von einer Summe von Skalaren und einem Vektor ist distributiv:

$$(\gamma + \lambda) \cdot \mathbf{v}_x = \mathbf{v}_{(\gamma+\lambda)x+a(\gamma+\lambda-1)} = \mathbf{v}_{\gamma x+a(\gamma-1)+\lambda x+a(\lambda-1)+a}$$

$$= \mathbf{v}_{\gamma x+a(\gamma-1)} \oplus \mathbf{v}_{\lambda x+a(\lambda-1)} = \gamma \cdot \mathbf{v}_x \oplus \lambda \cdot \mathbf{v}_x \cdot \checkmark$$

- (vii) Multiplikation von einem Skalar und einer Summe von Vektoren ist distributiv:

$$\lambda \cdot (\mathbf{v}_x \oplus \mathbf{v}_y) = \lambda \cdot \mathbf{v}_{x+y+a} = \mathbf{v}_{\lambda(x+y+a)+a(\lambda-1)} = \mathbf{v}_{\lambda x+a(\lambda-1)+\lambda y+a(\lambda-1)+a}$$

$$= \mathbf{v}_{\lambda x+a(\lambda-1)} \oplus \mathbf{v}_{\lambda y+a(\lambda-1)} = \lambda \cdot \mathbf{v}_x \oplus \lambda \cdot \mathbf{v}_y \cdot \checkmark$$

- (viii) Multiplikation von einem Produkt von Skalaren und einem Vektor ist assoziativ:

$$(\gamma \lambda) \cdot \mathbf{v}_x = \mathbf{v}_{(\gamma \lambda)x+a(\gamma \lambda-1)} = \mathbf{v}_{\gamma(\lambda x+a(\lambda-1))+a(\gamma-1)} = \gamma \cdot \mathbf{v}_{\lambda x+a(\lambda-1)} = \gamma \cdot (\lambda \cdot \mathbf{v}_x) \cdot \checkmark$$

- (ix) Neutrales Element:  $1 \cdot \mathbf{v}_x = \mathbf{v}_{x+a(1-1)} = \mathbf{v}_x \cdot \checkmark$

Folglich ist das Triple  $(V_a, \oplus, \cdot)$  ein  $\mathbb{R}$ -Vektorraum.

### Lösung Beispielaufgabe 4: Lineare Unabhängigkeit [3]

- (a) Die drei Vektoren sind linear unabhängig wenn, und nur wenn, die einzige Lösung der Gleichung

$$\mathbf{0} = a^1 \mathbf{v}_1 + a^2 \mathbf{v}_2 + a^3 \mathbf{v}_3 = a^1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} + a^2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + a^3 \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad \text{with } a^j \in \mathbb{R}, \quad (1)$$

die triviale ist,  $a^1 = a^2 = a^3 = 0$ . Die Vektorgleichung (1) liefert ein System von drei Gleichungen, (i)-(iii), je eine für jede der drei Komponenten von (1), das wir wie folgt lösen:

(i) $0a^1 + 1a^2 + 2a^3 = 0$	$\stackrel{(i)}{\Rightarrow}$	(iv) $a^2 = -2a^3$	
(ii) $1a^1 - 1a^2 - 1a^3 = 0$	$\stackrel{(iv) \text{ in } (ii)}{\Rightarrow}$	(v) $a^1 = -a^3$	
(iii) $2a^1 + 1a^2 + 4a^3 = 0$	$\stackrel{(iv,v) \text{ in } (iii)}{\Rightarrow}$	(vi) $0 = 0$	

(i) liefert (iv):  $a^2 = -2a^3$ . (iv) in (ii) eingesetzt liefert (v):  $a^1 = -a^3$ . (iv) und (v) in (iii) eingesetzt liefern keine neue Information. Somit existieren unendlich viele nicht-triviale Lösungen (eine für jeden Wert von  $a^3 \in \mathbb{R}$ ), also sind  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}_2$  und  $\mathbf{v}_3$  **nicht** linear unabhängig.

- (b) Der gesuchte Vektor  $\mathbf{v}'_2 = (x, y, z)^T$  soll linear unabhängig von  $\mathbf{v}_1$  und  $\mathbf{v}_3$  sein, d.h. seine Komponenten  $x$ ,  $y$  und  $z$  sind so zu wählen, dass die Gleichung  $\mathbf{0} = a^1 \mathbf{v}_1 + a^2 \mathbf{v}'_2 + a^3 \mathbf{v}_3$  keine nicht-triviale Lösung hat, also  $a^1 = a^2 = a^3 = 0$  impliziert:

$$\begin{array}{llll} \text{(i)} & 0a^1 + xa^2 + 2a^3 = 0 & \xrightarrow{\text{(i)}} & \text{(iv)} \quad \text{wähle } \boxed{x=0}, \text{ dann } a^3 = 0. \\ \text{(ii)} & 1a^1 + ya^2 - 1a^3 = 0 & \xrightarrow{\text{(iv) in (ii)}} & \text{(v)} \quad \text{wähle } \boxed{y=0}, \text{ dann } a^1 = 0. \\ \text{(iii)} & 2a^1 + za^2 + 4a^3 = 0 & \xrightarrow{\text{(iv),(v) in (iii)}} & \text{(vi)} \quad \text{wähle } \boxed{z=1}, \text{ dann } a^2 = 0. \end{array}$$

(i) liefert (iv):  $2a^3 = -xa^2$ ; um  $a^3 = 0$  zu erzwingen, wählen wir  $x = 0$ . (iv) in (ii) eingesetzt liefert (v):  $a^1 = -ya^2$ ; um  $a^1 = 0$  zu erzwingen wählen wir  $y = 0$ . (iv,v) in (iii) eingesetzt liefert  $za^2 = 0$ ; um  $a^2 = 0$  zu erzwingen wählen wir  $z = 1$ . Folglich ist  $\boxed{\mathbf{v}'_2 = (0, 0, 1)^T}$  eine Wahl, für die  $\mathbf{v}_1$ ,  $\mathbf{v}'_2$  und  $\mathbf{v}_3$  linear unabhängig sind. Diese Wahl ist nicht eindeutig – es gibt unendlich viele Alternativen; eine davon ist z.B.  $\mathbf{v}'_2 = (0, 1, 0)^T$ .

## Lösung Beispielaufgabe 5: Einsteinsche Summenkonvention [2]

- (a)  $a_i b^i = b^j a_j$  ist **korrekt**, da  $i$  und  $j$  Dummy-Variablen sind, über die summiert wird. Daher können wir nach Belieben umbenennen:

$$a_i b^i = \sum_{i=1}^2 a_i b^i = a_1 b^1 + a_2 b^2 = b^1 a_1 + b^2 a_2 = \sum_{j=1}^2 b^j a_j = b^j a_j. \checkmark$$

- (b)  $a_i \delta^i_j b^j = a_k b^k$  ist **korrekt**, da  $\delta^i_j$  nur für  $i = j$  ungleich null (und gleich 1) ist:

$$a_i \delta^i_j b^j = a_1 \underbrace{(\delta^1_1)}_{=1} b^1 + a_1 \underbrace{(\delta^1_2)}_{=0} b^2 + a_2 \underbrace{(\delta^2_1)}_{=0} b^1 + a_2 \underbrace{(\delta^2_2)}_{=1} b^2 = a_1 b^1 + a_2 b^2 = a_k b^k. \checkmark$$

- (c)  $a_i b^j a_j b^k \stackrel{?}{=} a_k b^l a_l b^i$  ist **falsch**, da sich die Indizes  $i$  und  $k$  *nicht* wiederholen, d.h. es wird nicht über sie summiert und sie können daher nicht umbenannt werden. Beispielsweise für  $i = 1$  und  $k = 2$  sind die linke Seite,  $a_1(b^1 a_1 + b^2 a_2)b^2$ , und die rechte Seite,  $a_2(b^1 a_1 + b^2 a_2)b^1$ , klar verschieden.

- (d)  $a_1 a_i b^1 b^i + b^2 a_j a_2 b^j = (a_i b^i)^2$  ist **korrekt**, da die Multiplikation assoziativ und kommutativ ist und wir Dummy-Indizes nach Belieben umbenennen können:

$$a_1 a_i b^1 b^i + b^2 a_j a_2 b^j = a_1 b^1 a_i b^i + a_2 b^2 a_i b^i = (a_1 b^1 + a_2 b^2)(a_i b^i) = (a_j b^j)(a_i b^i) = (a_i b^i)^2. \checkmark$$


In der Praxis müssen die oben aufgeführten Argumente nicht explizit aufgeschrieben werden. Zusammenhänge wie (a), (b) und (d) können einfach ohne weitere Bemerkungen verwendet werden.

## Lösung Beispielaufgabe 6: Winkel, orthogonale Zerlegung [2]

$$(a) \quad \cos(\angle(\mathbf{a}, \mathbf{b})) = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|} = \frac{3 \cdot 7 + 4 \cdot 1}{\sqrt{9+16} \cdot \sqrt{49+1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \boxed{\frac{\pi}{4}}$$

$$(b) \quad \mathbf{c}_{\parallel} = \frac{(\mathbf{c} \cdot \mathbf{d})\mathbf{d}}{\|\mathbf{d}\|^2} = \frac{3 \cdot (-1) + 1 \cdot 2}{1+4} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \boxed{\frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}}$$

$$\mathbf{c}_{\perp} = \mathbf{c} - \mathbf{c}_{\parallel} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \boxed{\frac{7}{5} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}}$$



$$\text{Konsistenzcheck: } \mathbf{c}_{\perp} \cdot \mathbf{c}_{\parallel} = \frac{7}{25}(1 \cdot 2 - 2 \cdot 1) = 0. \quad \checkmark$$

## Lösung Beispielaufgabe 7: Projektion auf eine Orthonormalbasis [2]

$$(a) \quad \begin{aligned} \langle \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_1 \rangle &= \frac{1}{2}[1 \cdot 1 + 1 \cdot 1] = 1, & \langle \mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2 \rangle &= \frac{1}{2}[1 \cdot 1 + (-1) \cdot 1] = 0. \\ \langle \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_2 \rangle &= \frac{1}{2}[1 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1)] = 1 \end{aligned}$$

Die beiden Vektoren sind normiert und orthogonal zueinander,  $\langle \mathbf{e}'_i, \mathbf{e}'_j \rangle = \delta_{ij}$ , bilden also eine Orthonormalbasis in  $\mathbb{R}^2$ .  $\checkmark$

(b) Da die Vektoren  $\{\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2\}$  eine Orthonormalbasis bilden, ist die Komponente  $w^i$  des Vektors  $\mathbf{w} = (-2, 3)^T = \mathbf{e}'_i w^i$  bezüglich dieser Basis durch die Projektion  $w^i = \langle \mathbf{e}'^i, \mathbf{w} \rangle$  (mit  $\mathbf{e}'^i = \mathbf{e}'_i$ ), gegeben:

$$\begin{aligned} w^1 &= \langle \mathbf{e}'^1, \mathbf{w} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[1 \cdot (-2) + 1 \cdot 3] = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}}, \\ w^2 &= \langle \mathbf{e}'^2, \mathbf{w} \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}[1 \cdot (-2) - 1 \cdot 3] = \boxed{-\frac{5}{\sqrt{2}}}. \end{aligned}$$

## Lösung Beispielaufgabe 8: Gram-Schmidt-Verfahren [2]

Strategie: iterative Orthogonalisierung und Normierung, ausgehend von  $\mathbf{v}_{1,\perp} = \mathbf{v}_1$ :

$$\text{Startvektor: } \mathbf{v}_{1,\perp} = \mathbf{v}_1 = (1, -2, 1)^T$$

$$\text{Normierung } \mathbf{v}_{1,\perp}: \quad \mathbf{e}'_1 = \frac{\mathbf{v}_{1,\perp}}{\|\mathbf{v}_{1,\perp}\|} = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)^T = \mathbf{e}'^1.$$

$$\text{Orthogonalisierung } \mathbf{v}_2: \quad \mathbf{v}_{2,\perp} = \mathbf{v}_2 - \mathbf{e}'_1 \langle \mathbf{e}'^1, \mathbf{v}_2 \rangle = (1, 1, 1)^T - \mathbf{e}'_1(0)$$

$$\text{Normierung } \mathbf{v}_{2,\perp}: \quad \mathbf{e}'_2 = \frac{\mathbf{v}_{2,\perp}}{\|\mathbf{v}_{2,\perp}\|} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T = \mathbf{e}'^2.$$

$$\begin{aligned} \text{Orthogonalisierung } \mathbf{v}_3: \quad \mathbf{v}_{3,\perp} &= \mathbf{v}_3 - \mathbf{e}'_1 \langle \mathbf{e}'^1, \mathbf{v}_3 \rangle - \mathbf{e}'_2 \langle \mathbf{e}'^2, \mathbf{v}_3 \rangle \\ &= (0, 1, 2)^T - \mathbf{e}'_1(0) - \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T \left( 3 \frac{1}{\sqrt{3}} \right) = (-1, 0, 1)^T \end{aligned}$$

Normierung  $\mathbf{v}_{3,\perp}$  : 
$$\mathbf{e}'_3 = \frac{\mathbf{v}_{3,\perp}}{\|\mathbf{v}_{3,\perp}\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T = \mathbf{e}'_3.$$

### Lösung Beispielaufgabe 9: Nicht-Orthogonale Basis und Metrik [4]

(a)  $\hat{\mathbf{v}}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\mathbf{v}}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \quad \Rightarrow \quad \hat{\mathbf{e}}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \boxed{\frac{1}{2}\hat{\mathbf{v}}_1}, \quad \hat{\mathbf{e}}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \boxed{-\frac{1}{2}\hat{\mathbf{v}}_1 + \hat{\mathbf{v}}_2}.$

Die Vektoren  $\hat{\mathbf{v}}_1$  und  $\hat{\mathbf{v}}_2$  bilden eine Basis, da sich beide Standardbasisvektoren  $\hat{\mathbf{e}}_1$  und  $\hat{\mathbf{e}}_2$  durch sie ausdrücken lassen.

(b) Eine Darstellung der Vektoren  $\hat{\mathbf{x}}$  und  $\hat{\mathbf{y}}$  als Spaltenvektoren in der Standardbasis von  $\mathbb{R}^2$  finden wir wie folgt:

$$\hat{\mathbf{x}} = \hat{\mathbf{v}}_1 x^1 + \hat{\mathbf{v}}_2 x^2, \quad x^1 = 3, \quad x^2 = -4 \quad \Rightarrow \quad \hat{\mathbf{x}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} 3 + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} (-4) = \boxed{\begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix}}.$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \hat{\mathbf{v}}_1 y^1 + \hat{\mathbf{v}}_2 y^2, \quad y^1 = -1, \quad y^2 = 3 \quad \Rightarrow \quad \hat{\mathbf{y}} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix} (-1) + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} 3 = \boxed{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}}.$$

Skalarprodukt:  $\langle \hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}} \rangle_{\mathbb{R}^2} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 2 \cdot 1 + (-4) \cdot 3 = \boxed{-10}.$

(c) 
$$\begin{aligned} g_{11} &= \langle \hat{\mathbf{v}}_1, \hat{\mathbf{v}}_1 \rangle_{\mathbb{R}^2} = \boxed{4}, & g_{12} &= \langle \hat{\mathbf{v}}_1, \hat{\mathbf{v}}_2 \rangle_{\mathbb{R}^2} = \boxed{2}, \\ g_{21} &= \langle \hat{\mathbf{v}}_2, \hat{\mathbf{v}}_1 \rangle_{\mathbb{R}^2} = \boxed{2}, & g_{22} &= \langle \hat{\mathbf{v}}_2, \hat{\mathbf{v}}_2 \rangle_{\mathbb{R}^2} = \boxed{2}. \end{aligned}$$

(d) 
$$\begin{aligned} \langle \hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}} \rangle_{\mathbb{R}^2} &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle_g = x^i g_{ij} y^j \\ &= 3 \cdot 4 \cdot (-1) + 3 \cdot 2 \cdot 3 + (-4) \cdot 2 \cdot (-1) + (-4) \cdot 2 \cdot 3 = \boxed{-10}. \quad \checkmark \quad [= (b)] \end{aligned}$$

---

[Gesamtpunktzahl Beispielaufgaben: 21]

---