

処方箋

カルテ番号		発行	年	月	日
病名					
処方	<ul style="list-style-type: none">・薬剤名（一般名）：スボレキサント・英名：suvorexant・分類：オレキシン受容体拮抗薬・分類（略称）：睡眠薬・用法：経口（錠）・表示区分：なし <p>[禁忌・慎重投与]</p> <ul style="list-style-type: none">・禁忌：過敏症既往歴、イトラコナゾール、ボサコナゾール、クラリスロマイシン、リトナビル、ネルフィナビルなど CYP3A を強力に阻害する薬剤を投与中の患者・慎重投与：ナルコレプシー・カタプレキシー患者、高齢者、器質的脳障害のある者 <p>[作用]</p> <p>覚醒促進に関与するオレキシン A、B が OX1、OX2 受容体に結合するのを選択的かつ可逆的に阻害することにより、脳を睡眠状態に移行させ睡眠を誘発する。</p> <p>[適応]</p> <p>不眠症</p> <p>[副作用]</p> <p>頭痛、浮動性めまい、悪夢、傾眠、悪心、入眠時幻覚など</p> <p>④豆知識（国試対策事項や使用の注意等）</p> <ul style="list-style-type: none">●成人は 20 mg 高齢者は 15 mg を 1 日量とする。●製品は光や湿気に弱く、一包化・半錠・粉砕のいずれも出来ない。●服用中はアルコール摂取を避ける。●肝代謝型薬剤であり、腎機能低下時でも使いやすい。●服用後 1～3 時間程度で効果発現し、6～8 時間程度持続する。●そのため、入眠障害と中途覚醒に適する。●二次性不眠には有効性確認されていない。				