

แบบบันทึกการเตรียมยา
กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลท่าศาลา

ตำรับ : Vancomycin oral solution (125 mg/2 ml) ; 60 ml/ขวด
วิธีใช้ยาตามแพทย์สั่ง :จำนวน.....วัน
ปริมาณการผลิต :ml

คำนวณปริมาณยาเตรียมให้เพียงพอต่อการใช้ยาของผู้ป่วย

วัสดุอุปกรณ์ :

- 1. Syringe 10 ml จำนวน 2 อัน
- 2. Needle No. 18 จำนวน 2 อัน
- 3. ขวดแก้วสีชา ขนาด 60 ml จำนวนตามปริมาณการผลิต

ลำดับ	ส่วนประกอบ	Master formula (56 ml)	Working formula	Lot No. / วันหมดอายุ	ผู้ผลิต	ผู้ตรวจสอบซ้ำ
1	Vancomycin inj. 500 mg/vial	7 vial		Lot : EXP :		
2	Sterile water for injection 10 ml/amp	7 amp		Lot : EXP :		

ขั้นตอนการเตรียม :

- 1. ละลายผงยา Vancomycin inj. 500 mg/vial จำนวน 1 vial ด้วย SWFI 8 ml (conc. 125 mg/2 ml)
- 2. ดูดยาที่ละลายแล้วทั้งหมดในขวด ใส่ลงในขวดแก้วสีชาขนาด 60 ซีซี
- 3. ทำตามขั้นตอน 1-2 ซ้ำ ให้ได้ปริมาณยาเตรียมเพียงพอต่อการใช้ของผู้ป่วย

ตารางคำนวณ สำหรับขนาดยามาตรฐาน 125 mg ทุก 6 ชั่วโมง

จำนวนวันที่แพทย์สั่ง	จำนวนครั้ง (dose)	จำนวน Vancomycin inj. (vial)	SWFI 10 ml (amp)	ปริมาณยาน้ำรวม (ml)
5 วัน	20 dose	5 vials	5 amp (ดูดใช้ amp ละ 8 ml)	40 ml
7 วัน	28 dose	7 vials	7 amp (ดูดใช้ amp ละ 8 ml)	56 ml
10 วัน	40 dose	10 vials	10 amp (ดูดใช้ amp ละ 8 ml)	80 ml
14 วัน	56 dose	14 vials	14 amp (ดูดใช้ amp ละ 8 ml)	112 ml

กรณีใช้ขนาดยาอื่นนอกเหนือจากตาราง :

- 1. จำนวน Vancomycin inj. ที่ต้องใช้ (vial) = $\frac{\text{ขนาดยาต่อครั้ง (mg)} \times \text{จำนวนครั้งต่อวัน (ครั้ง)} \times \text{จำนวนวัน (วัน)}}{500}$
- 2. ปริมาณยาน้ำรวมที่ได้ (ml) = จำนวน Vancomycin inj. ที่คำนวณได้ (vial) x 8

ข้อบ่งใช้ : สำหรับ Pseudomembranous colitis (PMC)
ขนาดยาที่แนะนำ : รับประทาน 125 – 500 mg ทุก 6 ชั่วโมง,
ระยะเวลาการรักษา 10 – 14 วัน
ลักษณะยาเตรียม : ยาน้ำใส (solution) ไม่มีสี บรรจุในภาชนะ
ขวดแก้วสีชา ขนาด 60 ml หรือขนาดที่เหมาะสม

ความคงตัว / การเก็บรักษา :

14 วันหลังจากวันผลิต หรือ วันหมดอายุของสารเคมี (เลือกวันที่สั้นกว่า)
เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ป้องกันแสง ในตู้เย็นอุณหภูมิ 2-8 °C

ขั้นตอนการเตรียมยาสำหรับผู้ป่วย (สำหรับผสมยาแต่ละมื้อ)

ดูดยาจากขวด Vancomycin solution (125 mg/2ml)
ปริมาณ.....ml (ตามแพทย์สั่ง)
ผสมยาด้วยน้ำหวาน (กรณีไม่มีช้อนหามาใช้ เพื่อกลบรสเฝื่อนของยา)
หรือน้ำ 10 – 30 ml และรับประทานจนหมด

ลงชื่อ ผู้ผลิต ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบซ้ำ
(.....) (.....)

พื้นที่สำหรับติด Sticker ข้อมูลผู้ป่วย
หรือ ระบุรายละเอียด
ชื่อ-สกุล ผู้ป่วย
HN วันที่ผลิต/...../.....

ฉลากยาติดภาชนะบรรจุ

พื้นที่สำหรับติด Sticker ฉลากเสริม
ข้อมูลวิธีการเตรียมยาที่สั่งพิมพ์อัตโนมัติจาก HOSxP
พร้อมลงชื่อเจ้าหน้าที่ผู้จัดยา