

02.03.2026

Wieviel Stickstoff ist im Boden?

$N_{\min}$ -Gehalte unter Wintergetreide und Winterraps

Autoren:

Rebekka Deimel, Konrad Offenberger, Sarah Kalmbach

Institut für Agrarökologie – Düngung, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising

Beitrag im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt, Ausgabe 11/2026, S. **XX-XX**

Bei Wintergetreide und Winterraps keine Neuberechnung des Düngedarfs erforderlich

Nachdem bereits in der Wochenblatt-Ausgabe 49/2025 die vorläufigen $N_{\min}$ -Werte für alle Hauptfrüchte bekannt gegeben wurden, liegen inzwischen Bodenuntersuchungsergebnisse von Wintergetreide- und Winterrapsflächen vor. Damit stehen in ausreichendem Umfang Daten zur Veröffentlichung der endgültigen $N_{\min}$ -Werte für diese Kulturen zur Verfügung.

Die endgültigen $N_{\min}$ -Werte haben sich gegenüber den vorläufigen Werten nur geringfügig verändert. Eine Neuberechnung der Düngedarfsermittlung ist rechtlich nicht erforderlich.

Die vorläufigen und endgültigen $N_{\min}$ -Werte für Wintergetreide- und Winterrapsflächen sind in Tabelle 1 dargestellt. Erlaubt der Boden anstelle einer möglichen Durchwurzelung von 90 cm nur eine Durchwurzelungstiefe von circa 60 cm sollten 75 Prozent des $N_{\min}$ -Gehalts angesetzt werden. Kann der Boden nur circa 30 cm durchwurzelt werden, sollten 45 Prozent des $N_{\min}$ -Gehalts angesetzt werden.

Tabelle 1: Vorläufige $N_{\min}$ -Werte und endgültige $N_{\min}$ -Werte für Winterungen mit einer tiefen (0-90 cm) Durchwurzelung des Bodens (kg N/ha).

Hauptfrucht	Ober-bayern		Nieder-bayern		Ober-pfalz		Ober-franken		Mittel-franken		Unter-franken		Schwa-ben	
	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig
W-Raps	43	40	44	41	41	39	42	41	39	38	41	39	40	37
W-Gerste	57	54	59	60	57	51	49	49	47	46	53	46	48	45
Triticale, W-Roggen	54	48	59	57	48	48	50	49	46	44	52	48	48	47
W-Weizen, Dinkel	51	54	52	56	60	62	56	56	50	51	59	57	48	48

Die Tabelle ist auch auf der Internetseite der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) unter www.lfl.bayern.de/duengebedarfsermittlung zu finden. Dort sind auch die vorläufigen $N_{\min}$ -Werte der Sommerungen veröffentlicht. Durch die Aufhebung der roten Gebiete dürfen die veröffentlichten $N_{\min}$ -Werte auf allen Flächen mit den entsprechenden Kulturen verwendet werden.