

23.03.2026

Wieviel Stickstoff ist im Boden?

$N_{\min}$ -Gehalte unter Sommergetreide und Rüben

Autoren:

Sarah Kalmbach, Rebekka Deimel, Konrad Offenberger

Institut für Agrarökologie – Düngung, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising

Beitrag im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt, Ausgabe 13/2026, S. **XX-XX**

Nachdem bereits in der Wochenblatt-Ausgabe 11/2026 die endgültigen $N_{\min}$ -Werte für die wichtigsten Winterungen bekannt gegeben wurden, liegen zwischenzeitlich Bodenuntersuchungsergebnisse von Sommergetreide- und Rübenanbauflächen vor. Damit stehen in ausreichendem Umfang Daten zur Veröffentlichung der endgültigen $N_{\min}$ -Werte für diese Kulturen zur Verfügung. Für Mais und Kartoffeln liegen die endgültigen $N_{\min}$ -Werte erst später vor. Dazu werden Sie ebenfalls über das Wochenblatt informiert.

Die vorliegenden endgültigen $N_{\min}$ -Werte für Sommerungen sind in den nachfolgenden Tabellen zusammengestellt und ebenso auf der Internetseite der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) unter www.lfl.bayern.de/duengebedarfsermittlung zu finden. Die auftretenden Unterschiede zwischen den Regierungsbezirken sind bei der Düngebedarfsermittlung entsprechend zu berücksichtigen.

Tabelle 1: Vorläufige und endgültige $N_{\min}$ -Werte für Sommerungen mit einer tiefen (0-90 cm) Durchwurzelung des Bodens (kg N/ha).

	Ober-bayern		Nieder-bayern		Ober-pfalz		Ober-franken		Mittel-franken		Unter-franken		Schwa-ben	
Hauptfrucht	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig
S-Weizen, Durum, S-Roggen, S-Raps	62	60	53	58	55	58	59	63	56	61	60	56	56	54
Z-Rüben, F-Rüben	60	59	52	58	50	53	55	60	57	62	53	57	52	60
Silomais, Körnermais	61		67		56		57		58		57		52	
Sonstige Fruchtarten	62	61	53	57	54	61	54	56	55	53	58	59	57	56

Tabelle 2: Vorläufige und **endgültige** N_{min}-Werte für Sommerungen mit einer mittleren (0-60 cm) Durchwurzelung des Bodens (kg N/ha).

Hauptfrucht	Ober-bayern		Nieder-bayern		Ober-pfalz		Ober-franken		Mittel-franken		Unter-franken		Schwa-ben	
	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig
S-Gerste, Hafer	49	52	37	42	38	43	37	44	40	46	47	47	47	47
Sonnenblumen, Lein	50	49	44	44	46	47	48	49	45	48	51	50	47	47
Kartoffeln	43		41		43		40		36		44		42	
Sonstige Fruchtarten	46	45	39	43	40	45	40	41	41	40	43	44	42	42

Eine Neuberechnung der Düngbedarfsermittlung ist rechtlich nicht erforderlich. Wer im eigenen Interesse eine erneute Berechnung auf Basis der endgültigen Werte durchführen und die Stickstoffdüngung entsprechend anpassen will, kann diese Möglichkeit jedoch nutzen.