

02.04.2026

1 Stickstoffdüngung zu Kartoffeln und Mais

1.1 Die endgültigen $N_{\min}$ -Werte liegen vor

Autoren:

Konrad Offenberger, Rebekka Deimel, Sarah Kalmbach

Institut für Agrarökologie – Düngung, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising

Beitrag im Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblatt, Ausgabe 15/2026, S. 39 – 40

Neben den bereits veröffentlichten $N_{\min}$ -Werten für Winterungen, Sommergetreide und Zuckerrüben liegen zwischenzeitlich ausreichend Bodenuntersuchungsergebnisse für Kartoffeln und Mais vor, die eine Veröffentlichung der endgültigen $N_{\min}$ -Werte für diese Kulturen ermöglichen.

Alle vorläufigen und endgültigen $N_{\min}$ -Werte für das Jahr 2026 sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Weitere Informationen, wie z. B. zur verringerten $N_{\min}$ -Anrechnung bei geringerer Durchwurzelungstiefe des Bodens, sind auf der Internetseite der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LFL) unter www.lfl.bayern.de/duengebedarfsermittlung zu finden.

Tabelle 1: Vorläufige und **endgültige** $N_{\min}$ -Werte in kg N/ha

	Ober-bayern		Nieder-bayern		Ober-pfalz		Ober-franken		Mittel-franken		Unter-franken		Schwa-ben	
Hauptfrucht	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig	Vor-läufig	End-gültig
Tiefe (0 – 90 cm) Durchwurzelung des Bodens														
W-Raps	43	40	44	41	41	39	42	41	39	38	41	39	40	37
W-Gerste	57	54	59	60	57	51	49	49	47	46	53	46	48	45
Triticale, W-Roggen	54	48	59	57	48	48	50	49	46	44	52	48	48	47
W-Weizen, Dinkel	51	54	52	56	60	62	56	56	50	51	59	57	48	48
S-Weizen, Durum, S-Roggen, S-Raps	62	60	53	58	55	58	59	63	56	61	60	56	56	54
Z-Rüben, F-Rüben	60	59	52	58	50	53	55	60	57	62	53	57	52	60
Silomais, Körnermais	61	68	67	77	56	66	57	67	58	62	57	63	52	58
Sonstige Fruchtarten	62	61	53	57	54	61	54	56	55	53	58	59	57	56
Mittlere (0 – 60 cm) Durchwurzelung des Bodens														

Seite 1 von 2

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Internet: www.Lfl.Bayern.de

13.04.2026 / KA(/ Y:\Lfl\OrgEinheiten\IAB\IAB2\A0120_Oeffentlichkeitsarbeit\Fachartikel\BLW\2026\BLW_Heft 15_2026_Nmin Kartoffel und Mais endgültig\Internet\BLW_2026_Heft 15_Nmin Kartoffel und Mais endgültig_MAP.docx

	Ober- bayern		Nieder- bayern		Ober- pfalz		Ober- franken		Mittel- franken		Unter- franken		Schwa- ben	
S-Gerste, Hafer	49	52	37	42	38	43	37	44	40	46	47	47	47	47
Sonnenblumen, Lein	50	49	44	44	46	47	48	49	45	48	51	50	47	47
Kartoffeln	43	38	41	40	43	41	40	38	36	37	44	41	42	40
Sonstige Fruchtarten	46	45	39	43	40	45	40	41	41	40	43	44	42	42

Eine Neuberechnung des Düngedarfs ist rechtlich nicht erforderlich. Wer im eigenen Interesse eine erneute Berechnung auf Basis der endgültigen Werte durchführen und die Stickstoffdüngung entsprechend anpassen will, kann diese Möglichkeit jedoch nutzen

Stickstoffdüngung zu Kartoffeln

Bei der Ermittlung des Stickstoffdüngedarfs wird zwischen den verschiedenen Verwertungsrichtungen – Speise- bzw. Stärkekartoffeln, Frühkartoffeln und Veredelungskartoffeln – unterschieden, während sortenabhängige Ansprüche an die Düngung unberücksichtigt bleiben. Der ermittelte Stickstoffdüngedarf stellt eine Obergrenze dar. Demnach dürfen für bestimmte Kartoffelsorten empfohlene Abschlüsse vom berechneten Düngedarf vorgenommen werden, während Zuschläge nicht zulässig sind.

Für Betriebe, bei denen die endgültige Dammformung erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt, wird empfohlen, die Düngemengen auf leichten Böden von mehr als 80 kg N/ha und auf mittleren sowie schweren Böden von mehr als 100 kg N/ha aufzuteilen. Hierbei sollten 60 % der vorgesehenen Düngemenge kurz vor dem Legen und 40 % vor dem letzten Anhäufeln ausgebracht werden. Bei Verwendung von stabilisierten N-Düngern ist eine Aufteilung der N-Düngung nicht notwendig.

Stickstoffdüngung zu Mais

Der Düngedarf von Mais kann sowohl mit organischen als auch mineralischen Düngemitteln gedeckt werden. Dabei können 30 bis 40 kg N/ha durch die zum Mais häufig praktizierte Unterfußdüngung verabreicht werden. Sind höhere Mengen notwendig, kann der Rest entweder vor der Saat eingearbeitet oder bis zu einer Wuchshöhe von 20 cm gedüngt werden. Ein Düngetermin bei 20 cm Wuchshöhe mit maximal 60 kg N/ha ist zu bevorzugen.