

Đại số - Bài 1: Ứng dụng phương trình bậc hai để giải phương trình nghiệm nguyên

Nguyễn Thành Phát

Lớp 9 (chuyên) - Trung tâm Thành Nhân

3/2023

Trong nội dung của "Chương 4 - Bài 3: Nghiệm của phương trình bậc hai" có kết quả

Điều kiện để có nghiệm nguyên

Cho các số $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Nếu phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ có nghiệm hữu tỉ thì Δ là số chính phương.

Chứng minh.

Vì phương trình có nghiệm

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \in \mathbb{Q}$$

nên $\sqrt{\Delta} \in \mathbb{Q}$. Mà $\Delta = b^2 - 4ac \in \mathbb{Z}$ nên Δ phải là số chính phương. \square

Ví dụ 1

Giải phương trình nghiệm nguyên $x^2 + 3y^2 + 4xy + 2x + 4y = 3$.

Lời giải

Phương trình tương đương

$$x^2 + 2(2y + 1)x + 3y^2 + 4y - 3 = 0.$$

Xem như đây là một phương trình bậc hai theo ẩn x với tham số y , ta có

$$\Delta'_x = (2y + 1)^2 - (3y^2 + 4y - 3) = y^2 + 4.$$

Phương trình có nghiệm nguyên $\iff \Delta'_x$ phải là số chính phương. Đặt $y^2 + 4 = k^2$ với $k \in \mathbb{N}$ thì

$$(y - k)(y + k) = -4.$$

Lời giải.

Đặt $y^2 + 4 = k^2$ với $k \in \mathbb{N}$ thì

$$(y - k)(y + k) = -4.$$

Vì $y - k \leq y + k$ và $y - k \equiv y + k \pmod{2}$ nên

$y - k$		-2	2	-4	-1
$y + k$		2	-2	1	4
y		0			

Với $y = 0$ thì ta có $x^2 + 2x = 3$, do đó $x \in \{-3, 1\}$. Vậy nghiệm nguyên của phương trình là

$$(x, y) \in \{(-3, 0), (1, 0)\}.$$



Ví dụ 2

Giải phương trình nghiệm nguyên $x^2 + 2y^2 - 2xy - 2x - 4y + 6 = 0$.

Lời giải

Phương trình tương đương

$$2y^2 - 2y(x + 2) + x^2 - 2x + 6 = 0.$$

Xem như đây là một phương trình bậc hai theo ẩn y với tham số x , ta có

$$\Delta'_y = (x + 2)^2 - 2(x^2 - 2x + 6) = -x^2 + 8x - 8.$$

Lời giải.

Ta có

$$\Delta'_y = -x^2 + 8x - 8.$$

Vì phương trình có nghiệm nên $\Delta'_y \geq 0$, do đó

$$\begin{aligned}x^2 - 8x + 8 \leq 0 &\iff (x - 4)^2 \leq 8 \\&\iff -\sqrt{8} \leq x - 4 \leq \sqrt{8} \\&\iff \underbrace{4 - \sqrt{8}}_{1,17} \leq x \leq \underbrace{4 + \sqrt{8}}_{6,83}.\end{aligned}$$

Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên $x \in \{2, 3, 4, 5, 6\}$. Với mỗi giá trị của x thì thay vào để tìm y ta có

$$(x, y) \in \{(2, 1), (2, 3), (6, 3), (6, 5)\}.$$



Chú ý

Khi hệ số cao nhất của Δ âm, ví dụ như

$$\Delta_1 = -x^2 + 2x + 3$$

$$\Delta_2 = -3y^2 + 5$$

$$\Delta_3 = -y^3 + 2y^2 - y - 4.$$

Ta thường xử lí bằng cách sử dụng tính chất $\Delta \geq 0$.