



CENTRO DE  
HEMATOLOGIA  
DE SÃO PAULO

## Termo de responsabilidade

Eu, \_\_\_\_\_, portador do RG \_\_\_\_\_,  
declaro q recebi a medicação eritropoietina \_\_\_\_\_ UI.  
Esta medicação deverá ser utilizada para o  
paciente \_\_\_\_\_, em via subcutânea.  
É minha a responsabilidade pelo transporte adequado, pela aplicação e pelo  
retorno da embalagem devidamente acondicionada para o descarte adequado no  
centro de hematologia de São Paulo.  
Declaro ter recebido e entendido as instruções para o acondicionamento,  
transporte e manipulação do medicamento em questão.

São Paulo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data	Lote	Validade	Assinatura
____/____/____			
____/____/____			
____/____/____			
____/____/____			



## Orientações gerais

### Não aplicar se apresentar :

- 1 - Cefaléia semelhante à enxaqueca com pontadas fortes.
- 2 - Sintomas “semelhantes à gripe” tais com cefaléia, dor nas articulações, sensação de fraqueza, tontura.
- 3 - aumento da pressão arterial.

### Uso subcutâneo

A injeção subcutânea é dada por meio de aplicação sob a pele, normalmente atrás do braço, na parte superior da coxa ou no abdômen. O volume máximo por local de injeção é de 1 ml. Portanto, para volumes maiores, deve-se utilizar mais de um local de aplicação.

### Orientações pré aplicação:

Você deve ler atentamente esta bula antes de começar.  
Conservar em temperatura entre 15 e 30°C.  
Proteger da luz e umidade.

### Como aplicar:

Se você for fazer a aplicação, certifique-se que entendeu corretamente as instruções de como deve ser aplicado:

- Limpe a parte de cima do frasco com álcool antes de utilizá-lo.
- Não agite o frasco. Não utilize o medicamento caso observe alguma partícula dentro do frasco.
- Insira a agulha pela borracha localizada na parte superior do frasco. Com a agulha dentro do frasco, vire o frasco de cabeça para baixo e mantenha-o na altura dos olhos.
- Puxe o êmbolo para baixo até atingir a dose indicada, verificando sempre com a marcação indicada na seringa.
- Não administre outras medicações simultaneamente na mesma seringa e não dilua a medicação com outros diluentes.



- Delicadamente, bata na seringa com os dedos, para que as bolhas se dirijam para a parte superior da seringa. Aperte o êmbolo até que não se tenha mais bolhas, e complete a seringa para acertar a dose.
- A área de aplicação também deve ser desinfetada com álcool, antes da injeção.
- Aplique o medicamento sempre em locais diferentes do corpo.
- Troque sempre a seringa a cada aplicação. Não utilize a seringa e a agulha mais de uma vez.
- Após a reconstituição, usar imediatamente.
- Não reutilizar o frasco-ampola após retirar a dose a ser administrada. Desprezar o resto do produto.
- Acondicionar todo o material utilizado de maneira adequada para o retorno ao centro de hematologia e descarte adequado.
- Higienizar caixa térmica e gelox para o retorno ao centro de hematologia de São Paulo, mantendo em local seco e arejado.

***Ciente ,***

---



## Orientações gerais - Pacientes

### Não aplicar se apresentar :

- 1 - cefaléia semelhante à enxaqueca com pontadas fortes.
- 2 - Sintomas “semelhantes à gripe” tais com cefaléia, dor nas articulações, sensação de fraqueza, tontura.
- 3 - aumento da pressão arterial.

### Uso subcutâneo

A injeção subcutânea é dada por meio de aplicação sob a pele, normalmente atrás do braço, na parte superior da coxa ou no abdômen. O volume máximo por local de injeção é de 1 ml. Portanto, para volumes maiores, deve-se utilizar mais de um local de aplicação.

### Orientações pré aplicação:

Você deve ler atentamente esta bula antes de começar.

Conservar em temperatura entre 15 e 30°C.

Proteger da luz e umidade.

### Como aplicar:

Se você for fazer a aplicação, certifique-se que entendeu corretamente as instruções de como deve ser aplicado:

- Limpe a parte de cima do frasco com álcool antes de utilizá-lo.
- Não agite o frasco. Não utilize o medicamento caso observe alguma partícula dentro do frasco.
- Insira a agulha pela borracha localizada na parte superior do frasco. Com a agulha dentro do frasco, vire o frasco de cabeça para baixo e mantenha-o na altura dos olhos.
- Puxe o êmbolo para baixo até atingir a dose indicada, verificando sempre com a marcação indicada na seringa.
- Não administre outras medicações simultaneamente na mesma seringa e não dilua a medicação com outros diluentes.
- Delicadamente, bata na seringa com os dedos, para que as bolhas se dirijam para a parte superior da seringa. Aperte o êmbolo até que não se tenha mais bolhas, e complete a seringa para acertar a dose.
- A área de aplicação também deve ser desinfetada com álcool, antes da injeção.
- Aplique o medicamento sempre em locais diferentes do corpo.
- Troque sempre a seringa a cada aplicação. Não utilize a seringa e a agulha mais de uma vez.
- Após a reconstituição, usar imediatamente.
- Não reutilizar o frasco-ampola após retirar a dose a ser administrada. Desprezar o resto do produto.
- Acondicionar todo o material utilizado de maneira adequada para o retorno ao centro de hematologia e descarte adequado.
- Higienizar caixa térmica e gelox para o retorno ao centro de hematologia de São Paulo, mantendo em local seco e arejado.