


**Università degli Studi di Padova**

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA "TULLIO LEVI-CIVITA "

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN INFORMATICA



## **Il modello Bradley-Terry per l'analisi delle partite della Serie A italiana di calcio**

*Tesi di laurea magistrale*

*Relatore*

Prof. Annamaria Guolo

*Laureando*

Federico Perin

---

ANNO ACCADEMICO 2022-2023



# ABSTRACT

---

Come sappiamo viviamo nell'era dei cosiddetti *Big Data*, dove grazie all'interconnessione; un grande flusso di informazioni e di dati può essere ricavato da ogni possibile attività.

Non fa eccezione il calcio in cui da un paio d'anni, le società calcistiche si affidano a sistemi di analisi per produrre tattiche di gioco ma anche per effettuare *scouting* di giocatori emergenti. Nel calcio moderno perciò, numerose variabili ad esempio il possesso palla, il numero di tiri effettuati da una squadra ecc. vengono raccolte durante una partita di calcio.

Tale fatto scaturlisce l'attenzione su un'ulteriore tematica d'analisi: dato che si hanno a disposizione un gran numero di dati sulle prestazioni delle squadre nelle loro partite, è possibile individuare quali variabili vanno ad influenzare in modo significativo il successo o il fallimento sportivo delle singole squadre?

Da questo quesito nasce la tesi qui presentata che ha come obiettivo di presentare un'analisi che prova a rispondere a tale quesito, attraverso l'utilizzo di tecniche di *Data Mining*, in particolare lo sfruttamento di un modello a comparazione a coppie per le partite di calcio che sia in grado di tenere conto delle covariate specifiche per le partite. Nella nostra analisi tale modello sarà il *Bradley-Terry model*, il quale verrà esteso includendo possibili covariate significative e l'utilizzo di valori di risposta ordinati. Lo studio prenderà in considerazione i dati relativi alle partite della Serie A italiana della stagione 2021/2022.

TO DO + POSSIBLE ADDITIONS



*“If something’s important enough, you should try. Even if the probable outcome is failure.”*

— Elon Musk

# RINGRAZIAMENTI

---

*Innanzitutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al Prof. Annamaria Guolo, relatrice della mia tesi, per l’aiuto ed il sostegno fornitomi durante tutto il lavoro.*

*Desidero ringraziare con affetto i miei genitori per il sostegno, per il grande aiuto che mi hanno dato e per essermi stati vicini in ogni momento durante gli anni di studio.*

*Voglio inoltre ringraziare i miei amici per questi tre bellissimi anni trascorsi assieme e per avermi sempre sostenuto anche nei momenti più difficili.*

*Padova, Febbraio 2023*

Federico Perin



# INDICE

---

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>  | <b>1</b>  |
| 1.1      | Dominio del problema . . . . .                                     | 1         |
| 1.2      | Applicazione . . . . .   | 1         |
| 1.3      | Tecnologie e Tools usati . . . . .                                 | 1         |
| 1.3.1    | Tecnologie . . . . .   | 1         |
| 1.3.2    | Tools . . . . .  | 1         |
| 1.4      | Motivazioni personali . . . . .                                    | 1         |
| 1.5      | Struttura della tesi . . . . .                                     | 1         |
| <b>2</b> | <b>Serie A 2021/2022 dataset</b>                                   | <b>3</b>  |
| 2.1      | Serie A 2021/2022 . . . . .  | 3         |
| 2.1.1    | Ranking . . . . .  | 3         |
| 2.2      | Costruzione del dataset . . . . .                                  | 3         |
| 2.3      | Struttura del dataset . . . . .                                    | 5         |
| 2.3.1    | Dati generali . . . . .  | 6         |
| 2.3.2    | Dati relativi ai tiri . . . . .                                    | 8         |
| 2.3.3    | Dati relati al possesso . . . . .                                  | 8         |
| 2.3.4    | Dati relativi ai passaggi . . . . .                                | 12        |
| 2.3.5    | Dati difensivi . . . . .   | 14        |
| <b>3</b> | <b>Analisi dei dati</b>  | <b>19</b> |
| 3.1      | Preprocessing dei dati . . . . .                                   | 19        |
| 3.2      | Analisi grafica dei dati . . . . .                                 | 19        |
| 3.2.1    | Relazione tra la variabile risposta e le covariate . . . . .       | 22        |
| 3.2.2    | Analisi possibili interazioni . . . . .                            | 32        |
| 3.3      | Ulteriori modifiche del dataset . . . . .                          | 40        |
| 3.3.1    | Modifiche per il pacchetto BradleyTerry2 . . . . .                 | 40        |
| 3.3.2    | Modifiche per il pacchetto BTLLasso . . . . .                      | 41        |
| <b>4</b> | <b>Il modello Bradley-Terry</b>                                    | <b>43</b> |
| 4.1      | Introduzione al Modello Bradley-Terry . . . . .                    | 43        |
| 4.2      | Modello Bradley-Terry con categorie di risposta ordinate . . . . . | 44        |
| 4.3      | Modello Bradley-Terry con effetti dell'ordine . . . . .            | 45        |
| 4.4      | Modello Bradley-Terry con variabili esplicative . . . . .          | 46        |
| 4.5      | Stima e penalizzazione . . . . .                                   | 48        |
| 4.5.1    | LASSO . . . . .  | 49        |
| 4.5.2    | Scelta del parametro di tuning . . . . .                           | 50        |
| <b>5</b> | <b>Risultati dei modelli Bradley-Terry</b>                         | <b>51</b> |
| 5.1      | Premesse . . . . .   | 51        |
| 5.2      | BTM con effetto dell'ordine . . . . .                              | 51        |
| 5.3      | BTM con covariate specifiche dell'oggetto . . . . .                | 53        |

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| 5.4      | Modello Bradley-Terry e LASSO . . . . .      | 56        |
| 5.5      | BTM senza l'intercetta e con LASSO . . . . . | 70        |
| 5.6      | Conclusione dei risultati ottenuti . . . . . | 81        |
| 5.7      | Predizioni . . . . .                         | 84        |
| <b>6</b> | <b>Conclusioni</b>                           | <b>87</b> |
| <b>7</b> | <b>Codice in R</b>                           | <b>89</b> |
| 7.1      | extractRowsAway . . . . .                    | 89        |
| 7.2      | createYFull . . . . .                        | 90        |
| 7.3      | extractData . . . . .                        | 91        |
| 7.4      | extractAll . . . . .                         | 92        |
| 7.5      | colLabel . . . . .                           | 93        |
| 7.6      | rowLabel . . . . .                           | 93        |
|          | <b>Bibliografia</b>                          | <b>95</b> |
|          | <b>Sitografia</b>                            | <b>97</b> |



# ELENCO DELLE FIGURE

---

|      |  |    |
|------|--|----|
| 2.1  | Logo di FBref. . . . .   | 5  |
| 2.2  | Rappresentazione del fuorigioco . . . . .  | 7  |
| 2.3  | In rosso l'area di rigore in un campo da calcio. . . . .   | 9  |
| 2.4  | In rosso la mediana nel campo da calcio. . . . .   | 10 |
| 2.5  | In rosso il centrocampo nel campo da calcio. . . . .   | 11 |
| 2.6  | In rosso la trequarti dell'avversario nel campo da calcio. . . . .   | 11 |
| 2.7  | Esecuzione di un passaggio filtrante . . . . .   | 13 |
| 2.8  | Esecuzione di un cambio di gioco . . . . .   | 13 |
| 2.9  | Rappresentazione di un cross . . . . .   | 14 |
| 2.10 | Rappresentazione di un contrasto in scivolata . . . . .  | 15 |
| 3.1  | Barplot della distribuzione della variabile di risposta <b>Res</b> . . . . .   | 20 |
| 3.2  | Barplot della distribuzione della variabile di risposta per squadra <b>Res</b> . . . . .   | 21 |
| 3.3  | Mosaicplot che mostra la distribuzione degli esiti rispetto alle partite giocate in casa e fuori casa . . . . .  | 22 |
| 3.4  | Boxplot della distribuzione della variabile <b>Poss</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> . . . . .   | 23 |
| 3.5  | Boxplot della distribuzione della variabile <b>SoT</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> . . . . .  | 24 |
| 3.6  | Boxplot della distribuzione della variabile <b>G/Sh</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> . . . . .   | 24 |
| 3.7  | Boxplot della distribuzione della variabile <b>Saves</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> . . . . .  | 25 |
| 3.8  | A sinistra il boxplot della variabile numerica <b>PAtt</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> e a destra il boxplot della variabile numerica <b>PCmp%</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> . . . . . | 27 |
| 3.9  | Boxplot della distribuzione della variabile <b>ToDefPen</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> . . . . .   | 27 |
| 3.10 | Boxplot della distribuzione della variabile <b>ToAttPen</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> . . . . .   | 28 |
| 3.11 | A sinistra il boxplot della variabile numerica <b>FIs</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> e a destra il boxplot della variabile numerica <b>FId</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> . . . . .    | 29 |
| 3.12 | Boxplot della distribuzione della variabile <b>Int</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> . . . . .  | 30 |
| 3.13 | Boxplot della distribuzione della variabile <b>TklWin</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> . . . . .   | 31 |
| 3.14 | Boxplot della distribuzione della variabile <b>Recov</b> rispetto ai valori della variabile risposta <b>Res</b> . . . . .  | 31 |
| 3.15 | Grafico delle correlazioni di ogni coppia di variabili . . . . .   | 33 |
| 3.16 | Scatterplot della distribuzione della variabile <b>Sh</b> rispetto ai valori della variabile <b>ToAttPen</b> . . . . .   | 34 |

|      |   |    |
|------|---|----|
| 3.17 | Scatterplot della distribuzione della variabile <b>Sh</b> rispetto ai valori della variabile <b>G/Sh</b> . . . . .  | 35 |
| 3.18 | Scatterplot della distribuzione della variabile <b>Sh</b> rispetto ai valori della variabile <b>Poss</b> . . . . .  | 36 |
| 3.19 | Scatterplot della distribuzione della variabile <b>ToMid3rd</b> rispetto ai valori della variabile <b>LPAtt</b> . . . . .   | 37 |
| 3.20 | Scatterplot della distribuzione della variabile <b>ToMid3rd</b> rispetto ai valori della variabile <b>PCmp%</b> . . . . .   | 37 |
| 3.21 | Scatterplot della distribuzione della variabile <b>TotDist</b> rispetto ai valori della variabile <b>PCmp%</b> . . . . .  | 38 |
| 3.22 | Scatterplot della distribuzione della variabile <b>PAtt</b> rispetto ai valori della variabile <b>PCmp%</b> . . . . .   | 39 |
| 3.23 | Scatterplot della distribuzione della variabile <b>ToDefPen</b> rispetto ai valori della variabile <b>ToAttPen</b> . . . . .  | 39 |
| 5.1  | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del possesso della palla per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .                                  | 62 |
| 5.2  | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di tiri in porta per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .                               | 62 |
| 5.3  | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di passaggi corti tentati per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .                      | 63 |
| 5.4  | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima della percentuale di passaggi corti riusciti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .              | 63 |
| 5.5  | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima della percentuale di passaggi medi riusciti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .               | 64 |
| 5.6  | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima della percentuale di passaggi lunghi riusciti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .             | 65 |
| 5.7  | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di tocchi fatti nell'area di rigore avversaria per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . . | 65 |
| 5.8  | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di falli subiti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .                                | 66 |

|      |  |    |
|------|--|----|
| 5.9  | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di falli fatti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .                                | 66 |
| 5.10 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di fuorigioco fatti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .                           | 67 |
| 5.11 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di cross fatti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .                                | 68 |
| 5.12 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di contrasti vinti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .                            | 68 |
| 5.13 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di recuperi per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .                                   | 69 |
| 5.14 | Grafico che riporta l'importanza delle covariate rispetto alle norme L2 al variare del parametro di tuning $\lambda$ secondo le stime del modello (4.12). La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .                                       | 69 |
| 5.15 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del possesso della palla per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .                                  | 73 |
| 5.16 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di tiri in porta per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .                               | 74 |
| 5.17 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima della percentuale di passaggi corti riusciti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . .                | 74 |
| 5.18 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima della percentuale di passaggi medi riusciti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . .                 | 75 |
| 5.19 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima della percentuale di passaggi lunghi riusciti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . .               | 75 |
| 5.20 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di tocchi fatti nell'area di rigore avversaria per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . . | 76 |

|      |   |    |
|------|---|----|
| 5.21 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di falli fatti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .      | 77 |
| 5.22 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di falli subiti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .     | 77 |
| 5.23 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di fuorigioco fatti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . . | 78 |
| 5.24 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di cross fatti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .      | 78 |
| 5.25 | Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di contrasti vinti per ogni squadra al variare del parametro di tuning $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning $\lambda$ ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali. . . . .  | 79 |
| 5.26 | Grafico a effetto stella che riporta il contributo medio di una covariata sull'abilità di una singola squadra secondo il modello (5.2). . . . .   | 80 |
| 5.27 | Grafico a effetto stella che riporta il contributo medio di una covariata sull'abilità di una singola squadra secondo il modello (5.2). . . . .   | 81 |
| 5.28 | Grafico che riporta il contributo medio di una covariata sull'abilità di una singola squadra secondo il modello 5.2. . . . .  | 82 |
| 5.29 | Grafico che riporta l'importanza delle covariate rispetto alle norme L2 al variare del parametro di tuning $\lambda$ . . . . .  | 83 |
| 5.30 | La prima tabella indica le predizioni di 80 partite fatte dal modello (4.1), la seconda dal modello (5.1), la terza dal modello (4.12), la quarta dal modello (5.2) e la quinta dai <i>bookmakers</i> . . . . .   | 85 |
| 5.31 | La prima tabella indica le sensibilità delle predizioni del modello (4.1), la seconda del modello (5.1), la terza del modello (4.12), la quarta del modello (5.2) e la quinta dei <i>bookmakers</i> . . . . .   | 85 |
| 5.32 | La prima tabella indica le specificità delle predizioni del modello (4.1), la seconda del modello (5.1), la terza del modello (4.12), la quarta del modello (5.2) e la quinta dei <i>bookmakers</i> . . . . .   | 86 |

# ELENCO DELLE TABELLE

---

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 2.1 | La tabella mostra i punti guadagnati da ogni squadra con il loro piazzamento. Inoltre viene mostrata la percentuale di punti guadagnati in casa. . . . .  | 4  |
| 2.2 | La tabella mostra un estratto del <i>dataset</i> utilizzato i cui dati sono stati ricavati da FBref. . . . .  | 5  |
| 2.3 | La tabella riassuntiva variabili presenti nel <i>dataset</i> . . . . .  | 16 |
| 2.4 | Tabella corrispondenza nomi originali e nomi nel <i>dataset</i> . . . . .   | 17 |
| 4.1 | Tipi di covariate e possibili parametrizzazioni applicabili al parametro abilità $\gamma$ . . . . .   | 48 |
| 5.1 | Per ogni squadra viene riportata l'abilità stimata, lo <i>Standard Error</i> (SE), il <i>Quasi Standard Error</i> (QSE) e il <i>Quasi Variance</i> (QV). Nella tabella viene indicato con un asterisco le squadre con un piazzamento stimato diverso da quello reale. . . . . | 52 |
| 5.2 | Stime delle abilità con relativi <i>Standard Error</i> (SE), <i>Quasi Standard Error</i> (QSE) e <i>Quasi Variance</i> (QV). Nella tabella viene indicato con un asterisco le squadre con un piazzamento stimato diverso da quello reale. . . . .                             | 54 |
| 5.3 | Stime delle covariate con relativo <i>Standard Error</i> (SE), stimate dal modello 5.1. . . . .   | 55 |
| 5.4 | Stime delle abilità per ogni squadra stimate dal modello (4.12). Nella tabella viene indicato con un asterisco le squadre con un piazzamento stimato diverso da quello reale. . . . .   | 57 |
| 5.5 | Stime delle covariate stimate dal modello (4.12). . . . .   | 59 |
| 5.6 | Stime delle covariate stimate dal modello (4.12). . . . .   | 60 |
| 5.7 | Stime delle covariate stimate dal modello (5.2). . . . .  | 71 |
| 5.8 | Stime delle covariate stimate dal modello (5.2). . . . .  | 72 |



# 1 | INTRODUZIONE

---

MEMO: Spiegazione del problema affrontato (il suo dominio) alcune applicazioni fatte nell'ambito delle comparazioni sportive, con maggior attenzione a qui studi con approccio statistico, esporre tecnologie usate e tools (Packages R ecc), motivazione scelta argomento della tesi e esposizione struttura della tesi(capitoli) TO DO

## 1.1 Dominio del problema

## 1.2 Applicazione

## 1.3 Tecnologie e Tools usati

### 1.3.1 Tecnologie

### 1.3.2 Tools

## 1.4 Motivazioni personali

## 1.5 Struttura della tesi





## 2 | SERIE A 2021/2022 DATASET

---

*Nel seguente capitolo verrà descritta la raccolta dati effettuata per costruire il dataset riguardante le partite di calcio della Serie A italiana della stagione 2021/2022 e la struttura di tale dataset.*

### 2.1 Serie A 2021/2022

L'analisi effettuata ha preso in considerazione le partite della Serie A italiana della stagione 2021/2022. La Serie A è un torneo che comprende 20 squadre sparse per tutta l'Italia, alcune anche della stessa città, come ad esempio Milan e Inter per Milano. Tale torneo è organizzato con una struttura *Double-Round-Robin*, dove ogni squadra affronta due volte le altre 19 avversarie del torneo. Vi è quindi una partita di andata e una di ritorno. In base al sorteggio necessario alla creazione del calendario delle partite si decide quale delle due partite sarà giocata in casa oppure fuori casa (in casa dell'avversario).

Il torneo della stagione 2021/2022 è iniziato il 22 Agosto con Inter - Genoa e si è concluso il 22 Maggio con le partite Salernitana - Udinese e Venezia - Cagliari, per un totale 380 partite giocate, suddivise in 38 turni, ciascuno composto da 10 partite.

#### 2.1.1 Ranking

Le squadre di calcio sono classificate in base all'ordine dei punti che hanno totalizzato al termine della stagione. In un torneo calcistico, per ogni partita, la squadra vincitrice guadagna tre punti, la squadra sconfitta guadagna un punto, mentre, in caso di pareggio, entrambe le squadre guadagnano un punto. Nel torneo della Serie A chi guadagna più punti vince il campionato, mentre chi si classifica tra le ultime tre retrocede alla lega inferiore, la Serie B. Il posto delle tre squadre retrocesse verrà preso da tre squadre della Serie B che hanno guadagnato la promozione alla Serie A.

La classifica della stagione 2021/2022 è riportata nella Tabella 2.1.

### 2.2 Costruzione del dataset

Al giorno d'oggi, nelle partite di calcio professionistico viene raccolta un'enorme quantità di variabili. Ad esempio, per ogni squadra è noto il tempo in percentuale del possesso della palla e il numero di tiri in porta in una determinata partita. L'obiettivo principale di questo lavoro è determinare l'influenza che queste variabili hanno sull'esito della partita.

A tale scopo, sono state raccolte un gran numero di variabili che si suppone essere associate all'esito della partita.

Tali dati sono stati offerti dal sito web **fbref**, un sito web dedicato al tracciamento delle statistiche relative ai calciatori e alle squadre di calcio di tutto il mondo. **fbref**

| Posizione | Squadra       | Punti | % casa |
|-----------|---------------|-------|--------|
| 1         | Milan         | 86    | 0.47   |
| 2         | Inter         | 84    | 0.54   |
| 3         | Napoli        | 79    | 0.46   |
| 4         | Juventus      | 70    | 0.50   |
| 5         | Lazio         | 64    | 0.56   |
| 6         | Roma          | 63    | 0.57   |
| 7         | Fiorentina    | 62    | 0.66   |
| 8         | Atalanta      | 59    | 0.33   |
| 9         | Hellas Verona | 53    | 0.57   |
| 10        | Torino        | 50    | 0.58   |
| 11        | Sassuolo      | 50    | 0.48   |
| 12        | Udinese       | 47    | 0.53   |
| 13        | Bologna       | 46    | 0.61   |
| 14        | Empoli        | 41    | 0.42   |
| 15        | Sampdoria     | 36    | 0.58   |
| 16        | Spezia        | 36    | 0.50   |
| 17        | Salernitana   | 31    | 0.48   |
| 18        | Genoa         | 30    | 0.50   |
| 19        | Cagliari      | 28    | 0.61   |
| 20        | Venezia       | 27    | 0.52   |

**Tabella 2.1:** La tabella mostra i punti guadagnati da ogni squadra con il loro piazzamento. Inoltre viene mostrata la percentuale di punti guadagnati in casa.

mette a disposizione i dati sotto forma di tabelle che possono essere modificate per mantenere solo i dati di nostro interesse.

Dunque, per ogni squadra che ha partecipato alla stagione 2021/2022 di Serie A, sono state esportate le variabili di interesse per ogni partita giocata, selezionando le macro aree opportune e adattando le tabelle per ottenere solo i dati utili. Le varie tabelle hanno composto un file *Excel* divenuto il *dataset* per le analisi svolte nelle tesi



**Figura 2.1:** Logo di FBRef.  
Source: <https://fbref.com>

## 2.3 Struttura del dataset

Il *dataset* risultante dalla raccolta dati è composto da 760 righe e 35 colonne. Ogni riga riguarda una specifica partita di calcio giocata dalla squadra indicata nella colonna **Team** contro la squadra indicata nella colonna **Vs**. Ogni riga contiene informazioni riguardanti solo la squadra indicata in **Team** fatta eccezione per la data della partita (**Date**), il turno (**Round**) e gli spettatori (**Spec**). Quindi, per ogni partita esistono due righe, una per ciascuna squadra coinvolta. Come risultato finale, ogni squadra appare nella colonna **Team** 38 volte e, siccome il numero totale di squadre è 20, si ottengono 760 righe. La Tabella 2.2 mostra un breve estratto dei dati riguardanti le prime tre partite della stagione.

| Date         | AtHome | Res | GF  | GA  | Team      | Vs        | Poss | ... |
|--------------|--------|-----|-----|-----|-----------|-----------|------|-----|
| 21/08/2021   | TRUE   | 1   | 4   | 0   | Inter     | Genoa     | 0,59 | ... |
| ...          | ...    | ... | ... | ... | ...       | ...       | ...  | ... |
| 22/08/2021   | TRUE   | 1   | 2   | 0   | Napoli    | Venezia   | 0,56 | ... |
| ...          | ...    | ... | ... | ... | ...       | ...       | ...  | ... |
| 23/08/2021   | FALSE  | 1   | 1   | 0   | Milan     | Sampdoria | 0,51 | ... |
| ...          | ...    | ... | ... | ... | ...       | ...       | ...  | ... |
| 21/08/2021   | FALSE  | -1  | 0   | 4   | Genoa     | Inter     | 0,41 | ... |
| ...          | ...    | ... | ... | ... | ...       | ...       | ...  | ... |
| 22/08/2021   | FALSE  | -1  | 0   | 2   | Venezia   | Napoli    | 0,44 | ... |
| ...          | ...    | ... | ... | ... | ...       | ...       | ...  | ... |
| 23/08/2021 1 | TRUE   | 1   | 0   | 1   | Sampdoria | Milan     | 0,49 | ... |
| ...          | ...    | ... | ... | ... | ...       | ...       | ...  | ... |

**Tabella 2.2:** La tabella mostra un estratto del *dataset* utilizzato i cui dati sono stati ricavati da FBRef.

Come scritto precedentemente all'interno del *dataset* sono presenti 35 colonne. Oltre

alle già citate **Date**, **Round** e **Spec** che hanno solo un valore di completezza dei dati, le restanti 32 colonne sanno le possibili variabili che possono influenzare l'esito della partita. Le covariate sono state raggruppate nelle seguenti cinque macro-aree:

- \* dati generali,
- \* dati relativi ai tiri,
- \* dati possesso,
- \* dati passaggi,
- \* dati difensivi,

che sono illustrate di seguito.

### 2.3.1 Dati generali

In questo gruppo sono presenti le variabili legate a statistiche che non fanno parte di una precisa macro-area ma che descrivono più genericamente la partita giocata. Le possibili covariate sono le seguenti:

- \* **AtHome**: indica se la squadra specificata della variabile **Team** gioca nel proprio stadio, quindi in casa oppure fuori casa. Per indicare se la squadra gioca in casa viene messo come valore **TRUE** altrimenti **FALSE**.

Come mostrato nella terza colonna della Tabella 2.1, la quale indica in percentuale quante partite sono state vinte in casa per ogni singola squadra, ci sono 11 squadre che hanno avuto un leggero vantaggio nel giocare in casa le partite di calcio rispetto a altre sei squadre che hanno avuto l'effetto opposto, mentre le rimanenti tre hanno avuto un effetto nullo.

- \* **Res**: indica se la squadra specificata della variabile **Team** ha vinto, pareggiato o perso la partita. Per indicare se ha vinto viene inserito il valore 1, se ha pareggiato 0, altrimenti se ha perso -1. **Res** sarà la variabile risposta.
- \* **GF**: indica il numero di gol fatti dalla squadra specificata della variabile **Team**.  
È stata inserita perché può permettere di valutare la qualità della fase offensiva della squadra e quindi ci si aspetta che possa essere utile ai fini dell'analisi.
- \* **GA**: Indica il numero di gol subiti dalla squadra specificata della variabile **Team** e quindi fatti dalla squadra indicata nella variabile **Vs**.

Essa può essere utile perché subire pochi gol incide positivamente sull'esito della partita, limitando l'esposizione della squadra ad uno sbilanciamento in attacco per recuperare lo svantaggio e quindi rischiando maggiormente di subire ulteriori gol dagli avversari. Inoltre, è un fatto riconosciuto che aver la miglior difesa del campionato è associato ad una maggiore probabilità di vittoria del campionato.

- \* **Team**: indica il nome della squadra a cui i dati della riga fanno riferimento.
- \* **Vs**: indica il nome della squadra avversaria.


- \* **FIs:** indica il numero di falli fatti dai giocatori della squadra specificata della variabile **Team**.

Questa variabile è stata inserita per capire se una squadra adotta un gioco più fisico/tattico. In questo caso sarà più propensa a interrompere il gioco della squadra avversaria e a commettere più falli. Si vuole perciò capire come questa variabile possa essere associata all'esito della partita, ricordando però che una squadra che commette molti falli è più soggetta a ricevere cartellini gialli o rossi che condizionano la prestazione dei giocatori.

- \* **FId:** indica il numero di falli subiti ai giocatori della squadra specificata della variabile **Team** da parte della squadra avversaria specificata della variabile **Vs**.

Si è deciso di inserire questa covariata perché un alto numero di falli può portare a molte interruzione della manovra di gioco e quindi permettere alla squadra avversaria di riorganizzarsi.

- \* **Off:** indica il numero di volte che la squadra specificata della variabile **Team** è finita in fuorigioco. Un calciatore si trova in posizione di fuorigioco quando una qualsiasi parte del suo corpo, fatta eccezione per braccia e mani, si trova nella metà campo avversaria ed è più vicina alla linea di porta avversaria, sia rispetto al pallone che rispetto al penultimo giocatore difendente avversario, portiere compreso nel caso in cui un compagno di questi è più vicino alla linea di porta. Una rappresentazione grafica del fuorigioco è mostrata nella Figura 2.2.



**Figura 2.2:** Rappresentazione del fuorigioco

Source: <https://sport.sky.it/calcio/2021/10/05/fifa-figc-var-fuorigioco>

È stata inserita perché, se una squadra viene colta molte volte in fuorigioco allora il suo gioco sarà interrotto con vantaggio della squadra avversaria che farà ripartire la sua azione a proprio favore.

### 2.3.2 Dati relativi ai tiri

In questo gruppo sono presenti le variabili collegate alla fase offensiva della squadra in esame.

- \* **Sh**: indica il numero di tiri totali fatti dalla squadra specificata della variabile **Team**. Quindi vengono conteggiati il numero di tiri in porta più i tiri fuori dalla porta.

Una squadra che effettua tanti tiri ha più probabilità di segnare un gol. Occorre però capire quanto è precisa una squadra nel centrare la porta.

- \* **SoT**: Indica il numero di tiri in porta totali fatti dalla squadra specificata della variabile **Team**.

Una squadra con un alto valore di tiri in porta è più probabile che possa segnare un gol. **SoT** permette di capire quanto è precisa in combinazione con **Sh** la squadra di calcio nel centrare la porta.

- \* **G/Sh**: indica la proporzione tra gol e tiri fatti dalla squadra specificata della variabile **Team**.

Questo può permettere di capire quanto la produzioni di tiri della squadra è efficace o meno. Con **Sh** e **SoT** si riesce a valutare quanto sia offensiva la squadra, cioè se essa gioca costantemente in attacco o utilizza la tattica "difesa e contropiede". Inoltre permette di capire quanto la squadra sia precisa nell'effettuare i tiri in porta.

### 2.3.3 Dati relati al possesso

In questo gruppo sono contenute le variabili collegate al possesso della palla

- \* **Poss**: indica la quantità di tempo (in percentuale) di possesso palla durante una partita di calcio per la squadra specificata della variabile **Team**. Nel gioco del calcio, con il termine "possesso palla" si intende un'azione manovrata di due o più giocatori che riescono a passarsi la palla evitando i contrasti degli avversari. Durante la partita, ogni volta che una squadra ha il dominio della palla si dice che questa squadra è in fase di "possesso palla", quindi in questa variabile viene indicato quanto questa fase è durata nell'intera partita.

Il metodo più comune utilizzato per calcolare il possesso palla di una squadra si basa sull'utilizzo di tre cronometri, uno per ciascuna formazione più uno per i tempi morti. Quando un giocatore della squadra A tocca un pallone che prima era in possesso della squadra B, il cronometro della squadra A parte e quello della squadra B si ferma e così via. Il terzo cronometro registra il tempo in tutte le situazioni di palla inattiva, ad esempio, rimesse laterali, calci di punizione ecc.. I tempi vengono poi trasformati in percentuali. Per una registrazione più sofisticata, si possono utilizzare ventidue cronometri, uno per ogni giocatore.

La variabile è stata inserita perché, la supremazia nel possesso palla è solitamente desiderabile e utile, dati i seguenti vantaggi:


- spingere l'avversario a muoversi verso la palla per allontanarlo dalla difesa della propria porta per poi sorprenderlo negli spazi lasciati incustoditi.

- modulare il ritmo della gara, ad esempio, se una squadra sta vincendo con un gol di scarto, "congela" il risultato mantenendo il possesso della palla in modo da non ricevere attacchi da parte della squadra avversaria.

Il possesso palla però non garantisce la vittoria. Produrre un possesso palla "sterile", cioè senza che questo porti alla produzioni di azioni offensive, può esporre la squadra in possesso della palla a contropiedi nel caso in cui la palla venga persa e quindi all'alto rischio di subire gol perché sbilanciata e non ben posizionata. Vedremo di seguito quali variabili possono essere utili per capire se il possesso palla fatto dalla squadra è "sterile" oppure no.

- \* **ToDefPen**: indica il numero di tocchi fatti dai giocatori della squadra specificata della variabile **Team** nella propria area di rigore.

Questa variabile è stata inserita perché può essere utile per capire come venga gestito il possesso della palla. Se vi è un alto numero di tocchi, vuol dire che la squadra subisce molto la pressione della squadra avversaria, viceversa cerca di fare un gioco più offensivo. Questa variabile, in combinazione con le variabili **ToDef3rd**, **ToMid3rd**, **ToAtt3rd** e **ToAttPen** permette di capire se il possesso della palla fatto della squadra sia utile e porti benefici ai fini del risultato oppure sia sterile. Inoltre, si vuole capire in che misura come **ToDefPen** influenza il risultato della partita con un alto o un basso valore di numero di tocchi nella propria area di rigore, la cui area è indicata nella Figura 2.3.




**Figura 2.3:** In rosso l'area di rigore in un campo da calcio.

Source: <https://it.freepik.com/foto-vettori-gratuito/campo-da-calcio>

- \* **ToDef3rd**: indica il numero di tocchi fatti dai giocatori della squadra specificata della variabile **Team** nella propria mediana o trequarti difensiva.

Questa variabile è stata inserita perché può essere utile per capire come venga gestito il possesso della palla. Se vi è un alto numero di tocchi, vuol dire che la squadra cerca di mantenere il possesso palla creando poche azioni offensive, viceversa cerca di fare un gioco più offensivo. Questa variabile, in combinazione con **ToDefPen**, **ToMid3rd**, **ToAtt3rd** e **ToAttPen**, permette di capire se il possesso della palla fatto della squadra sia utile e porti benefici ai fini del risultato oppure

sia sterile. Inoltre, si vuole capire in che misura `ToDef3rd` influenza il risultato della partita con un alto o un basso valore di numero di tocchi nella propria mediana la cui area, è indicata nella Figura 2.4.



**Figura 2.4:** In rosso la mediana nel campo da calcio.

Source: <https://it.freepik.com/foto-vettori-gratuito/campo-da-calcio>

- \* `ToMid3rd`: indica il numero di tocchi fatti dai giocatori della squadra specificata della variabile `Team` a centrocampo.


Questa variabile è stata inserita perché può essere utile per capire come venga gestito il possesso della palla. Se vi è un alto numero di tocchi, vuol dire che la squadra cerca di mantenere il possesso palla cercando di creare delle azioni offensive, viceversa cerca di fare un gioco più difensivo. Questa variabile, in combinazione con le variabili `ToDefPen`, `ToDef3rd`, `ToAtt3rd` e `ToAttPen`, permette di capire se il possesso della palla fatto dalla squadra sia utile e porti benefici ai fini del risultato oppure sia sterile. Inoltre, si vuole capire in che misura `ToMid3rd` influenza il risultato della partita con un alto o un basso valore di numero di tocchi a centrocampo la cui area, è indicata nella Figura 2.5.

- \* `ToAtt3rd`: indica il numero di tocchi fatti dai giocatori della squadra specificata della variabile `Team` a nella trequarti dell'avversario.

Questa variabile è stata inserita perché può essere utile per capire come venga gestito il possesso della palla. Se vi è un alto numero di tocchi, vuol dire che la squadra cerca di mantenere il possesso palla per effettuare una pressione sulla squadra avversaria affinché si possano creare degli spazi per delle azioni offensive, viceversa cerca di fare un gioco molto più difensivo. Questa variabile, in combinazione con le variabili `ToDefPen`, `ToDef3rd`, `ToMid3rd` e `ToAttPen`, permette di capire se il possesso della palla fatto della squadra sia utile e porti benefici ai fini del risultato oppure sia sterile. Inoltre, si vuole capire in che misura `ToAtt3rd` influenza il risultato della partita con un alto o un basso valore di numero di tocchi nella trequarti dell'avversario la cui area, è indicata nella Figura 2.6.


- \* `ToAttPen`: indica il numero di tocchi fatti dai giocatori della squadra specificata della variabile `Team` a nell'area di rigore dell'avversario.





**Figura 2.5:** In rosso il centrocampo nel campo da calcio.

Source: <https://it.freepik.com/foto-vettori-gratuito/campo-da-calcio>



**Figura 2.6:** In rosso la tre quarti dell'avversario nel campo da calcio.

Source: <https://it.freepik.com/foto-vettori-gratuito/campo-da-calcio>

Questa variabile è stata inserita perché può essere utile per capire come venga gestito il possesso della palla. Se vi è un alto numero di tocchi, vuol dire che la squadra cerca di mantenere il possesso palla applicando un'alta pressione sulla squadra avversaria affinché si possano creare molte occasioni da gol in area, viceversa o la squadra subisce troppo la pressione dell'avversario oppure tende ad avere un gioco molto difensivo. Questa variabile, in combinazione con le variabili `ToDefPen`, `ToDef3rd`, `ToMid3rd` e `ToAtt3rd` permette di capire se il possesso della palla fatto della squadra sia utile e porti benefici ai fini del risultato oppure sia sterile. Inoltre, si vuole capire in che misura `ToAttPen` influenza il risultato della partita con un alto o un basso valore di numero di tocchi nell'area di rigore dell'avversario.

- \* **ToDist**: Indica la distanza totale, espressa in metri, in cui un giocatore della squadra specificata della variabile **Team** si è mosso con la palla in qualsiasi direzione, controllandola con i piedi.

Questa variabile è stata inserita perché permette di comprendere se il possesso della palla sia stato statico, ovvero i giocatori si sono mossi poco senza avanzare, oppure no. Sarà di interesse analizzare se un alto valore di metri percorsi con palla al piede possa essere utile ad ottenere la vittoria.

### 2.3.4 Dati relativi ai passaggi

In questo gruppo vi sono raggruppate le variabili collegate ai passaggi della palla.

- \* **PAtt**: Indica il numero di tutti i passaggi tentati dai giocatori della squadra specificata della variabile **Team**.

Utile a capire quanto la squadra sia incline a tentare i passaggi.

- \* **PCmp%**: Indica la percentuale di passaggi riusciti ai giocatori della squadra specificata della variabile **Team**.

È stata inserita perché permette di capire quanti passaggi siano andati a buon fine tra tutti quelli tentati e quindi la precisione dei giocatori della squadra.

- \* **SPAtt**: Indica il numero di passaggi corti tentati dai giocatori della squadra specificata della variabile **Team**. Per passaggi corti si intendono tutti quelli effettuati all'interno di una lunghezza tra i tre e quattordici metri.

È stata inserita per capire se un alto numero di passaggi corti possa essere determinanti ai fini dell'esito della partita.

- \* **SPCmp%**: Indica la percentuale di passaggi corti riusciti ai giocatori della squadra specificata della variabile **Team**.


È stata inserita perché permette di capire quanti passaggi andati a buon fine tra tutti quelli tentati e quindi la precisione dei giocatori della squadra.

- \* **MPAtt**: Indica il numero di passaggi medi tentati dai giocatori della squadra specificata della variabile **Team**. Per passaggi medi si intendono tutti quelli effettuati all'interno di una lunghezza tra i tredici e ventisette metri. Questi passaggi possono essere considerati come passaggi filtranti, cioè non diretti al proprio compagno di squadra ma verso un'area del campo dove il compagno di squadra deve andare a prendere la palla. Spesso questi passaggi vengono fatti per sorprendere la difesa avversaria e evitare che la palla venga intercettata. Nella Figura 2.7 viene mostrato l'esecuzione di un passaggio filtrante.

È stata inserita per capire se un alto numero di passaggi medi possa essere determinante ai fini dell'esito della partita.

- \* **MPCmp%**: Indica la percentuale di passaggi medi riusciti ai giocatori della squadra specificata della variabile **Team**.


È stata inserita perché permette di capire quanti passaggi siano andati a buon fine tra tutti quelli tentati e quindi la precisione dei giocatori della squadra.



**Figura 2.7:** Esecuzione di un passaggio filtrante

Source: <https://www.ilmisterone.com/2019/01/16/passaggi-filtranti/>

- \* LPAtt: Indica il numero di passaggi lunghi tentati dai giocatori della squadra specificata della variabile **Team**. Per passaggi lunghi si intendono tutti quelli effettuati all'interno di una lunghezza superiore ai ventisette metri. Questi passaggi possono essere considerati come lanci lunghi per cambi di gioco o per lanciare le punte, cioè i giocatori che giocano come attaccanti, in profondità. Una rappresentazione di passaggio lungo è mostrata nella Figura 2.8.



**Figura 2.8:** Esecuzione di un cambio di gioco


Source: <https://www.mistercalcio.com/tattica/il-cambio-di-gioco/>

È stata inserita per capire se un alto numero di passaggi lunghi possa essere determinante ai fini dell'esito della partita.

- \* **LPCmp%**: Indica la percentuale di passaggi lunghi riusciti ai giocatori della squadra specificata della variabile **Team**.

È stata inserita perché permette di capire quanti passaggi sono andati a buon fine tra tutti quelli tentati e quindi qual'è la precisione dei giocatori della squadra.

- \* **Crs**: Indica il numero di cross effettuati dalla squadra specificata della variabile **Team**. Un cross (in italiano traversone) è un tipo di passaggio medio o lungo, solitamente effettuato sulle fasce laterali dell'area avversaria o comunque vicino all'area avversaria, che permette al compagno di squadra posizionato vicino alla porta avversaria di colpire la palla al volo di testa oppure di piede per segnare un possibile gol. Quindi, se eseguito correttamente, il cross può diventare un assist, cioè l'ultimo passaggio per la realizzazione del gol.



**Figura 2.9:** Rappresentazione di un cross

Source: <http://www.allfootball.it/blog/calcio-vincere-allenando-i-dettagli/27-2-2017/calcio-la-marcatura-a-uomo-su-cross-laterale/>

Una rappresentazione di cross è mostrata nella Figura 2.9.

### 2.3.5 Dati difensivi

In questo gruppo sono contenute le variabili collegate alla fase difensiva.


- \* **Saves**: Indica il numero di parate fatte del portiere della squadra specificata della variabile **Team**.

È stata inserita perché permette di valutare se la squadra subisce tanti tiri dagli avversari, così come la qualità del portiere nel salvare la squadra da un possibile gol subito.

- \* **Int**: Indica il numero di intercettazioni fatte dai giocatori della squadra specificata della variabile **Team**. Per intercettazione della palla si intende l'intercettazione di un passaggio della squadra avversaria entrando in possesso del pallone andando ad interrompere il passaggio avversario.

- \* **TklWin**: Indica il numero di contrasti vinti dai giocatori della squadra specificata della variabile **Team**. Per contrasto si intende il tentativo da parte di un giocatore

difendente di sottrarre il possesso della palla all'avversario. Quindi chi ha in possesso la palla viene attaccato da chi ne è privo. Se si riesce a prendere il pallone all'avversario allora si avrà vinto il contrasto. I contrasti vengono effettuati anche per allontanare l'avversario dalle zone pericolose. La Figura 2.10 mostra un contrasto di gioco.



**Figura 2.10:** Rappresentazione di un contrasto in scivolata

Source: <https://www.ilmisterone.com/2022/01/24/partita-solo-tackle/>

Visto che tale intervento senza palla modifica il gioco dell'avversario, si è deciso di inserire i contrasti vinti come variabile.

- \* **Recov:** Indica il numero di palle vaganti recuperate dalla squadra specificata della variabile *Team*. Per palle vaganti si intendono quei palloni che, a seguito di un contrasto di gioco, non sono stati recuperati dalla squadra che ha effettuato il contrasto ma chi ha subito il contrasto, ne ha comunque perso il controllo. Quindi nessuno ha in possesso il pallone e la palla viene detta vagante.

Dato che questa variabile sembra essere legata al possesso del pallone, potrebbe essere interessante per l'analisi.

Nella Tabella 2.3 è riassunto l'insieme delle variabili presenti e le loro macro-aree di appartenenza.

Di seguito nella Tabella 2.4 è mostrato per ogni variabile il nome che ha all'interno del *dataset*.

| Statistiche generali | Tiri | Possesso | Passaggi | Difensive |
|----------------------|------|----------|----------|-----------|
| AtHome               | Sh   | Poss     | PAtt     | Saves     |
| Res                  | SoT  | ToDefPen | PCmp%    | Int       |
| GF                   | G/Sh | ToDef3rd | SPAtt    | TklWin    |
| GA                   |      | ToMid3rd | SPCmp%   | Recov     |
| Team                 |      | ToAtt3rd | MPAtt    |           |
| VS                   |      | ToAttPen | MPCmp%   |           |
| Fls                  |      | ToDist   | LPAtt    |           |
| Fld                  |      |          | LPCmp%   |           |
| Off                  |      |          | Crs      |           |

**Tabella 2.3:** La tabella riassuntiva variabili presenti nel *dataset*.

| Originale | Rinominate |
|-----------|------------|
| AtHome    | AtHome     |
| Res       | Res        |
| GF        | GF         |
| GA        | GF         |
| Team      | Team       |
| VS        | Vs         |
| Poss      | Poss       |
| Sh        | Sh         |
| SoT       | SoT        |
| G/Sh      | G.Sh       |
| Saves     | Saves      |
| PAtt      | PAtt       |
| PCmp%     | PCmp.      |
| SPAtt     | SPAtt      |
| SPCmp%    | SPCmp.     |
| MPAtt     | MPAtt      |
| MPCmp%    | MPCmp.     |
| LPAtt     | LPAtt      |
| LPCmp%    | LPCmp.     |
| ToDefPen  | ToDefPen   |
| ToDef3rd  | ToDef3rd   |
| ToMid3rd  | ToMid3rd   |
| ToAtt3rd  | ToAtt3rd   |
| ToAttPen  | ToAttPen   |
| ToDist    | ToDist     |
| Fls       | Fls        |
| Fld       | Fld        |
| Off       | Off        |
| Crs       | Crs        |
| Int       | Int        |
| TklWin    | TklWin     |
| Recov     | Recov      |

**Tabella 2.4:** Tabella corrispondenza nomi originali e nomi nel *dataset*





## 3 | ANALISI DEI DATI

---

*Nel seguente capitolo verrà illustrata la fase di preprocessing e le analisi grafiche dei dati. Le analisi verranno svolte usando il linguaggio di programmazione di (R-language).*

### 3.1 Preprocessing dei dati

Dopo aver importato il dataset utilizzando il linguaggio di programmazione R (**R-language**), il primo step da effettuare durante il preprocessing è individuare e risolvere possibili anomalie nei dati. Il dataset è stato importato in modo che la prima riga contenga l'intestazione, mentre le restanti righe tutte le osservazioni. Il comando usato per importare il dataset è il seguente:

```
1 > soccer<-read.xlsx("SerieA.xlsx", 1, header=TRUE)
```

Il dataset non ha valori mancanti. Questo è stato possibile grazie a **fbref** che ha messo a disposizione dati quasi sempre completi; in quei rari casi di mancanza di dati sono stati reperiti manualmente da altre fonti altrettanto attendibili.

Sono state inoltre tolte le variabili **Date** e **Round**.


Il passo successivo è stato controllare che le variabili fossero interpretate correttamente. **Team** e **Vs** vengono interpretate erroneamente come tipo **character**. **Team** e **Vs** devono essere interpretate come un fattore cioè è un valore non numerico, espresso in termini verbali, ad esempio una categoria; quindi ogni squadra sarà un livello del fattore. Analogamente, **AtHome** è stata fatta trasformata in un fattore a due livelli. Invece, **Res** è stata trasformata in un fattore ordinato con i livelli: -1 = sconfitta < 0 = pareggio < 1 = vittoria.

### 3.2 Analisi grafica dei dati

In questa sezione attraverso il supporto di grafici, si analizzerà graficamente i dati disponibili e le loro relazione per avere una prima visione dei dati raccolti. Si valuteranno le relazione tra covariate e la variabile di risposta, le relazioni tra due covariate. Tutto ciò per individuare quali covariate possano essere significative per la variabile risposta e quali interazioni emergono dall'analisi grafica.


Come primo passo, è stata valutata la distribuzione della variabile risposta **Res**, come è mostrato in Figura 3.1.

Si può notare come le classi sembrino ben distribuite, dato che abbiamo 196 pareggi e 282 vittorie e altrettante sconfitte. Si ha quindi un campione abbastanza ampio, distribuito e privo di classi povere.



**Figura 3.1:** Barplot della distribuzione della variabile di risposta **Res**


La Figura 3.2 mostra la distribuzione delle vittorie, dei pareggi e delle sconfitte per ogni squadra.



**Figura 3.2:** Barplot della distribuzione della variabile di risposta per squadra

### 3.2.1 Relazione tra la variabile risposta e le covariate


La prima relazione che si analizza riguarda la variabile categorica **AtHome**. Nella Figura 3.3 viene riportato il mosaicplot tra la variabile risposta e **AtHome**. Tale grafico è un particolare tipo di diagramma a barre impilate che mostra la relazione che c'è tra due fattori. Il numero di colonne è uguale al numero livelli della variabile inserita sull'asse orizzontale. L'altezza delle barre in verticale, invece, è proporzionale al numero di osservazioni della variabile inserita sull'asse verticale per ciascun livello della variabile nell'asse orizzontale. In sostanza, il mosaicplot è una rappresentazione grafica di una tabella di contingenza che permette un confronto visivo tra gruppi. Nella Figura 3.3 c'è una leggera variazione dei risultati tra la squadra che gioca in casa e l'avversaria, infatti per le squadre che giocano in casa, c'è una maggior presenza di vittorie e di minor sconfitte. Naturalmente non c'è alcuna variazione per il pareggio dato che entrambe le squadre lo ottengono.



**Figura 3.3:** Mosaicplot che mostra la distribuzione degli esiti rispetto alle partite giocate in casa e fuori casa

Nella Figura 3.4 viene riportato il boxplot della distribuzione della variabile **Poss** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**. Il boxplot è un grafico che consente di visualizzare il centro e la distribuzione dei dati. Inoltre, può essere uno strumento visivo per la verifica della normalità o per l'identificazione di possibili outlier. Dal grafico si nota che **Poss** sembra essere significativa per l'esito. Infatti i valori crescono dal boxplot della sconfitta al boxplot della vittoria. C'è una buona distribuzione dei dati perché la lunghezza dei baffi per ogni boxplot è simmetrica. Si segnala che la mediana della sconfitta è più vicina al 3° quantile mentre la mediana della vittoria è più vicina al 1° quantile. Non sono presenti outlier.

Nella Figura 3.5 viene riportato il boxplot della distribuzione della variabile **SoT** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**. Valori più alti sono presenti nella vittoria mentre valori molto più bassi sono presenti nella sconfitta. C'è una buona distribuzione dei valori nella vittoria dato che i baffi sono simmetrici, viceversa per le altre due boxplot.




**Figura 3.4:** Boxplot della distribuzione della variabile **Poss** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**

non c'è simmetria infatti, il baffo inferiore è molto più corto rispetto al baffo superiore, segno che la maggior parte dei valori sono bassi e simili tra loro. Inoltre alcuni outliers si discostano dalla distribuzione di tutti e tre i boxplot, questo perché ci sono state squadre che hanno tirato molte volte in porta. Le mediane dei boxplot pareggio e vittoria non sono equidistanti dai quantili ma più vicine al 1° quantile. Il boxplot della sconfitta ha una bassa varianza. In conclusione, avere un valore alto di tiri in porta sembra essere utile ai fini della vittoria.


Per la relazione tra la variabile risposta e la variabile **Sh**, si ha un boxplot molto simile al boxplot mostrato nella Figura 3.4. Il grafico di **Sh** rispetto al grafico di **Poss**, ha degli outliers e la mediana della sconfitta non è equidistante dai quantili ma più vicina al 1° quantile.

Nella Figura 3.6 viene riportato il boxplot della distribuzione della variabile **G/Sh** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**. Si nota che ci sono valori molto bassi ma leggermente più alti per la vittoria. La distribuzione non è buona perché i baffi sono asimmetrici infatti, tutti i valori sono concentrati in basso e pochi verso il baffo superiore, segno che la maggior parte dei valori sono bassi e simili tra loro. C'è una bassa varianza tra i valori. C'è la presenza di outliers perché alcune squadre sono riuscite a ottenere il massimo da ogni tiro. I risultati mostrati, nonostante la distribuzione, sono comunque coerenti dato che non ci si aspetta dal rapporto tiri-gol un numero alto ma comunque una tendenza che favorisca la vittoria.

Nella Figura 3.7 viene riportato il boxplot della distribuzione della variabile **Saves** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**. Come si può notare sembra che **Saves** sia poco significativa ai fini del risultato. Infatti c'è poca variazione tra un boxplot e l'altro




**Figura 3.5:** Boxplot della distribuzione della variabile *SoT* rispetto ai valori della variabile risposta *Res*



**Figura 3.6:** Boxplot della distribuzione della variabile *G/Sh* rispetto ai valori della variabile risposta *Res*

perché sembra che avere un alto numero di parate non è determinante a fini del risultato.



**Figura 3.7:** Boxplot della distribuzione della variabile **Saves** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**

La Figura 3.8 viene riportato a sinistra il boxplot della variabile numerica **PAtt** rispetto ai valori della variabile risposta **Res** e a destra il boxplot della variabile numerica **PCmp%** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**. Per entrambi sembra significativo l'elevato numero di passaggi tentati ma soprattutto quelli completati ai fini della vittoria. Nel grafico a sinistra, nel secondo e terzo boxplot il baffo superiore è più lungo rispetto al baffo inferiore, segno che molti valori sono bassi e simili tra loro, viceversa il primo boxplot ha una buona distribuzione perché i baffi sono simmetrici. Il boxplot della vittoria ha una maggiore varianza rispetto agli altri due e in più ha valori più alti; sia la mediana del boxplot della vittoria e sia quello del pareggio sono più vicine al 1° quantile, viceversa quella della sconfitta. I dati nel primo boxplot sembrano essere coerenti con l'esito della partita perché, maggior numero di passaggi si prova ad effettuare, maggiori sono le possibilità di vittoria. Occorre però sapere quanto è precisa la squadra e questo lo si può scoprire con la variabile **PCmp%**

Nel grafico a destra, si notano valori alti e molti outliers con valori bassi dovuti al fatto che ci sono state partite dove alcune squadre sono state poco precise nei passaggi. I baffi superiori di tutti e tre i boxplot sono molto meno lunghi rispetto ai baffi inferiori segno che molti valori sono alti e simili tra loro, inoltre, le varianze dei box sembrano essere uguali tra di loro. Sorprendentemente l'andamento invece di essere sempre crescente, prima scende da sconfitta a pareggio e poi sale da pareggio a vittoria.

Per la relazione tra la variabile risposta e la variabile **SPAtt**, si ha un grafico molto simile al grafico a sinistra della Figura 3.8. Il grafico di **SPAtt** rispetto al grafico di **PAtt**, ha un maggior numero di outliers soprattutto per la sconfitta rispetto al grafico

**PAtt** inoltre, c'è una minor varianza per tutti i tre boxplot oltre a valori più bassi in generale, questo è naturale perché **PAtt** contiene tutti i passaggi tentati e non solo quelli corti.

Per la relazione tra la variabile risposta e la variabile **SPCmp%**, si ha un grafico molto simile al grafico a destra della Figura 3.8. Il grafico di **SPCmp%** rispetto al grafico di **PCmp%**, il boxplot della sconfitta ha una maggior varianza, viceversa per la vittoria, che ha una minor varianza.

Per la relazione tra la variabile risposta e la variabile **MPAtt**, si ha un grafico molto simile al grafico a sinistra della Figura 3.8. Il grafico di **MPAtt** rispetto al grafico di **PAtt**, il boxplot della sconfitta ha una maggior varianza. In generale i valori sono più bassi rispetto al grafico di **PAtt** ma questo è naturale perché **PAtt** contiene tutti i passaggi tentati e non solo quelli medi.

Per la relazione tra la variabile risposta e la variabile **MPCmp%**, si ha un grafico molto simile al grafico a destra della Figura 3.8. Il grafico di **MPCmp%** rispetto al grafico di **PCmp%**, ha valori più alti e molti più outliers, inoltre i baffi inferiore dei boxplot della sconfitta e della vittoria sono più corti.

Per la relazione tra la variabile risposta e la variabile **LPAtt**, si ha un grafico molto simile al grafico a sinistra della Figura 3.8. Il grafico di **LPAtt** rispetto al grafico di **PAtt**, ha per il boxplot della sconfitta valori più bassi rispetto agli boxplot del pareggio e della vittoria inoltre, il boxplot del pareggio ha una maggior varianza valori mentre il boxplot della vittoria ha una minor varianza.


In generale i valori sono più bassi rispetto al grafico di **PAtt** ma questo è naturale perché **PAtt** contiene tutti i passaggi tentati e non solo quelli lunghi.

Per la relazione tra la variabile risposta e la variabile **LPCmp%**, si ha un grafico molto simile al grafico a destra della Figura 3.8. Il grafico di **LPCmp%** rispetto al grafico di **PCmp%**, ha valori più bassi, la distribuzione dei valori per il boxplot della sconfitta è ben equilibrata perché i baffi sono della stessa lunghezza e in più la mediana è equidistante dai due quantili, analogamente anche il boxplot del pareggio ha una distribuzione equilibrata ma con più varianza e una mediana equidistante dai quantili.


Nella Figura 3.9 viene riportato il boxplot della distribuzione della variabile **ToDefPen** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**. Si nota che non c'è nessuna variazione dei tre boxplot, oltre ad avere la stessa varianza. L'esito può essere giustificato dal fatto che le squadre cercano di rimanere fuori il più possibile dalla propria area di rigore per non portare troppo vicino alla porta l'avversario. Da ciò si può ipotizzare che **ToDefPen** non è significativa per la variabile risposta. Prima di escluderla si andrà ad analizzare se c'è qualche interazione con altre variabili che la fanno diventare significativa.

Nella Figura 3.10 viene riportato il boxplot della distribuzione della variabile **ToAttPen** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**. Contrariamente quanto visto con la Figura 3.9 qui si nota una certa variazione tra i boxplot infatti, i valori crescono dal boxplot della sconfitta fino al boxplot della vittoria. C'è una maggior varianza per il boxplot della vittoria rispetto agli altri due boxplot. Per tutti e tre i boxplot i baffi inferiori sono leggermente meno lunghi rispetto ai baffi superiori, segno che i valori sono bassi e simili tra loro infatti, ci sono alcuni outliers sopra al baffo superiore, segno





**Figura 3.8:** A sinistra il boxplot della variabile numerica **PAtt** rispetto ai valori della variabile risposta **Res** e a destra il boxplot della variabile numerica **PCmp%** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**




**Figura 3.9:** Boxplot della distribuzione della variabile **ToDefPen** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**

che alcune squadre in qualche partita, si sono particolarmente rese note nel produrre un quantitativo di tocchi maggiore rispetto alla distribuzione, ciò però non sembra influenzare l'esito. Le mediane sono equidistanti.

Per la relazione tra la variabile risposta e la variabile `ToDef3rd`, si ha un grafico molto simile a quello mostrato nella Figura 3.10. Il grafico di `ToDef3rd` rispetto al grafico di `ToAttPen`, ha un minore numero di outliers soprattutto per il boxplot del pareggio, tale boxplot ha inoltre una varianza simile al boxplot della sconfitta. Il boxplot della vittoria invece, ha una distribuzione ben equilibrata.

Per la relazione tra la variabile risposta e la variabile `ToMid3rd`, si ha un grafico molto simile a quello mostrato nella Figura 3.10. Il grafico di `ToMid3rd` rispetto al grafico di `ToAttPen`, ha un minore numero di outliers e la varianza del boxplot della sconfitta è molto simile alla mediana del boxplot del pareggio ma con la mediana più vicina al 3° quantile.


Per la relazione tra la variabile risposta e la variabile `ToAtt3rd`, si ha un grafico molto simile a quello mostrato nella Figura 3.10. Il grafico di `ToAtt3rd` rispetto al grafico di `ToAttPen`, ha una minor varianza in generale per tutti e tre i boxplot e una distribuzione sbilanciata verso valori più bassi dato che tutti i baffi inferiori sono più corti rispetto ai baffi superiori. L'andamento però rimane lo stesso presente nella Figura 3.10.



**Figura 3.10:** Boxplot della distribuzione della variabile `ToAttPen` rispetto ai valori della variabile risposta `Res`

Nella Figura 3.11 vengono riportati a sinistra il boxplot della variabile numerica `F1s` rispetto ai valori della variabile risposta `Res` e a destra il boxplot della variabile numerica `F1d` rispetto ai valori della variabile risposta `Res`. Nel boxplot a sinistra si può notare che i valori più alti sono nel boxplot del pareggio e della vittoria ma nel boxplot

del pareggio ci sono più valori alti. Ciò fa ipotizzare che subire molti falli può impedire la vittoria alla squadra che li subisce. Per quanto riguarda la distribuzione sembra essere buona; c'è una minor varianza per quanto riguarda il boxplot della sconfitta.



**Figura 3.11:** A sinistra il boxplot della variabile numerica **Fls** rispetto ai valori della variabile risposta **Res** e a destra il boxplot della variabile numerica **Fld** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**


Nel secondo boxplot si hanno valori più alti nel boxplot della vittoria e una maggior varianza rispetto al boxplot della sconfitta. Sembra perciò che dal grafico si può intuire che se la squadra non commette dei falli allora sarà più soggetta a perdere.

Per la relazione tra la variabile risposta e la variabile **Off**, si ha un grafico molto simile a quello mostrato nella Figura 3.7. Il grafico di **Off** rispetto al grafico di **Saves**, ha un numero minore di valori per il boxplot della sconfitta rispetto agli altri due boxplot inoltre, le mediane del boxplot della sconfitta e del pareggio sono attaccate al 1° quantile.

Per la relazione tra la variabile risposta e la variabile **Crs**, si ha un grafico molto simile a quello mostrato nella Figura 3.12. Il grafico di **Crs** rispetto al grafico di **Saves**, ha per il boxplot della sconfitta maggior varianza e il baffo inferiore dei boxplot della sconfitta e della vittoria sono più corti rispetto ai baffi superiori.

Nella Figura 3.12 viene riportato il boxplot della distribuzione della variabile **Int** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**. Sorprendentemente valori più alti sono registrati nel boxplot della sconfitta, anche se la mediana risulta essere più vicina al 1° quantile sottolineando che c'è un maggior numero di valori bassi piuttosto che alti. Le mediane dei restanti boxplot invece, sono ben equilibrate ma il boxplot del pareggio risulta avere meno varianza. Sembra perciò che effettuare troppi intercettazioni dei passaggi avversari contrariamente da quanto si pensi sia controproducente per la


vittoria. Si segnala inoltre la presenza di alcuni outliers con valori alti di intercettazioni, che si discostano dalle distribuzioni.




**Figura 3.12:** Boxplot della distribuzione della variabile **Int** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**

Nella Figura 3.13 viene riportato il boxplot della distribuzione della variabile **Tk1Win** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**. Come si può notare, vincere più contrasti possibili evita di subire una sconfitta. Infatti ci sono valori più alti nei boxplot del pareggio e della vittoria rispetto al boxplot della sconfitta. Nello specifico però si nota che: nella distribuzione ci sono maggior valori alti nella vittoria rispetto al pareggio, graficamente lo si vede dalla mediana che nel boxplot del pareggio è più vicina al 1° quindi ha valori più bassi e lo si nota anche dal baffo inferiore che è meno lungo rispetto a quello superiore viceversa, la mediana del boxplot della vittoria risulta più vicina al 3° oltre ad avere il baffo superiore più corto rispetto a quello inferiore. C'è inoltre qualche outliers con valori più alti di contrasti vinti ma sembrano non influenzare la classificazione.

Infine nella Figura 3.14 viene riportato il Boxplot della distribuzione della variabile **Recov** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**. Per entrambi i boxplot la distribuzione sembra più sbilanciata verso valori bassi quindi ad una loro maggior presenza, infatti entrambe i baffi inferiori sono più corti rispetto a quelli superiori. Per quanto riguarda la mediana sembra equidistante dai quantili per entrambi i tre boxplot. Si nota che il boxplot del pareggio presenta minor varianza rispetto agli altri due boxplot ma valori più alti soprattutto nei confronti del boxplot della vittoria. Sembra perciò che un eccessivo numero di recuperi non porti alla vittoria. Si nota inoltre che ci sono numerosi outliers.



**Figura 3.13:** Boxplot della distribuzione della variabile **TkWin** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**



**Figura 3.14:** Boxplot della distribuzione della variabile **Recov** rispetto ai valori della variabile risposta **Res**

### 3.2.2 Analisi possibili interazioni

Per concludere l'attività di preprocessing, non resta che analizzare le relazioni tra le covariate per individuare possibili interazioni tra di loro che possono influenzare la variabile risposta. Chiaramente dato che ci sono più di trenta variabili e dunque, un grandissimo numero di combinazioni, non si sono esaminate tutte le relazioni ma sono state selezionate solo alcune per l'analisi, basandosi su teorie calcistiche esaminate durante la fase di studio del problema.

Per l'analisi delle interazioni si sono utilizzati i grafici di dispersione. Un grafico di dispersione mostra la relazione tra due variabili continue. A tali grafici si è inserito una terza variabile, la variabile risposta **Res**, dove ogni punto è colorato in tre possibili colori che rappresentano una delle tre categorie di **Res**. Di conseguenza il grafico permette di visualizzare se le categorie sono ben separati e quindi se un'interazione può spiegare l'andamento dei punti della variabile risposta.

Inoltre è stato utilizzato l'indice di correlazione, che indica la forza dell'associazione lineare espressa in valori compresi tra -1 e 1. Tale misura permette di escludere da subito alcune relazioni tra variabili se l'indice è troppo alto o basso, infatti, le relazioni troppo forti vanno escluse perché può presentarsi il fenomeno della collinearità. La collinearità è quel fenomeno che va a nasconde il legame tra le variabili e la variabile risposta, a causa di un legame troppo forte tra le covariate.

Nella Figura 3.15 viene mostrato il valore della correlazione per ogni possibile relazione tra variabili numeriche. Si nota che ci sono molte relazioni che hanno un valore di correlazione molto vicino a 1, in basso a sinistra del grafico. Ad esempio notiamo che la variabile **SPCmp%** ha una relazione molto forte con la variabile **PCmp%** (correlazione = 0.82), ciò è coerente perché, la variabile **SPCmp%** contiene solo i passaggi corti completati mentre **PCmp%** contiene tutti i tipi di passaggi completati, ne consegue che la ridondanza dei dati causa questa alta correlazione. Analogamente la stessa motivazione la si può applicare tra la variabile **PAtt** e la variabile **SPAtt** (correlazione = 0.91). Perciò tale motivazione è applicabile a tutte le variabili relative ai passaggi completati o relative ai passaggi tentati.

Di seguito si riporteranno le interazioni che sono state individuate come significative.

Sono state individuate le seguenti tre interazioni con la variabile **Sh**:

- \* Interazione tra la variabile **Sh** e la variabile **ToAttPen**. È ragionevole ipotizzare che il numero di tocchi fatti nell'area di rigore avversaria possano creare azioni da tiro. È quindi possibile che tra le due variabili possa esserci una relazione. La Figura 3.16 mostra una relazione positiva tra le due variabili infatti, quando aumenta la variabile **Sh** aumenta anche la variabile **ToAttPen** e viceversa. Sono distinguibili tre differenti gruppi che rappresentano le tre categorie della variabile risposta, inoltre la correlazione tra le due variabili non è troppo alta (0.72). Ne consegue che un'interazione tra la variabile **Sh** e la variabile **ToAttPen**, sembra essere significativa rispetto alla variabile risposta.
- \* Interazione tra la variabile **Sh** e la variabile **G/Sh**. È ragionevole ipotizzare che ci sia un legame naturale tra tiri fatti e rapporto tiri-gol. La Figura 3.17 mostra una relazione negativa tra le due variabili infatti, quando aumenta la variabile **Sh** diminuisce anche la variabile **G/Sh** e viceversa. Sono distinguibili tre differenti gruppi che rappresentano le tre categorie della variabile risposta infatti, i punti della categoria vittoria sono più in alto mentre i punti delle categorie pareggio





Figura 3.15: Grafico delle correlazioni di ogni coppia di variabili



**Figura 3.16:** Scatterplot della distribuzione della variabile **Sh** rispetto ai valori della variabile **ToAttPen**


e sconfitta più in basso. Inoltre la correlazione tra le due variabili non è bassa (-0.15). Ne consegue che un'interazione tra la variabile **Sh** e la variabile **G/Sh**, sembra essere significativa rispetto alla variabile risposta.

- \* Interazione tra la variabile **Sh** e la variabile **Poss**. Generalmente è possibile ipotizzare che il possesso della palla possa favorire nel effettuare i tiri. Infatti, la Figura 3.18 mostra una relazione positiva tra le due variabili, quando aumenta la variabile **Sh** aumenta anche la variabile **Poss** e viceversa. Sono distinguibili tre differenti gruppi che rappresentano le tre categorie della variabile risposta, inizialmente i vari punti sono mescolati tra di loro ma, con l'avanzamento emergono le direzioni di ogni categoria infatti, i punti della categoria vittoria vanno più verso destra mentre i punti delle categoria sconfitta si spostano verso l'alto senza tendere verso destra, i punti della categoria pareggio invece, si muovono in mezzo ai punti delle altre due categorie. La correlazione tra le due variabili non è alta (0.51). Ne consegue che un'interazione tra la variabile **Sh** e la variabile **Poss**, sembra essere significativa rispetto alla variabile risposta.


Sono state individuate le seguenti tre interazioni con la variabile **ToMid3rd**:

- \* Interazione tra la variabile **ToMid3rd** e la variabile **LPAtt**. Si suppone che tra le due variabili ci sia una relazione perché molti lanci lunghi per le punte partono proprio del centrocampista. La Figura 3.19 mostra un andamento un po' a "nuvola" ma comunque, è possibile individuare una relazione positiva tra le due variabili infatti, quando aumenta la variabile **ToMid3rd** aumenta anche la variabile **LPAtt** e viceversa. Sono distinguibili tre differenti gruppi che rappresentano le tre categorie della variabile risposta, inizialmente i vari punti sono mescolati tra di loro ma, successivamente i punti della categoria vittoria vanno molto in alto





**Figura 3.17:** Scatterplot della distribuzione della variabile  $Sh$  rispetto ai valori della variabile  $G/Sh$




**Figura 3.18:** Scatterplot della distribuzione della variabile **Sh** rispetto ai valori della variabile **Poss**

mentre i punti della categoria sconfitta rimangono molto più bassi muovendosi verso destra, invece i punti della categoria pareggio anche essi vanno verso destra ma rimanendo più alti rispetto ai punti della categoria sconfitta. La correlazione tra le due variabili non è alta (0.45). Ne consegue che un'interazione tra la variabile **ToMid3rd** e la variabile **LPAtt**, sembra essere significativa rispetto alla variabile risposta.


- \* Interazione tra la variabile **ToMid3rd** e la variabile **PCmp%**. Per le stesse ragioni illustrate nel punto precedente si ipotizza una relazione tra le variabili. La Figura 3.20 mostra una relazione positiva tra le due variabili infatti, quando aumenta la variabile **ToMid3rd** aumenta anche la variabile **PCmp%**, con un'andamento simile ad una funzione esponenziale. Sono distinguibili tre differenti gruppi che rappresentano le tre categorie della variabile risposta, dove i punti più in alto sono della categoria del pareggio, leggermente più sotto ci sono i punti della vittoria che però verso la fine del grafico raggiungono i valori più alti, e infine i punti della sconfitta. La correlazione tra le due variabili non è alta (0.66). Ne consegue che un'interazione tra la variabile **ToMid3rd** e la variabile **PCmp%**, sembra essere significativa rispetto alla variabile risposta.

Infine sono state individuate le seguenti interazioni:

- \* Interazione tra la variabile **TotDist** e la variabile **PCmp%**. Naturalmente per effettuare i passaggi e completarli è possibile farlo solo se ci si muove con la palla. La Figura 3.21 mostra una relazione positiva tra le due variabili infatti, quando aumenta la variabile **TotDist** aumenta anche la variabile **PCmp%**, con un'andamento simile ad una funzione esponenziale. Sono distinguibili tre differenti




**Figura 3.19:** Scatterplot della distribuzione della variabile **ToMid3rd** rispetto ai valori della variabile **LPAtt**



**Figura 3.20:** Scatterplot della distribuzione della variabile **ToMid3rd** rispetto ai valori della variabile **PCmp%**

gruppi che rappresentano le tre categorie della variabile risposta, dove i punti più in alto sono della categoria del pareggio, leggermente più sotto ci sono i punti della vittoria e infine i punti della sconfitta. La correlazione tra le due variabili non è troppo alta (0.75). Ne consegue che un'interazione tra la variabile **TotDist** e la variabile **PCmp%**, sembra essere significativa rispetto alla variabile risposta.




**Figura 3.21:** Scatterplot della distribuzione della variabile **TotDist** rispetto ai valori della variabile **PCmp%**

- \* Interazione tra la variabile **PAtt** e la variabile **PCmp%**. Data la loro naturale correlazione si ipotizza che ci sia un'interazione. La Figura 3.22 mostra una relazione positiva tra le due variabili infatti, quando aumenta la variabile **PAtt** aumenta anche la variabile **PCmp%**, con un'andamento simile ad una funzione esponenziale. Sono distinguibili tre differenti gruppi che rappresentano le tre categorie della variabile risposta, dove i punti più in alto sono della categoria del pareggio, leggermente più sotto ci sono i punti della vittoria e infine i punti della sconfitta. La correlazione tra le due variabili non è troppo alta (0.74). Ne consegue che un'interazione tra la variabile **PAtt** e la variabile **PCmp%**, sembra essere significativa rispetto alla variabile risposta.
- \* Interazione tra la variabile **ToDefPen** e la variabile **ToAttPen**. Come ci si può aspettare la Figura 3.23 mostra una relazione negativa tra le due variabili, quando aumenta la variabile **ToDefPen** diminuisce anche la variabile **ToAttPen** e viceversa. Sono distinguibili tre differenti gruppi che rappresentano le tre categorie della variabile risposta infatti, i punti della categoria vittoria sono quelli più distanti dallo zero mentre i punti delle categorie pareggio e sconfitta sono più vicini allo zero. Inoltre la correlazione tra le due variabili non è bassa (-0.45). Ne consegue che un'interazione tra la variabile **ToDefPen** e la variabile **ToAttPen**, sembra essere significativa rispetto alla variabile risposta.



**Figura 3.22:** Scatterplot della distribuzione della variabile **PAtt** rispetto ai valori della variabile **PCmp%**



**Figura 3.23:** Scatterplot della distribuzione della variabile **ToDefPen** rispetto ai valori della variabile **ToAttPen**

### 3.3 Ulteriori modifiche del dataset

Nelle sezioni precedenti si è descritto come si è costruito il *dataset* e come esso è stato strutturato. Tale struttura ha il vantaggio di rendere il *dataset* di facile interpretazione, ma deve essere riadattato per poter utilizzare le funzioni del pacchetto **bt2** e del pacchetto **bt1**.

Innanzitutto la variabile risposta **Res** viene modificata in modo tale che valga le seguenti condizioni

$$Res = \begin{cases} 1 & \text{se la squadra in casa batte la squadra ospite,} \\ 2 & \text{se la partita termina con un pareggio,} \\ 3 & \text{se la squadra ospite batte la squadra in casa.} \end{cases} \quad (3.1)$$

La variabile risposta **Res** rimane ancora un fattore ordinato.

Di seguito vengono presentate le modifiche effettuate specifiche per i due pacchetti.

#### 3.3.1 Modifiche per il pacchetto BradleyTerry2

Innanzitutto il modello richiede che le due variabili **Team** e **Vs** siano di tipo fattore oppure che costituiscano un **data.frame**. Un **data.frame** è una raccolta di vettori di osservazioni, che devono avere tutti la stessa lunghezza, ma possono essere di tipo diverso: variabili nominali (fattori) o variabili numeriche. Le variabili **Team** e **Vs** sono state trasformate in **data.frame** in modo da poter inserire al loro interno tutte le variabili descritte nella sezione precedente.

Inoltre i valori della variabile **AtHome** sono stati convertiti in 1 se **TRUE** mentre in 0 se **FALSE**.

Per poter creare i due **data.frame** occorre raccogliere le informazioni sulle partite giocate fuori casa dalle squadre indicate nella variabile **Team**. Con la funzione 7.1 viene implementato ciò in R. La definizione è la seguente.

Innanzitutto viene creato un vettore vuoto per ogni variabile presente nel *dataset*, ad eccezione di **AtHome** che verrà gestita in un modo diverso. Viene creato il vettore **del** che tiene traccia di quali osservazioni saranno da eliminare. Si eliminano le osservazioni delle partite giocate fuori casa dalle squadre indicate nella variabile **Team** perché dopo le modifiche saranno ridondanti. La variabile **k** è l'indice usato per scorrere il *dataset* per trovare i dati dell'avversario. La variabile **z** è l'indice usato per inserire un nuovo elemento nel vettore **del**. Il funzionamento è il seguente

Il primo ciclo **for** scorre tutto il *dataset* alla ricerca delle righe con i dati delle partite giocate in casa dalla squadra indicata in **Team**, infatti al suo interno il primo costrutto **if** controlla se la partita è in casa per **Team** se sì, parte un secondo ciclo **for** che anche esso scorre tutto il *dataset* per cercare la riga con la partita giocata della squadra indicata in **Vs**. All'interno del secondo ciclo **for** c'è un costrutto **if** che controlla se la *j*-esima riga si riferisce alla stessa partita indicata nella *i*-esima riga, se sì allora si salvano tutti i dati nei vettori e si incrementa l'indice **k**. Se il primo **if** da esito negativo allora si andrà a inserire l'indice dell'*i*-esima riga nel vettore **del** perché contiene informazioni di una partita giocata fuori casa dalla squadra indicata in **Team** e viene incrementato l'indice di uno **z**.

Di seguito vengono riportati i comandi fatti per applicare le modifiche al *dataset*.

```
1 > AdjserieA2 <- AdjserieA[-del,]
```

Con il precedente comando si va a creare un nuovo *dataset* con 380 righe, eliminando tutte quelle righe con valore FALSE su `AtHome`.

Con il comando 3.1 si va a modificare `Team` rendendolo un `data.frame`, andando a inserire i dati della riga relativi alla squadra che gioca in casa. Si inserisce come chiave `team = AdjserieA2$Team` e si indica che la partita è in casa per la squadra di riferimento con `at.home = 1`.

```
1 > AdjserieA2$Team <- data.frame(team = AdjserieA2$Team, GF =
  AdjserieA2$GF, GA = AdjserieA2$GA, at.home = 1, Poss = AdjserieA2$
  Poss, Sh = AdjserieA2$Sh, SoT = AdjserieA2$SoT, G.Sh = AdjserieA2$G.
  Sh, PAtt = AdjserieA2$PAtt, PCmp. = AdjserieA2$PCmp., SPAtt =
  AdjserieA2$SPAtt, SPCmp. = AdjserieA2$SPCmp., MPAtt = AdjserieA2$
  MPAtt, MPCmp. = AdjserieA2$MPCmp., LPAtt = AdjserieA2$LPAtt, LPCmp. =
  AdjserieA2$LPCmp., ToDef3rd = AdjserieA2$ToDef3rd, ToAtt3rd =
  AdjserieA2$ToAtt3rd, ToAttPen = AdjserieA2$ToAttPen, TotDist =
  AdjserieA2$TotDist, Fls = AdjserieA2$Fls, Fld = AdjserieA2$Fld, Crs =
  AdjserieA2$Crs, Int = AdjserieA2$Int, TklWin = AdjserieA2$TklWin,
  Recov = AdjserieA2$Recov)
```

**Listing 3.1:** Codice per la creazione del `data.frame` `Team`

Con il comando 3.2 si va a modificare `Vs` rendendolo un `data.frame`, andando a inserire i dati della riga relativi alla squadra che gioca fuori casa. Si inserisce come chiave `team = AdjserieA2$Vs` e si indica che la partita è fuori casa per la squadra `Vs` con `at.home = 0`. Per quanto riguarda il resto dei dati, vengono riportati attraverso l'inserimento dei vettori costruiti e riempiti precedentemente.

```
1 > AdjserieA2$Vs <- data.frame(team = AdjserieA2$Vs, GF = GFVs, GA =
  GAVs, at.home = 0, Poss = PossVs, Sh = ShVs, SoT = ShTVs, G.Sh = G.
  ShVs, PAtt = PAttVs, PCmp. = PCmp.Vs, SPAtt = SPAttVs, SPCmp. = SPCmp
  .Vs, MPAtt = MPAttVs, MPCmp. = MPCmp.Vs, LPAtt = LPAttVs, LPCmp. =
  LPCmp.Vs, ToDef3rd = ToDef3rdVs, ToAtt3rd = ToAtt3rdVs, ToAttPen =
  ToAttPenVs, TotDist = TotDistVs, Fls = FlsVs, Fld = FldVs, Crs = CrsVs
  , Int = IntVs, TklWin = TklWinVs, Recov = RecovVs)
```

**Listing 3.2:** Codice per la creazione del `data.frame` `Vs`

### 3.3.2 Modifiche per il pacchetto `BTLLasso`

Il pacchetto richiede una specifica lista strutturata nel seguente modo:

- \* **Y3:** Oggetto risposta per il pacchetto con tre categorie di risposta, inoltre include i seguenti attributi:
  - **response:** Variabile risposta di tipo fattore ordinato,
  - **first.object:** Vettore che indica il nome della squadra che gioca in casa
  - **second.object:** Vettore che indica il nome della squadra che gioca fuori casa,
  - **subject:** Vettore che indica a quale giornata appartiene ogni partita,
  - **subject.names:** Vettore di tipo fattore che indica l'identificativo di ogni giornata,
  - **object.names:** Vettore di tipo fattore che indica l'identificativo di ogni squadra,

- **m**: Indica il numero di giornate presenti,
- **n**: Indica il numero di squadre presenti,
- **k**: Indica il numero di categorie presenti,
- **with.order**: Vettore di tipo logico che indica per ogni partita se considerare l'effetto dell'ordine.

\* **Z1**: Matrice che contiene tutti i dati sulle variabili raccolte suddivise per squadra e per partita.

Con la funzione 7.2 vengono raccolte le informazioni per produrre l'elemento **Y3**. Nella funzione ci sono tre cicli, il primo per scorre le giornate, il secondo per scorrere le partite della *i*-esima giornata, il terzo per trovare l'altra osservazione della *j*-esima partita, dato che si ricorda per ogni partita ci sono due osservazioni. Quindi man mano vengono raccolte le varie informazioni e ritornata attraverso *side effects*.

Per creare la matrice **Z1** viene utilizzata la funzione 7.4, la quale estrae tutte le variabili indicate nell'attributo **covs**. Per funzionare tale funzione estrae una alla volta le variabili attraverso la funzione 7.3. La funzione 7.3 scorre tutto il *dataset* raccogliendo per ogni squadra tutti i valori registra in ogni partita per la variabile indicata nell'attributo **cov**. Una volta estratte tutti i dati della *z*-esima variabile viene creata una nuova matrice contenente i dati raccolti precedentemente sulle altre variabili, insieme a le informazioni della *z*-esima variabile, inserendo **n** colonne dove **n** indica il numero di squadre presenti. Perciò, viene creata una colonna per ogni squadra per ogni variabile raccolta. Infine viene creata per ogni colonna la sua etichetta, nella forma *variabile.squadra*. Per creare le etichette viene utilizzata la funzione 7.5.

Infine vengono riportati i comandi per eseguire le modifiche

```

1 Ztmp <-c()
2 row <- rowLabel(str1, 38)
3 createYFull(SerieA)
4 subject.name <- levels(as.factor(SerieA$Round))
5 object.name <- levels(as.factor(SerieA$Team))
6 Ztmp<-extractAll(c("Poss","Sh","SoT", "G/Sh", "Saves", "PAtt","PCmp%", "
  SPAtt", "SPCmp%",
7 "MPAtt", "MPCmp%", "LPAtt", "LPCmp%", "ToDefPen", "ToDef3rd", "
  ToMid3rd", "ToAtt3rd", "ToAttPen", "TotDist", "Fls", "Fld", "Off", "
  Crs", "Int", "TklWin", "Recov"), row, object.name)
8 #"Poss", "SoT", "G/Sh", "PCmp%", "LPAtt", "ToDefPen", "ToMid3rd", "
  ToAttPen", "Fld", "TklWin"
9 SerieA2122 <- list(Y3 = list(response = as.ordered(response), first.
  object = as.double(first.object), second.object = as.double(second.
  object), subject = subject, withS = TRUE, subject.names = subject.
  name, object.names = object.name, n = 38, m = 20, k = 3, q = 2, with.
  order = with.order), Z1 = Ztmp)

```

**Listing 3.3:** Comandi per la creazione della lista per il pacchetto *BTLLAsso*



## 4 | IL MODELLO BRADLEY-TERRY

*Nel seguente capitolo verranno introdotti differenti modelli per il confronto a coppie, iniziando con il modello Bradley-Terry versione base fino a presentare tutte le sue estensioni usate per l'analisi trattata. Infine verrà illustrata la penalizzazione applicata.*

### 4.1 Introduzione al Modello Bradley-Terry

Il modello Bradley-Terry (**bradley1952rank**) è un modello probabilistico che permette di predire il risultato di un confronto a coppie. Un confronto a coppie è un processo di comparazione tra una serie di oggetti dove ogni oggetto viene confrontato in coppia con un altro oggetto determinando per ogni confronto, se l'oggetto è preferibile all'altro. Formalmente, dato un set di  $n$  oggetti  $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ , un set di  $n$  parametri  $\{\gamma_1, \dots, \gamma_n\}$  che rappresentano ciascuno l'abilità/forza dell' $i$ -esimo oggetto, la variabile casuale associata al risultato del confronto a coppie  $Y_{i,j}$  con  $i < j \in \{1, \dots, n\}$ , la probabilità che il risultato sia  $\alpha_i \succ \alpha_j$  è

$$P(\alpha_i \succ \alpha_j) = P(Y_{i,j} = 1) = \frac{\exp(\gamma_i - \gamma_j)}{1 + \exp(\gamma_i - \gamma_j)}. \quad (4.1)$$

Il risultato  $\alpha_i \succ \alpha_j$  può essere letto come "l'oggetto  $\alpha_i$  è preferito all'oggetto  $\alpha_j$ ", " $\alpha_i$  batte l'oggetto  $\alpha_j$ " oppure " $\alpha_i$  è migliore dell'oggetto  $\alpha_j$ ". La variabile casuale  $Y_{i,j}$  è di tipo binario, cioè  $Y_{i,j} = 1$  se l'oggetto  $\alpha_i$  è preferito all'oggetto  $\alpha_j$  e  $Y_{i,j} = 0$  se l'oggetto  $\alpha_j$  è preferito all'oggetto  $\alpha_i$ . I parametri  $\gamma_i$  sono stimati dal modello attraverso la massima verosimiglianza. È necessario imporre un vincolo per identificare gli oggetti. Tali vincoli possono essere il vincolo di somma  $\sum_{i=1}^n \gamma_i = 0$  oppure il vincolo dell'oggetto di riferimento. Per il vincolo dell'oggetto di riferimento si intende che viene fissato  $\gamma_i = 0$  per un oggetto  $\alpha_i \in \{1, \dots, n\}$ , mentre il valore dei parametri  $\gamma_j$  degli altri oggetti  $\alpha_j$  sarà la differenza rispetto all'oggetto di riferimento  $\alpha_i$ .

Il modello può essere alternativamente espresso in forma di logit lineare

$$\text{logit}(\alpha_i \succ \alpha_j) = \log \left( \frac{P(\alpha_i \succ \alpha_j)}{P(\alpha_j \succ \alpha_i)} \right) = \log \left( \frac{\exp(\gamma_i)}{\exp(\gamma_j)} \right) = \gamma_i - \gamma_j. \quad (4.2)$$

Il modello descritto è chiamato *modello non strutturato*. Il modello non strutturato non considera covariate e, in generale, non presta alcuna attenzione all'eterogeneità causata dai soggetti dei confronti. Per la nostra analisi, vengono considerati un numero di oggetti pari a  $n=20$ , cioè il numero di squadre partecipanti alla Serie A.

## 4.2 Modello Bradley-Terry con categorie di risposta ordinate

In molti contesti di comparazione tra oggetti, è possibile che sia richiesto di dare una scala di preferenza tra un oggetto e un altro. In tal caso, la variabile casuale presenta  $K$  possibili categorie di risposta con  $K > 2$ . Le scelte di preferenza devono avere un ordine, dal risultato meno gradevole al più gradevole per ogni oggetto. Avere  $K$  categorie di risposta ordinate con  $K > 2$  è di interesse per le comparazioni calcistiche. Infatti non è sufficiente stimare la probabilità di vittoria o di sconfitta ma deve essere obbligatoriamente preso in considerazione anche il pareggio come risultato. Inoltre anche l'ordine delle  $K$  categorie di risposta è importante infatti, un oggetto preferisce il pareggio piuttosto che la sconfitta. Perciò il modello (4.2) con una variabile risposta binaria non è adeguato.

Modelli che consentono un numero generale di categorie  $K$  sono stati proposti da **bradley1952rank** e **tutz1986bradley**. In particolare, **tutz1986bradley** mostrò come due modelli per l'analisi di dati ordinati possono essere adattati per i confronti a coppie.

Il primo modello presentato è detto a *collegamento cumulativo* il quale sarà usato per l'analisi. Il modello sfrutta la rappresentazione tramite variabili latenti. In generale, data la variabile continua casuale latente  $Z_{i,j}$ , sia  $K$  il numero di gradi della scala di preferenza e siano  $\theta_1 < \theta_2 < \dots < \theta_{K-1}$  le soglie tale che  $Y_{i,j} = k$  quando  $\theta_{k-1} < Z_{i,j} < \theta_k$ . Allora:

$$P(Y_{i,j} \leq k) = \frac{\exp(\theta_k + \gamma_i - \gamma_j)}{1 + \exp(\theta_k + \gamma_i - \gamma_j)}, \quad (4.3)$$

con  $k \in \{1, \dots, K\}$  che indica le possibili categorie di risposta. I parametri  $\theta_k$  rappresentano le cosiddette soglie per le singole categorie di risposta, cioè sono i migliori valori in cui dividere le categorie. Tali soglie vengono stimate dai dati. In generale vi è imposta una simmetria del modello, in modo che valga:  $P(Y_{i,j} = k) = P(Y_{j,i} = K - k + 1)$ . Pertanto le soglie sono ristrette a  $\theta_k = -\theta_{K-k}$  e se,  $K$  è dispari,  $\theta_{K/2} = 0$ , per garantire che le probabilità siano simmetriche, cioè il risultato opposto abbia la stessa probabilità di verificarsi. Per garantire che le probabilità siano non negative per le singole categorie di risposta si impone il seguente vincolo  $-\infty = \theta_0 < \theta_1 < \dots < \theta_{K-1} < \theta_K = \infty$ . Dato che la soglia per l'ultima categoria è fissata a  $\theta_K = \infty$ , allora  $P(Y_{i,j} \leq K) = 1$ . La probabilità di una singola categoria di risposta può essere derivata dalla differenza tra categorie adiacenti, come segue,

$$P(Y_{i,j} = k) = P(Y_{i,j} \leq k) - P(Y_{i,j} \leq k-1).$$

Il modello ha anche la seguente rappresentazione logit lineare

$$\text{logit}(Y_{i,j} \leq k) = \theta_k + \gamma_i - \gamma_j. \quad (4.4)$$

Il secondo modello invece proposto da **agresti1992analysis** è detto *modello a categorie adiacenti*. In questo caso il collegamento è applicato alle probabilità di risposte adiacenti piuttosto che alle probabilità cumulative, riducendosi così al modello Bradley-Terry quando sono consentite solo due categorie. Quando sono consentite solo tre categorie, il modello coincide con quello di **davidson1970extending** che verrà presentato di seguito.

Il modello a categorie adiacenti è più semplice da interpretare rispetto ai modelli a collegamenti cumulativi poiché la probabilità si riferisce a un determinato risultato anziché a raggruppamenti di risultati.

Sia  $\theta$  il parametro stimato dai dati che indica quanto è auspicabile la non preferenza. Allora (**davidson1970extending**)

$$P(Y_{i,j} = 2 | Y_{i,j} \neq 0) = \frac{\exp(\gamma_i - \gamma_j)}{1 + \exp(\gamma_i - \gamma_j)}, \quad (4.5)$$

$$P(Y_{i,j} = 1) = \frac{\theta \sqrt{\exp(\gamma_i) * \exp(\gamma_j)}}{\exp(\gamma_i) + \exp(\gamma_j) + \theta \sqrt{\exp(\gamma_i) * \exp(\gamma_j)}}, \quad (4.6)$$

$$P(Y_{i,j} = 0 | Y_{i,j} \neq 1) = \frac{\exp(\gamma_j - \gamma_i)}{1 + \exp(\gamma_j - \gamma_i)}. \quad (4.7)$$

Si è riportato la modellazione di tutti e tre i possibili risultati, con  $\gamma_n$  che rappresenta la forza degli oggetti in comparazione. La probabilità che l'oggetto  $\alpha_i$  batta l'oggetto  $\alpha_j$  è rappresentata da (4.5), mentre la probabilità che l'oggetto  $\alpha_j$  batta l'oggetto  $\alpha_i$  è rappresentata da (4.7). Sia (4.5) sia (4.7) rimangono uguali alla probabilità (4.2) descritta precedentemente. Invece, per la probabilità che l'oggetto  $\alpha_i$  pareggi con l'oggetto  $\alpha_j$  (4.6), viene aggiunto il parametro  $\theta$ . Il parametro  $\theta$  rappresenta, quindi, quanto sia auspicabile il pareggio.

### 4.3 Modello Bradley–Terry con effetti dell'ordine

Nel modello descritto nella sezione 4.2 è necessario imporre la simmetria tra le categorie di risposta. Purtroppo la simmetria imposta risulta essere non adeguata in alcuni contesti. Tra questi vi è anche il calcio poiché l'ordine dei oggetti (le squadre) conta. Infatti in una partita di calcio, la prima squadra che viene indicata tra le due squadre è quella che gioca in casa, per cui ci si attende crei un vantaggio sull'avversario. Perciò, il presupposto che le categorie di risposta siano simmetriche non vale più.

Un possibile modello riadattato al problema esposto è il seguente:

$$P(\alpha_i \succ \alpha_j) = P(Y_{i,j} = 1) = \frac{\exp(\delta + \gamma_i - \gamma_j)}{1 + \exp(\delta + \gamma_i - \gamma_j)}. \quad (4.8)$$

L'effetto dell'ordine come ad esempio il vantaggio di giocare in casa in ambito calcistico, viene trattato come un parametro  $\delta$ . Se  $\delta > 0$ , viene attribuito un vantaggio all'oggetto  $\alpha_i$ , aumentando la probabilità che vinca il confronto o, nel caso di categorie di risposta ordinate, di avere un risultato superiore rispetto all'oggetto  $\alpha_j$ . Chiaramente il valore di  $\delta$  deve essere stimato dai dati.

Invece un modello con categorie di risposta ordinate con l'effetto dell'ordine è il seguente

$$P(Y_{i,j} \leq k) = \frac{\exp(\delta + \theta_k + \gamma_i - \gamma_j)}{1 + \exp(\delta + \theta_k + \gamma_i - \gamma_j)}. \quad (4.9)$$

Il modello (4.8) e il modello (4.9) hanno anche la seguente rappresentazione logit lineare rispettivamente,

$$\text{logit}(\alpha_i \succ \alpha_j) = \delta + \gamma_i - \gamma_j, \quad (4.10)$$

$$\text{logit}(\alpha_i \succ \alpha_j) = \delta + \theta_h + \gamma_i - \gamma_j. \quad (4.11)$$

Perciò si fissa che la prima squadra che viene indicata tra le due squadre è quella che gioca in casa.

#### 4.4 Modello Bradley–Terry con variabili esplicative

In precedenza è stato descritto un modello che valutasse il grado di preferenza per un oggetto  $\alpha_i$  rispetto a un oggetto  $\alpha_j$ , senza considerare nessuna covariata. Spesso, però, si è interessati a capire quali elementi possono essere associati al risultato della comparazione. Prima di esporre il modello con covariate, è necessario fare una distinzione tra soggetti e oggetti e successivamente distinguere i tre tipi di covariate di un confronto a coppie, ovvero, le covariate specifiche al soggetto  $x_p$ , le covariate specifiche all'oggetto  $z_i$  e infine le covariate specifiche al soggetto e all'oggetto  $z_{pi}$  per i soggetti  $p$ ,  $p = 1, \dots, m$  e gli oggetti  $\alpha_i$ ,  $i = 1, \dots, n$ .

Gli oggetti sono le entità che vengono confrontate in un confronto a coppie. I soggetti invece, sono le unità che stabiliscono la preferenza tra gli oggetti in un confronto a coppie. Nel calcio gli oggetti sono le squadre di calcio, mentre i soggetti sono le partite di calcio tramite le quali avviene la comparazione tra le squadre. Nell'analisi tratta il numero di soggetti sarà pari a  $m=380$ , cioè il numero di partite giocate nel campionato di Serie A.

Di seguito vengono illustrate le tre tipologie di covariate in un confronto a coppie:

- \* **covariate specifiche del soggetto.** Caratterizzano i soggetti che eseguono i confronti tra oggetti e quindi queste covariate variano solo tra soggetti. Ad esempio nel calcio, covariate specifiche del soggetto sono il numero spettatori o le condizioni meteo sono specifiche al soggetto. Sia  $x_p$  un vettore di covariate specifiche del soggetto,  $\beta_i$  il peso stimato delle covariate per ogni oggetto  $\alpha_i$  e  $\beta_{i0}$  l'intercetta. Allora l'abilità  $\gamma_{pi}$  dell'oggetto  $\alpha_i$  nel soggetto  $p$  sarà

$$\gamma_{pi} = \beta_{i0} + x_p^T \beta_i.$$

Con l'inclusione di covariate specifiche del soggetto, il modello è in grado di spiegare l'eterogeneità tra i soggetti. Le covariate specifiche del soggetto nei confronti a coppie sono state considerate, ad esempio da **francis2010** e **Turner2012Firth**.

- \* **covariate specifiche dell'oggetto.** Caratterizzano gli oggetti che vengono confrontati. Non variano tra i soggetti, ma tra gli oggetti. Nel caso del calcio, una covariata specifica dell'oggetto può essere il valore di mercato della rosa della squadra di calcio. Un loro utilizzo lo si può trovare in **schauberger2017**. Sia  $z_i$  un vettore di covariate specifiche all'oggetto,  $\tau$  il peso uguale per tutti gli oggetti e  $\beta_{i0}$  l'intercetta. Allora l'abilità  $\gamma_i$  dell'oggetto  $\alpha_i$  sarà

$$\gamma_{pi} = \gamma_i = \beta_{i0} + z_i^T \tau.$$

Il peso  $\tau$  è un parametro globale che insieme a  $z_i$  rappresenta l'abilità spiegata dalle covariate, mentre  $\beta_{i0}$  rappresenta la parte dell'abilità non spiegata dalle covariate. Nell'analisi in esame questo tipo di covariate non verrà usato.

\* **covariate specifiche del soggetto e dell'oggetto.** Questi tipi di covariate possono variare sia per oggetti e sia per i soggetti. Nel calcio, ad esempio il possesso palla, è una covariata che varia per ogni singola squadra e per ogni singola partita. Tali variabili vengono approfondite in **thurner2000policy** e in **mauerer2015modeling**. Sia  $z_{pi}$  un vettore di covariate specifiche del soggetto e dell'oggetto,  $\eta_i$  il peso stimato delle covariate per ogni oggetto,  $\beta_{i0}$  l'intercetta. Allora l'abilità  $\gamma_{pi}$  dell'oggetto  $\alpha_i$  nel soggetto  $p$  sarà

$$\gamma_{pi} = \beta_{i0} + z_{pi}^T \eta_i.$$

Contrariamente alle covariate specifiche al soggetto, le covariate specifiche al soggetto e all'oggetto posso essere modellate con un effetto globale

$$\gamma_{pi} = \beta_{i0} + z_{pi}^T \tau,$$

dove  $\tau$  rappresenta il peso stimato delle covariate. Come si può notare, il parametro  $\tau$  non ha alcun indice, questo perché l'effetto della covariate è uguale su tutti gli oggetti.

Il parametro  $\beta_{i0}$  nelle specificazioni precedenti è l'intercetta specifica dell'oggetto. Tale parametro spiega la maggior parte della forza dell'oggetto. Infatti le covariate possono essere viste come estensioni contenenti effetti aggiuntivi dell'abilità dell'oggetto che non sono spiegati dall'intercetta. In tal senso, gli effetti della covariata possono aiutare a spiegare i risultati imprevisti di un soggetto che non possono essere completamente spiegati esclusivamente dall'intercetta (**cattelan2012models**) e (**schauberger2017**). Nella Sezione 4.3 viene presentato l'effetto dell'ordine degli oggetti in competizione. Invece dell'effetto d'ordine globale  $\delta$ , che è uguale per tutti gli oggetti, è possibile specificare l'effetto d'ordine specifico per ogni oggetto  $\alpha_i$ , quindi  $\delta_i$ . Nella Tabella 4.1 vengono riassunti tutti i tipi di covariate e tutte le possibili parametrizzazioni che possono essere applicate.

Quindi, il parametro abilità  $\gamma_{pi}$  di un oggetto  $\alpha_i$  con  $i = 1, \dots, n$  su un soggetto  $p$ ,  $p = 1, \dots, m$  non è altro che una combinazione lineare dei parametri precedentemente spiegati. Da ciò si ottiene il modello capace di utilizzare le covariate. Tale modello viene chiamato modello strutturato e fa parte dei *generalized linear models* (GLMs). Aggiungendo al modello 4.9 le covariate di tipo specifiche del soggetto e dell'oggetto al modello e l'effetto dell'ordine con effetto specifico dell'oggetto si ha

$$P(Y_{p(i,j)} \leq k) = \frac{\exp(\delta_i + \theta_k + \beta_{i0} - \beta_{j0} + x_{pi}^T \eta_i - x_{pj}^T \eta_j)}{1 + \exp(\delta_i + \theta_k + \beta_{i0} - \beta_{j0} + x_{pi}^T \eta_i - x_{pj}^T \eta_j)}, \quad (4.12)$$

con  $i < j \in \{1, \dots, 20\}$  e  $p \in \{1, \dots, 380\}$ .

Come si può vedere, il parametro abilità  $\gamma_i$  è stato sostituito da  $\beta_{i0}$  e  $x_{pi}^T \eta_i$ . Analogamente anche per  $\gamma_j$ .

| Tipo di covariate                    | Tipo di effetto    | $\gamma_{pi} =$     | $\gamma_{pj} =$     | $\gamma_{p(ij)} = \gamma_{pi} - \gamma_{pj}$ |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| Intercetta                           | Spec. dell'oggetto | $\beta_{i0}$        | $\beta_{j0}$        | $\beta_{i0} - \beta_{j0}$                    |
| Effetto dell'ordine                  | Globale            | $+$                 | $\delta$            | $+$  |
| Effetto dell'ordine                  | Spec. dell'oggetto | $+$                 | $\delta_i$          | $+$  |
| Spec. del soggetto $x_p$             | Spec. dell'oggetto | $+ x_p^T \beta_i$   | $+ x_p^T \beta_j$   | $+ x_p^T (\beta_i - \beta_j)$                |
| Spec. dell'oggetto $z_i$             | Globale            | $+ z_i^T \tau$      | $+ z_{si}^T \tau$   | $+ (z_i - z_j)^T \tau$                       |
| Spec. del sogg. e dell'ogg. $z_{pi}$ | Globale            | $+ z_{pi}^T \tau$   | $+ z_{pj}^T \tau$   | $+ (z_{pi} - z_{pj})^T \tau$                 |
| Spec. del sogg. e dell'ogg. $z_{pi}$ | Spec. dell'oggetto | $+ x_{pi}^T \eta_i$ | $+ x_{pj}^T \eta_i$ | $+ x_{pi}^T \eta_i - x_{pj}^T \eta_j$        |

**Tabella 4.1:** Tipi di covariate e possibili parametrizzazioni applicabili al parametro abilità  $\gamma$ .

## 4.5 Stima e penalizzazione

È importante considerare che, con l'inserimento di un elevato numero di covariate, si ha un aumento di complessità del modello. Dato che si utilizza un modello lineare, un eccessivo livello di complessità può portare a problemi di identificabilità ed efficienza. Infatti se si include una covariata specifica del soggetto e dell'oggetto equivale a inserire  $n$  covariate dove  $n$  è il numero di oggetti in considerazione. Nel nostro caso abbiamo 26 covariate di tipo specifiche del soggetto e dell'oggetto da inserire, cioè significa che se abbiamo 20 squadre abbiamo 520 parametri da stimare, un numero chiaramente troppo grande. Inoltre, la complessità è aumentata dalla presenza di una intercetta per ogni oggetto. La soluzione alla gestione di modelli complessi è l'utilizzo di metodi di *shrinkage*, che includono termini di penalizzazione nelle procedure di stima. I metodi di *shrinkage* (**copas1983regression**) regolarizzano il processo di stima spingendo le stime dei parametri verso zero. L'inclusione della penalizzazione dei termini potrebbe migliorare o leggermente peggiorare il modello, ma la variabilità associata alle stime sarà minore. C'è perciò un trade off di cui occuparsi, infatti più è forte la penalità inserita, più i parametri saranno vicini a zero e quindi meno informazioni si avranno sui parametri, di conseguenza sarà elevata la varianza a causa della perdita di informazioni. Ovviamente più informazioni vengono perse meno complesso sarà il modello ma allo stesso tempo sarà poco preciso. Non si massimizzerà la log verosimiglianza ma la log verosimiglianza penalizzata

$$L(\varepsilon)^p = L(\varepsilon) - \lambda P(\varepsilon),$$

dove  $L(\varepsilon)$  è la log verosimiglianza con  $\varepsilon$  che rappresenta il vettore contenente tutti i parametri del modello e  $P(\varepsilon)$  è un termine di penalizzazione. Il parametro  $\lambda$  è il parametro di tuning che stabilisce quanto forte deve essere la penalizzazione sui parametri.

Per eseguire la penalizzazione è necessario trasformare in scale comparabili tutte le covariate, per evitare che la penalizzazione influisca in modo diverso sui parametri. Oltre a una riduzione di complessità del modello, si vogliono ottenere i seguenti due obiettivi:

- \* Eseguire una selezione delle covariate spingendo a zero quelle non significative,
- \* Valutare se vi è la formazione di un *cluster* di valori di una covariata su più squadre, in modo tale da utilizzare un effetto globale piuttosto che un effetto specifico dell'oggetto.

Quello che si intende per *cluster* di valori è che, durante la penalizzazione può accadere che una covariata ha come valore del parametro lo stesso per tutti gli oggetti in esame, perciò non occorre considerare  $n$  volte la covariata ma soltanto una volta, riducendo così la complessità. Per soddisfare questi punti, come metodo di penalizzazione verrà applicato il *LASSO* (**tibshirani1996regression**).

### 4.5.1 LASSO

Il metodo *Least Absolute Shrinkage and Selection Operator* detto *LASSO* (**tibshirani1996regression**) è un metodo di penalizzazione che permette di eseguire una selezione delle covariate. La selezione è possibile perché la penalizzazione applicata spinge i parametri ad essere uguali a zero. Si ha la seguente penalizzazione

$$L(\varepsilon)^P = L(\varepsilon) + \lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j|,$$

dove  $\lambda \sum_{j=1}^p |\beta_j|$  è il fattore di penalizzazione che include una norma  $L_1$  dei parametri. Grazie alla norma  $L_1$  è possibile eseguire la selezione delle covariate.

Sono state utilizzate solo alcune modalità di penalizzazione tra quelle disponibili, quindi verranno esposte solo quelle effettivamente utilizzate. Si veda ad esempio, **schauberger2019btlasso** per una trattazione delle varie penalizzazioni esistenti.

Le applicazioni del *LASSO* sono le seguenti:

- \* **Penalizzazione all'effetto partita in casa**

Si è applicata la seguente penalizzazione su 20 parametri che rappresentano l'effetto di giocare una partita in casa

$$P_{\delta}(\delta_1, \dots, \delta_n) = \sum_{i < j}^n |\delta_i - \delta_j|.$$

Come si può notare l'effetto partita in casa  $\delta_i$  è un parametro con effetto specifico all'oggetto. La penalizzazione risultante è data dai valori delle differenze assolute tra tutti i parametri. Tale tipo di penalizzazione permette di formare clusters di oggetti, nel nostro caso squadre, con un valore dell'abilità simile.

È possibile applicare una penalizzazione sul valore assoluto del parametro ma, dato che non vi sono dubbi che l'effetto casa sia determinante per l'esito di una partita di calcio (**lago2016home**), non verrà applicata nessun'altra penalizzazione.

- \* **Penalizzazione alla covariata specifica del soggetto e dell'oggetto**

Si è applicata la seguente penalizzazione sui parametri della  $c$ -esima covariata

$$P_{\eta_c}(\eta_{1,1}, \dots, \eta_{n,m}) = \sum_{p=1}^m \sum_{i < j}^n |\eta_{ip} - \eta_{jp}| + \sum_{p=1}^m \sum_{i < j}^n |\eta_{ip}|.$$

Rispetto alla penalizzazione precedente è stata aggiunta una penalizzazione al valore assoluto delle covariate. Questo perché non sappiamo in anticipo se una variabile è associata alla risposta oppure no. Perciò con la penalizzazione al valore assoluto possiamo fare selezione delle covariate.

Le penalizzazioni illustrate precedentemente se combinate permettono di ottenere il parametro

$$P(\varepsilon) = \sum_{c=1}^C P_{\eta_c} + P_{\delta},$$

con  $C = 26$  che indica il numero di covariate descritte nel Capitolo 2.

#### 4.5.2 Scelta del parametro di tuning

Un punto cruciale per le tecniche di *shrinkage* è la determinazione del parametro di *tuning* ottimo  $\lambda$ , cioè il grado di penalizzazione che fornisce il miglior trade off tra complessità e precisione del modello. Per farlo ci si affiderà alla *K-Fold Cross-Validation* con  $k = 10$ , che sceglierà la miglior  $\lambda$  rispetto alla metrica *ranked probability score* (RPS). Il RPS (**gneiting2007strictly**) per categorie di risposte ordinate  $y \in \{1, \dots, K\}$  misura quanto siano buone le previsioni espresse come distribuzioni di probabilità rispetto ai valori osservati. Sia  $K$  il numero di categorie della variabile risposta  $y$ , il RPS è così espresso

$$RPS(y, \pi(k)) = \sum_{k=1}^K \pi(k) - \mathbb{1}(y \leq k)^2$$

dove  $\pi(k)$  rappresenta la probabilità cumulativa  $\pi(k) = P(y \leq k)$  mentre  $\mathbb{1}$  è una funzione che restituisce 1 se il parametro in ingresso è vero, 0 altrimenti. A differenza delle altre possibili misure dell'errore, ad esempio la devianza, il RPS tiene conto dell'ordine di preferenza.



## 5 | RISULTATI DEI MODELLI BRADLEY-TERRY

---

*In questo capitolo vengono presentate le stime e i risultati ottenuti dai modelli Bradley-Terry (BTM) descritti nel Capitolo 4. Inoltre, sarà riportata l'applicazione del metodo LASSO con relativi risultati. Infine si riporteranno le predizioni sugli esiti delle partite prodotte dai modelli per essere poi confrontate con le predizioni dei bookmakers*

### 5.1 Premesse

I risultati che verranno esposti non tengono in considerazione le variabili esplicative del numero di gol fatti GF e dei gol subiti GA. Questo perché provocano la non convergenza del modello. Infatti, le librerie usate non sono in grado di interpretare correttamente i dati. Una possibile soluzione è allargare il numero di categoria  $K$  inserendo per ogni possibile risultato finale una categoria. Ovviamente questa soluzione rende troppo complesso il modello, perciò si è deciso di lasciare  $K = 3$ . Inoltre, data l'elevata complessità che raggiunge il modello esteso Bradley-Terry, non sono state inserite le interazioni illustrate nel Capitolo 3.

### 5.2 BTM con effetto dell'ordine

Le analisi dello studio iniziano con l'applicazione del modello (4.9). Tale modello presenta una struttura abbastanza semplice, in cui la stima dell'abilità delle squadre tiene conto solo degli esiti osservati delle varie partite e del vantaggio di giocare in casa. La stima dei parametri soglia  $\theta_1$  e  $\theta_2$  è pari rispettivamente, a -0.669 e 0.669 mentre il parametro  $\delta$  globale per tutte le squadre è di 0.099 con uno *standard error* (SE) di 0.126. Si nota che la possibilità di giocare in casa è effettivamente in quanto la stima del parametro è positiva. Nella Tabella 5.1 vengono riportati i risultati ottenuti in ordine dell'abilità stimata. Inoltre viene riportato lo *Standard Error* (SE) il *Quasi Standard Error* (QSE) (firth2004quasi) e il *Quasi Variance* (QV)(firth2004quasi) per ogni squadra. Nonostante, la semplicità del modello, viene offerta una stima delle abilità delle squadre che rispecchia molto il piazzamento mostrato nella Tabella 2.1. Infatti, solo quattro squadre hanno un piazzamento diverso da quello reale. L'Udinese e il Sassuolo hanno il piazzamento invertito con una stima dell'abilità che è molto simile. Ciononostante, il risultato è comunque soddisfacente dato che nella stagione in esame il distacco tra Udinese e Sassuolo è stato solo di tre punti. Anche Genoa e Salernitana hanno un piazzamento differente da quello reale. Per quanto riguarda il Genoa tale risultato può essere spiegato dal fatto che all'inizio del campionato ha avuto un buon andamento (vedi storyGenoa) e dall'ottenimento di punti contro Juventus, Inter, Roma e Atalanta, cioè squadre considerate tra le più forti del campionato. Per

| Squadra       | Abilità | SE    | QSE   | QV    | Rank |
|---------------|---------|-------|-------|-------|------|
| Milan         | 1.492   | 0.557 | 0.359 | 0.129 | 1    |
| Inter         | 1.4     | 0.537 | 0.400 | 0.160 | 2    |
| Napoli        | 1.17    | 0.530 | 0.389 | 0.152 | 3    |
| Juventus      | 0.825   | 0.520 | 0.373 | 0.139 | 4    |
| Lazio         | 0.459   | 0.516 | 0.368 | 0.135 | 5    |
| Roma          | 0.413   | 0.516 | 0.368 | 0.135 | 6    |
| Fiorentina    | 0.339   | 0.511 | 0.357 | 0.127 | 7    |
| Atalanta      | 0.312   | 0.000 | 0.368 | 0.135 | 8    |
| Hellas Verona | 0.049   | 0.513 | 0.356 | 0.127 | 9    |
| Torino        | -0.012  | 0.512 | 0.355 | 0.126 | 10   |
| *Udinese      | -0.072  | 0.512 | 0.355 | 0.126 | 12   |
| *Sassuolo     | -0.145  | 0.511 | 0.355 | 0.126 | 11   |
| Bologna       | -0.233  | 0.515 | 0.359 | 0.128 | 13   |
| Empoli        | -0.549  | 0.518 | 0.362 | 0.131 | 14   |
| Sampdoria     | -0.775  | 0.527 | 0.372 | 0.138 | 15   |
| Spezia        | -0.831  | 0.527 | 0.372 | 0.138 | 16   |
| *Genoa        | -0.879  | 0.532 | 0.378 | 0.143 | 19   |
| Cagliari      | -0.897  | 0.532 | 0.378 | 0.143 | 18   |
| *Salernitana  | -0.91   | 0.527 | 0.372 | 0.138 | 17   |
| Venezia       | -1.156  | 0.538 | 0.387 | 0.149 | 20   |

**Tabella 5.1:** Per ogni squadra viene riportata l'abilità stimata, lo *Standard Error* (SE), il *Quasi Standard Error* (QSE) e il *Quasi Variance* (QV). Nella tabella viene indicato con un asterisco le squadre con un piazzamento stimato diverso da quello reale.

quanto la stima al ribasso della Salernitana è determinata dal suo pessimo andamento per la maggior parte del campionato fatta eccezione per l'ultima parte, dove sono stati guadagnati la maggior parte dei punti, tanto da permettere alla squadra di guadagnare all'ultima giornata la salvezza (vedi **storySal**).

Il *Quasi Variance* (QV)(**firth2004quasi**) è un metodo che fornisce un'approssimazione della varianza, ed è utilizzato per confrontare livelli differenti di un fattore. Il tipo

fattore è stato illustrato nel Capitolo 3. Il QV è stato introdotta da **firth2004quasi** per risolvere il problema della categoria di riferimento. Tale problema si riferisce al fatto che risulta essere semplice confrontare un livello qualsiasi del fattore con il suo livello di riferimento ma confrontare tra loro due livelli entrambi non di riferimento non è possibile. Grazie al QV cioè è possibile, infatti permette di confrontare tra di loro diversi livelli che non sono di riferimento con il vantaggio di non dover riportare tutta la matrice delle varianze e delle covarianze per effettuare i confronti. Nel nostro caso abbiamo la variabile **team** di tipo fattore con la squadra Atalanta come livello di riferimento. Grazie al QV ci viene fornita il QSE, una stima dello SE che verrà utilizzata per confrontare le abilità stimate dei diversi livelli, ovvero le squadre, per poter dedurre se la differenza di abilità tra due squadre sia significativa dal punto di vista statistico. Con il QSE le squadre vengono trattate come unità indipendenti. Esempio di applicazioni del QSE e del QV su BTM è possibile trovarli in **firth2004quasi** e in **turner2012bradley**.

Perciò, confrontiamo le stime dei valori delle abilità delle squadre classificate nelle prime due posizione, rispettivamente Milan e Inter. Il QSE per Milan è di 0.359, mentre per l'Inter è di 0.400. La differenza assoluta tra le loro abilità è pari a  $|1.492 - 1.4| = 0.092$ . Applicando il calcolo pitagorico è possibile calcolare lo QSE, cioè un SE approssimato, relativo alla differenza tra abilità. Questo risulta essere  $(0.359^2 + 0.400^2)^{\frac{1}{2}} = 0.537 > 0.092$ . Perciò la differenza in termini di abilità tra le due squadre non è significativa da un punto di vista statistico. Infatti le due squadre hanno una differenza di soli due punti.

### 5.3 BTM con covariate specifiche dell'oggetto

Si consideri l'estensione del modello Bradley-Terry con covariate specifiche dell'oggetto. Il modello applicato è il seguente

$$P(Y_{p(i,j)} \leq k) = \frac{\exp(\delta + \theta_k + \beta_{i0} - \beta_{j0} + x_{pi}^T \tau - x_{pj}^T \tau)}{1 + \exp(\delta + \theta_k + \beta_{i0} - \beta_{j0} + x_{pi}^T \tau - x_{pj}^T \tau)}, \quad (5.1)$$

dove l'effetto dell'ordine  $\delta$ , cioè il vantaggio di giocare la partita in casa, ha ancora un effetto globale per tutte le squadre, mentre  $x_{pi}^T$  è il vettore con tutti i valori delle ventisei covariate per l'i-esima squadra e per la p-esima partita. Il parametro  $\tau$  è il peso medio stimato di ogni covariata. Le covariate, perciò, sono specifiche del soggetto e dell'oggetto ma con un effetto specifico dell'oggetto.

La stima dei parametri soglia  $\theta_1$  e  $\theta_2$  è pari, rispettivamente a -1.113 e 1.113, mentre il parametro  $\delta$  globale per tutte le squadre è salito a 0.27, con uno SE di 0.142. Nella Tabella 5.2 e nella Tabella 5.3 vengono riportate le stime delle abilità delle squadre con i relativi SE, QSE e QV, e le stime di ogni covariata sul modello con relativo SE.

Dai risultati si nota che alcune variabili esplicative sono fortemente associate all'esito della partita. Come ci si aspetta le variabili esplicative legate ai tiri quindi, tiri **Sh**, tiri in porta **SoT** e il rapporto tiri/gol **G/Sh** hanno un peso stimato molto alto e positivo. Sono perciò fortemente decisive per aumentare la probabilità di vittoria. Da notare che sia **G/Sh** e sia **Sh** hanno un alto SE, quindi un'elevata variabilità. Sarà interessante perciò analizzare nel prossimo modello, il peso di queste covariate per ogni singola squadra. Sorprendentemente la variabile esplicativa ha una forte associazione positiva con la probabilità di vittoria è il numero di tocchi con la palla fatti a centrocampo **ToMid3rd**. Le altre covariate legate ai tocchi nelle altre zone del campo quindi

| Squadra        | Abilità | SE    | QSE   | QV    | Rank |
|----------------|---------|-------|-------|-------|------|
| Milan          | 1.406   | 0.644 | 0.455 | 0.239 | 1    |
| Inter          | 1.097   | 0.685 | 0.433 | 0.286 | 2    |
| Napoli         | 1.067   | 0.595 | 0.423 | 0.236 | 3    |
| Juventus       | 0.892   | 0.623 | 0.417 | 0.226 | 4    |
| Lazio          | 0.399   | 0.645 | 0.467 | 0.276 | 5    |
| Roma           | 0.377   | 0.634 | 0.469 | 0.279 | 6    |
| *Atalanta      | 0.317   | 0.000 | 0.423 | 0.238 | 8    |
| *Fiorentina    | 0.236   | 0.596 | 0.383 | 0.235 | 7    |
| *Torino        | 0.092   | 0.591 | 0.427 | 0.165 | 10   |
| *Hellas Verona | 0.013   | 0.561 | 0.427 | 0.164 | 9    |
| Sassuolo       | -0.023  | 0.587 | 0.435 | 0.253 | 11   |
| *Bologna       | -0.045  | 0.657 | 0.459 | 0.128 | 13   |
| *Empoli        | -0.094  | 0.618 | 0.432 | 0.211 | 14   |
| *Udinese       | -0.178  | 0.642 | 0.478 | 0.281 | 12   |
| Sampdoria      | -0.426  | 0.600 | 0.453 | 0.288 | 15   |
| *Salernitana   | -0.854  | 0.544 | 0.429 | 0.219 | 17   |
| *Spezia        | -0.922  | 0.587 | 0.452 | 0.249 | 16   |
| Cagliari       | -1.01   | 0.612 | 0.498 | 0.269 | 18   |
| Genoa          | -1.026  | 0.632 | 0.456 | 0.214 | 19   |
| Venezia        | -1.318  | 0.592 | 0.434 | 0.231 | 20   |

**Tabella 5.2:** Stime delle abilità con relativi *Standard Error* (SE), *Quasi Standard Error* (QSE) e *Quasi Variance* (QV). Nella tabella viene indicato con un asterisco le squadre con un piazzamento stimato diverso da quello reale.

ToDefPen, ToDef3rd, ToAtt3rd e ToAttPen hanno un'associazione positiva seppur minore rispetto a ToMid3rd. Sembra perciò che avere il controllo del centrocampo sia fondamentale per costruire azioni da gol, ma anche per mantenere un risultato positivo dalla partita. Anzi, mantenere il pallone in zone difensive con meno transizioni in zone d'attacco sembra che dia maggior probabilità di vittoria. Infatti, si può notare che un elevato numero di tocchi in area di rigore avversaria ToAttPen aumenti di molto poco la probabilità di vittoria. A sostegno di ciò, si consideri che il campionato italiano è

| Covariata | Stima  | SE    |
|-----------|--------|-------|
| ToMid3rd  | 1.57   | 0.025 |
| G/Sh      | 1.135  | 0.317 |
| Sh        | 0.787  | 0.085 |
| SoT       | 0.536  | 0.324 |
| PCmp%     | 0.534  | 0.300 |
| ToDefPen  | 0.375  | 0.027 |
| ToDef3rd  | 0.347  | 0.026 |
| ToAtt3rd  | 0.283  | 0.025 |
| Saves     | 0.280  | 0.312 |
| Fls       | 0.138  | 0.204 |
| Fld       | 0.100  | 0.204 |
| TklWin    | 0.082  | 0.049 |
| LPAtt     | 0.078  | 0.049 |
| Poss      | 0.032  | 0.169 |
| ToAttPen  | 0.027  | 0.044 |
| TotDist   | -0.039 | 0.001 |
| Off       | -0.054 | 0.144 |
| PAtt      | -0.080 | 0.053 |
| Int       | -0.082 | 0.057 |
| SPCmp%    | -0.100 | 0.136 |
| Crs       | -0.199 | 0.062 |
| LPCmp%    | -0.309 | 0.380 |
| Recov     | -0.512 | 0.030 |
| SPAtt     | -0.650 | 0.053 |
| MPCmp%    | -0.748 | 0.126 |
| MPAtt     | -1.011 | 0.050 |

**Tabella 5.3:** Stime delle covariate con relativo *Standard Error* (SE), stimate dal modello 5.1.

spesso considerato un campionato difensivista e tattico (vedi **speculazione**), dove si spinge l'avversario a sbilanciarsi per poi attaccarlo in contropiede.

Un aspetto difensivo chiave sembra essere rappresentato dalle parate fatte **Saves**. Inoltre, anche il numero di contrasti vinti **TklWin** è positivo quando associato alla probabilità di vittoria. Sorprendentemente però per quanto riguarda le altre variabili esplicative difensive rispettivamente, numero di intercetti **Int** e numero di recuperi **Recov** hanno un'associazione negativa con la probabilità di vittoria. Al contrario di quanto si pensi il possesso della palla non sembra essere un elemento chiave per la vittoria. Infatti la sua stima fa aumentare di molto poco la probabilità di vittoria. Analogamente, anche la distanza percorsa con la palla **TotDist** non sembra essere un elemento chiave per la vittoria, anzi va a diminuire la probabilità di vittoria. Perciò sembra che stia emergendo dall'analisi una tendenza ad avere il controllo del gioco nei momenti giusti e nelle zone giuste del campo per aver maggior probabilità di vittoria. Per quanto riguarda l'aggressività della squadra, la stima del modello indica che commettere falli **Fld** aumenti le probabilità di vittoria, d'altra parte subire falli **Fls** è più conveniente.

Si nota che subire un fuorigioco **Off** ha un impatto negativo sulle probabilità di vittoria. Per quanto riguarda le covariate legate ai passaggi notiamo che solo la percentuale dei passaggi completati **PCmp%** e il numero di lanci lunghi tentati **LPAtt** hanno un'associazione positiva con la probabilità di vittoria, le restanti covariate invece presentano un'associazione negativa. Un abuso di passaggi filtrati **MPAtt** o di cross **Crs** sembra essere controproducente per la vittoria. Una buona precisione sui passaggi **PCmp%** e tentare i cambi di gioco **LPAtt** invece, suggeriscono la possibilità di maggiori probabilità di vittoria.

Come fatto nella sezione precedente è possibile anche qui confrontare tra loro le squadre utilizzando i loro QSE relativi alla loro abilità stimata. Confrontando ancora le prime due squadre cioè Milan e Inter, la loro differenza assoluta di abilità è pari  $|1.406 - 1.097| = 0.309$  e il relativo QSE è pari a  $(0.455^2 + 0.433^2)^{\frac{1}{2}} = 0.628 > 0.309$ . Si ottiene per ciò che la differenza di abilità tra le due squadre è ancora non significativa anche con l'effetto delle covariate.

## 5.4 Modello Bradley-Terry e LASSO

Nella sezione precedente si sono presentati i risultati ottenuti nel modello Bradley-Terry con l'inserimento di covariate con effetto specifico dell'oggetto. È però di interesse per le nostre analisi capire come ogni singola covariata sia determinante per la vittoria a seconda della squadra in esame. Per esempio, è possibile che il possesso della palla possa essere determinante per una squadra mentre per un'altra no. A tale scopo si applicherà il modello (4.12) utilizzando covariate specifiche del soggetto e dell'oggetto. Ovviamente con l'inserimento di questo tipo di covariate il modello sarà estremamente complesso, essendo basato su 520 covariate. Di conseguenza sarà applicata una selezione delle covariate operata attraverso il metodo *LASSO* illustrato nel Capitolo 4. Sempre attraverso il *LASSO* sarà di interesse individuare clusters di squadre che per una certa covariata hanno un effetto simile. Allo stesso tempo si cercherà di individuare quali squadre invece si discostano maggiormente da questi clusters.

Purtroppo non è stato possibile riportare gli SE delle stime a causa dell'elevata complessità del procedimento di calcolo. Questo è possibile solo attraverso la procedura di tipo *bootstrap* (**henderson2005bootstrap**), molto onerosa in termini computazionali,

soprattutto con un numero elevato di covariate.

Nelle Tabella 5.4, 5.5 e 5.6 vengono riportate le stime dei parametri delle abilità e delle covariate per ogni singola squadra. Si noti che non tutte le covariate hanno un'unica stima per tutte le squadre, ma in alcuni casi ci sono più stime per alcune covariate. Perciò, per ogni stima del parametro di una covariata verrà indicata quale squadra ha tale valore stimato. Nell'analisi dei risultati spesso si farà un confronto con i risultati ottenuti con il modello della sezione precedente.

| Squadra       | Abilità | Rank |
|---------------|---------|------|
| Milan         | 1.673   | 1    |
| Inter         | 1.443   | 2    |
| Napoli        | 1.436   | 3    |
| Juventus      | 1.003   | 4    |
| Lazio         | 0.641   | 5    |
| *Atalanta     | 0.594   | 8    |
| *Roma         | 0.555   | 6    |
| *Fiorentina   | 0.227   | 7    |
| Hellas Verona | 0.126   | 9    |
| Torino        | -0.042  | 10   |
| Sassuolo      | -0.171  | 11   |
| Udinese       | -0.262  | 12   |
| Bologna       | -0.292  | 13   |
| Empoli        | -0.386  | 14   |
| *Spezia       | -0.869  | 16   |
| *Salernitana  | -0.876  | 17   |
| *Sampdoria    | -1.095  | 15   |
| Cagliari      | -1.136  | 18   |
| Genoa         | -1.231  | 19   |
| Venezia       | -1.338  | 20   |

**Tabella 5.4:** Stime delle abilità per ogni squadra stimate dal modello (4.12). Nella tabella viene indicato con un asterisco le squadre con un piazzamento stimato diverso da quello reale.

Nella Tabella 5.4 si può notare che le abilità stimate tramite *LASSO* sono quasi sempre in linea con il piazzamento reale, migliorando perciò le prestazioni del modello rispetto al modello con effetto specifico dell'oggetto stimato nella sezione precedente.

Purtroppo l'abilità dell'Atalanta viene sovrastimata nonostante al termine della stagione si sia classificata dietro a Roma e Fiorentina. Tale fenomeno può essere spiegato dal fatto che l'Atalanta per larga parte della stagione militasse tra il terzo e il quarto posto, ma nell'ultima parte della stagione l'Atalanta è crollata di prestazione (vedi **storyAta**). Si nota che l'abilità della Sampdoria viene sottostimata, infatti in generale, non ha avuto un buon rendimento soprattutto verso la fine della stagione (vedi **storySamp**). Nella Tabella 5.5 e nella Tabella 5.6 alcune variabili esplicative sono state portate a zero, quindi eliminate per effetto della regolarizzazione tramite *LASSO*, mentre altre hanno diversi valori a seconda della squadra in considerazione.

Tra le covariate eliminate c'è il numero di passaggi tentati **PAtt** che nella Tabella 5.3 del modello precedente aveva un valore stimato quasi nullo. Sorprendentemente anche la percentuale di passaggi tentati **PCmp%** viene eliminata dal modello nonostante per il modello precedente avesse un valore stimato alto del parametro. Anche il numero di tocchi nella tre quarti di difesa **ToDef3rd** viene tolta dal modello nonostante un valore stimato alto nella Tabella 5.3E. Infine l'ultima variabile esplicativa eliminata interamente dal modello è la distanza percorsa con la palla **TotDist** rimanendo in linea con quanto visto nella Tabella 5.3. Anche qui viene confermato che giocare la partita **Home** ha un effetto positivo stimato in 0.310. Per quanto riguarda invece il possesso della palla **Poss**, come visto dal precedente modello viene stimato con un peso nullo per la maggior parte delle squadre ad eccezione di Lazio e Torino, il quale ha una stima positiva. Il risultato della stima legata alla Lazio è un risultato in realtà non è sorprendente, infatti il **sarrismotr**, neologismo per indicare il gioco applicato dall'allenatore Maurizio Sarri, allenatore della Lazio nella stagione 2021/2022, ha tra le sue caratteristiche il mantenimento del possesso della palla, oltre a una propensione offensiva (vedi **sarrismo**). Analogamente anche il gioco del Torino si fonda sul possesso palla, ma con minor propensione offensiva (vedi **torino**).

Come era atteso, il numero di tiri **Sh**, il numero di tiri in porta **SoT**, il rapporto tiri/gol **G/Sh** e il numero di parate **Saves** sono fortemente associate all'aumento della probabilità di vittoria. Si nota che per **SoT** ci sono ben cinque stime, ciò poteva essere atteso dato che nella Tabella 5.3 era stato stimato un SE pari a 0.324 che giustifica la variazione di stima da squadra a squadra.

Per quanto riguarda le variabili legate ai passaggi non ancora illustrate, abbiamo che, il numero di passaggi corti tentati **SPAtt** non risulta associato alla probabilità di vittoria per le squadre ad eccezione del Napoli, per la quale invece la stima risulta positiva. La percentuale di passaggi corti completati **SPCmp%**, invece, presenta una stima del parametro molto bassa per tutte le squadre ad eccezione del Genoa, squadra per la quale il valore stimato è associato ad una diminuzione della probabilità di vittoria. Il numero di passaggi medi tentati **MPAtt** diminuisce le probabilità di vittoria per tutte le squadre. Analogamente anche per la percentuale di passaggi medi riusciti **MPCmp%** ha il parametro stimato fortemente negativo. Si nota che il numero di passaggi lunghi tentati **LPAtt** ha la stessa stima calcolata con il modello precedente per tutte le squadre. È interessante notare come la percentuale di passaggi lunghi riusciti **LPCmp%** per la maggior parte delle squadre non ha alcuna associazione con l'esito della partita. Per l'Hellas Verona è associato ad un aumento della probabilità di vittoria, al contrario al Bologna è associato ad una diminuzione delle probabilità di vittoria. Infine, si nota che al crescere del numero di cross **Crs** si ha una diminuzione della probabilità di vittoria, principalmente per Atalanta e Napoli. Resta escluso il Torino, con una stima pari a 0.



| Covariata | Stima  | Squadra  |
|-----------|--------|--|
| Home      | 0.310  | Tutti  |
| Poss      | 0.239  | Lazio  |
| Poss      | 0.171  | Torino   |
| Poss      | 0.000  | Tutti tranne Lazio e Torino  |
| Sh        | 0.520  | Tutti  |
| SoT       | 0.596  | Atalanta, Cagliari, Empoli, Genoa, Verona, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Venezia |
| SoT       | 0.495  | Inter, Roma  |
| SoT       | 0.361  | Bologna  |
| SoT       | 0.263  | Fiorentina   |
| SoT       | 0.007  | Udinese  |
| G/Sh      | 1.107  | Tutti  |
| Saves     | 0.260  | Tutti  |
| PAtt      | 0.000  | Tutti  |
| PCmp%     | 0.000  | Tutti  |
| SPAtt     | 0.124  | Napoli   |
| SPAtt     | 0.000  | Tutti tranne Napoli  |
| SPCmp%    | 0.067  | Tutti tranne Genoa   |
| SPCmp%    | -0.235 | Genoa  |
| MPAtt     | -0.058 | Tutti  |
| MPCmp%    | -0.246 | Tutti tranne Bologna e Genoa   |
| MPCmp%    | -0.255 | Bologna e Genoa  |
| LPAtt     | 0.077  | Tutti  |
| LPCmp%    | 0.199  | Hellas Verona  |
| LPCmp%    | 0.000  | Tutti tranne Bologna e Verona  |
| LPCmp%    | -0.303 | Bologna  |

**Tabella 5.5:** Stime delle covariate stimate dal modello (4.12).

| Covariata | Stima  | Squadra  |
|-----------|--------|--|
| ToDefPen  | 0.135  | Tutti  |
| ToDef3rd  | 0.000  | Tutti  |
| ToMid3rd  | 0.147  | Tutti  |
| ToAtt3rd  | -0.154 | Tutti  |
| ToAttPen  | 0.000  | Tutti tranne Atalanta                                |
| ToAttPen  | -0.311 | Atalanta   |
| TotDist   | 0.000  | Tutti  |
| Fls       | 0.219  | Bologna  |
| Fls       | 0.012  | Tutti tranne Bologna, Napoli, Genoa e Salernitana    |
| Fls       | -0.001 | Napoli   |
| Fls       | -0.030 | Genoa, Salernitana                                   |
| Fld       | 0.100  | Spezia   |
| Fld       | 0.015  | Tutti tranne Spezia e Udinese                        |
| Fld       | -0.005 | Udinese  |
| Off       | 0.055  | Hellas Verona  |
| Off       | 0.002  | Tutti tranne Verona, Inter, Juventus, Milan e Napoli |
| Off       | -0.097 | Inter, Juventus, Milan e Napoli                      |
| Crs       | 0.000  | Torino   |
| Crs       | -0.180 | Tutti tranne Milan, Roma, Torino, Atalanta e Napoli  |
| Crs       | -0.391 | Milan e Roma   |
| Crs       | -0.671 | Atalanta e Napoli                                    |
| Int       | 0.012  | Tutti  |
| TklWin    | 0.225  | Empoli   |
| TklWin    | 0.086  | Tutti tranne Empoli                                  |
| Recov     | -0.132 | Tutti tranne Udinese                                 |
| Recov     | -0.189 | Udinese  |

**Tabella 5.6:** Stime delle covariate stimate dal modello (4.12).

Per quanto riguarda le variabili legate al possesso, al crescere del numero di tocchi in area di rigore **ToDefPen** e a centrocampo **ToMid3rd** si ha una crescita della probabilità di vittoria. Viceversa, il numero di tocchi fatti nella tre quarti avversaria **ToAtt3rd** e nell'area di rigore avversaria **ToAttPen** è associato ad una riduzione della probabilità di vittoria.

Al subire falli **Fls** viene associato ad un aumento della probabilità di vittoria per molte squadre, specialmente per il Bologna, mentre la relazione si inverte per Napoli, Genoa e Salernitana. Per quanto riguarda l'effettuare falli **Fld** si associa una leggera probabilità di vittoria per la maggior parte delle squadre, soprattutto per la Spezia. Trend inverso per l'Udinese.

Il numero di fuorigioco **Off** in generale ha una associazione non rilevante con l'esito della partita. Curiosamente per le quattro squadre con la maggior abilità stimata, cioè Milan, Inter, Napoli e Juventus, **Off** ha un impatto negativo sull'esito della partita. Tale risultato può essere spiegato dal fatto che le squadre più forti ad esempio Milan, Inter ecc., creano più azioni d'attacco, mentre le squadre meno forti per difendersi da esse, utilizzano la trappola del fuorigioco per fermarle.

Per quanto riguarda le variabili esplicative difensive, il numero di intercetti **Int** e il numero di contrasti vinti **TklWin** sono associati ad un aumento della probabilità di vittoria. Viceversa il numero di recuperi si associa ad una diminuzione della probabilità di vittoria a tutte le squadre. Anche qui rispetto al modello precedente è cambiato la stima delle soglie  $\theta_1$  e  $\theta_2$  che valgono rispettivamente -1.075 e 1.075.


In alcuni casi nella stime dei parametri delle variabili esplicative c'è un alta variabilità delle stime tanto da essere negative per alcune squadre mentre per altre nulle o positive. Inoltre, in altri casi invece, si vengono a formare dei clusters per alcune covariate. Questo fenomeno lo si può osservare chiaramente dalla Figura 5.1 alla Figura 5.13. Nei grafici vengono mostrati come cambiano le stime dei parametri associati ad ogni covariata e per ogni squadra al variare del parametro di tuning espresso in scala logaritmica. Ovviamente con un valore alto di penalizzazione si vede all'inizio che tutte le stime sono spinte a zero, ma con il diminuire della penalizzazione si iniziano ad ottenere stime diverse per la stessa covariata. La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati illustrati precedentemente. Si ricorda che il parametro di tuning ottimo è stato scelto attraverso la procedura di *Cross Validation* spiegata nel Capitolo 4. In questo caso il parametro di tuning  $\lambda$  scelto è pari a 2.307.

In Figura 5.1 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata del possesso della palla **Poss**, si diversificano i risultati per Lazio e Torino che si discostano nettamente dall'andamento nullo tenuto dalla maggior parte delle squadre.


In Figura 5.2 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata del numero di tiri in porta **SoT**. Si notano cinque clusters con stima positiva. Il cluster con la stima più alta contiene la maggioranza delle squadre, seguito dal secondo cluster per stima contenente Inter e Roma. Il terzo cluster per stima contiene solo il Bologna, anche il quarto cluster per stima contiene solo una squadra, la Fiorentina. Infine il quinto cluster per stima contiene l'Udinese che ha un valore positivo prossimo a zero.

In Figura 5.3 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata del numero di passaggi corti tentati **SPAtt**. Si nota che il Napoli ha un andamento positivo che si discosta nettamente dall'andamento nullo tenuto dalla maggior parte delle squadre.


In Figura 5.4 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata della percentuale di passaggi corti riusciti **SPComp%**. Si nota che il Genoa ha un andamento negativo che si discosta nettamente dall'andamento leggermente positivo tenuto dalla maggior parte delle squadre.




**Figura 5.1:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del possesso della palla per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.




**Figura 5.2:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di tiri in porta per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.



**Figura 5.3:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di passaggi corti tentati per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.



**Figura 5.4:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima della percentuale di passaggi corti riusciti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.



**Figura 5.5:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima della percentuale di passaggi medi riusciti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.


In Figura 5.5 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata della percentuale di passaggi medi riusciti MPCmp%. Si nota che il Genoa e il Bologna hanno un andamento leggermente più negativo rispetto all'andamento comunque negativo tenuto dalla maggior parte delle squadre.

In Figura 5.6 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata della percentuale di passaggi lunghi riusciti LPCmp%. Sono presenti tre clusters. Il primo contenente solo l'Hellas Verona con un percorso positivo, il cluster più grande che contiene quasi tutte le squadre ha un andamento nullo. Infine, il terzo cluster con il Bologna che presenta un andamento negativo.


In Figura 5.7 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata del numero di tocchi fatti nell'area di rigore avversari ToAttPen. Si nota che l'Atalanta ha un andamento negativo che si discosta nettamente dall'andamento nullo tenuto dalla maggior parte delle squadre.

In Figura 5.8 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata del numero di falli subiti Fls, in cui si notano quattro clusters. Il primo cluster contenente il Bologna che con un percorso positivo, è seguito dal cluster più grande che contiene quasi tutte le squadre che ha un andamento leggermente positivo. Invece il cluster che contiene il Napoli ha un andamento leggermente negativo, mentre ancora più negativo è il cluster contenente Genoa e Salernitana.


In Figura 5.9 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata del numero di falli fatti, in cui si notano tre clusters. C'è il cluster contenente lo Spezia che ha un percorso positivo, il cluster più grande che contiene quasi tutte le squadre che ha un andamento leggermente positivo. Invece il cluster che contiene l'Udinese ha un andamento leggermente negativo.




**Figura 5.6:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima della percentuale di passaggi lunghi riusciti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.



**Figura 5.7:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di tocchi fatti nell'area di rigore avversaria per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.




**Figura 5.8:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di falli subiti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.



**Figura 5.9:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di falli fatti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.





**Figura 5.10:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di fuorigioco fatti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.

In Figura 5.10 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata del numero di fuorigioco fatti **Off**. Ci sono tre clusters. Il primo cluster contenente l'Hellas Verona ha un percorso positivo. Il cluster più grande contiene quasi tutte le squadre ha un andamento leggermente positivo. Infine il cluster terzo che contiene Milan, Inter, Napoli e Juventus ha un andamento negativo.


In Figura 5.11 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata del numero di cross fatti **Crs**. Ci sono quattro clusters. Il primo cluster contenente il Torino ha un andamento nullo. Il cluster più grande che contiene quasi tutte le squadre ha un percorso negativo. Ancora più negativi sono il percorso del cluster contenente Milan e Roma, secondo solo al cluster contenente Atalanta e Napoli che si discosta nettamente da tutti gli altri clusters.

In Figura 5.12 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata del numero di contrasti vinti **TklWin**, in cui si nota che l'Empoli ha un percorso positivo che si discosta nettamente dall'andamento comunque positivo ma in minor misura tenuto dalla maggior parte delle squadre.


In Figura 5.13 viene mostrato l'andamento relativo alla stima della covariata del numero di recuperi **Recov**. Si nota che l'Udinese ha un percorso leggermente più negativo rispetto all'andamento negativo tenuto dalla maggior parte delle squadre.

Per riassumere quanto visto finora, la Figura 5.14 mostra i percorsi delle norme L2 che rappresentano l'importanza complessiva dei singoli effetti delle covariate.


Dal grafico si nota che il rapporto tiri/gol **G/Sh** è la variabile che incide maggiormente nella determinazione dell'esito di una partita. Analogamente, il numero di tiri in porta **SoT** e il numero di parate **Saves** sono determinanti sull'esito di una partita, ma con un




**Figura 5.11:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di cross fatti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.



**Figura 5.12:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di contrasti vinti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.



**Figura 5.13:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (4.12) della stima del numero di recuperi per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.



**Figura 5.14:** Grafico che riporta l'importanza delle covariate rispetto alle norme L2 al variare del parametro di tuning  $\lambda$  secondo le stime del modello (4.12). La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.

minor peso rispetto a **G/Sh**. Anche il numero di cross **Crs** è significativamente associato all'esito della partita, ma al contrario di **G/Sh** sappiamo che contribuisce a diminuire le probabilità di vittoria. Si nota anche qui che il possesso della palla ha un ruolo molto marginale nel determinare il risultato di una partita. Viene confermata la tendenza che mantenere il pallone in zone difensive con meno transizioni in zone d'attacco sembra che si associa maggior probabilità di vittoria. Si riconferma importante il numero di lanci lunghi tentati **LPAtt** per l'esito favorevole della partita. Dal grafico si nota che sia il numero di contrasti vinti **TklWin** e il numero di fuorigioco **Off** sono determinanti per l'ottenimento della vittoria. Diversamente, il numero di recuperi **Recov**, la distanza percorsa con la palla **TotDist** e il numero di intercetti **Int** sono poco significativi. Infine notiamo che il numero di falli fatti **fld** è più determinante di quelli subiti **fls**. Perciò, la maggior parte delle stime ottenute sembrano essere in linea con i risultati osservati nel precedente modello con covariate specifiche dell'oggetto senza l'applicazione del metodo *LASSO*.

## 5.5 BTM senza l'intercetta e con LASSO

Come era stato accennato nel Capitolo 4, l'intercetta spiega la maggior parte dell'abilità relativa alla squadra. Per cui le covariate possono essere viste come estensioni contenenti effetti aggiuntivi dell'abilità della squadra che non sono spiegati dall'intercetta. In tal senso, gli effetti della covariata possono aiutare a spiegare i risultati imprevisti di una partita. Nelle tre precedenti applicazioni del modello Bradley-Terry è sempre stata inserita un intercetta per ogni squadra. Perciò, di seguito verranno mostrati i risultati relativi a un modello Bradley-Terry della stessa forma del modello (4.12) ma senza le intercette, con lo scopo di capire quale sia l'effetto che ogni variabile esplicativa sull'abilità della squadra senza l'interferenza dell'intercetta. Ovviamente dato il numero elevato di covariate è stata applicata una selezione attraverso il metodo *LASSO*. Il modello applicato è il seguente

$$P(Y_{p(i,j)} \leq k) = \frac{\exp(\delta_i + \theta_k + x_{pi}^T \eta_i - x_{pj}^T \eta_j)}{1 + \exp(\delta_i + \theta_k + x_{pi}^T \eta_i - x_{pj}^T \eta_j)}. \quad (5.2)$$

Nella Tabella 5.7 e nella Tabella 5.8 vengono riportati i risultati nella stessa modalità utilizza nella precedente sezione.

Anche in questa applicazione sono state eliminate alcune covariate. Come già visto nel modello precedente, vengono confermate l'eliminazione del numero di passaggi tentati **PAtt**, della percentuale dei passaggi completati **PCmp%** e della distanza percorsa con la palla **TotDist**. Viene tolta dal modello la variabile esplicativa del numero di passaggi corti tentati **SPAtt** la quale nel modello precedente andava ad aumentare le probabilità di vittoria solo per il Napoli. Viene eliminata la covariata del numero di passaggi medi tentati **MPAtt** e quella del numero di intercettazioni **Int**. Infine si rivela l'eliminazione della variabile esplicativa che indica il numero di recuperi che nel precedente modello era valutata come una covariata che incideva negativamente sulla probabilità di vittoria.

In questa nuovo tipo di modello la stima del parametro del possesso palla **Poss** ha subito una piccola variazione. Infatti ora la stima non è più nulla per la maggior parte delle squadre ma è leggermente positiva. Ciononostante, la significatività si riconferma ancora bassa. Si riconferma però significativa solo per il gioco della Lazio, ma non più per il Torino come nello scorso modello. Tale risultato è visibile nella Figura 5.15.


Il numero di tiri **Sh**, il rapporto tiri/gol **G/Sh** e il numero di parate **Saves** sono ancora

| Covariata | Stima  | Squadra   |
|-----------|--------|---|
| Home      | 0.270  | Tutti   |
| Poss      | 0.299  | Lazio   |
| Poss      | 0.047  | Tutti tranne Lazio  |
| Sh        | 0.317  | Tutti   |
| SoT       | 0.495  | Atalanta, Cagliari, Empoli, Genoa, Verona, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma, Salernitana, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino e Venezia |
| SoT       | 0.438  | Inter   |
| SoT       | 0.399  | Bologna, Fiorentina e Udinese   |
| G/Sh      | 0.867  | Tutti   |
| Saves     | 0.242  | Tutti   |
| PAtt      | 0.000  | Tutti   |
| PCmp%     | 0.000  | Tutti   |
| SPAtt     | 0.000  | Tutti   |
| SPCmp%    | 0.000  | Tutti tranne Genoa  |
| SPCmp%    | -0.076 | Genoa   |
| MPAtt     | 0.000  | Tutti   |
| MPCmp%    | -0.230 | Udinese   |
| MPCmp%    | -0.236 | Tutti tranne Udinese  |
| LPAtt     | 0.178  | Tutti   |
| LPCmp%    | 0.016  | Hellas Verona   |
| LPCmp%    | 0.000  | Tutti tranne Verona   |
| ToDefPen  | 0.080  | Tutti   |
| ToDef3rd  | 0.024  | Tutti   |

**Tabella 5.7:** Stime delle covariate stimate dal modello (5.2).

| Covariata | Stima  | Squadra                        |
|-----------|--------|--------------------------------|
| ToMid3rd  | 0.002  | Tutti tranne Inter e Sampdoria |
| ToMid3rd  | 0.000  | Inter e Sampdoria              |
| ToAtt3rd  | -0.013 | Tutti                          |
| ToAttPen  | 0.035  | Tutti tranne Atalanta          |
| ToAttPen  | -0.083 | Atalanta                       |
| TotDist   | 0.000  | Tutti                          |
| Fls       | 0.256  | Bologna                        |
| Fls       | 0.088  | Tutti tranne Bologna           |
| Fld       | 0.066  | Tutti tranne Udinese           |
| Fld       | 0.023  | Udinese                        |
| Off       | 0.055  | Hellas Verona                  |
| Off       | 0.000  | Tutti tranne Juventus          |
| Off       | -0.085 | Juventus                       |
| Crs       | -0.190 | Tutti tranne Atalanta          |
| Crs       | -0.464 | Atalanta                       |
| Int       | 0.000  | Tutti                          |
| TklWin    | 0.117  | Empoli                         |
| TklWin    | 0.000  | Tutti tranne Empoli            |
| Recov     | 0.000  | Tutti                          |

**Tabella 5.8:** Stime delle covariate stimate dal modello (5.2).



**Figura 5.15:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del possesso della palla per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.


determinati per aumentare la probabilità di vittoria. Analogamente anche il numero di tiri in porta **SoT** mantiene una stima positiva del parametro, comune variabilità più ristretta rispetto al modello precedente. Infatti nella Figura 5.16 è possibile individuare tre clusters. Il più grande con la maggiore stima contiene la maggior parte delle squadre. Il secondo contiene solo l'Inter e infine il terzo contiene Bologna, Fiorentina e Udinese. Il risultato è visibile nella Figura 5.16.

Nella percentuale di passaggi corti riusciti **SPCmp%** ora viene a crearsi un cluster con un percorso nullo contenente quasi tutte le squadre eccetto il Genoa che è contenuto in un cluster con un percorso negativo. Tali risultati sono visibili nella Figura 5.17.


Per la variabile esplicativa della percentuale di passaggi medi riusciti **MPCmp%** ora viene a crearsi un cluster con un percorso fortemente negativo contenente quasi tutte le squadre eccetto l'Udinese dove si distingue per avere un percorso leggermente meno negativo. Tali risultati sono visibili nella Figura 5.18.

Il numero di passaggi lunghi tentati è ancora una covariata con una stima del parametro che aumenta la probabilità di vittoria. Si nota che la stima della covariata della percentuale di passaggi lunghi riusciti **LPCmp%** ha un cluster con un percorso nullo contenente quasi tutte le squadre eccetto l'Hellas Verona, che si distingue per un percorso positivo. Tali risultati sono visibili nella Figura 5.19.

Sia il numero di tocchi fatti in area di rigore **ToDefPen** sia il numero di tocchi fatti nella trequarti di difesa **ToDef3rd** sono associate ad un aumento della probabilità di vittoria. Nella stima del parametro della covariata che indica il numero di tocchi fatti a centrocampo **ToMid3rd**, viene a crearsi un cluster con un percorso poco significativo contenente quasi tutte le squadre eccetto l'Inter e la Sampdoria, le quali formano un cluster con un percorso non significativo.




**Figura 5.16:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di tiri in porta per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.




**Figura 5.17:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima della percentuale di passaggi corti riusciti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.






**Figura 5.18:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima della percentuale di passaggi medi riusciti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.



**Figura 5.19:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima della percentuale di passaggi lunghi riusciti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.


Il numero di tocchi fatti nella trequarti offensiva **ToAtt3rd** si conferma essere associato ad una riduzione della probabilità di vittoria.

Per la stima della variabile esplicativa che indica il numero di tocchi fatti nell'area di rigore avversaria **ToAttPen**, c'è un cluster con un percorso negativo contenente quasi tutte le squadre eccetto l'Atalanta che si distingue per un percorso positivo. Tali risultati sono visibili nella Figura 5.20. Per quanto riguarda l'aggressività della squadra,




**Figura 5.20:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di tocchi fatti nell'area di rigore avversaria per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.


il numero di falli fatti **Fld** si associa ad un aumento della probabilità di vittoria per tutte le squadre. Come mostrato nella Figura 5.21 però, la stima per l'Udinese è minore rispetto a tutte le altre squadre. Analogamente anche il numero di falli subiti **Fls** si associa ad un aumento della probabilità di vittoria di tutte le squadre, in particolare il Bologna si distingue con una stima maggiore come mostrato nella Figura 5.22. Nella stima della covariata che indica il numero di fuorigioco fatti **Off**, viene a crearsi un cluster con un percorso nullo contenente quasi tutte le squadre eccetto la Juventus, la quale forma un cluster con un percorso negativo. Tali risultati sono visibili nella Figura 5.23. La stima della variabile esplicativa del numero di cross fatti **Crs** si conferma essere ancora determinante per diminuire la probabilità di vittoria. L'Atalanta inoltre si distingue dalle altre squadre con un percorso ancora più negativo rispetto, come mostrato nella Figura 5.24. Si nota che nella stima della covariata che indica il numero di contrasti vinti **TklWin**, viene a crearsi un cluster con un percorso nullo contenente quasi tutte le squadre eccetto l'Empoli, il quale forma un cluster con un percorso positivo. Tali risultati sono visibili nella Figura 5.25. Infine, viene confermato che giocare la partita **Home** ha un effetto positivo stimato in 0.270, mentre è cambiato la stima delle soglie  $\theta_1$  e  $\theta_2$  che valgono rispettivamente -0.803 e 0.803.




**Figura 5.21:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di falli fatti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.




**Figura 5.22:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di falli subiti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.



**Figura 5.23:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di fuorigioco fatti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.



**Figura 5.24:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di cross fatti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.




**Figura 5.25:** Grafico che riporta l'andamento stimato dal modello (5.2) della stima del numero di contrasti vinti per ogni squadra al variare del parametro di tuning  $\lambda$ . La linea rossa tratteggiata indica il parametro di tuning  $\lambda$  ottimo che è stato scelto per ottenere i risultati finali.

Tutti i risultati sono stati ottenuti impostando come parametro di tuning  $\lambda$  pari a 3.299.

Un'ulteriore analisi che può essere condotta è la validazione dell'effetto medio dei valori assunti della covariata per ogni partita e per ogni squadra, insieme alle stime dei singoli parametri per squadra. Si utilizzeranno i grafici a *effetto stella* proposti da **tutz2013visualization**. In questi grafici è possibile visualizzare i valori medi per squadra e per covariata moltiplicati per le rispettive stime riportate precedentemente. Quindi verrà illustrato graficamente il contributo medio di una variabile esplicativa sull'abilità di una singola squadra. Il grafico funziona nel seguente modo: esso mostra il prodotto esponenziale tra la media dei valori assunti da una covariate e le sue stime per ogni squadra. Per ogni grafico, viene creato un cerchio con raggio  $\exp(0) = 1$  il quale rappresenta il caso con stima nulla. I valori oltre il cerchio indicano che la covariata ha effetto positivo in media sulla squadra. Viceversa, i valori all'interno del cerchio indicano che la variabile esplicativa si associa a effetti negativi in media sulla squadra. Nella Figura 5.26 nella Figura 5.27 e nella Figura 5.28 vengono mostrati i grafici a *effetto stella*. Nella Figura 5.26 si possono vedere tutte le variabili esplicative in cui la maggioranza delle squadre ha ricevuto una stima dei parametri delle variabili esplicative uguale a zero. Si possono comunque notare alcune squadre distinguersi in alcune covariate. Ad esempio la Lazio si differenzia dalle altre squadre con il possesso palla **Poss** mentre l'Empoli con il numero di contrasti vinti **TklWin**.


Per la Figura 5.27 abbiamo due particolari grafici. Entrambi rappresentano l'effetto negativo delle covariate che indicano, rispettivamente, il numero di tocchi nella trequarti avversaria fatti **ToAtt3rd** e il numero di cross fatti **Crs**. Notiamo che a subire più



**Figura 5.26:** Grafico a effetto stella che riporta il contributo medio di una covariata sull'abilità di una singola squadra secondo il modello (5.2).

gli effetti negativi sono Inter e Atalanta per entrambe le variabili esplicative. Infine, risultati più interessanti si hanno nella Figura 5.28. Innanzitutto si vede che con riferimento al numero di tiri **Sh** l'Inter ha un grosso beneficio. In minor misura ne beneficiano Milan, Roma, Atalanta, Napoli, Juventus e Sassuolo. Analoghi risultati sono visibili con il numero di tiri in porta **SoT**, con l'aggiunta della Lazio tra le squadre che ricevano più benefici. In generale, nel grafico relativo al numero di parate **Saves**, tutte le squadre ottengono benefici. Stesso risultato si rileva per il numero di passaggi lunghi tentati **LPAtt**. Nel grafico del numero di tocchi in area di rigore **ToDefPen** c'è un particolare beneficio ottenuto dal Venezia, così come Inter, Lazio, Empoli e Sassuolo. Analoghi risultati anche per il numero di tocchi nella tre quarti difensiva **ToDef3rd**, ma con la differenza di minori benefici per il Venezia. Pertanto, si nota la tendenza delle squadre italiana ad attuare tattiche che prediligono di giocare nella propria metà campo. Il numero di tocchi a centrocampo **ToMid3rd** vengono in media effettuati molto dalle squadre, tranne Inter e Sampdoria per le quali l'effetto è nullo. Analogo effetto anche per il numero di tocchi fatti in area di rigore **ToAttPen**, con l'unica differenza si registra ora un effetto positivo per Inter e Sampdoria e un effetto negativo solo per Atalanta. In generali i falli subiti **FIs** portano benefici alle squadre, come si era notato dalle stime del modello. Per i falli fatti, invece abbiamo che l'Udinese ha minori benefici rispetto a tutte le altre squadre.

Infine come fatto nella sezione precedente, si analizzano i percorsi delle norme L2 che rappresentano l'importanza complessiva dei singoli effetti delle covariate. Tali percorsi sono visibili nella Figura 5.29.




**Figura 5.27:** Grafico a effetto stella che riporta il contributo medio di una covariata sull'abilità di una singola squadra secondo il modello (5.2).

Gli andamenti ottenuti nella Figura 5.29 sono molto simili a quelli visti nella Figura 5.14, con un aumento di importanza per la covariata **ToAttPen** in termini di diminuzione della probabilità di vittoria. Pertanto, quanto ricavato del modello (4.12) ora trova conferma anche nel modello (5.2).

## 5.6 Conclusione dei risultati ottenuti


(BOZZA) (\*\*\*\*\*Probabilmente da spostare nel capitolo delle conclusioni\*\*\*\*\*)

Dai risultati ottenuti e dalle analisi condotte è possibile concludere quanto segue. Nel campionato italiano, ai fini della vittoria o, in generale, dell'ottenimento di buoni risultati è rilevante per una squadra adottare un comportamento tattico e giocare prevalentemente nella propria metà campo. Si intende quindi che la squadra debba adottare un comportamento meno propenso a controllare il pallone per lungo tempo perché sia il possesso della palla **Poss** e sia la distanza percorsa con la palla **TotDist** non sono significativi. Inoltre, la squadra deve essere più propensa a giocare maggiormente la palla nella propria area di difesa per evitare contropiedi perché sia le stime del numero di tocchi in area di rigore **ToDefPen**, sia il numero di tocchi nella trequarti difensiva **ToDef3rd** e sia il numero di tocchi a centrocampo **ToMid3rd** sono associati ad un aumento della probabilità di vittoria. Avere perciò una buona difesa è fondamentale. La fase offensiva non deve essere troppo lunga in termini di possesso della palla. Infatti, il numero di tocchi fatti nella trequarti offensiva **ToAtt3rd** porta ad avere una diminuzione delle probabilità di vittoria ma se si fanno i giusti passaggi per entrare nell'area di rigore avversaria mantenendo sempre un possesso palla breve si aumentano le probabilità di vittoria come visto nella stima del numero di tocchi in area di rigore avversaria **ToAttPen**. Dalle analisi emerge che uno sbilanciamento verso la fase offensiva porta una forte diminuzione alle probabilità di vittoria. Considerando



**Figura 5.28:** Grafico che riporta il contributo medio di una covariata sull'abilità di una singola squadra secondo il modello 5.2.





**Figura 5.29:** Grafico che riporta l'importanza delle covariate rispetto alle norme L2 al variare del parametro di tuning  $\lambda$

i casi di Inter e Atalanta. La prima si dimostra essere una delle squadre che più tira in generale (**Sh**) e in porta (**SoT**). Alti valori sono presenti anche per l'Atalanta. Entrambe però mantengono troppo il controllo del pallone nell'area avversaria. Infatti, per entrambe le squadre si riscontrano notevoli diminuzioni della probabilità di vittoria a causa della stima del parametro di **ToAtt3rd**. Peggio ancora per l'Atalanta, che ha un gioco particolarmente offensivo (vedi **ataGioco**), che le fa ottenere una diminuzione della probabilità della vittoria dalla stima del parametro **ToAttPen**. Questo perché il prolungato controllo del pallone la porta a esporsi e a subire contropiede. Si è parlato spesso di contropiedi nella nostra analisi. Quello che emerge sempre in tema di fase offensiva è che, il numero di tiri è relativamente basso, fatto dimostrato dal notevole aumento della probabilità di vittoria portato dalla stima del rapporto tiri/gol **G/Sh**. Di conseguenza le squadre attaccano poco e, quando lo fanno, cercano di massimizzare la loro fase offensiva. Infatti, le partite nel campionato italiano spesso finiscono con un massimo di due o tre gol segnati. Pertanto, l'efficacia di un'azione offensiva che porta al gol e la carenza di azioni offensive portano **Sh**, **SoT** ma soprattutto **G/Sh** ad assumere un elevato contributo nel determinare la vittoria.

Concludendo la trattazione sulla fase offensiva, si illustra quale sia il miglior modo di attaccare che emerge dai modelli. Si sa che il contropiede è efficace, ma allo stesso tempo difficile da attuare per via del comportamento delle squadre a non sbilanciarsi. Una valida alternativa che emerge è il lancio lungo che parte dall'area compresa tra l'area di rigore della squadra fino a centrocampo ed arriva nell'area avversaria. Infatti, la stima del parametro del numero di passaggi lunghi tentati **LPAAtt** è associata ad una crescita della probabilità di vittoria. L'utilizzo di passaggi filtrati **MPCmp%** non è una buona tattica. Analogamente anche i cross **Crs** non danno benefici. Anzi, causano svantaggi, e ancora una volta ne rimangono penalizzate Inter e soprattutto Atalanta che con il suo gioco sfrutta molto le fasce (vedi **ataGioco**). Concludendo, è importante

sottolineare che un atteggiamento troppo speculativo o difensivo da parte della squadra non porta alla vittoria. Questo è il caso del Venezia, classificatosi come ultimo, e che ha ottenuto benefici dalle covariate `ToDefPen` e `ToDef3rd` ma non dalle variabili esplicative offensive.

## 5.7 Predizioni

In questa sezione si vuole valutare le prestazioni dei quattro modelli presentati. I modelli saranno valutati tra loro in base alle predizioni che hanno prodotto ciascuno. Per predizione si intende che il modello stabilisce l'esito di una partita senza conoscerne il risultato reale. Per rendere più interessante il confronto si aggiunge un quinto elemento nel confronto, ossia le predizioni fatte dai *bookmakers*, ad esempio Bet365, William Hill ecc.. I dati dei *bookmakers* sono stati presi da **bet**, il quale fornisce la media delle probabilità dei *bookmakers* per ogni risultato, su un gran numero di campionati di calcio tra cui la Serie A italiana. Si è quindi preso come predizione il risultato più probabile secondo i *bookmakers*.

Le predizioni dei modelli sono state eseguite nel seguente modo: il *dataset* è stato diviso in modo casuale in due parti chiamate solitamente *training set* e *test set*. Il *training set* contiene quasi l'80% delle 38 giornate, ossia 30 giornate per un totale di 300 partite. Invece il *test set* contiene circa il restante 20% ossia 8 giornate per un totale di 80 partite. Il *training set* è utilizzato per stimare i parametri del modello mentre il *test set* è utilizzato per fare predizione. Perciò una parte delle osservazioni sono state utilizzate per allenare il modello, mentre la restante parte per predire l'esito delle restanti osservazioni.

Prima di discutere delle misurazioni e delle predizioni ottenute, è importante tener presente che, i modelli (4.1), (5.1), (4.12) e (5.2), utilizzano informazioni e statistiche che sono disponibili solo dopo il termine delle partite, cioè non disponibili per i *bookmakers*. Infatti i *bookmakers* calcolano le loro predizioni prima che le partite comincino ma tenendo conto delle informazioni delle partite precedentemente giocate. Certamente i quattro modelli non sono utilizzabili per poter fare predizioni, ma l'obiettivo del confronto è quello di capire se le informazioni sono state impiegate in modo ragionevole per acquisire maggior conoscenza. Ciò è possibile notarlo se i modelli hanno prestazioni superiori alle predizioni dei *bookmakers*.

Le metriche che saranno usate per valutare le predizioni calcolate sono le seguenti:

- \* **Accuratezza.** Indica il rapporto tra il numero di predizioni classificate correttamente e il numero totale delle osservazioni in esame.
- \* **Sensibilità.** Indica il rapporto tra il numero di predizioni identificate correttamente con la categoria  $k$  e il numero totale delle osservazioni classificate con la categoria  $k$  con  $k \in \{1, \dots, K\}$ .
- \* **Specificità.** Indica il rapporto tra il numero di predizioni identificate correttamente con una categoria diversa dalla categoria  $k$  e il numero totale delle osservazioni classificate con una categoria diversa dalla categoria  $k$  con  $k \in \{1, \dots, K\}$ .

Nella Figura 5.30 sono mostrate le classificazioni ottenute sulle 80 partite del *test set* per ogni modello e per la predizione dei *bookmakers*.

Dai risultati ottenuti, l'accuratezza dei quattro modelli è rispettivamente 0.65, 0.6125, 0.6625 e 0.6375, mentre per i *bookmakers* è di 0.55. Si può subito notare che tutti e

| ResOss |    |    |    |     | ResOss |    |    |    |     | ResOss |    |    |    |     | ResOss |    |    |    |     | ResOss  |    |    |    |     |
|--------|----|----|----|-----|--------|----|----|----|-----|--------|----|----|----|-----|--------|----|----|----|-----|---------|----|----|----|-----|
| ResPre | 1  | 2  | 3  | Sum | ResPre | 1  | 2  | 3  | Sum | ResPre | 1  | 2  | 3  | Sum | ResPre | 1  | 2  | 3  | Sum | ResPrev | 1  | 2  | 3  | Sum |
| 1      | 13 | 0  | 0  | 13  | 1      | 13 | 0  | 0  | 13  | 1      | 15 | 0  | 0  | 15  | 1      | 15 | 0  | 0  | 15  | 1       | 27 | 12 | 9  | 48  |
| 2      | 13 | 19 | 8  | 40  | 2      | 12 | 20 | 12 | 44  | 2      | 0  | 10 | 0  | 10  | 2      | 0  | 8  | 0  | 8   | 2       | 0  | 0  | 0  | 0   |
| 3      | 3  | 4  | 20 | 27  | 3      | 4  | 3  | 16 | 23  | 3      | 14 | 13 | 28 | 55  | 3      | 14 | 15 | 28 | 57  | 3       | 6  | 9  | 17 | 32  |
| Sum    | 29 | 23 | 28 | 80  | Sum    | 29 | 23 | 28 | 80  | Sum    | 29 | 23 | 28 | 80  | Sum    | 29 | 23 | 28 | 80  | Sum     | 33 | 21 | 26 | 80  |

**Figura 5.30:** La prima tabella indica le predizioni di 80 partite fatte dal modello (4.1), la seconda dal modello (5.1), la terza dal modello (4.12), la quarta dal modello (5.2) e la quinta dai *bookmakers*

quattro i modelli sono migliori delle predizioni dei *bookmakers*. In particolare il modello (4.12) risulta essere quello che produce più predizioni corrette. Sorprendentemente il modello (4.1) che utilizza solo le abilità medie delle squadre e quindi senza l'utilizzo delle variabili esplicative risulta essere migliore di tutti eccetto per il modello (4.12). In particolare si conferma quanto enunciato nel Capitolo 4 riguardo al ruolo dell'intercetta e delle covariate, infatti il modello senza intercetta (5.2) risulta essere leggermente peggiore del modello con l'intercetta (4.12). A tal proposito si può confermare l'esistenza di una differente relazione delle variabili esplicative da squadra a squadra. Infatti tra i quattro modelli confrontati, il modello (5.1) ottiene le peggiori prestazioni dato che ha ignorato la diversa relazione delle variabili esplicative con ogni singola squadra. Nella Figura 5.31 vengono mostrate le misurazioni della sensibilità per ognuna delle tre categorie per i quattro modelli e per i *bookmakers*.

| 1         |           |           |           | 2         |           |           |           | 3         |           |           |           | 1         |           |           |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| 0.4482759 | 0.8260870 | 0.7142857 | 0.4482759 | 0.8695652 | 0.5714286 | 0.5172414 | 0.4347826 | 1.0000000 | 0.5172414 | 0.3478261 | 1.0000000 | 0.8181818 | 0.0000000 | 0.6538462 |  |   |  |  |  |   |  |  |  |

**Figura 5.31:** La prima tabella indica le sensibilità delle predizioni del modello (4.1), la seconda del modello (5.1), la terza del modello (4.12), la quarta del modello (5.2) e la quinta dei *bookmakers*

Come si può notare i *bookmakers* hanno molti problemi a classificare correttamente l'esito di una partita quando questa termina con un pareggio. Infatti vediamo che la sensibilità è zero, questo perché ci sono zero partite classificate con il pareggio, ma dai dati osservati si sa che ci sono delle partite che terminano con un pareggio. Tuttavia sono molto affidabili nel predire la vittoria della squadra in casa contro la squadra ospite. I modelli (4.12) e (5.2) sanno classificare correttamente quando la squadra ospite batte la squadra in casa, infatti la sensibilità è a uno, il massimo. Infine notiamo che i modelli (4.1) e (5.1) sanno ben identificare una partita che termina con un pareggio.

Nella Figura 5.32 vengono mostrate le misurazioni della specificità per ognuna delle tre categorie per i quattro modelli e per i *bookmakers*.

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |   |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
|           | 1         | 2         | 3         |           | 1         | 2         | 3         |           | 1         | 2         | 3 |
| 1.0000000 | 0.6315789 | 0.8653846 |           | 1.0000000 | 0.5789473 | 0.8653846 |           | 1.0000000 | 1.0000000 | 0.4807692 |   |
|           | 1         | 2         | 3         |           | 1         | 2         | 3         |           | 1         | 2         | 3 |
|           | 1.0000000 | 1.0000000 | 0.4423077 |           | 0.5531915 | 1.0000000 | 0.7222222 |           |           |           |   |

**Figura 5.32:** La prima tabella indica le specificità delle predizioni del modello (4.1), la seconda del modello (5.1), la terza del modello (4.12), la quarta del modello (5.2) e la quinta dei *bookmakers*

Ovviamente in questa misurazione i *bookmakers* ottengono il miglior risultato per quanto riguarda l'identificare se una partita non termina in un pareggio. Si nota che tutti e quattro i modelli sanno ben identificare quando l'esito della partita non è la vittoria della squadra di casa, infatti la misurazione ottenuta è uno. Inoltre anche i modelli (4.12) e (5.2) sanno ben identificare quando una partita non termina in un pareggio. D'altra parte i modelli (4.1) e (5.1) ottengono le migliori misurazione nell'identificare quando una partita non termina con la vittoria della squadra ospite.

In conclusione, dai risultati ottenuti si può affermare di aver utilizzato correttamente le informazioni a disposizione dato che si ottengono in generale, prestazioni migliori rispetto alle predizioni dei *bookmakers*.

## 6 | CONCLUSIONI

---

MEMO Riassunto del lavoro/risultati ottenuti, possibili estensione e migliorie che possono essere apportate. Sottolineare che alcune variabili possono avere un peso differente a seconda della lega in cui si svolge la partita, (ad esempio Premier league è un campionato più fisico con alti ritmi rispetto alla Serie A che è più "tattica") TO DO



## 7 | CODICE IN R

### 7.1 extractRowsAway

Codice della funzione per la raccolta delle partite giocate fuori casa dalla squadra indicata nella variabile `Team`.

```
1 extractRowsAway <-function(){
2   k <- 1
3   z <- 1
4   for(i in 1:nrow(AdjserieA)){
5     if(AdjserieA$AtHome[i] == TRUE){
6       for(j in 1:nrow(AdjserieA)){
7         if((AdjserieA$Team[j] == AdjserieA$Vs[i]) && (AdjserieA$Team[i]
8 == AdjserieA$Vs[j]) && (AdjserieA$AtHome[j] == FALSE)){
9           PossVs[k] <- AdjserieA$Poss[j]
10          ShVs[k] <- AdjserieA$Sh[j]
11          ShTVs[k] <- AdjserieA$SoT[j]
12          G.ShVs[k] <- AdjserieA$G/Sh[j]
13          SavesVs[k] <- AdjserieA$Saves[j]
14          PAttVs[k] <- AdjserieA$PAtt[j]
15          PCmp.Vs[k] <- AdjserieA$PCmp[j]
16          SPAttVs[k] <- AdjserieA$SPAtt[j]
17          SPCmp.Vs[k] <- AdjserieA$SPCmp[j]
18          MPAttVs[k] <- AdjserieA$MPAtt[j]
19          MPCmp.Vs[k] <- AdjserieA$MPCmp[j]
20          LPAttVs[k] <- AdjserieA$LPAtt[j]
21          LPCmp.Vs[k] <- AdjserieA$LPCmp[j]
22          ToDefPenVs[k] <- AdjserieA$ToDefPen[j]
23          ToDef3rdVs[k] <- AdjserieA$ToDef3rd[j]
24          ToMid3rdVs[k] <- AdjserieA$ToMid3rd[j]
25          ToAtt3rdVs[k] <- AdjserieA$ToAtt3rd[j]
26          ToAttPenVs[k] <- AdjserieA$ToAttPen[j]
27          ToDistVs[k] <- AdjserieA$TotDist[j]
28          FlsVs[k] <- AdjserieA$Fls[j]
29          FldVs[k] <- AdjserieA$Fld[j]
30          OffVs[k] <- AdjserieA$Off[j]
31          CrsVs[k] <- AdjserieA$Crs[j]
32          IntVs[k] <- AdjserieA$Int[j]
33          TklWinVs[k] <- AdjserieA$TklWin[j]
34          RecovVs[k] <- AdjserieA$Recov[j]
35          GFVs[k] <- AdjserieA$GF[j]
36          GAVs[k] <- AdjserieA$GA[j]
37         k <- k + 1
38       }
39     } else{
40       del[z] <- i
41       z <- z + 1
42     }
43   }
44 }
```

Listing 7.1: Codice di adattamento dataset per il trasferimento dati.

## 7.2 createYFull

Codice della funzione per la creazione della variabile Y3.

```

1 createYFull <- function(SerieA){
2   for(i in 1:38){
3     for(y in 1:10){
4       for(z in 1:nrow(SerieA)){
5         if((paste(str1, i) == SerieA$Round[z]) && (SerieA$AtHome[z] ==
TRUE ) && (first.time[z] == TRUE)){
6           if(SerieA$Res[z] == -1)
7             {
8               response[w] <- 3
9             }
10          else{
11            if(SerieA$Res[z] == 0){
12              response[w] <- 2
13            }
14            else{
15              response[w] <- SerieA$Res[z]
16            }
17          }
18        }
19        switch(
20          SerieA$Team[z],
21          "Atalanta" = first.object[w] <- 1,
22          "Bologna" = first.object[w] <- 2,
23          "Cagliari" = first.object[w] <- 3,
24          "Empoli" = first.object[w] <- 4,
25          "Fiorentina" = first.object[w] <- 5,
26          "Genoa" = first.object[w] <- 6,
27          "Hellas Verona" = first.object[w] <- 7,
28          "Inter" = first.object[w] <- 8,
29          "Juventus" = first.object[w] <- 9,
30          "Lazio" = first.object[w] <- 10,
31          "Milan" = first.object[w] <- 11,
32          "Napoli" = first.object[w] <- 12,
33          "Roma" = first.object[w] <- 13,
34          "Salernitana" = first.object[w] <- 14,
35          "Sampdoria" = first.object[w] <- 15,
36          "Sassuolo" = first.object[w] <- 16,
37          "Spezia" = first.object[w] <- 17,
38          "Torino" = first.object[w] <- 18,
39          "Udinese" = first.object[w] <- 19,
40          "Venezia" = first.object[w] <- 20,
41        )
42        switch(
43          SerieA$Vs[z],
44          "Atalanta" = second.object[w] <- 1,
45          "Bologna" = second.object[w] <- 2,
46          "Cagliari" = second.object[w] <- 3,
47          "Empoli" = second.object[w] <- 4,
48          "Fiorentina" = second.object[w] <- 5,
49          "Genoa" = second.object[w] <- 6,
50          "Hellas Verona" = second.object[w] <- 7,
51          "Inter" = second.object[w] <- 8,
52          "Juventus" = second.object[w] <- 9,
53          "Lazio" = second.object[w] <- 10,
54          "Milan" = second.object[w] <- 11,
55          "Napoli" = second.object[w] <- 12,
56          "Roma" = second.object[w] <- 13,
57          "Salernitana" = second.object[w] <- 14,
58          "Sampdoria" = second.object[w] <- 15,

```



```

59     "Sassuolo" = second.object[w] <- 16,
60     "Spezia"   = second.object[w] <- 17,
61     "Torino"   = second.object[w] <- 18,
62     "Udinese"  = second.object[w] <- 19,
63     "Venezia"  = second.object[w] <- 20,
64   )
65
66   subject[w] <- paste(str1, i)
67   with.order[w] <- TRUE
68   first.time[z] <- FALSE
69   w <- w + 1
70   break
71 }
72 }
73 }
74 }
75 }

```

Listing 7.2: Codice per la creazione della variabile Y3.

## 7.3 extractData

Codice della funzione per estrarre le informazioni di una variabile.

```

1 extractData <-function(cov){
2   for(i in 1:nrow(SerieA)){
3     switch(
4       SerieA$Team[i],
5       "Atalanta" = {ata[it[1]] <- SerieA[[cov]][i]
6         it[1] <- it[1] + 1
7       },
8       "Bologna"   = {bol[it[2]] <- SerieA[[cov]][i]
9         it[2] <- it[2] + 1
10      },
11      "Cagliari"   = {cag[it[3]] <- SerieA[[cov]][i]
12        it[3] <- it[3] + 1
13      },
14      "Empoli"     = {emp[it[4]] <- SerieA[[cov]][i]
15        it[4] <- it[4] + 1
16      },
17      "Fiorentina" = {fio[it[5]] <- SerieA[[cov]][i]
18        it[5] <- it[5] + 1
19      },
20      "Genoa"      = {gen[it[6]] <- SerieA[[cov]][i]
21        it[6] <- it[6] + 1
22      },
23      "Hellas Verona" = {ver[it[7]] <- SerieA[[cov]][i]
24        it[7] <- it[7] + 1
25      },
26      "Inter"      = {int[it[8]] <- SerieA[[cov]][i]
27        it[8] <- it[8] + 1
28      },
29      "Juventus"   = {juv[it[9]] <- SerieA[[cov]][i]
30        it[9] <- it[9] + 1
31      },
32      "Lazio"      = {laz[it[10]] <- SerieA[[cov]][i]
33        it[10] <- it[10] + 1
34      },
35      "Milan"      = {mil[it[11]] <- SerieA[[cov]][i]
36        it[11] <- it[11] + 1
37      },

```

```

38     "Napoli" = {nap[it[12]] <- SerieA[[cov]][i]
39       it[12] <- it[12] + 1
40     },
41     "Roma" = {rom[it[13]] <- SerieA[[cov]][i]
42       it[13] <- it[13] + 1
43     },
44     "Salernitana" = {sal[it[14]] <- SerieA[[cov]][i]
45       it[14] <- it[14] + 1
46     },
47     "Sampdoria" = {sam[it[15]] <- SerieA[[cov]][i]
48       it[15] <- it[15] + 1
49     },
50     "Sassuolo" = {sas[it[16]] <- SerieA[[cov]][i]
51       it[16] <- it[16] + 1
52     },
53     "Spezia" = {spe[it[17]] <- SerieA[[cov]][i]
54       it[17] <- it[17] + 1
55     },
56     "Torino" = {tor[it[18]] <- SerieA[[cov]][i]
57       it[18] <- it[18] + 1
58     },
59     "Udinese" = {udi[it[19]] <- SerieA[[cov]][i]
60       it[19] <- it[19] + 1
61     },
62     "Venezia" = {ven[it[20]] <- SerieA[[cov]][i]
63       it[20] <- it[20] + 1
64     },
65   )
66 }
67 }

```

**Listing 7.3:** Codice per estrarre le informazioni di una variabile.

## 7.4 extractAll

Codice della funzione per estrarre le informazioni di tutte le variabili.

```

1 extractAll <- function(covs, row, teams, n = 20, m = 38){
2   clear()
3   num <- 20
4   isFirst = TRUE
5   tab <- c()
6   for(z in 1:length(covs)){
7     extractData(covs[z])
8     if(isFirst){
9       tab <- matrix(cbind(ata,bol,cag,emp,fio,gen,ver,int,juv,laz,mil,
10         nap,rom,sal,sam,sas,spe,tor,udi,ven), nrow = m, ncol = num)
11       isFirst = FALSE
12     }
13     else{
14       tab <- matrix(cbind(tab, ata,bol,cag,emp,fio,gen,ver,int,juv,laz,
15         mil,nap,rom,sal,sam,sas,spe,tor,udi,ven), nrow = m, ncol = num)
16     }
17     refresh()
18     num <- num + n
19   }
20   col <- colLabel(teams, covs)
21   num2 <- num - n
22   dimnames(tab) <- list(row[1:m], col[1:num2])
23   return(tab)

```

```
22 }
```

**Listing 7.4:** Codice per estrarre le informazioni di tutte le variabili.

## 7.5 colLabel

Codice della funzione per creare le etichette delle colonne.

```
1 colLabel <- function(teams, cov){
2   nameCov <- c()
3   z <- 1
4   for(i in 1:length(cov)){
5     for(y in 1:length(teams)){
6       nameCov[z] <- paste(cov[i], teams[y], sep=".")
7       z <- z + 1
8     }
9   }
10  return(nameCov)
11 }
```

**Listing 7.5:** Codice per creare le etichette delle colonne.

## 7.6 rowLabel

Codice della funzione per creare le etichette delle righe.

```
1 rowLabel <- function(str, n){
2   nameRows <- c()
3   for(i in 1:n){
4     nameRows[i] <- paste(str, i)
5   }
6   return(nameRows)
7 }
```

**Listing 7.6:** Codice per creare le etichette delle righe.



# BIBLIOGRAFIA

---



# SITOGRAFIA

---