

COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES	SOLICITAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES PARA TRANSFUSÃO	 GOVERNO DA PARAÍBA		
		Nº DE ORDEM:		
IDENTIFICAÇÃO, DADOS CLÍNICOS E INDICAÇÃO DE TRANSFUSÃO				
Paciente: PACIENTE JOÃO DE TESTE Sexo: ☐ Fem ☒ Masc Idade: 42 Peso: Kg Data de Nasc: Hospital COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES Apto: Enfermaria: Leito: Recebeu Transfusão: ☐ S ☐ N ☐ Ignorado. Quando? Onde? Internação: ☐ Particular ☒ SIH – SUS – nº AIH Prontuário: ☐ Convênio: (NOME E Nº DO REGISTRO) Hemoglobina: g% Hematócrito: % Plaquetas: /mm³ Diagnóstico e Indicação Clínica: Distúrbio de Coagulação? Cirurgia Proposta: OSTEOTOMIA DE TESTE				
ESPECIFICAÇÃO DO HEMOCOMPONENTE	TIPO DE ANTEDIMENTO			
	TRANSFUSÃO			
	<u>PROGRAMADA</u> (Para determinada data e hora)	<u>NÃO URGENTE</u> (A se realizar dentro de 24 horas)	<u>URGÊNCIA</u> (A se realizar dentro de 3 horas)	<u>EXTREMA URGÊNCIA</u> (Vide Verso)
____ ml de Concentrado de Hemácias				
____ ml de Plasma fresco congelado				
____ unidades de Concentrado de Plaquetas				
____ unidades de Crioprecipitado				
____ ml de Concentrado de Hemácias Lavadas				
____ Plaquetaférese:				
____ Outros (especificar):				
MÉDICO SOLICITANTE			DATA:	
____ Nome Legível e CRM ou Carimbo	____ ASSINATURA		03/05/2024	

ORIENTAÇÕES HEMOTERÁPICA E DE REQUISIÇÃO

TRANSFUSÃO DE EXTREMA URGÊNCIA, SEM TESTE DE COMPATIBILIDADE: Só é indicado em raríssimas exceções e de ALTO RISCO DE VIDA. Será feita a classificação sanguínea do paciente e reclassificação do doador, não sendo efetuada a PROVA DE COMPATIBILIDADE PRETRANSFUSIONAL (PROVA CRUZADA). Portanto o risco de reação hemolítica por anticorpos irregulares existirá e será de responsabilidade do médico requisitante, isentando o serviço de hemoterapia das consequências delas advindas.

Assinatura, de acordo, para atendimento à solicitação:

COMPONENTES, CONTEÚDO E INDICAÇÕES

- CONCENTRADO DE HEMÁCIAS: Volume médio de 300ml. Contém plasma residual e leucócitos. Indicado no tratamento de Anemias. Uma Unidade aumenta 1g/dL de hemoglobina ou 3% do Hematócrito (adulto).

- CONCENTRADO DE HEMÁCIAS LAVADAS: Volume médio 300ml. Indicado em pacientes pós transfundidos e que apresentam reações transfusionais.

- CONCENTRADO DE PLAQUETAS: Volumes entre 50 a 70ml. Indicado em pacientes com plaquetopenia e na prevenção de sangramento em pacientes em tratamento de leucemias.

- CRIOPRECIPITADO: Volume entre 10 a 20ml. Contém principalmente fator VII: C, fator de Von Willebrand, Fibrinogênio e Fator XIII. Indicados nas hipofibrinogenemia herdada ou adquirida, disfibrinogenemia e deficiência de fator XIII. Só é indicado no tratamento da hemofilia A e von Willebrand quando não houver disponibilidade de concentrado de fator VIII liofilizado.

- PLASMA FRESCO CONGELADO: Volume entre 180 – 250ml possui todos os fatores de coagulação. Indicado em pacientes com sangramento nas deficiências múltiplas de fatores de coagulação secundária e hepatopatias, CIVD ou Coagulopatia Dilucional

RESPONSÁVEL PELOS TESTES: _____

DATA: