

Câu 1 Viết hàm trong Python để đổi độ F ra độ C (google cách đổi). Kiểm tra thử xem $F = 69.8$ thì $C = 21$ đúng không? Khi viết hàm phải có phần giải thích và ghi tên, ví dụ

```
"""
This is a function to convert degree F to degree C
Using the formula C = .....
Name: Phi Ha, K63 TTUD
"""

def doi_nhiet_do(F):

    .....

    return C
```

Câu 2 Convert from meters to British length units. Make a program where you set a length given in meters and then compute and write out the corresponding length measured in inches, in feet, in yards, and in miles. Use that one inch is 2.54 cm, one foot is 12 inches, one yard is 3 feet, and one British mile is 1760 yards. As a verification, a length of 640 meters corresponds to 25196.85 inches, 2099.74 feet, 699.91 yards, or 0.3977 miles. Name of program file: `length_conversion.py` or the function `length_conversion`.

Câu 3 Compute the growth of money in a bank.

Let p be a bank's interest rate in percent per year. An initial amount A has then grown to $A \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$ after n years. Make a program for computing how much money 1000 euros have grown to after three years with 5% interest rate. Name of program file: `interest_rate.py`.

Câu 4 Ôn lại thuật toán Horner.

a) Viết script Python để tính các đa thức sau một cách hiệu quả. $p_1(x) = 3(x-1)^5 + 7(x-1)^9$, $p_2(x) = 6(x+2)^3 + 9(x+2)^7 + 3(x+2)^{15} - (x+2)^{31}$.

b) Sử dụng thuật toán Horner để tính giá trị đa thức $P(x)$ sau tại $x = 1.1$ một cách hiệu quả

$$p(x) = (n+1)x^n + nx^{n-1} + \dots + x + 1.$$

Số n lớn nhất các em có thể tìm được là bao nhiêu (làm tròn đến 1000)?

Câu 5 Tính toán lực cản của môi trường khí lên quả bóng đá.

Lực kéo trên một vật thể, theo sức cản không khí, được tính bởi

$$F_d = \frac{1}{2} C_D \rho A V^2,$$

trong đó ρ là mật độ của khí, V là vận tốc của vật thể, A là diện tích tiếp xúc (vuông góc với hướng vận tốc), và C_D là hệ số kéo, phụ thuộc vào hình dạng của vật thể và độ gồ ghề của bề mặt vật thể đó. Lực hấp dẫn trên một bề mặt với khối lượng m là $F_g = mg$, trong đó $g = 9.81 \text{ ms}^{-2}$. Chúng ta có thể dùng các công thức của F_d và F_g để nghiên cứu mức độ tác động của không khí và trọng lực khi đá một quả bóng. Mật độ không khí là $\rho = 1.2 \text{ kg/m}^3$. $A = \pi a^2$ với mọi quả bóng mà bán kính là a . Thông

thường với bóng đá $a = 11\text{cm}$. Khối lượng quả bóng đá là 0.43kg , $C_D = 0.2$. Viết hàm tính toán các lực trên và in kết quả ra khi đá quả bóng với vận tốc $V = 120\text{km/h}$ (mạnh) và $V = 10\text{km/h}$ (yếu). Đặc biệt chú ý đến đơn vị của V khi tính. Đặt tên hàm/file là `kick`.

Câu 6 Import hàm giai thừa trong module `math` sử dụng lệnh `from math import factorial`. Hãy tính xấp xỉ e sử dụng 1000 số hạng đầu tiên trong khai triển MacLaurin như sau

$$e = 1 + \sum_{k=1}^{1000} \frac{1}{k!} .$$

Hết