

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS

División Académica de Tecnologías de la Información y Diseño
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Integradora de Matemáticas para la Ingeniería I

- Hernández Sánchez Katia Alexandra
- Higareda Vázquez María del Pilar
- León Flores Axel Daniel
- Miranda Roldán Jose Luis

9 de noviembre de 2025

Información del Curso

Materia:

Matemáticas para Ingeniería I

Profesor:

M.C. Jorge Yusef Colin Castillo

Grupo:

7°C

Integrantes del Equipo:

Hernández Sánchez Katia Alexandra

Higareda Vázquez María del Pilar

León Flores Axel Daniel

Miranda Roldán Jose Luis

Índice

1. Unidad I: Funciones de varias variables	3
1.1. Funciones de varias variables	3
1.1.1. Funciones escalares de varias variables	3
1.1.2. Dominio	3
1.1.3. Rango	4
1.1.4. Funciones explícitas	5
1.1.5. Funciones implícitas	5
1.2. Planos y superficies	6
1.2.1. Curvas de nivel: Planos, superficies cuadráticas (elipsoides, cono, paraboloides, hiperboloides) – Graficación	6
1.3. Límites y continuidad en funciones de 3 variables	8
1.3.1. Definición y conceptos	8
1.3.2. Racionalización de límites	9
1.3.3. Ejercicios prácticos	9
2. Unidad II: Derivadas Parciales	13
2.1. La derivada parcial	13
2.1.1. Construcción geométrica de la derivada parcial con software	16
2.1.2. Reglas de derivación parcial	21
2.1.3. Regla de la cadena para varias variables	28
2.2. Vector gradiente y derivada direccional	34
2.2.1. Cálculo e interpretación geométrica del gradiente y derivada direccional	34
2.2.2. Representar SW vectores gradientes en superficies	34
2.3. Extremos de funciones multivariables	34
2.3.1. Valores críticos	34
2.3.2. Máximos	34
2.3.3. Mínimos	34
2.3.4. Método de multiplicadores de Lagrange	34
2.3.5. Representación gráfica de extremos de funciones	34
3. Unidad III: Integral múltiple	35
3.1. Integrales dobles	35
3.2. Integrales triples	35
3.3. Cambio de variable en integrales múltiples	35
3.4. Aplicaciones de integrales múltiples	35
4. Unidad IV: Funciones vectoriales	36
4.1. Funciones vectoriales de una variable	36
4.2. Derivadas e integrales de funciones vectoriales	36
4.3. Longitud de arco y curvatura	36
4.4. Aplicaciones de funciones vectoriales	36

1. Unidad I: Funciones de varias variables

1.1. Funciones de varias variables

Funciones de varias variables: estudio teórico

Esta sección presenta un estudio teórico fundamental sobre las funciones de varias variables, abarcando conceptos esenciales como dominio, rango, y la distinción entre funciones explícitas e implícitas. Estos conceptos son la base para el análisis multivariable y aplicaciones en ciencias e ingeniería.

Introducción. Las **funciones de varias variables** son aquellas que dependen de dos o más variables independientes. A diferencia de las funciones de una variable $y = f(x)$, estas funciones se expresan como $z = f(x, y)$ para dos variables, o más generalmente como $w = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ para n variables.

Las funciones de varias variables permiten modelar fenómenos donde múltiples factores influyen simultáneamente en un resultado. Por ejemplo:

- La temperatura $T(x, y, z)$ en un punto del espacio tridimensional.
- El volumen $V(r, h) = \pi r^2 h$ de un cilindro en función de su radio y altura.
- La producción $P(L, K)$ de una empresa en función del trabajo L y capital K (función de producción en economía).

1.1.1. Funciones escalares de varias variables

1.1.2. Dominio

El **dominio** de una función de varias variables $f(x, y)$ es el conjunto de todos los pares ordenados (x, y) para los cuales la función está definida. Formalmente:

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) \text{ está definida}\}$$

Para funciones de tres o más variables, el dominio se extiende naturalmente a \mathbb{R}^3 o \mathbb{R}^n .

¿Cuándo se aplica?

- Al identificar restricciones físicas o matemáticas (raíces cuadradas, denominadores, logaritmos).
- Para determinar la región del plano o espacio donde la función tiene sentido.

Ejemplos ilustrativos:

1. Función polinomial: $f(x, y) = x^2 + y^2$

El dominio es todo \mathbb{R}^2 , ya que no hay restricciones:

$$\text{Dom}(f) = \mathbb{R}^2$$

2. **Función con raíz cuadrada:** $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

La expresión dentro de la raíz debe ser no negativa:

$$9 - x^2 - y^2 \geq 0 \Rightarrow x^2 + y^2 \leq 9$$

El dominio es el disco cerrado de radio 3 centrado en el origen:

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 9\}$$

3. **Función con denominador:** $f(x, y) = \frac{1}{x-y}$

El denominador no puede ser cero:

$$x - y \neq 0 \Rightarrow x \neq y$$

El dominio excluye la recta $y = x$:

$$\text{Dom}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq y\}$$

1.1.3. Rango

El **rango** (o imagen) de una función $f(x, y)$ es el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar la función. Formalmente:

$$\text{Ran}(f) = \{z \in \mathbb{R} : z = f(x, y) \text{ para algún } (x, y) \in \text{Dom}(f)\}$$

¿Cuándo se aplica?

- Al determinar los valores de salida posibles de una función.
- Para analizar el comportamiento global de la función.

Ejemplos ilustrativos:

1. **Paraboloide:** $f(x, y) = x^2 + y^2$

Dado que $x^2 \geq 0$ y $y^2 \geq 0$, tenemos $f(x, y) \geq 0$, y el mínimo se alcanza en $(0, 0)$:

$$\text{Ran}(f) = [0, +\infty)$$

2. **Función con raíz:** $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

Como $0 \leq x^2 + y^2 \leq 9$, tenemos:

$$0 \leq 9 - x^2 - y^2 \leq 9 \Rightarrow 0 \leq \sqrt{9 - x^2 - y^2} \leq 3$$

$$\text{Ran}(f) = [0, 3]$$

3. **Función seno:** $f(x, y) = \sin(x) + \cos(y)$

Dado que $-1 \leq \sin(x) \leq 1$ y $-1 \leq \cos(y) \leq 1$:

$$\text{Ran}(f) = [-2, 2]$$

1.1.4. Funciones explícitas

Una función se dice **explícita** cuando la variable dependiente está despejada en términos de las variables independientes. La forma general es:

$$z = f(x, y)$$

¿Cuándo se aplican?

- Cuando se necesita evaluar directamente la función para valores específicos.
- Para graficar superficies en el espacio tridimensional.
- En cálculo de derivadas parciales de forma directa.

Ejemplos ilustrativos:

1. $z = x^2 + y^2$ — Paraboloide circular
2. $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ — Cono
3. $z = \sin(x) \cos(y)$ — Superficie ondulatoria
4. $w = xyz$ — Función de tres variables

En funciones explícitas, es directo calcular derivadas parciales:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2y \quad \text{para } z = x^2 + y^2$$

1.1.5. Funciones implícitas

Una función se dice **implícita** cuando no está despejada, sino que se define mediante una ecuación de la forma:

$$F(x, y, z) = 0$$

donde z no está aislada explícitamente.

¿Cuándo se aplican?

- Cuando es difícil o imposible despejar la variable dependiente.
- En ecuaciones de superficies como esferas, elipsoides, hiperboloides.
- Para aplicar el teorema de la función implícita en análisis avanzado.

Ejemplos ilustrativos:

1. **Esfera:** $x^2 + y^2 + z^2 = 9$

Esta ecuación define z implícitamente. Si se despeja:

$$z = \pm \sqrt{9 - x^2 - y^2}$$

Se obtienen dos funciones explícitas (hemisferio superior e inferior).

2. **Cilindro:** $x^2 + y^2 = 4$

Define una superficie cilíndrica donde z puede tomar cualquier valor.

3. Ecuación general: $x^2 + y^2 - z^2 = 1$

Hiperboloide de una hoja, difícil de expresar explícitamente.

Derivación implícita: Para funciones implícitas $F(x, y, z) = 0$, podemos calcular derivadas parciales usando:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

Ejemplo aplicado: Para $x^2 + y^2 + z^2 = 9$, con $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 9$:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial F}{\partial z} = 2z$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{2x}{2z} = -\frac{x}{z}$$

Comparación: Explícitas vs. Implícitas.

Aspecto	Función Explícita	Función Implícita
Forma	$z = f(x, y)$	$F(x, y, z) = 0$
Evaluación	Directa	Requiere despejar o métodos numéricos
Derivadas	Directas	Requiere derivación implícita
Ejemplos	$z = x^2 + y^2$	$x^2 + y^2 + z^2 = 9$

Aplicaciones prácticas. Las funciones de varias variables tienen aplicaciones en:

- **Física:** Campos escalares (temperatura, presión, potencial eléctrico).
- **Economía:** Funciones de utilidad $U(x, y)$, funciones de producción Cobb-Douglas $P(L, K) = AL^\alpha K^\beta$.
- **Ingeniería:** Análisis de estructuras, distribución de esfuerzos, optimización de diseños.
- **Estadística:** Regresión multivariable, funciones de densidad conjunta.

1.2. Planos y superficies

1.2.1. Curvas de nivel: Planos, superficies cuadráticas (elipsoides, cono, paraboloides, hiperboloides) – Graficación

Descripción

Una **curva de nivel** de una función $z = f(x, y)$ es el conjunto de puntos (x, y) en el plano xy tales que $f(x, y) = k$ para una constante fija k . Geométricamente, surge al intersectar la *superficie* $z = f(x, y)$ con el *plano horizontal* $z = k$ y proyectar el contorno sobre el plano xy .

Propósito: Visualizar funciones de dos variables mediante sus curvas de nivel y relacionarlas con cortes horizontales de la superficie.

Competencias: Modelación, representación gráfica y comunicación matemática.

Teoría breve. Para $f(x, y) = x^2 + y^2$, las curvas de nivel satisfacen $x^2 + y^2 = k$. Cada $k > 0$ produce una circunferencia de radio $r = \sqrt{k}$ centrada en el origen. El patrón de circunferencias concéntricas refleja que la superficie $z = x^2 + y^2$ es un paraboloide circular.

Curvas de nivel de $f(x, y) = x^2 + y^2$




Figura 1: Curvas de nivel concéntricas para $k = 2, 3, 4, 5, 6$.

Ejemplos guiados.

- $k = 2 \Rightarrow r = \sqrt{2} \approx 1,41$
- $k = 3 \Rightarrow r = \sqrt{3} \approx 1,73$
- $k = 4 \Rightarrow r = 2,00$
- $k = 5 \Rightarrow r = \sqrt{5} \approx 2,24$
- $k = 6 \Rightarrow r = \sqrt{6} \approx 2,45$

Ejercicios.

1) Identificación de curvas

Dibuja las curvas de nivel para $k = 2, 3, 4, 5, 6$ y anota sus radios.

2) Intersección con planos

Encuentra las curvas resultantes de los cortes con los planos $z = k$ y describe su forma.




Figura 2: Paraboloide $z = x^2 + y^2$ y cortes horizontales $z = \text{const}$.

3) Normalización

Transforma $x^2 + y^2 = k$ en la forma $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ y deduce que $a = b = \sqrt{k}$.

1.3. Límites y continuidad en funciones de 3 variables

Descripción

Un **límite** describe el comportamiento de una función $f(x)$ cuando la variable independiente x se aproxima a un valor específico a . La notación formal es:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Esto significa que los valores de $f(x)$ se acercan arbitrariamente a L cuando x se acerca a a . Los límites son fundamentales para definir la **continuidad** de una función y establecer las bases del cálculo diferencial e integral.

Propósito: Comprender el comportamiento de una función cuando la variable se aproxima a un valor determinado.

Competencias: Razonamiento lógico, análisis algebraico y comprensión de la continuidad.

1.3.1. Definición y conceptos

Definición formal. Decimos que el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a es L si:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

siempre que para cada $\varepsilon > 0$ exista un $\delta > 0$ tal que si $0 < |x - a| < \delta$, entonces $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Indeterminaciones comunes. Algunas formas indeterminadas requieren técnicas algebraicas para resolverse:

- $\frac{0}{0}$ — Factorización, racionalización o L'Hôpital
- $\frac{\infty}{\infty}$ — Simplificación algebraica
- $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ — Transformaciones logarítmicas o algebraicas

Continuidad. Una función $f(x)$ es **continua** en $x = a$ si:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Es decir, el límite existe, la función está definida en a , y ambos valores coinciden.

1.3.2. Racionalización de límites

Cuando aparecen raíces cuadradas en expresiones que producen indeterminaciones $\frac{0}{0}$, podemos usar la técnica de **multiplicar por el conjugado**.

Ejemplo resuelto. Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - 3}{x}$$

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - 3}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - 3}{x} \cdot \frac{\sqrt{9+x} + 3}{\sqrt{9+x} + 3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(9+x) - 9}{x(\sqrt{9+x} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{9+x} + 3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{9+x} + 3} \\ &= \frac{1}{\sqrt{9} + 3} = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{9+x} - 3}{x} = \frac{1}{6}}.$

1.3.3. Ejercicios prácticos

Ejercicio 1

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2-9}$$

Solución:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{x^2-9} &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x+3}{(x-3)(x+3)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -3} \frac{1}{x-3} \\ &= \frac{1}{-3-3} = \frac{1}{-6} = \boxed{-\frac{1}{6}}\end{aligned}$$

Ejercicio 2

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-4x+3}{x^2+3x-4}$$

Solución:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-4x+3}{x^2+3x-4} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-3)}{(x-1)(x+4)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-3}{x+4} \\ &= \frac{1-3}{1+4} = \frac{-2}{5} = \boxed{-\frac{2}{5}}\end{aligned}$$

Ejercicio 3

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3-2x^2}{3x^2}$$

Solución:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3-2x^2}{3x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(x-2)}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-2}{3} \\ &= \frac{0-2}{3} = \boxed{-\frac{2}{3}}\end{aligned}$$

Ejercicio 4 (Racionalización)

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 - 2x + x^2} - 2}{x}$$

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 - 2x + x^2} - 2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{4 - 2x + x^2} - 2}{x} \cdot \frac{\sqrt{4 - 2x + x^2} + 2}{\sqrt{4 - 2x + x^2} + 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4 - 2x + x^2) - 4}{x(\sqrt{4 - 2x + x^2} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x + x^2}{x(\sqrt{4 - 2x + x^2} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(-2 + x)}{x(\sqrt{4 - 2x + x^2} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 + x}{\sqrt{4 - 2x + x^2} + 2} \\ &= \frac{-2 + 0}{\sqrt{4} + 2} = \frac{-2}{4} = \boxed{-\frac{1}{2}} \end{aligned}$$

Ejercicio 5 (Racionalización)

Calcular:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x + 3} - 2}{x - 1}$$

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x + 3} - 2}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x + 3} - 2}{x - 1} \cdot \frac{\sqrt{x + 3} + 2}{\sqrt{x + 3} + 2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x + 3) - 4}{(x - 1)(\sqrt{x + 3} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{(x - 1)(\sqrt{x + 3} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt{x + 3} + 2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{4}} \end{aligned}$$

Gráfica ilustrativa. La siguiente figura muestra la función $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ y su comportamiento cerca de $x = 1$, donde existe una discontinuidad removible:

Conclusión.

Función $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ con discontinuidad removible en $x = 1$




Figura 3: Visualización del límite: aunque $f(1)$ no está definida, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$.

“El concepto de límite es fundamental en el cálculo diferencial y sirve como base para las derivadas y la continuidad.”

— Stewart, J. (2016). *Cálculo de varias variables* (8a ed.). Cengage Learning.

2. Unidad II: Derivadas Parciales

Derivadas Parciales: Concepto fundamental

Las derivadas parciales extienden el concepto de derivada a funciones de varias variables, permitiéndonos estudiar cómo cambia una función cuando variamos una sola variable mientras mantenemos las demás constantes. Este concepto es fundamental en física, ingeniería, economía y todas las áreas donde interactúan múltiples variables.

2.1. La derivada parcial

Introducción. En cálculo de una variable, la derivada $\frac{dy}{dx}$ mide la razón de cambio de y con respecto a x . Para funciones de varias variables, necesitamos un concepto similar que nos permita medir cómo cambia la función cuando variamos una variable a la vez.

Consideremos una función $z = f(x, y)$ de dos variables. Podemos estudiar cómo cambia z cuando:

- Variamos x manteniendo y constante
- Variamos y manteniendo x constante

Definición: La **derivada parcial** de f con respecto a x se denota $\frac{\partial f}{\partial x}$ o f_x , y se calcula derivando con respecto a x tratando y como constante.

Notación: Para $z = f(x, y)$ usamos:

- $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial x}, f_x(x, y),$ o z_x
- $\frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial z}{\partial y}, f_y(x, y),$ o z_y

Definición formal. Sea $z = f(x, y)$ una función de dos variables. Las derivadas parciales se definen como:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

Interpretación geométrica.

- $\frac{\partial f}{\partial x}$ representa la pendiente de la curva formada al intersectar la superficie $z = f(x, y)$ con un plano $y = \text{constante}$
- $\frac{\partial f}{\partial y}$ representa la pendiente de la curva formada al intersectar la superficie $z = f(x, y)$ con un plano $x = \text{constante}$

Ejemplos resueltos.

Ejemplo 1: Función polinomial

Calcular las derivadas parciales de $f(x, y) = x^3 + 2xy^2 - y^3$.

Solución:

Para $\frac{\partial f}{\partial x}$: Tratamos y como constante

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(x^3 + 2xy^2 - y^3) \\ &= 3x^2 + 2y^2 \cdot 1 - 0 \\ &= \boxed{3x^2 + 2y^2}\end{aligned}$$

Para $\frac{\partial f}{\partial y}$: Tratamos x como constante

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(x^3 + 2xy^2 - y^3) \\ &= 0 + 2x \cdot 2y - 3y^2 \\ &= \boxed{4xy - 3y^2}\end{aligned}$$

Ejemplo 2: Función con exponencial

Calcular las derivadas parciales de $f(x, y) = e^{xy} + \sin(x) \cos(y)$.

Solución:

Para $\frac{\partial f}{\partial x}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(e^{xy} + \sin(x) \cos(y)) \\ &= e^{xy} \cdot y + \cos(x) \cdot \cos(y) \\ &= \boxed{ye^{xy} + \cos(x) \cos(y)}\end{aligned}$$

Para $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(e^{xy} + \sin(x) \cos(y)) \\ &= e^{xy} \cdot x + \sin(x) \cdot (-\sin(y)) \\ &= \boxed{xe^{xy} - \sin(x) \sin(y)}\end{aligned}$$

Ejemplo 3: Función racional

Calcular las derivadas parciales de $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x - y}$.

Solución:

Para $\frac{\partial f}{\partial x}$: Usamos la regla del cociente

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{(x-y)\frac{\partial}{\partial x}(x^2+y^2) - (x^2+y^2)\frac{\partial}{\partial x}(x-y)}{(x-y)^2} \\ &= \frac{(x-y)(2x) - (x^2+y^2)(1)}{(x-y)^2} \\ &= \frac{2x^2 - 2xy - x^2 - y^2}{(x-y)^2} \\ &= \boxed{\frac{x^2 - 2xy - y^2}{(x-y)^2}}\end{aligned}$$

Para $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{(x-y)\frac{\partial}{\partial y}(x^2+y^2) - (x^2+y^2)\frac{\partial}{\partial y}(x-y)}{(x-y)^2} \\ &= \frac{(x-y)(2y) - (x^2+y^2)(-1)}{(x-y)^2} \\ &= \frac{2xy - 2y^2 + x^2 + y^2}{(x-y)^2} \\ &= \boxed{\frac{x^2 + 2xy - y^2}{(x-y)^2}}\end{aligned}$$

Ejemplo 4: Función de tres variables

Calcular las derivadas parciales de $f(x, y, z) = x^2yz + xy^2z + xyz^2$.

Solución:

Para $\frac{\partial f}{\partial x}$:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xyz + y^2z + yz^2 = \boxed{yz(2x + y + z)}$$

Para $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2z + 2xyz + xz^2 = \boxed{xz(x + 2y + z)}$$

Para $\frac{\partial f}{\partial z}$:

$$\frac{\partial f}{\partial z} = x^2y + xy^2 + 2xyz = \boxed{xy(x + y + 2z)}$$

Aplicaciones prácticas. Las derivadas parciales tienen aplicaciones en:

- **Física:** Ecuaciones de calor, ondas y difusión
- **Economía:** Utilidad marginal, productividad marginal

- **Ingeniería:** Análisis de sensibilidad en diseño
- **Estadística:** Optimización de funciones de verosimilitud
- **Machine Learning:** Gradiente descendente en redes neuronales

2.1.1. Construcción geométrica de la derivada parcial con software

Visualización geométrica de derivadas parciales

La interpretación geométrica de las derivadas parciales nos permite comprender cómo se comporta una superficie tridimensional al realizar cortes paralelos a los planos coordenados. Cada derivada parcial representa la pendiente de una curva resultante de estas intersecciones.

Concepto geométrico fundamental. Para una función $z = f(x, y)$ que representa una superficie en el espacio tridimensional:

- $\frac{\partial f}{\partial x}$ en (x_0, y_0) es la pendiente de la curva de intersección entre la superficie y el plano $y = y_0$
- $\frac{\partial f}{\partial y}$ en (x_0, y_0) es la pendiente de la curva de intersección entre la superficie y el plano $x = x_0$

Visualización paso a paso. Consideremos la función $f(x, y) = x^2 + y^2$ (un paraboloide). Vamos a visualizar cómo se construyen geoméricamente sus derivadas parciales.




Figura 4: Superficie $z = f(x, y) = x^2 + y^2$ con punto de interés $P(1, 1, 2)$.

Derivada parcial respecto a x : Corte con $y = \text{constante}$. Cuando fijamos $y = 1$, la superficie se reduce a una curva en el plano $y = 1$:

$$z = f(x, 1) = x^2 + 1$$

La derivada parcial en $(1, 1)$ es:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(1,1)} = 2x \Big|_{x=1} = 2$$

Esto significa que la pendiente de la curva en el punto P es 2 cuando nos movemos en la dirección x .




Figura 5: Curva azul: intersección con $y = 1$. Recta roja: tangente con pendiente $\frac{\partial f}{\partial x} = 2$.

Derivada parcial respecto a y : Corte con $x = \text{constante}$. Cuando fijamos $x = 1$, la superficie se reduce a:

$$z = f(1, y) = 1 + y^2$$

La derivada parcial en $(1, 1)$ es:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(1,1)} = 2y \Big|_{y=1} = 2$$




Figura 6: Curva azul: intersección con $x = 1$. Recta roja: tangente con pendiente $\frac{\partial f}{\partial y} = 2$.

Ejemplo 2: Silla de montar (Paraboloides hiperbólico). Consideremos ahora $f(x, y) = x^2 - y^2$, una superficie con forma de silla de montar.

Calculamos las derivadas parciales:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -2y$$

En el punto $(1, 1, 0)$:

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(1,1)} = 2, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(1,1)} = -2$$

Comparación visual de curvaturas. La siguiente gráfica muestra las curvas de nivel de la función paraboloides. Cada círculo representa puntos donde la función tiene el mismo valor:

Interpretación práctica con software. En software como **GeoGebra**, **Mathematica**, **MATLAB** o **Python** (matplotlib), podemos:

1. **Graficar la superficie** $z = f(x, y)$ en 3D
2. **Crear planos de corte** $x = x_0$ o $y = y_0$
3. **Visualizar las curvas de intersección**
4. **Calcular y dibujar las rectas tangentes** con pendientes dadas por las derivadas parciales
5. **Animar** el movimiento del punto para ver cómo cambian las pendientes




Figura 7: Silla de montar con cortes que muestran pendientes opuestas en direcciones perpendiculares.




Figura 8: Curvas de nivel: círculos concéntricos para $k = 1, 2, 3, 4$.

Herramientas recomendadas: GeoGebra 3D, Desmos 3D Calculator, Python (matplotlib + numpy), MATLAB, Mathematica, Wolfram Alpha

Ventajas de la visualización: Permite comprender intuitivamente conceptos abstractos, verificar cálculos analíticos y explorar comportamientos locales de funciones complejas.

Ejercicio guiado con visualización.

Ejercicio: Cono

Considera la función $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$, que representa un cono.

Tareas:

1. Calcula $\frac{\partial f}{\partial x}$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$
2. Evalúa las derivadas en el punto $(3, 4)$
3. Interpreta geoméricamente el resultado

Solución:

1. Cálculo de derivadas parciales:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x}{f(x, y)}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{y}{f(x, y)}$$

2. Evaluación en $(3, 4)$:

$$f(3, 4) = \sqrt{9 + 16} = 5$$

$$\left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(3,4)} = \frac{3}{5} = 0,6, \quad \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{(3,4)} = \frac{4}{5} = 0,8$$

3. Interpretación geométrica:

- Al movernos en dirección x desde $(3, 4, 5)$, la superficie sube con pendiente 0.6
- Al movernos en dirección y , la pendiente es 0.8
- Ambas pendientes son positivas porque nos alejamos del vértice del cono en el origen

Conclusión. La construcción geométrica de derivadas parciales nos permite:

- **Visualizar** cómo una superficie cambia localmente en diferentes direcciones
- **Comprender** que cada derivada parcial es la pendiente de una curva específica
- **Utilizar software** para verificar y explorar cálculos analíticos
- **Desarrollar intuición** sobre el comportamiento de funciones multivariables




Figura 9: Superficie cónica con punto de análisis en $(3, 4, 5)$.

2.1.2. Reglas de derivación parcial

Reglas de derivación: Extensión al caso multivariable

Las reglas de derivación que conocemos del cálculo de una variable se extienden naturalmente a las derivadas parciales. La diferencia clave es que al derivar respecto a una variable, tratamos las demás como constantes.

Introducción. Las reglas de derivación parcial nos permiten calcular derivadas de funciones complejas de manera sistemática y eficiente. Estas reglas son idénticas a las del cálculo de una variable, pero aplicadas variable por variable.

Reglas básicas. Sea $f(x, y)$ y $g(x, y)$ funciones de dos variables, y c una constante.

Regla 1: Constante:

$$\frac{\partial}{\partial x}(c) = 0, \quad \frac{\partial}{\partial y}(c) = 0$$

Regla 2: Constante por una función:

$$\frac{\partial}{\partial x}[c \cdot f(x, y)] = c \cdot \frac{\partial f}{\partial x}$$

Regla 3: Suma y diferencia:

$$\frac{\partial}{\partial x}[f(x, y) \pm g(x, y)] = \frac{\partial f}{\partial x} \pm \frac{\partial g}{\partial x}$$

Regla 4: Producto:

$$\frac{\partial}{\partial x}[f(x, y) \cdot g(x, y)] = f \cdot \frac{\partial g}{\partial x} + g \cdot \frac{\partial f}{\partial x}$$

Regla 5: Cociente:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{f(x, y)}{g(x, y)} \right] = \frac{g \cdot \frac{\partial f}{\partial x} - f \cdot \frac{\partial g}{\partial x}}{g^2}$$

Regla 6: Potencia:

$$\frac{\partial}{\partial x}[f(x, y)]^n = n[f(x, y)]^{n-1} \cdot \frac{\partial f}{\partial x}$$

Función	$\frac{\partial f}{\partial x}$	$\frac{\partial f}{\partial y}$
$f(x, y) = x^n$	nx^{n-1}	0
$f(x, y) = y^n$	0	ny^{n-1}
$f(x, y) = x^n y^m$	$nx^{n-1} y^m$	$mx^n y^{m-1}$
$f(x, y) = e^x$	e^x	0
$f(x, y) = e^{xy}$	ye^{xy}	xe^{xy}
$f(x, y) = \ln(x)$	$\frac{1}{x}$	0
$f(x, y) = \ln(xy)$	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{y}$
$f(x, y) = \sin(x)$	$\cos(x)$	0
$f(x, y) = \sin(xy)$	$y \cos(xy)$	$x \cos(xy)$
$f(x, y) = \cos(x)$	$-\sin(x)$	0
$f(x, y) = \tan(x)$	$\sec^2(x)$	0

Cuadro 1: Derivadas parciales de funciones comunes.

Tabla resumen de derivadas parciales comunes.

Ejemplos resueltos detallados.

Ejemplo 1: Regla de la suma y producto

Calcular las derivadas parciales de:

$$f(x, y) = 3x^2y + 5xy^3 - 7x + 2y$$

Solución:

Para $\frac{\partial f}{\partial x}$: Derivamos término por término respecto a x

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y) + \frac{\partial}{\partial x}(5xy^3) - \frac{\partial}{\partial x}(7x) + \frac{\partial}{\partial x}(2y) \\ &= 3y \cdot 2x + 5y^3 \cdot 1 - 7 + 0 \\ &= \boxed{6xy + 5y^3 - 7} \end{aligned}$$

Para $\frac{\partial f}{\partial y}$: Derivamos término por término respecto a y

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(3x^2y) + \frac{\partial}{\partial y}(5xy^3) - \frac{\partial}{\partial y}(7x) + \frac{\partial}{\partial y}(2y) \\
&= 3x^2 \cdot 1 + 5x \cdot 3y^2 - 0 + 2 \\
&= \boxed{3x^2 + 15xy^2 + 2}
\end{aligned}$$

Ejemplo 2: Regla del producto

Calcular las derivadas parciales de:

$$f(x, y) = (x^2 + y)(3x - y^2)$$

Solución:

Para $\frac{\partial f}{\partial x}$: Usamos la regla del producto

Sean $u = x^2 + y$ y $v = 3x - y^2$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x} &= u \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + v \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \\
&= (x^2 + y) \cdot 3 + (3x - y^2) \cdot 2x \\
&= 3x^2 + 3y + 6x^2 - 2xy^2 \\
&= \boxed{9x^2 - 2xy^2 + 3y}
\end{aligned}$$

Para $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial y} &= u \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + v \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \\
&= (x^2 + y) \cdot (-2y) + (3x - y^2) \cdot 1 \\
&= -2x^2y - 2y^2 + 3x - y^2 \\
&= \boxed{-2x^2y - 3y^2 + 3x}
\end{aligned}$$

Ejemplo 3: Regla del cociente

Calcular las derivadas parciales de:

$$f(x, y) = \frac{x^2 + y}{x - 2y}$$

Solución:

Sean $u = x^2 + y$ y $v = x - 2y$

Para $\frac{\partial f}{\partial x}$: Aplicamos la regla del cociente

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{v \cdot \frac{\partial u}{\partial x} - u \cdot \frac{\partial v}{\partial x}}{v^2} \\
&= \frac{(x-2y) \cdot 2x - (x^2+y) \cdot 1}{(x-2y)^2} \\
&= \frac{2x^2 - 4xy - x^2 - y}{(x-2y)^2} \\
&= \boxed{\frac{x^2 - 4xy - y}{(x-2y)^2}}
\end{aligned}$$

Para $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{v \cdot \frac{\partial u}{\partial y} - u \cdot \frac{\partial v}{\partial y}}{v^2} \\
&= \frac{(x-2y) \cdot 1 - (x^2+y) \cdot (-2)}{(x-2y)^2} \\
&= \frac{x - 2y + 2x^2 + 2y}{(x-2y)^2} \\
&= \boxed{\frac{2x^2 + x}{(x-2y)^2}}
\end{aligned}$$

Ejemplo 4: Regla de la potencia (cadena)

Calcular las derivadas parciales de:

$$f(x, y) = (x^3 + xy^2)^5$$

Solución:

Sea $u = x^3 + xy^2$, entonces $f = u^5$

Para $\frac{\partial f}{\partial x}$: Aplicamos la regla de la cadena

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x} &= 5u^4 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \\
&= 5(x^3 + xy^2)^4 \cdot (3x^2 + y^2) \\
&= \boxed{5(x^3 + xy^2)^4(3x^2 + y^2)}
\end{aligned}$$

Para $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial y} &= 5u^4 \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \\
&= 5(x^3 + xy^2)^4 \cdot (2xy) \\
&= \boxed{10xy(x^3 + xy^2)^4}
\end{aligned}$$

Ejemplo 5: Funciones exponenciales y trigonométricas

Calcular las derivadas parciales de:

$$f(x, y) = e^{x^2y} \sin(xy)$$

Solución:

Usamos la regla del producto: $f = e^{x^2y} \cdot \sin(xy)$

Para $\frac{\partial f}{\partial x}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= e^{x^2y} \cdot \frac{\partial}{\partial x}[\sin(xy)] + \sin(xy) \cdot \frac{\partial}{\partial x}[e^{x^2y}] \\ &= e^{x^2y} \cdot \cos(xy) \cdot y + \sin(xy) \cdot e^{x^2y} \cdot 2xy \\ &= e^{x^2y}[y \cos(xy) + 2xy \sin(xy)] \\ &= \boxed{ye^{x^2y}[\cos(xy) + 2x \sin(xy)]}\end{aligned}$$

Para $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= e^{x^2y} \cdot \frac{\partial}{\partial y}[\sin(xy)] + \sin(xy) \cdot \frac{\partial}{\partial y}[e^{x^2y}] \\ &= e^{x^2y} \cdot \cos(xy) \cdot x + \sin(xy) \cdot e^{x^2y} \cdot x^2 \\ &= xe^{x^2y}[\cos(xy) + x \sin(xy)] \\ &= \boxed{xe^{x^2y}[\cos(xy) + x \sin(xy)]}\end{aligned}$$

Ejemplo 6: Función logarítmica

Calcular las derivadas parciales de:

$$f(x, y) = \ln(x^2 + y^2 + 1)$$

Solución:

Sea $u = x^2 + y^2 + 1$, entonces $f = \ln(u)$

Para $\frac{\partial f}{\partial x}$: Usamos la regla de la cadena

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{1}{u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} \\ &= \frac{1}{x^2 + y^2 + 1} \cdot 2x \\ &= \boxed{\frac{2x}{x^2 + y^2 + 1}}\end{aligned}$$

Para $\frac{\partial f}{\partial y}$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{1}{u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} \\
&= \frac{1}{x^2 + y^2 + 1} \cdot 2y \\
&= \boxed{\frac{2y}{x^2 + y^2 + 1}}
\end{aligned}$$

Derivadas parciales de orden superior. Las derivadas parciales pueden derivarse nuevamente, obteniendo derivadas de segundo orden o superiores.

Notación: Para $f(x, y)$:

Segundas derivadas parciales:

- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = f_{xx}$: derivar dos veces respecto a x
- $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = f_{yy}$: derivar dos veces respecto a y
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = f_{xy}$: derivar primero respecto a y , luego respecto a x
- $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = f_{yx}$: derivar primero respecto a x , luego respecto a y

Teorema de Schwarz: Si las derivadas parciales mixtas f_{xy} y f_{yx} son continuas, entonces:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Es decir, el orden de derivación no importa.

Ejemplo 7: Derivadas de segundo orden

Calcular todas las segundas derivadas parciales de:

$$f(x, y) = x^3y^2 + x^2y$$

Solución:

Primero calculamos las derivadas de primer orden:

$$\begin{aligned}
f_x &= 3x^2y^2 + 2xy \\
f_y &= 2x^3y + x^2
\end{aligned}$$

Ahora las segundas derivadas:

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2 + 2xy) = \boxed{6xy^2 + 2y}$$

$$f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(2x^3y + x^2) = \boxed{2x^3}$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2y^2 + 2xy) = \boxed{6x^2y + 2x}$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}(2x^3y + x^2) = \boxed{6x^2y + 2x}$$

Verificación: Como esperábamos por el Teorema de Schwarz: $f_{xy} = f_{yx}$

Errores comunes al calcular derivadas parciales.

- **Error 1:** Olvidar que las otras variables son constantes.

Incorrecto: $\frac{\partial}{\partial x}(xy^2) = y^2 + 2xy$

Correcto: $\frac{\partial}{\partial x}(xy^2) = y^2$ (porque y es constante)

- **Error 2:** Confundir el orden en derivadas mixtas.

Para $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$: primero derivar respecto a y , luego respecto a x

- **Error 3:** No aplicar la regla de la cadena cuando es necesaria.

Incorrecto: $\frac{\partial}{\partial x}[\sin(x^2y)] = \cos(x^2y)$

Correcto: $\frac{\partial}{\partial x}[\sin(x^2y)] = \cos(x^2y) \cdot 2xy$

Ejercicios propuestos. Calcular las derivadas parciales de las siguientes funciones:

1. $f(x, y) = 5x^4y^3 - 3x^2y + 7xy^2 - 2$
2. $f(x, y) = \frac{x^3 - y^3}{x + y}$
3. $f(x, y) = e^{x/y} + \ln(x^2 + y^2)$
4. $f(x, y) = x^y$ (*Sugerencia:* $x^y = e^{y \ln x}$)
5. $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2) \cdot e^{xy}$
6. $f(x, y, z) = xyz + x^2y + y^2z + z^2x$ (tres variables)
7. Calcular f_{xx} , f_{yy} , f_{xy} para $f(x, y) = \sin(x) \cos(y)$
8. Verificar que $f_{xy} = f_{yx}$ para $f(x, y) = e^{xy^2}$

2.1.3. Regla de la cadena para varias variables

Regla de la cadena: Composición de funciones multivariables

La regla de la cadena para funciones de varias variables nos permite calcular derivadas cuando las variables son, a su vez, funciones de otras variables. Es una extensión natural de la regla de la cadena del cálculo de una variable y es fundamental en física, ingeniería y optimización.

Introducción. En cálculo de una variable, la regla de la cadena establece que si $y = f(u)$ y $u = g(x)$, entonces:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$$

Para funciones de varias variables, esta regla se extiende considerando todas las trayectorias de dependencia entre variables.

Caso 1: Función de dos variables con dependencia de una sola variable.

Teorema (Regla de la cadena - Caso 1): Sea $z = f(x, y)$ una función diferenciable de x e y , donde:

- $x = x(t)$
- $y = y(t)$

Entonces la **derivada total** de z respecto a t es:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$$

Interpretación: La tasa de cambio de z respecto a t se obtiene sumando las contribuciones de cada variable intermedia.

Visualización de las dependencias. Para visualizar la regla de la cadena, imaginamos un diagrama de árbol con las siguientes dependencias:

Caminos de dependencia: Existen dos caminos desde t hasta z :

- **Camino 1:** $t \rightarrow x \rightarrow z$ contribuye: $\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt}$
- **Camino 2:** $t \rightarrow y \rightarrow z$ contribuye: $\frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt}$

La derivada total es la suma de las contribuciones de ambos caminos.

Ejemplo 1: Caso básico

Sea $z = x^2 + xy + y^2$ donde $x = t^2$ y $y = t^3$. Calcular $\frac{dz}{dt}$.

Solución:

Método 1: Aplicando la regla de la cadena

Primero calculamos las derivadas parciales de z :

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= 2x + y \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= x + 2y\end{aligned}$$

Luego las derivadas de x e y respecto a t :

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2t \\ \frac{dy}{dt} &= 3t^2\end{aligned}$$

Aplicamos la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt} \\ &= (2x + y)(2t) + (x + 2y)(3t^2) \\ &= (2t^2 + t^3)(2t) + (t^2 + 2t^3)(3t^2) \\ &= 4t^3 + 2t^4 + 3t^4 + 6t^5 \\ &= \boxed{6t^5 + 5t^4 + 4t^3}\end{aligned}$$

Método 2: Sustitución directa (verificación)

Sustituimos $x = t^2$ y $y = t^3$ en z :

$$\begin{aligned}z &= (t^2)^2 + (t^2)(t^3) + (t^3)^2 \\ &= t^4 + t^5 + t^6\end{aligned}$$

Derivamos directamente:

$$\frac{dz}{dt} = 4t^3 + 5t^4 + 6t^5 = \boxed{6t^5 + 5t^4 + 4t^3}$$

Ambos métodos dan el mismo resultado.

Ejemplo 2: Funciones trigonométricas

Sea $z = e^x \sin(y)$ donde $x = t^2$ y $y = \pi t$. Calcular $\frac{dz}{dt}$ cuando $t = 1$.

Solución:

Calculamos las derivadas parciales:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= e^x \sin(y) \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= e^x \cos(y)\end{aligned}$$

Las derivadas respecto a t :

$$\begin{aligned}\frac{dx}{dt} &= 2t \\ \frac{dy}{dt} &= \pi\end{aligned}$$

Aplicamos la regla de la cadena:

$$\begin{aligned}\frac{dz}{dt} &= e^x \sin(y) \cdot 2t + e^x \cos(y) \cdot \pi \\ &= e^{t^2} [\sin(\pi t) \cdot 2t + \cos(\pi t) \cdot \pi]\end{aligned}$$

Evalúamos en $t = 1$:

$$\begin{aligned}\left. \frac{dz}{dt} \right|_{t=1} &= e^1 [\sin(\pi) \cdot 2 + \cos(\pi) \cdot \pi] \\ &= e[0 \cdot 2 + (-1) \cdot \pi] \\ &= \boxed{-\pi e}\end{aligned}$$

Caso 2: Función de dos variables con dependencia de dos variables.

Teorema (Regla de la cadena - Caso 2): Sea $z = f(x, y)$ donde:

- $x = x(u, v)$
- $y = y(u, v)$

Entonces:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v}\end{aligned}$$

Visualización para el Caso 2. Para este caso más complejo, existen cuatro caminos desde las variables u y v hasta z :

Caminos de dependencia para el Caso 2: Cuatro caminos:

- **Camino 1:** $u \rightarrow x \rightarrow z$ contribuye: $\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u}$
- **Camino 2:** $u \rightarrow y \rightarrow z$ contribuye: $\frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u}$
- **Camino 3:** $v \rightarrow x \rightarrow z$ contribuye: $\frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v}$
- **Camino 4:** $v \rightarrow y \rightarrow z$ contribuye: $\frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v}$

Por tanto:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} &= \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}\end{aligned}$$

Ejemplo 3: Coordenadas polares

Sea $z = x^2 + y^2$ donde $x = r \cos(\theta)$ y $y = r \sin(\theta)$. Calcular $\frac{\partial z}{\partial r}$ y $\frac{\partial z}{\partial \theta}$.

Solución:

Calculamos las derivadas parciales de z :

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= 2x \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= 2y\end{aligned}$$

Las derivadas de x e y respecto a r y θ :

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial r} &= \cos(\theta), & \frac{\partial x}{\partial \theta} &= -r \sin(\theta) \\ \frac{\partial y}{\partial r} &= \sin(\theta), & \frac{\partial y}{\partial \theta} &= r \cos(\theta)\end{aligned}$$

Para $\frac{\partial z}{\partial r}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial r} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial r} \\ &= 2x \cdot \cos(\theta) + 2y \cdot \sin(\theta) \\ &= 2r \cos^2(\theta) + 2r \sin^2(\theta) \\ &= 2r(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta)) \\ &= \boxed{2r}\end{aligned}$$

Para $\frac{\partial z}{\partial \theta}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial \theta} &= \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial \theta} \\ &= 2x \cdot (-r \sin(\theta)) + 2y \cdot r \cos(\theta) \\ &= -2r^2 \cos(\theta) \sin(\theta) + 2r^2 \sin(\theta) \cos(\theta) \\ &= \boxed{0}\end{aligned}$$

Interpretación: $\frac{\partial z}{\partial r} = 2r$ indica que z crece linealmente con r . $\frac{\partial z}{\partial \theta} = 0$ confirma que $z = x^2 + y^2$ no depende del ángulo (es simétrica circularmente).

Ejemplo 4: Caso general

Sea $z = x^2y + xy^2$ donde $x = uv$ y $y = u - v$. Calcular $\frac{\partial z}{\partial u}$ y $\frac{\partial z}{\partial v}$.

Solución:

Derivadas parciales de z :

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= 2xy + y^2 \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= x^2 + 2xy\end{aligned}$$

Derivadas de x e y :

$$\begin{aligned}\frac{\partial x}{\partial u} &= v, & \frac{\partial x}{\partial v} &= u \\ \frac{\partial y}{\partial u} &= 1, & \frac{\partial y}{\partial v} &= -1\end{aligned}$$

Para $\frac{\partial z}{\partial u}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= (2xy + y^2) \cdot v + (x^2 + 2xy) \cdot 1 \\ &= v(2xy + y^2) + x^2 + 2xy\end{aligned}$$

Sustituyendo $x = uv$ y $y = u - v$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial u} &= v[2uv(u - v) + (u - v)^2] + (uv)^2 + 2uv(u - v) \\ &= 2uv^2(u - v) + v(u - v)^2 + u^2v^2 + 2uv(u - v) \\ &= \boxed{2u^2v^2 - 2uv^3 + u^2v - 2uv^2 + v^3 + u^2v^2 + 2u^2v - 2uv^2}\end{aligned}$$

Simplificando:

$$\frac{\partial z}{\partial u} = \boxed{3u^2v^2 + 2u^2v + u^2v - 4uv^2 + v^3}$$

Para $\frac{\partial z}{\partial v}$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial v} &= (2xy + y^2) \cdot u + (x^2 + 2xy) \cdot (-1) \\ &= u(2xy + y^2) - x^2 - 2xy\end{aligned}$$

(Se puede desarrollar de manera similar sustituyendo valores)

Caso 3: Derivada implícita. Cuando tenemos una ecuación implícita $F(x, y) = 0$, podemos usar la regla de la cadena para encontrar $\frac{dy}{dx}$.

Derivación implícita: Para $F(x, y) = 0$:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial y}}$$

Generalización: Para $F(x, y, z) = 0$:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}$$

Ejemplo 5: Derivación implícita

Para la ecuación $x^3 + y^3 + xyz = 10$, calcular $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.

Solución:

Sea $F(x, y, z) = x^3 + y^3 + xyz - 10$

Calculamos las derivadas parciales de F :

$$\begin{aligned}\frac{\partial F}{\partial x} &= 3x^2 + yz \\ \frac{\partial F}{\partial y} &= 3y^2 + xz \\ \frac{\partial F}{\partial z} &= xy\end{aligned}$$

Aplicamos la fórmula:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{3x^2 + yz}{xy} = \boxed{-\frac{3x^2 + yz}{xy}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{3y^2 + xz}{xy} = \boxed{-\frac{3y^2 + xz}{xy}}$$

Aplicaciones prácticas.

1. **Física:** Cambio de coordenadas (cartesianas a polares, cilíndricas, esféricas)
2. **Termodinámica:** Relaciones entre variables de estado
3. **Optimización:** Funciones objetivo con restricciones paramétricas
4. **Ingeniería:** Análisis de sensibilidad en sistemas complejos
5. **Cinemática:** Velocidad y aceleración en trayectorias curvas

Ejercicios propuestos.

1. Sea $z = x^2 - y^2$ donde $x = e^t$ y $y = e^{-t}$. Calcular $\frac{dz}{dt}$.
2. Sea $w = xyz$ donde $x = t$, $y = t^2$, $z = t^3$. Calcular $\frac{dw}{dt}$ cuando $t = 2$.
3. Sea $z = \ln(x^2 + y^2)$ donde $x = r \cos(\theta)$ y $y = r \sin(\theta)$. Calcular $\frac{\partial z}{\partial r}$ y $\frac{\partial z}{\partial \theta}$.

4. Sea $z = e^{x+y}$ donde $x = u^2 - v^2$ y $y = 2uv$. Calcular $\frac{\partial z}{\partial u}$ y $\frac{\partial z}{\partial v}$.
5. Para la ecuación implícita $x^2 + y^2 + z^2 = 25$, calcular $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$.
6. Sea $w = f(x, y, z)$ donde $x = r \sin(\phi) \cos(\theta)$, $y = r \sin(\phi) \sin(\theta)$, $z = r \cos(\phi)$ (coordenadas esféricas). Expresar $\frac{\partial w}{\partial r}$ usando la regla de la cadena.
7. Verificar que si $z = f(x - y, y - x)$, entonces $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 0$.

Caso	Fórmula
$z = f(x, y), x = x(t), y = y(t)$	$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{dy}{dt}$
$z = f(x, y), x = x(u, v), y = y(u, v)$	$\frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u}$
$F(x, y, z) = 0$	$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\partial F / \partial x}{\partial F / \partial z}$

Cuadro 2: Resumen de casos de la regla de la cadena.

Resumen de la regla de la cadena.

2.2. Vector gradiente y derivada direccional

2.2.1. Cálculo e interpretación geométrica del gradiente y derivada direccional

2.2.2. Representar SW vectores gradientes en superficies

2.3. Extremos de funciones multivariables

2.3.1. Valores críticos

2.3.2. Máximos

2.3.3. Mínimos

2.3.4. Método de multiplicadores de Lagrange

2.3.5. Representación gráfica de extremos de funciones

3. Unidad III: Integral múltiple

3.1. Integrales dobles

3.2. Integrales triples

3.3. Cambio de variable en integrales múltiples

3.4. Aplicaciones de integrales múltiples

4. Unidad IV: Funciones vectoriales

4.1. Funciones vectoriales de una variable

4.2. Derivadas e integrales de funciones vectoriales

4.3. Longitud de arco y curvatura

4.4. Aplicaciones de funciones vectoriales

Referencias (APA)

Bibliografía

- Stewart, J. (2016). *Cálculo de varias variables* (8a ed.). Cengage Learning. — Capítulos sobre funciones de varias variables, dominio, rango y derivación implícita.
- Larson, R., & Edwards, B. H. (2019). *Cálculo: Trascendentes tempranas* (9a ed.). Cengage Learning. — Secciones sobre funciones explícitas e implícitas.
- Marsden, J. E., & Tromba, A. J. (2003). *Vector Calculus* (5th ed.). W. H. Freeman. — Teoría de funciones escalares de varias variables.
- Thomas, G. B., Weir, M. D., & Hass, J. (2018). *Cálculo de una variable* (14a ed.). Pearson Educación. — Fundamentos matemáticos y aplicaciones.
- Colley, S. J. (2019). *Vector Calculus* (5th ed.). Pearson.
- Larson, R., & Edwards, B. H. (2019). *Cálculo: Trascendentes tempranas* (9a ed.). Cengage Learning.
- Marsden, J. E., & Tromba, A. J. (2003). *Vector Calculus* (5th ed.). W. H. Freeman.
- Stewart, J. (2016). *Cálculo de varias variables* (8a ed.). Cengage Learning.
- Thomas, G. B., Weir, M. D., & Hass, J. (2018). *Cálculo de una variable* (14a ed.). Pearson Educación.