

幽門螺旋桿菌

您需要知道的事


陽性檢查結果衛教 | 高雄榮總家庭醫學部 潘醫師



檢查結果：陽性


胃裡有幽門螺旋桿菌

世界衛生組織列為一級致癌物




按時服藥殺菌，風險可大幅下降

為什麼要治療？



感染不會自己好



除菌降低胃潰瘍風險



除菌降低胃癌風險

怎麼治療？



醫師會開 2-4 種藥（胃藥 + 抗生素），不可自行停藥或減量

服藥期間這樣做



開始服藥
胃藥餐前30-60分鐘服用



服藥期間
嚴格禁酒；黑便黑舌屬正常




吃完藥後
四環黴素與牛奶鈣鐵隔開2小時以上

最重要的兩件事



① 服藥期間到停藥後
48小時內不能喝酒



② 大便、舌頭變黑是鉍劑的
正常現象，不是出血

吃完藥之後



滿一個月回診複檢



做吹氣（ 碳13呼氣 ）或糞便檢查



不要用抽血驗抗體

複檢前要注意




PPI胃藥要停2週



抗生素與鉍劑要停4週

太早複檢會驗出「假陰性」，等於白吃一輪藥

家人要一起檢查嗎？



會傳染，尤其是小孩



45-74歲家人可終身一次
免費糞便篩檢



使用公筷母匙
不共用餐具牙刷



不要嚼食物餵小孩

常見疑問

沒有不舒服
也要治療嗎？



建議治療，除菌可
降低胃癌風險



治療會很
痛苦嗎？



多數人可忍受；嚴重
紅疹或呼吸困難
請立即就醫



殺乾淨了還會
再感染嗎？



再感染機率
約1%



帶走這三句話



- ① 按時吃完藥，服藥期間及停藥後48小時不喝酒
- ② 吃完藥滿一個月回來複檢；複檢前胃藥停2週
- ③ 家人先篩檢、陽性再治療，用公筷母匙