

Courbes algébriques

Alexandre Guillemot

13 octobre 2022

Table des matières

1	Ensembles algébriques affines	3
1.1	Définition	3
1.2	Topologie de Zariski	4
1.3	Nullstellensatz de Hilbert	5
1.4	Sous-ensembles irréductibles	10
2	Catégorie des ensembles algébriques et foncteur $k[-]$	13
2.1	Catégorie des ensembles algébriques sur k	13
2.2	Foncteur $k[-]$	15
2.3	Cas des corps algébriquement clos	18
3	Dimension, espace tangent	19
3.1	Topologie induite sur les ensembles algébriques	19
3.2	Variétés affines, dimension	20
3.2.1	Dimension d'une variété affine	20
3.2.2	Dimension de krull	22
3.3	Singularités	23
3.4	Espace tangent	25
3.4.1	Anneau des fonctions régulières en un point	25
3.4.2	Anneaux locaux	26
3.4.3	Espace tangent de Zariski	27
3.4.4	Espace tangent géométrique	27
4	Courbes algébriques affines	32
4.1	Rappels d'algèbre commutative	32

Introduction

ana-maria.castravet@uvsq.fr k un corps, on considère $P_1, \dots, P_r \in k[x_1, \dots, x_n]$. $V(P_1, \dots, P_r) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ sont les zéros de P_1, \dots, P_r . Courbe algébrique = variété algébrique de dimension 1. Les courbes elliptiques sont des cas particuliers de courbes algébriques.

Chapitre 1

Ensembles algébriques affines

1.1 Définition

k un corps, $n \in \mathbb{Z}$.

|| **Définition 1.1.1.** (Espace affine) $\mathbb{A}_k^n := k^n$ est l'espace affine sur le corps k de dimension n .

Rq 1.1.1. Ce n'est pas vraiment la définition de l'espace affine, c'est la définition de l'ensemble sous-jacent à l'espace affine, sachant que les espaces affines sont des variétés algébriques.

lorsque $n = 1$, on parlera de droite affine. Lorsque $n = 2$, on parlera de plan affine.

|| **Définition 1.1.2.** Soit $S \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$, on définit

$$V(S) := \{a \in \mathbb{A}_k^n \mid \forall P \in S, P(a) = 0\}$$

|| On appelle de tels ensembles des ensembles algébriques affines.

Rq 1.1.2. Si $S = \{P_1, \dots, P_r\}$, on écrit $V(P_1, \dots, P_r) := V(S)$.

Ex 1.1.1. 1. $V(\emptyset) = \mathbb{A}_k^n$

2. $V(1) = \emptyset$

3. $P = X^4 - 1 \in k[X]$, si $k = \mathbb{R}$, $V(P) = \{1, -1\}$. Si $k = \mathbb{C}$, $V(P) = \{1, -1, i, -i\}$. Si $k = \mathbb{F}_2$, $V(P) = \{1\}$.

4. $P = X^2 + Y^2 + 1 \in k[X, Y]$, si $k = \mathbb{R}$, $V(P) = \emptyset$. Si $k = \mathbb{C}$, $V(P)$ est isomorphe (en tant que variété algébrique, même si cela n'a pour le moment aucun sens) au cercle complexe (en considérant le changement de variables $a_j = ib_j$).

5. $P_i = \sum a_{ij}X_j - b_i \in k[X_1, \dots, X_n]$, $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$.

$$V(P_i) = \{x \in k^n \mid (a_{ij})x = b\} \simeq \mathbb{A}_k^n \text{ ou } \emptyset$$

Exercice. Les ensembles algébriques de \mathbb{A}_k^1 sont : \emptyset , \mathbb{A}_k^1 , tous les sous-ensembles finis (cf Td1 Exercice 1).

Ex 1.1.2. Les sous-ensembles algébriques de \mathbb{A}_k^2 sont \emptyset , tout le plan, les sous-ensembles finis et des réunions finies des sous-ensembles finis avec des courbes planes, i.e. $V(P) \neq \emptyset$ les zéros d'un seul polynôme non constant. Donnons des exemples de courbes planes :

1. Les droites $V(aX + bY + c) \in \mathbb{A}_k^2$, avec $a \neq 0$ ou $b \neq 0$.
2. Les coniques $V(aX^2 + bY^2 + cXY + dX + eY + f) \subseteq \mathbb{A}_k^2$ ($a \neq 0$ ou $b \neq 0$ ou $c \neq 0$).
Dans $\mathbb{P}_{\mathbb{C}}^2$, toutes les coniques sont de type cercle, droite ou droites qui se croisent.
3. $Y^2 = X^3 + aX + b$, $a, b \in k$ définissent ce qu'on appelle des courbes elliptiques.

Rq 1.1.3. $V(S) = V(T)$ n'implique pas que $S = T$. Par exemple $V(X^2 + Y^2 + 1) = V(X^4 + 1) \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^2$. Plus généralement, sur n'importe quel corps, $V(P^2) = V(P)$ avec $P = k[X_1, \dots, X_n]$.

|| **Théorème 1.1.1.** (*Théorème de la base de Hilbert*) Pour tout $n \geq 1$, $k[X_1, \dots, X_n]$ est un anneau noethérien.

Rq 1.1.4. Pour tout $S \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$, on a $V(S) = V((S))$. Ainsi tout ensemble algébrique peut s'écrire $V(I)$ avec $I \stackrel{\text{id}}{\subseteq} k[X_1, \dots, X_n]$.

La remarque précédente nous permet de donner le corollaire suivant :

|| **Corollaire 1.1.1.** Chaque ensemble algébrique $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ est de la forme $V = V(P_1, \dots, P_r)$ avec $P_i \in k[X_1, \dots, X_n]$

1.2 Topologie de Zariski

|| **Proposition 1.2.1.** 1. Si $S \subseteq T \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$, alors $V(T) \subseteq V(S) \subseteq \mathbb{A}_k^n$.

2. $S \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$, alors

$$V(S) = \bigcap_{P \in S} V(P)$$

3.

$$\bigcap_{j \in J} V(S_j) = V\left(\bigcup_{j \in J} S_j\right), S_j \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$$

4. $V(PQ) = V(P) \cup V(Q)$ pour $P, Q \in k[X_1, \dots, X_n]$
5. Plus généralement, $V(IJ) = V(I) \cup V(J) = V(I \cap J)$ avec $I, J \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$

Démonstration. 1. Soit $x \in V(T)$. Alors soit $P \in S$, $P \in T$ comme $S \subseteq T$ et donc $P(x) = 0$, d'où $x \in V(S)$.

2. Pour tout $P \in S$, $V(S) \subseteq V(P)$ d'après (1). Ainsi $V(S) \subseteq \bigcap_{P \in S} V(P)$. Réciproquement, si $x \in \bigcap_{P \in S} V(P)$, alors $P(x) = 0$ pour tout $P \in S$ et ainsi $x \in V(S)$.

3. $S_i \subseteq \bigcup_{j \in J} S_j$, \supseteq est claire. Maintenant soit $x \in \bigcap_{j \in J} V(S_j)$, soit $P \in \bigcup_{j \in J} S_j$, il existe $j \in J$ tel que $P \in S_j$. Mais en particulier $x \in V(S_j)$, et donc $P(x) = 0$, ce qui prouve \subseteq .

4. D'après (1), $V(P), V(Q) \subseteq V(PQ)$ et ainsi $V(P) \cup V(Q) \subseteq V(PQ)$. Réciproquement, si $x \in V(PQ)$, alors $PQ(x) = 0$ et ainsi $P(x) = 0$ ou $Q(x) = 0$ par intégrité de k , et donc $x \in V(P) \cup V(Q)$.

$IJ \subseteq I \cap J \subseteq I$ donc $V(I) \subseteq V(I \cap J) \subseteq V(IJ)$ et donc par symétrie $V(I) \cup V(J) \subseteq V(I \cap J) \subseteq V(IJ)$. Supposons qu'il existe $x \in V(IJ)$ tq $x \notin V(I) \cup V(J)$. Alors $\exists P \in I, Q \in J$ tq $P(x) \neq 0$ et $Q(x) \neq 0$. Mais $PQ \in IJ$ donc $PQ(x) = 0$, contradiction.

□

Corollaire 1.2.1. Les ensembles algébriques de \mathbb{A}_k^n forment les fermés d'une topologie. On appelle cette topologie la topologie de Zariski.

1.3 Nullstellensatz de Hilbert

Définition 1.3.1. Soit $E \subseteq \mathbb{A}_k^n$. On définit

$$I(E) = \{P \in k[X_1, \dots, X_n] \mid P(a) = 0, \forall a \in E\}$$

Ex 1.3.1. 1. $I(\emptyset) = k[X_1, \dots, X_n]$

2. $I(a) = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n) =: \mathfrak{m}_a$. Cet idéal est maximal, vu que c'est le noyau de l'application surjective

$$\begin{array}{ccc} \text{ev}_a : k[X_1, \dots, X_n] & \rightarrow & k \\ X_i & \mapsto & a_i \end{array}$$

et donc $k[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{m}_a \simeq k$.

3. $I(\mathbb{A}_k^n) = \{0\}$ si le corps est infini.

Définition 1.3.2. $I \stackrel{\text{id}}{\subseteq} A$, alors

$$\sqrt{I} = \{f \in A \mid \exists n > 0, f^n \in I\}$$

est le radical de I . I est un idéal radical si $I = \sqrt{I}$

Proposition 1.3.1. 1. $E \subseteq E' \subseteq \mathbb{A}_k^n$, alors $I(E') \subseteq I(E)$

2. $I(E \cup E') = I(E) \cap I(E')$

3. $J \subseteq I(V(J))$ pour tout $J \stackrel{\text{id}}{\subseteq} k[X_1, \dots, X_n]$.

4. $E \subseteq V(I(E))$ pour tout $E \subseteq \mathbb{A}_k^n$.

5. $V(I) = V(\sqrt{I}) \subseteq \mathbb{A}_k^n$, pour tout $I \stackrel{\text{id}}{\subseteq} k[X_1, \dots, X_n]$

6. $I(V) = \sqrt{I(V)}$, pour tout $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ ensemble algébrique affine.

Démonstration. 1. Soit $P \in I(E')$. Alors pour tout $x \in E$, $x \in E'$ et donc $P(x) = 0$, ce qui prouve que $P \in I(E)$.

2. $E, E' \subseteq E \cup E'$, donc $I(E \cup E') \subseteq I(E), I(E')$ et donc $I(E \cup E') \subseteq I(E) \cap I(E')$. Réciproquement, soit $P \in I(E) \cap I(E')$, alors pour tout $x \in E \cup E'$, $x \in E$ ou $x \in E'$ et donc $P(x) = 0$.

3. Soit $P \in J$, alors pour tout $x \in V(J)$, $P(x) = 0$ et ainsi $P \in I(V(J))$.

4. Soit $x \in E$, alors pour tout $P \in I(E)$, $P(x) = 0$ et ainsi $x \in V(I(E))$.

5. Comme $I \subseteq \sqrt{I}$, $V(\sqrt{I}) \subseteq V(I)$. Maintenant soit $x \in V(I)$, alors pour tout $P \in \sqrt{I}$, il existe $n \geq 1$ tel que $P^n \in I$, et ainsi $P^n(x) = 0$. Mais par intégrité de k , $P(x) = 0$ et ainsi $x \in V(\sqrt{I})$.

6. On a toujours $I(V) \subseteq \sqrt{I(V)}$. Maintenant soit $P \in \sqrt{I(V)}$, alors $\exists n \geq 1$ tel que $P^n \in I(V)$. Ainsi, pour tout $x \in V$, $P^n(x) = 0$ et donc $P(x) = 0$ par intégrité de k . Finalement, $P \in I(V)$.

□

Lemme 1.3.1. $E = V(I(E)) \iff E$ est un ensemble algébrique.

Démonstration. Il suffit de montrer que si E est un ensemble algébrique affine, alors $V(I(E)) \subseteq E$: supposons que $E = V(J)$, $J \stackrel{\text{id}}{\subseteq} k[X_1, \dots, X_n]$. Alors $J \subseteq I(V(J))$ et ainsi $V(I(E)) = V(I(V(J))) \subseteq V(J) = E$. □

Ex 1.3.2. Le segment $[0, 1] \subseteq \mathbb{A}_{\mathbb{R}}^1$ n'est pas un ensemble algébrique.

Fixons $k \in \mathbf{Fld}$, $n \geq 1$. Définissons deux applications :

$$\begin{array}{ccc} I : \{V \subseteq \mathbb{A}_k^n \text{ ensemble algébrique}\} & \xrightarrow{\text{id}} & \{I \subseteq k[X_1, \dots, X_n] \mid I = \sqrt{I}\} \\ V & \mapsto & I(V) \end{array}$$

Remarquons que cette application est bien définie d'après 1.3.1. De même, on définit

$$\begin{array}{ccc} V : \{I \subseteq k[X_1, \dots, X_n] \mid I = \sqrt{I}\} & \xrightarrow{\text{id}} & \{V \subseteq \mathbb{A}_k^n \text{ ensemble algébrique}\} \\ I & \mapsto & V(I) \end{array}$$

|| **Théorème 1.3.1.** (*Nullstellensatz, 1*) Si $k = \bar{k}$, alors on a $I(V(J)) = \sqrt{J}$ pour tout $J \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$

Ex 1.3.3. Si $k = \mathbb{R}$, $P = X^2 + Y^2 + 1 \in \mathbb{R}[X, Y]$ irréductible. $I = (P)$ est un idéal premier, donc radical, mais $I(V(P)) = I(\emptyset) = \mathbb{R}[X, Y] \neq (P)$.

|| **Corollaire 1.3.1.** Si $k = \bar{k}$, alors V et I sont inverses l'une de l'autre.

Démonstration. Soit $J \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$ un idéal radical. Alors $I(V(J)) = \sqrt{J} = J$ et donc $I \circ V = \text{id}$. Soit $V = V(J) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ un ensemble algébrique affine. Alors $I(V(J)) = \sqrt{J}$ et donc $V(I(V)) = V(\sqrt{J}) = V(J) = V$, donc $V \circ I = \text{id}$. \square

Donnons 2 reformulations du Nullstellensatz

|| **Proposition 1.3.2.** (*Nullstellensatz 2,3*) Considérons l'anneau $k[X_1, \dots, X_n]$. Tfae :

1. Pour tout $J \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$, $I(V(J)) = \sqrt{J}$
2. Pour tout $J \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$, J propre implique que $V(J) \neq \emptyset$
3. Les idéaux maximaux de $k[X_1, \dots, X_n]$ sont exactement les idéaux

$$\mathfrak{m}_a = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n)$$

Démonstration. $2 \Rightarrow 3$: Soit $\mathfrak{m} \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$ maximal. C'est un idéal propre, donc $V(\mathfrak{m}) \neq \emptyset$. Alors soit $a \in V(\mathfrak{m})$, remarquons que pour tout $f \in \mathfrak{m}$, $f(a) = 0$ donc $f \in \mathfrak{m}_a$ (vu que l'on peut écrire $f = Q_1(X_1 - a_1) + \dots + Q_i(X_i - a_i) + c$). Ainsi $\mathfrak{m} \subseteq \mathfrak{m}_a$ mais \mathfrak{m} est maximal donc $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_a$.

$1 \Rightarrow 2$: Soit $J \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$ idéal propre. On a $\sqrt{J} = I(V(J))$. Supposons que $V(J) = \emptyset$, alors $\sqrt{J} = I(V(J)) = k[X_1, \dots, X_n]$ et donc $J = k[X_1, \dots, X_n]$, contradiction.

$3 \Rightarrow 1$: Soit $I \subseteq^{\text{id}} k[X_1, \dots, X_n]$, on veut mq $\sqrt{I} = I(V(I))$. Comme $I \subseteq I(V(I))$, on a directement la première inclusion du fait que $\sqrt{I(V(I))} = I(V(I))$. Dans l'autre sens, si $I = k[X_1, \dots, X_n]$, l'égalité est claire. Sinon soit $f \in I(V(I))$, écrivons $I = (P_1, \dots, P_r)$. Maintenant considérons l'anneau $k[X_1, \dots, X_n, X_{n+1}]$, puis l'idéal

$$(P_1, \dots, P_r, 1 - X_{n+1}f) =: J \subseteq^{\text{id}} k[X_1, \dots, X_{n+1}]$$

Si J est un idéal propre, alors d'après le théorème de Krull il existe $\mathfrak{m} \subseteq^{\text{max}} k[X_1, \dots, X_{n+1}]$ tel que $J \subseteq \mathfrak{m}$. Maintenant par hypothèse il existe $(a_1, \dots, a_n, b) \in \mathbb{A}_k^{n+1}$ tel que

$$\mathfrak{m} = (X_1 - a_1, \dots, X_n - a_n, X_{n+1} - b)$$

Mais alors pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $P_i(a) = 0$ et $1 - bf(a) = 0$. Mais alors la première série d'égalités nous indique que $a \in V(I)$, et comme $f \in I(V(I))$, $f(a) = 0$, ce qui est absurde. Ainsi J est $k[X_1, \dots, X_{n+1}]$ tout entier, donc en particulier il existe $Q_1, \dots, Q_r, Q \in k[X_1, \dots, X_{n+1}]$ tels que

$$1 = P_1 Q_1 + \dots + P_r Q_r + Q(1 - X_{n+1}f) \quad (1.1)$$

Maintenant le morphisme de localisation $k[X_1, \dots, X_n] \rightarrow k[X_1, \dots, X_n, 1/f]$ et le choix de l'élément $1/f$ induit un morphisme d'évaluation

$$\begin{array}{ccccc} k[X_1, \dots, X_n] & \longrightarrow & k[X_1, \dots, X_n, 1/f] & \hookrightarrow & k(X_1, \dots, X_n) \\ \downarrow & & \nearrow \text{!} & & \\ k[X_1, \dots, X_n][X_{n+1}] & & & & \end{array}$$

Ainsi au travers de ce morphisme l'égalité 1.3 devient

$$1 = P_1(X_1, \dots, X_n)Q_1(X_1, \dots, X_n, 1/f) + \dots + P_r(X_1, \dots, X_n)Q_r(X_1, \dots, X_n, 1/f)$$

Alors écrivons les Q_i comme des éléments de $k[X_1, \dots, X_n][X_{n+1}]$,

$$Q_i = \sum_{l=0}^{d_i} R_{i,l}(X_1, \dots, X_n) X_{n+1}^l$$

En les passant au travers du morphisme d'évaluation précédent on peut les réécrire

$$Q_i = \frac{R_i(X_1, \dots, X_n)}{f^{d_i}}$$

et alors 1.3 deviens

$$1 = \sum_{i=1}^r \frac{P_i R_i}{f^{d_i}}$$

et ainsi en notant $d = \max\{d_i\}$

$$f^d = \sum_{i=1}^r P_i R_i f^{d-d_i}$$

dans $k(X_1, \dots, X_n)$ donc dans $k[X_1, \dots, X_n]$. Finalement si $d = 0$, alors $1 \in I$ absurde puisque l'on avait supposé I propre. Sinon, $f^d \in I$ et donc $f \in \sqrt{I}$. \square

Citons finalement une version plus générale du Nullstellensatz. Montrons qu'elle implique la version 3, et ainsi tous les énoncés équivalents prouvés précédemment.

|| **Théorème 1.3.2.** (*Nullstellensatz, 0*) Soit une extension de corps $K \hookrightarrow L$, avec L une k -algèbre de type fini. Alors $[L : K] < \infty$.

Rq 1.3.1. L K -algèbre de type fini ssi $L \simeq k[X_1, \dots, X_n]/I$.

Montrons que 1.3.2 implique 3 :

Démonstration. Soit k un corps algébriquement clos. Soit $\mathfrak{m} \subseteq^{\max} k[X_1, \dots, X_n]$. Soit $L := k[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{m}$ (qui est un corps et une k -algèbre de type fini). Considérons les morphismes $i : k \hookrightarrow k[X_1, \dots, X_n]$, $\pi : k[X_1, \dots, X_n] \twoheadrightarrow L$. On note $\varphi = \pi \circ i$. $k \rightarrow L$ est un morphisme de k -algèbres, donc de corps et donc d'après 1.3.2, $[L : K] < \infty$. Mais comme k est algébriquement clos, on doit avoir $k \simeq L$ (car $K \hookrightarrow L$ est alors une extension algébrique de k). Soit $a_i := \pi(X_i) \in L \simeq k$. Maintenant $\pi(X_i - i(\varphi^{-1}(a_i))) = \pi(X_i) - a_i = a_i - a_i = 0$, donc

$$(X_1 - i(\varphi^{-1}(a_1)), \dots, X_n - i(\varphi^{-1}(a_n))) =: \mathfrak{m}_a \subseteq \mathfrak{m}$$

et comme \mathfrak{m}_a est maximal, $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_a$. \square

Prouvons 1.3.2 dans le cas où k est non dénombrable :

Démonstration. (Nullstellensatz 0, corps K non dénombrable) Soit $K \hookrightarrow L$ une extension de corps, avec L une k -algèbre de type fini. Écrivons $L \simeq k[X_1, \dots, X_n]/I = K[a_1, \dots, a_n]$. Il suffit de montrer que $K \hookrightarrow L$ est algébrique, car dans ce cas a_1, \dots, a_n sont des éléments algébriques sur K et donc $K \hookrightarrow K(a_1) \hookrightarrow \dots \hookrightarrow K(a_1, a_2, \dots, a_n) = L$ est finie et chaque extension de cette suite d'extension est finie. Pour prouver que $K \hookrightarrow L$ est algébrique, supposons le contraire. Alors soit $z \in L$ un élément transcendant, puis considérons $K \hookrightarrow K(z) \hookrightarrow L$, et $K(z) \simeq K(T)$ le corps des fractions de $k[T]$. Maintenant

$L \simeq K[a_1, \dots, a_n]$ est un isom de K -algèbres, L admet une base dénombrable comme K -espace vectoriel. Mais $K(T)$ comme K -ev admet une famille libre non dénombrable

$$\left\{ \frac{1}{T - \lambda} \right\}_{\lambda \in k}$$

car K est non dénombrable. Vérifions que cette famille est bien libre : écrivons

$$\sum_{\text{finie}} a_i \frac{1}{T - \lambda_i} = 0$$

dans $K(T) \hookrightarrow L$. Ainsi

$$\sum_{\text{finie}} a_i (T - \lambda_i) \cdots (\widehat{T - \lambda_i}) \cdots (T - \lambda_l) = 0$$

dans $k[T]$, puis on évalue en λ_i et on obtiens $a_i = 0$ pour tout i . □

1.4 Sous-ensembles irréductibles

|| **Définition 1.4.1.** $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ ensemble algébrique. V est irréductible si pour toute décomposition $V = V_1 \cup V_2$ avec V_1, V_2 ensembles algébriques, on a $V = V_1$ ou $V = V_2$. On dit sinon que V est réductible.

|| **Proposition 1.4.1.** $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ ensemble algébrique. Alors tfae

1. V est irréductible
2. $I(V)$ est un idéal premier
3. $k[X_1, \dots, X_n]/I(V)$ est un anneau intègre

Démonstration.

$1 \Rightarrow 2$: Soient $f, g \in k[X_1, \dots, X_n]$ tq $fg \in I(V)$. Mais $V(fg) = V(f) \cup V(g)$, puis soit $V_1 = V \cap V(f)$, $V_2 = V \cap V(g)$, alors $V_1 \cup V_2 = V \cap V(fg) = V$. Ainsi $V_1 = V$ ou $V_2 = V$, donc $f \in V$ ou $g \in V$.

$2 \Rightarrow 1$: Soit $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ ensemble algébrique tq $I(V)$ est un idéal premier. Supposons que V est réductible, alors $V = V_1 \cup V_2$ avec $V \neq V_1, V \neq V_2$. Comme V_1, V_2 sont algébriques, alors $V(I(V)) = V$, $V(I(V_i)) = V_i$, et ainsi $V(I(V)) \neq V(I(V_1))$ et $I(V) \subseteq I(V_1)$. Donc il existe $f_1 \in I(V_1)$ tq $f_1 \notin I(V)$. De même, il existe $f_2 \in I(V_2)$ tq $f_2 \notin I(V)$. Mais $f_1 f_2 \in I(V_1) \cap I(V_2) = I(V)$ et ainsi $I(V)$ n'est pas premier.

$2 \iff 3$: viens du fait que $J \subseteq A$ est premier si et seulement si A/J est intègre. □

Rq 1.4.1. Supposons que $k = \bar{k}$. Alors I et V sont inverses l'une de l'autre et donnent une correspondance entre les idéaux radicaux de $k[X_1, \dots, X_n]$ et les ensembles algébriques affines de \mathbb{A}_k^n . Alors au travers de cette bijection, les ensembles irréductibles correspondent aux idéaux premiers, et les points aux idéaux maximaux.

Théorème 1.4.1. Soit $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ un ensemble algébrique. Alors $\exists V_1, \dots, V_m \subseteq \mathbb{A}_k^n$ irréductibles tels que

1. $V = V_1 \cup V_2 \cup \dots \cup V_m$
2. $\forall i \neq j, V_i \not\subseteq V_j$

Les $\{V_i\}_{i \in \llbracket 1, m \rrbracket}$ avec ces propriétés sont uniques à ordre près, on les appelle les composantes irréductibles de V .

Ex 1.4.1. Soit $V := V(XY, (X-1)Z) \subseteq \mathbb{A}_k^n$, k de caractéristique 0. Sur V , on a

$$\begin{aligned} & (X = 0 \vee Z = 0) \wedge (X = 1 \vee Y = 0) \\ \iff & (X = 0 \wedge Y = 0) \vee (Z = 0 \wedge X = 1) \vee (Z = 0 \wedge Y = 0) \end{aligned}$$

Ainsi $V = V_1 \cup V_2 \cup V_3$ avec $V_1 = V(X, Y)$, $V_2 = V(X-1, Z)$ et $V_3 = V(Y, Z)$. On peut alors prouver que ce sont les composantes irréductibles de V .

Démonstration. Soit $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ un ensemble algébrique. Si V est irréductible, on a terminé. Sinon il existe des sous-ensembles algébriques propres de V , $V_1, V_2 \subsetneq V$ tels que $V = V_1 \cup V_2$. Si V_1, V_2 sont irréductibles, alors on a fini. Sinon on itère le procédé sur V_1 et V_2 . Alors supposons que le procédé ne termine pas, il va exister une suite strictement décroissante $\dots \subsetneq W_2 \subsetneq W_1 \subsetneq V$ d'ensembles algébriques. Ainsi on obtiens une suite croissante

$$I(W) \subseteq I(W_1) \subseteq I(W_2) \subseteq \dots$$

Remarquons alors qu'elle est strictement croissante puisque $V(I(W_i)) = W_i$ et la suite des W_i est strictement décroissante. Ainsi on obtiens une contradiction avec le fait que $k[X_1, \dots, X_n]$ est noethérien.

Occupons nous maintenant de l'unicité : Supposons que

$$V = \bigcup_{i=1}^s V_i = \bigcup_{i=1}^t W_i$$

On veut montrer que l'ensemble $\{V_i\}_{i \in \llbracket 1, s \rrbracket}$ est égal à l'ensemble $\{W_i\}_{i \in \llbracket 1, t \rrbracket}$. On va montrer une inclusion : montrons qu'il existe $j \in \llbracket 1, t \rrbracket$ tel que $V_i = W_j$, avec $i \in \llbracket 1, s \rrbracket$. Comme $V_i \subseteq \bigcup_{j \in \llbracket 1, t \rrbracket} W_j$, on a

$$V_i \subseteq \bigcup_{j \in \llbracket 1, t \rrbracket} W_j \cap V_i$$

Mais V_i est irréductible, donc $\exists j \in \llbracket 1, t \rrbracket$ tel que $V_i = W_j \cap V_j$, et en particulier $V_i \subseteq W_j$. Maintenant de la même manière on peut prouver qu'il existe $i' \in \llbracket 1, s \rrbracket$ tel que $W_i \subseteq V_{i'}$. Mais alors $V_i \subseteq W_j \subseteq V_{i'}$ et donc $i = i'$, d'où $V_i = W_j$. \square

Chapitre 2

Catégorie des ensembles algébriques et foncteur $k[-]$

Fixons un $k \in \mathbf{Fld}$.

2.1 Catégorie des ensembles algébriques sur k

Pour définir une catégorie des ensembles algébriques, nous avons besoin de définir une notion de morphisme entre ensembles algébriques.

Définition 2.1.1. (Morphisme d'ensembles algébriques) Soit $V, W \subseteq \mathbb{A}^n, \mathbb{A}^m$ des ensembles algébriques affines. $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_m) : V \rightarrow W$ est une fonction régulière, ou morphisme (d'ensembles algébriques affines) si pour tout $i \in \llbracket 1, l \rrbracket$, $\exists P_i \in k[X_1, \dots, X_n]$ tel que $\varphi_i(q) = P_i(a)$ pour tout $a \in V$.

Ex 2.1.1. 1. Soit $V \subseteq W \subseteq \mathbb{A}^n$ un ensemble algébrique. Alors l'injection associée à cette inclusion $i : V \rightarrow W$ est un morphisme.
2. $\pi_i : \mathbb{A}_k^n \rightarrow \mathbb{A}_k^1$ la projection sur la i -ème coordonnée est un morphisme.

Proposition 2.1.1. Soit $\varphi^1 : V_1 \rightarrow V_2$, $\varphi^2 : V_2 \rightarrow V_3$ des morphismes d'ensembles algébriques, où $V_i \subseteq \mathbb{A}_k^{n_i}$. Alors $\varphi^2 \circ \varphi^1 : V_1 \rightarrow V_3$ est un morphisme d'ensembles algébriques.

Démonstration. Notons $\varphi^1 = (\varphi_1^1, \dots, \varphi_{n_2}^1)$ et $\varphi^2 = (\varphi_1^2, \dots, \varphi_{n_3}^2)$, puis $f_i^1, g_j^2 \in k[X_1, \dots, X_{n_1}], k[Y_1, \dots, Y_{n_2}]$ les polynômes associés à φ_i^1, φ_j^2 . Maintenant considérons les polynômes $h_i \in k[X_1, \dots, X_{n_1}]$ obtenus en évaluant les g_i en f_1, \dots, f_{n_2} , alors

on a

$$\begin{aligned} (\varphi^2 \circ \varphi^1)(a) &= (g_1(f_1(a), \dots, f_{n_2}(a)), \dots, g_{n_3}(f_1(a), \dots, f_{n_2}(a))) \\ &= (h_1(a), \dots, h_{n_3}(a)) \end{aligned}$$

et donc $\varphi^2 \circ \varphi^1$ est un morphisme. \square

|| **Proposition 2.1.2.** *Soient $V, W \subseteq \mathbb{A}_k^n, \mathbb{A}_k^l$ des ensembles algébriques. Une application $\varphi : V \rightarrow W$ est un morphisme si et seulement si pour tout morphisme $f : W \rightarrow \mathbb{A}^1$, $f \circ \varphi : V \rightarrow \mathbb{A}^1$ est un morphisme.*

Démonstration.

\Rightarrow : La composition de morphismes est un morphisme.

\Leftarrow : Soit $p_i : W \hookrightarrow \mathbb{A}^l \rightarrow \mathbb{A}^1$ la projection sur la i -ème coordonnée, c'est un morphisme car composition de morphismes. Maintenant $\pi \circ \varphi = \varphi_i$ est un morphisme donc il existe $P_i \in k[X_1, \dots, X_n]$ tel que $\varphi_i(a) = P_i(a)$ pour tout $a \in V$, et ainsi φ est un morphisme. \square

On peut ainsi définir une catégorie des ensembles algébriques affines sur k , notée $k\text{-}\mathbf{EnsAlg}$, ou encore seulement \mathbf{EnsAlg} si le contexte est clair, dont

1. Les objets sont les ensembles algébriques affines $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$,
2. $\mathbf{Hom}_{\mathbf{EnsAlg}}(V, W)$ est la classe des morphismes de V dans W au sens de 2.1.1
3. La composition de morphismes correspond à la composition des applications sous-jacentes.

Remarquons que cette catégorie est bien définie du fait que id_V est un morphisme et que les morphismes sont stables par composition.

|| **Proposition 2.1.3.** *$\varphi : V \rightarrow W \subseteq \mathbb{A}^l$ est un morphisme ssi $V \rightarrow \mathbb{A}^l$ est un morphisme.*

Démonstration.

\Rightarrow : $V \rightarrow W \hookrightarrow \mathbb{A}^l$ est une composition de morphismes, donc est un morphisme.

\Leftarrow : Par hypothèse, $i \circ \varphi : V \rightarrow \mathbb{A}^l$ est un morphisme ($i : W \rightarrow \mathbb{A}^l$ est le morphisme associé à l'inclusion $W \subseteq \mathbb{A}^l$). Ainsi il existe $P_i \in k[X_1, \dots, X_n]$ tels que

$$(P_1(a), \dots, P_l(a)) = (i \circ \varphi)(a) = \varphi(a)$$

pour tout $a \in V$, et donc φ est un morphisme. \square

- Ex 2.1.2.**
1. $\varphi : \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^l$ définie par $\varphi(X_1, \dots, X_n) = (P_1(x), \dots, P_l(x))$ avec les $P_i \in k[X_1, \dots, X_n]$ est un morphisme, par définition.
 2. $\varphi : \mathbb{A}^1 \rightarrow V := \{(x, y) \mid y = x^2\} \subseteq \mathbb{A}^2$ donné par $\varphi(t) = (t, t^2)$ est un morphisme.
 3. $\varphi : \mathbb{A}^1 \rightarrow V := \{(x, y) \mid y^2 = x^3\} \subseteq \mathbb{A}^2$ donné par $\varphi(t) = (t^2, t^3)$ est un morphisme.

2.2 Foncteur $k[-]$

Donnons maintenant un foncteur entre **EnsAlg** et $k - \mathbf{CAlg}_{\text{tf,red}}$ la catégorie des k -algèbres de type fini réduites sur k .

Définition 2.2.1. $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ ensemble algébrique. L'algèbre des fonctions régulières sur V est

$$k[V] := k[X_1, \dots, X_n]/I(V)$$

Rq 2.2.1. Comme $I(V) = \sqrt{I(V)}$, $k[V]$ est une k -algèbre de type fini et réduite ($\sqrt{\{0\}} = \{0\}$). En effet, pour tout anneau A et $I \subseteq A$, A/I est réduit si et seulement si $I = \sqrt{I}$.

Remarquons que l'ensemble des fonctions régulières sur un ensemble algébrique $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ est munie d'une structure naturelle de k -algèbre. Alors

Lemme 2.2.1. *L'application*

$$\begin{aligned} \chi : k[V] &\rightarrow \mathbf{Hom}_{\mathbf{EnsAlg}}(V, \mathbb{A}^1) \\ [P] &\mapsto (f_P : a \mapsto P(a)) \end{aligned}$$

est bien définie et est un isomorphisme de k -algèbres.

Démonstration. Considérons l'application

$$\begin{aligned} \tilde{\chi} : k[X_1, \dots, X_n] &\rightarrow \mathbf{Hom}_{\mathbf{EnsAlg}}(V, \mathbb{A}^1) \\ P &\mapsto f_P \end{aligned}$$

C'est un morphisme de k -algèbres, vérifions que son noyau est exactement $I(V)$:

$$\tilde{\chi}(P) = 0 \iff \forall a \in V, P(a) = 0 \iff P \in I(V)$$

Finalement, cette application est surjective par définition de $\mathbf{Hom}_{\mathbf{EnsAlg}}(V, \mathbb{A}^1)$, et donc $\tilde{\chi}$ se factorise en un isomorphisme au travers du quotient $k[V]$ (cet isomorphisme est χ et donc χ est un isomorphisme). \square

Maintenant, soit $\varphi : V \subseteq \mathbb{A}_k^n \rightarrow W \subseteq \mathbb{A}_k^l$ un morphisme, alors ce morphisme induit un morphisme de k -algèbres entre $k[W]$ et $k[V]$, définit formellement comme

$$\begin{aligned} k[\varphi] = \varphi^* : k[W] &\rightarrow k[V] \\ [P] &\mapsto \chi^{-1}(\chi([P]) \circ \varphi) \end{aligned}$$

Ainsi au travers de χ il envoie f_P sur $f_P \circ \varphi$. De plus, si on note $\varphi_i \in k[X_1, \dots, X_n]$ des polynômes tels que $\varphi(a) = (\varphi_i(a))$ pour tout $a \in V$, alors

$$\varphi^*([Y_i]) = \chi^{-1}(\chi([T_i]) \circ \varphi) = \varphi_i$$

Ainsi φ^* correspond au morphisme d'évaluation en les φ_i . Finalement, pour tout $y \in W$,

$$\varphi^*([P])(x) = (f_P \circ \varphi)(x) = f_P(\varphi(x)) = [P](\varphi(x))$$

|| **Proposition 2.2.1.** Soient $\varphi_1 : V_1 \rightarrow V_2$, $\varphi_2 : V_2 \rightarrow V_3$. Alors $\varphi_1^* \circ \varphi_2^* = (\varphi_2 \circ \varphi_1)^*$. De plus, $(\text{id}_V)^* = \text{id}_{k[V]}$.

Démonstration. 1. $k[\text{id}_V]([P]) = \chi^{-1}(\chi([P]) \circ \text{id}_V) = [P] = \text{id}_{k[V]}([P])$ donc $k[\text{id}_V] = \text{id}_{k[V]}$.
 2.

$$\begin{aligned} (k[\varphi_1] \circ k[\varphi_2])([P]) &= \chi^{-1}(\chi(\chi^{-1}(\chi([P]) \circ \varphi_2)) \circ \varphi_1) \\ &= \chi^{-1}(\chi([P]) \circ \varphi_2 \circ \varphi_1) \\ &= k[\varphi_2 \circ \varphi_1]([P]) \end{aligned}$$

□

|| **Définition 2.2.2.** (Foncteur $k[-]$) On définit

$$\begin{array}{ccc} k[-] : \mathbf{EnsAlg}^{\text{op}} & \rightarrow & k - \mathbf{CAlg}_{\text{tf,red}} \\ V & \mapsto & k[V] \\ \varphi : V \rightarrow W & \mapsto & k[\varphi] : k[W] \rightarrow k[V] \end{array}$$

Ce foncteur est bien défini au vu de 2.2.1.

|| **Théorème 2.2.1.** $k[-]$ est pleinement fidèle.

|| **Corollaire 2.2.1.** Soit $\varphi : V \rightarrow W$ morphisme. C'est un isomorphisme ssi $\varphi^* : k[W] \rightarrow k[V]$ est un isomorphisme. En particulier V non isomorphe à W ssi $k[V]$ non isomorphe à $k[W]$.

Démonstration. (2.2.1) Les foncteurs pleinement fidèles préservent et réfléchissent les isomorphismes. □

Démonstration. (2.2.1) **A relire** Soit $\varphi : V \rightarrow W \subseteq \mathbb{A}^l$, écrivons $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_l)$, avec $\varphi_i : V \rightarrow k$. φ morphisme, donc

$$\begin{array}{ccc} \varphi^* : k[W] \simeq k[Y_1, \dots, Y_l]/I(W) & \rightarrow & k[V] \\ [Y_i] & \mapsto & \varphi_i \end{array}$$

CHAPITRE 2. CATÉGORIE DES ENSEMBLES ALGÈBRIQUES ET FONCTEUR $K[-]$

Montrons que F est injective : soient φ, ψ telles que $\varphi^* = \psi^*$. Alors $\varphi_i = \psi_i$ et donc $\varphi = \psi$. Montrons que F est surjective : soit $\alpha : k[W] \rightarrow k[V]$ un morphisme de k -algèbres. Alors notons $\varphi_i := \alpha([Y_i]) \in k[V]$, ainsi $\varphi_i : V \rightarrow k$ est une fonction régulière. Posons alors $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_l)$. Il suffit de montrer que l'image de φ est contenue dans W . En effet, si c'est le cas, on peut définir $\tilde{\varphi} : V \rightarrow W$ qui fait commuter

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\varphi} & \mathbb{A}^l \\ & \searrow \tilde{\varphi} & \uparrow \\ & & W \end{array}$$

et ainsi $\tilde{\varphi}^* = \alpha$. Soit $W = V(P_1, \dots, P_r) \subseteq \mathbb{A}^l$, $P_i \in k[Y_1, \dots, Y_l]$. En particulier, $P_i \in I(W)$ pour tout i . On doit vérifier que $P_i(\varphi_1(a), \dots, \varphi_l(a)) = 0$ pour tout i et $a \in V$. Comme $P_i \in I(W)$, $\alpha([P_i]) = 0$. Mais $\alpha([Y_i]) = \varphi_i$, donc

$$0 = \alpha([P_i]) = P_i(\alpha([Y_1]), \dots, \alpha([Y_l])) = P_i(\varphi_1, \dots, \varphi_l) \in k[V]$$

□

|| **Proposition 2.2.2.** $\varphi : V \rightarrow W$ est un isomorphisme si et seulement si l'application sous-jacente à φ est bijective, et son inverse $\varphi^{-1} : W \rightarrow V$ est un morphisme.

Démonstration. Clair du fait que le foncteur d'oubli **EnsAlg** \rightarrow **Sets** est fidèle. □

Ex 2.2.1. Reprenons les points 2 et 3 de 2.1.2 :

3. C'est un isomorphisme puisque $\varphi^{-1} : V \rightarrow \mathbb{A}^1$ donné par $\varphi^{-1}(x, y) = x$ est un morphisme et est une inverse de φ dans **Sets**.
4. Forcément, une inverse de φ est une inverse dans **Sets** au travers du foncteur d'oubli qui envoie un ensemble algébrique sur son ensemble sous-jacent. Ainsi $\varphi^{-1} : V \rightarrow \mathbb{A}^1$ doit forcément être définie comme

$$\varphi^{-1}(x, y) = \begin{cases} y/x & \text{si } (x, y) \neq 0 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Mais φ^{-1} n'est pas un morphisme : supposons qu'il existe $P \in k[X, Y]$ tq $P(x, y) = \varphi^{-1}(x, y)$, alors $P(x, y) = y/x$ pour tout $(x, y) \in V$ et $V = \{(t^2, t^3) \mid t \in k\}$, et ainsi $P(t^2, t^3) = t$ pour tout $t \in k \setminus \{0\}$, ce qui est clairement impossible. On peut aussi vérifier que le morphisme induit sur les algèbres de fonctions régulières n'est pas un isomorphisme.

2.3 Cas des corps algébriquement clos

Supposons désormais que $k = \bar{k}$. Alors

|| **Proposition 2.3.1.** $k[-] : \mathbf{EnsAlg}^{\text{op}} \rightarrow k - \mathbf{CAlg}_{\text{tf,red}}$ est essentiellement surjectif.
 Ainsi les catégories $\mathbf{EnsAlg}^{\text{op}}$ et $k - \mathbf{CAlg}_{\text{tf,red}}$ sont équivalentes.

Démonstration. Soit $L = k[X_1, \dots, X_n]/J \in k - \mathbf{CAlg}_{\text{td,red}}$. Alors

$$k[V(J)] = k[X_1, \dots, X_n]/I(V(J)) = k[X_1, \dots, X_n]/\sqrt{J} = L$$

d'après le Nullstellensatz. □

Chapitre 3

Dimension, espace tangent

3.1 Topologie induite sur les ensembles algébriques

\mathbb{A}_k^n est muni d'une topologie, dont les fermés sont les $V(I)$ pour I un idéal de $k[X_1, \dots, X_n]$. Ainsi on définit la topologie de Zariski sur $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ un ensemble algébrique comme la topologie induite sur V . Plus concrètement, les fermés de V sont les $V(I) \cap V$, pour I un idéal de $k[X_1, \dots, X_n]$ (i.e. les ensembles algébriques $W \subseteq V$).

Exercice. Les ouverts distingués $D(f)$ forment une base pour la topologie de Zariski de \mathbb{A}^n .

Ainsi $\{D(f) \cap V\}_f$ est une base des ouverts pour la topologie de Zariski sur V un ensemble algébrique fixé.

|| **Proposition 3.1.1.** Soient $V, W \subseteq \mathbb{A}^n, \mathbb{A}^l$. Tout morphisme $\varphi : V \rightarrow W$ est continu pour la topologie de Zariski induite sur V et W .

Démonstration. Dans un premier temps, soit $f_i \in k[X_1, \dots, X_n]$ tels que $\varphi(a) = (f_1(a), \dots, f_i(a))$. Alors montrer que φ est continue revient à montrer que $\tilde{\varphi} : \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^l$ définie par $\tilde{\varphi}(a) = (f_1(a), \dots, f_i(a))$ pour tout $a \in \mathbb{A}^n$ est continue. En effet, soit Z un fermé de W , alors $Z = Z' \cap W$ pour Z' un fermé de \mathbb{A}^l . Maintenant $\varphi^{-1}(Z) = \tilde{\varphi}^{-1}(Z') \cap V$ et est donc un fermé si et seulement si $\tilde{\varphi}^{-1}(Z')$ est un fermé. On peut donc se ramener au cas $\varphi : \mathbb{A}^n \rightarrow \mathbb{A}^l$. Ainsi considérons un fermé $V(J) \stackrel{\text{ferm}}{\subseteq} \mathbb{A}^l$, posons $I := k[\varphi](J)$, et montrons que $\varphi^{-1}(V(J)) = V(I)$.
 \subseteq : soit $x \in \varphi^{-1}(V(J))$, alors pour tout $P \in I$, il existe $Q \in J$ tel que $P = k[\varphi](Q)$.
Maintenant

$$P(x) = k[\varphi](Q)(x) = Q(\varphi(x)) = 0$$

puisque $Q \in J$ et $\varphi(x) \in V(J)$.

\supseteq : Soit $x \in V(I)$, alors pour tout $Q \in J$, $k[\varphi](Q) \in I$ et donc

$$Q(\varphi(x)) = k[\varphi](Q)(x) = 0$$

et donc $\varphi(x) \in V(J)$. □

Exercice. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme dans **Top**, si X est irréductible, alors $\overline{f(X)}$ irréductible.

Ex 3.1.1. ($k = \bar{k}$) $f : \mathbb{A}^1 \rightarrow V := \{(x, y) \mid y^2 = x^3\}$ est surjectif, donc V est irréductible.

Ex 3.1.2. $V = \{(x, y) \mid xy = 1\} \subseteq \mathbb{A}^2$. Notons $f : V \rightarrow \mathbb{A}^1$ la projection sur la première coordonnée, alors $f(V) = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ n'est pas fermé (si $|k| = \infty$) et donc ne peut pas être un ensemble algébrique.

Exercice. $E \subseteq \mathbb{A}_k^n$ ensemble quelconque, alors $\bar{E} = V(I(E))$. Soit $E \subseteq V(J)$ un fermé. Alors $J \subseteq I(V(J)) \subseteq I(E)$ et donc $V(I(E)) \subseteq V(J)$, ce qui prouve que $V(I(E)) = \bar{E}$.

3.2 Variétés affines, dimension

|| **Définition 3.2.1.** (Variété affine) Une variété affine est un ensemble algébrique affine irréductible.

Ainsi si V est une variété affine, alors $k[V] = k[X_1, \dots, X_n]/I(V)$ est intègre (vu que $I(V)$ est un idéal premier).

3.2.1 Dimension d'une variété affine

|| **Définition 3.2.2.** $k(V) := \text{Frac } k[V]$ est le corps de fonctions rationnelles sur V .

$$k(V) = \left\{ \frac{P}{Q} \mid P, Q \in k[V], Q \neq 0 \right\}$$

|| **Définition 3.2.3.** ($k = \bar{k}$) V variété affine. On définit la dimension de V par

$$\dim V := \text{trdeg}_k k(V)$$

|| où $\text{trdeg}_k k(V)$ est le degré de transcendance de $k(V)$ sur k .

Définition 3.2.4. $k \subseteq K$ extension de corps.

1. Une partie $S \subseteq K$ est algébriquement indépendante si pour tout $m \geq 1$, tout $s_1, \dots, s_m \in S$, si $P \in k[X_1, \dots, X_m]$ est tel que $P(s_1, \dots, s_m) = 0$, alors $P = 0$.
2. $S \subseteq K$ est une base de transcendance de K (sur k) si S est algébriquement indépendante et $k(S) \subseteq K$ est algébrique.
3. On dit que $k \subseteq K$ est purement transcendante si $\exists S$ base de transcendance $k \subseteq k(S) = K$.

Rq 3.2.1. Si $|S| = n$, alors $k(S) \simeq k(X_1, \dots, X_n)$. Si S_1, S_2 sont deux bases de transcendance de K/k , alors $|S_1| = |S_2|$.

Rq 3.2.2. $\dim V \leq n$ pour toute variété algébrique dans \mathbb{A}^n .

Définition 3.2.5. $\text{trdeg}_k(K) = |S|$, S base de transcendance de K/k .

Ex 3.2.1. 1. $\dim \mathbb{A}_k^n = n : V = \mathbb{A}_k^n, k[V] = k[X_1, \dots, X_n]. I(V) = \{0\}$. Ainsi $k(V) = k(X_1, \dots, X_n)$. Et $\{X_1, \dots, X_n\}$ est une base de transcendance de $k(V)$, donc $\dim V = n$.

2. $V = \{(x, y) \mid xy = 1\} \subseteq \mathbb{A}^1$. Alors $V = V(XY - 1)$ est irréductible ; Ainsi V est une variété affine. $k[V] = k[X, Y]/(XY - 1) = k[x, y]$ où $x = [X], y = [Y]$ (et $xy = 1$). $k(V) = \text{Frac}(k[x, y]) =: k(x, y)$. Maintenant $k(x, y) = k(x)$ vu que $y = 1/x$. Maintenant $\{x\}$ est une base de transcendance de $k(x)$: sinon il existe $P \in k[X]$ non nul tel que $P(x) = 0 \in k(x)$, et en particulier dans $k[x] \subseteq k[V]$. Ainsi $P \in I(V)$ donc $P(X) = (XY - 1)Q(X, Y)$ dans $k[X, Y]$ avec $Q \in k[X, Y]$, ce qui est absurde puisque $\deg_Y P = 0$. Ainsi $\dim V = 1$

Lemme 3.2.1. ($k = \bar{k}$) Soit $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ irréductible. Alors $V := V(f) \subseteq \mathbb{A}_k^n$ est une variété affine de dimension $n - 1$.

Démonstration. f non constant. On peut supposer que $\deg_{X_n}(f) > 0$. Notons $k[V] = k[x_1, \dots, x_n]$. Ainsi $f(x_1, \dots, x_n) = 0$ vu que $I(V) = (f)$. Maintenant $k \subseteq k(x_1, \dots, x_{n-1}) \subseteq k(x_1, \dots, x_{n-1})(x_n)$ est algébrique car $f(x_1, \dots, x_n) = 0$. Montrons que $\{x_1, \dots, x_{n-1}\}$ sont algébriquement indépendants sur k : si $g \in k[X_1, \dots, X_{n-1}]$ tel que $g(x_1, \dots, x_{n-1}) = 0$ dans $k(V)$ (donc dans $k[V]$). Alors $g(x_1, \dots, x_{n-1}) \in I(V) = (f)$ mais $\deg_{X_n} g = 0$, absurde. \square

Rq 3.2.3. Soient $f_1, \dots, f_r \in k[X_1, \dots, X_n], V := V(f_1, \dots, f_r) \subseteq \mathbb{A}_k^n$. Supposons que V est irréductible, alors $\dim V \geq n - r$. **Preuve en exercice**

Ex 3.2.2. $V := V(Y - X^2, Z - X^3, XZ - Y^2) \subseteq \mathbb{A}_k^3$. Alors $V = \{(t, t^2, t^3) \mid t \in k\}$ est une variété affine de dimension 1 (on parle de courbe affine). En effet, V est irréductible, puis $k[V] \simeq k[T]$ donc $\frac{k[V]}{k} \simeq k(T)$ est de degré de transcendance 1 sur k . Comme V est définie par 3 équations, $XZ - Y^2$ peut s'exprimer en fonction des deux autres polynômes et est donc superflue.

Rq 3.2.4. Si V, W sont des variétés affines isomorphes, alors $k[V] \simeq k[W]$ et ainsi $k(V) \simeq k(W)$ donc $\dim V = \dim W$. Dans l'exemple précédente, on peut conclure que V est de dimension 1 avec cette remarque.

Ex 3.2.3. $V = V(XZ - Y^2, XW - YZ, YW - Z^2) = V(f_1, f_2, f_3) \subseteq \mathbb{A}^4$. On sait que $\dim V \geq 1$ d'après la remarque 3.2.3. En fait, $\dim V = 2$, et $f_i \notin (f_j, f_l)$ pour tout i, j, l différents deux à deux. Montrons par exemple que $f_3 \notin (f_1, f_2)$: Soit $W = V(f_1, f_2)$, si $f_3 \in (f_1, f_2)$, alors $V = W$. Mais $V \cap \{x = 0\} \neq W \cap \{x = 0\}$:

$$\begin{aligned} V \cap \{x = 0\} &= \{(0, 0, 0, w) \mid w \in k\} \\ W \cap \{x = 0\} &= \{(0, 0, z, w) \mid z, w \in k\} \end{aligned}$$

On peut montrer les autres de manière similaire, ainsi on ne peut pas éliminer d'équation, mais pourtant $\dim V = 2$: Soit $V' = V(f_1)$, $V'' = V(f_1, f_2)$ ($V \subseteq V'' \subseteq V'$). Calculons la dimension de ces différentes variétés :

$$k[V'] = k[X, Y, Z, W]/(XZ - Y^2) = k[x, y, z, w]$$

où $xz = y^2$. Alors $k(V') = k(x, y, z, w) = k(x, y, w)$ puisque $z = y^2/x$ dans $k(V')$. Enfin on peut prouver que x, y, w sont algébriquement indépendants, et donc $\dim V' = 3$.

$k[V''] = k[x, y, z, w]$ avec $xz = y^2$, $sw = yz$. Ainsi $k(V'') = k(x, y)$ puisque $z = y^2/x$, $w = yz/x$, et on peut prouver que x, y sont algébriquement indépendants, i.e. $\dim V'' = 2$.

$k(V) = k(x, y, z, w)$, mais $z = y^2/x$, $w = yz/x$, mais la 3ème équation ne nous donne pas d'autre relation (c'est la même que celle donnée par la première équation). Il est donc possible de prouver que x, y sont algébriquement indépendants et alors $\dim V = 2$.

3.2.2 Dimension de Krull

Soit $A \in \mathbf{CRings}$.

Définition 3.2.6. (Dimension de Krull)

$$\dim A := \sup\{l \geq 0 \mid \mathfrak{p}_0 \subsetneq \mathfrak{p}_1 \subsetneq \cdots \subsetneq \mathfrak{p}_l \subseteq A\}$$

Ex 3.2.4. 1. $A = k[X_1, \dots, X_n]$. Alors considérons $\mathfrak{p}_i = (X_1, \dots, X_i)$ pour $0 \leq i \leq n$, on a donc $\dim A \geq n$. On peut en fait montrer que $\dim A = n$.

2. La dimension d'un corps vaut 0,
3. $\dim \mathbb{Z} = 1$.

Rq 3.2.5. $\mathfrak{p} \subseteq A$ idéal premier, alors

$$\dim(A/\mathfrak{p}) = \sup\{l \geq 0 \mid \mathfrak{p} = \mathfrak{p}_0 \not\subseteq \cdots \not\subseteq \mathfrak{p}_l\}$$

Définition 3.2.7. (Hauteur) Soit $\mathfrak{p} \stackrel{\text{pr}}{\subseteq} A$, alors

$$ht(\mathfrak{p}) = \sup\{s \geq 0 \mid \mathfrak{p}_0 \not\subseteq \cdots \not\subseteq \mathfrak{p}_s = \mathfrak{p}\}$$

Ex 3.2.5. 1. $A = \mathbb{Z}$, alors $ht(p\mathbb{Z}) = 1$.

2. $A = k[T]$, alors $ht((f)) = 1$.

3. $A = k[X_1, \dots, X_n]$, $\mathfrak{p} = (X_1, \dots, X_s)$. Alors $ht\mathfrak{p} = s$.

Théorème 3.2.1. k corps, A k -algèbre de type fini. Soit \mathfrak{p} idéal premier, alors

$$ht\mathfrak{p} + \dim A/\mathfrak{p} = \dim A$$

Ex 3.2.6. 1. $A = \mathbb{Z}$, $\mathfrak{p} = p\mathbb{Z}$ avec p premier ; Alors $ht\mathfrak{p} = 1$, $A/\mathfrak{p} = \mathbb{F}_p$ est de dimension 0.

2. $A = k[X_1, \dots, X_n]$, $\mathfrak{p} = (X_1, \dots, X_s)$ avec $s \in \llbracket 1, n \rrbracket$. $ht\mathfrak{p} = s$, $A/\mathfrak{p} \simeq k[X_{s+1}, \dots, X_n]$, $\dim A/\mathfrak{p} = n - s$.

3. La dimension peut être infinie : par exemple $A = k[\mathbb{N}]$.

Théorème 3.2.2. Soit V une variété affine. Alors

$$\dim k[V] = \dim V$$

3.3 Singularités

Soit $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ une variété affine. Notons $d = \dim V$, et soit $I(V) = (P_1, \dots, P_r) \stackrel{\text{id}}{\subseteq} k[X_1, \dots, X_n]$. On a $d \geq n - r$. Considérons le morphisme

$$\begin{aligned} \varphi : \mathbb{A}^n &\rightarrow \mathbb{A}^r \\ x &\mapsto (P_1(x), \dots, P_r(x)) \end{aligned}$$

En particulier, $\varphi|_V = 0$.

Notation. On note

$$d\varphi(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_1}{\partial X_1}(x) & \cdots & \frac{\partial P_1}{\partial X_n}(x) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial P_r}{\partial X_1}(x) & \cdots & \frac{\partial P_r}{\partial X_n}(x) \end{bmatrix} \in M_{r,n}(k)$$

la matrice jacobienne de φ en x .

Définition 3.3.1. $a \in V$ est un point régulier (ou encore non singulier) de V si

$$rk(d\varphi(a)) = n - d$$

Si $rk(d\varphi(a)) < n - d$, on dit que a est un point singulier de V .

Rq 3.3.1. 1. $\forall a \in V, rk(d\varphi(a)) \leq n - d$
 2. La définition précédente ne dépend pas du choix de P_1, \dots, P_r

Définition 3.3.2. V est lisse si $\forall a \in V, a$ est un point régulier.

Ex 3.3.1. 1. \mathbb{A}^n est lisse.
 2. $V = V(f) \subseteq \mathbb{A}^n$, pour $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ irréductible est une variété affine de dimension $n - 1$? Alors

$$d\varphi = \left[\frac{\partial f}{\partial X_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial X_n} \right]$$

Ainsi $a \in V(f)$ est singulier ssi $rk(d\varphi(a)) = 0$ ssi $\frac{\partial f}{\partial X_1}(a) = \dots = \frac{\partial f}{\partial X_n}(a) = 0$.

3. Si $f = XY - 1, V = V(f) \subseteq \mathbb{A}^2$. Alors $\frac{\partial f}{\partial X} = Y$ et $\frac{\partial f}{\partial Y} = X$, alors $a \in V$ singulier si $a_2 = a_1 = 0$, mais $a \in V \iff a_1 a_2 = 1$, donc tout point de V est régulier et V est donc lisse.
4. $f = Y^2 - X^3, V := V(f) \subseteq \mathbb{A}^2$. Si $\text{char } k \neq 2, 3$, alors $a \in V$ singulier ssi $a = (0, 0)$.
5. $f = Y^2 - X(X-1)(X-\lambda), \lambda \in k$ ("courbe elliptique" si $\lambda \neq 0, 1$). $f = Y^2 - X^3 + (\lambda+1)X^2 - \lambda X$. Alors

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial X} &= -3X^2 + 2(\lambda+1)X - \lambda \\ \frac{\partial f}{\partial Y} &= 2Y \end{aligned}$$

et donc $(a, b) \in V(f)$ singulier ssi

$$\begin{cases} -3x^2 + 2(\lambda+1)x - \lambda = 0 \\ 2y = 0 \\ y^2 = x(x-1)(x-\lambda) \end{cases} \iff \begin{cases} y = 0 \\ x = 0, 1, \lambda \\ -3x^2 + 2(\lambda+1)x - \lambda = 0 \end{cases}$$

Alors

- (a) Si $x = 0, \lambda = 0$ et $(0, 0)$ est le seul point singulier.
 - (b) Si $x = 1$, alors $\lambda = 1$ et $(1, 0)$ est le seul point singulier.
 - (c) Si $x = \lambda$, alors $\lambda = 0, 1$ et donc c'est les cas précédents.
- Ainsi si $\lambda \neq 0, 1$, alors $V(f)$ est lisse.

3.4 Espace tangent

3.4.1 Anneau des fonctions régulières en un point

Soit $V \subseteq \mathbb{A}_k^n$ une variété affine, $a \in V$. Par définition,

$$k[V] = \frac{k[X_1, \dots, X_n]}{I(V)}$$

puis $k(V) = \text{Frack}[V]$.

|| **Définition 3.4.1.** $\alpha \in k(V)$ est bien définie au point $a \in V$ si $\exists f, g \in k[V]$ telles que $\alpha = f/g \in k(V)$ et $g(a) \neq 0$. Dans ce cas, la valeur de α en a est définie comme $\alpha(a) := f(a)/g(a) \in k$.

Rq 3.4.1. En général, pour $\alpha \in k(V)$, on peut toujours écrire $\alpha = f/g$ mais f et g ne sont pas uniques.

Ex 3.4.1. $V = V(Y^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}^2$; Alors $k[V] = k[x, y]$ avec $y^2 = x^3$. Alors

$$\frac{y}{x} = \frac{x^2}{y} \in k(V)$$

|| **Proposition 3.4.1.** Soit $\alpha \in k(V)$ bien définie en $a \in V$. Alors $\alpha(a)$ est bien définie.

Démonstration. Si $\alpha = f/g = f'/g'$ avec $f, g, f', g' \in k[V]$ et $g(a), g'(a) \neq 0$. Alors $fg' - f'g = 0 \in k[V]$ et donc $f(a)g'(a) - f'(a)g(a) = 0$, ce qui implique que

$$\frac{f(a)}{g(a)} = \frac{f'(a)}{g'(a)} \in k$$

□

Notation.

$$k[V]_a := \{\alpha \in k(V) \mid \alpha \text{ est définie en } a\}$$

C'est un sous anneau de $k(V)$, dit anneau local de fonctions régulières autour de a .

Rq 3.4.2. 1. $k \subseteq k[V] \subseteq k[V]_a \subseteq k(V)$

2. $a \in V \iff I(V) \subseteq \mathfrak{m}_a$. Si $g \in k[V]$, $g(a) = 0 \iff g \in \mathfrak{m}_a/I(V) \stackrel{\max}{\subseteq} k[V]$.

3. $k[V]_a$ est la localisation de $k[V]$ en $S = A \setminus \mathfrak{p}$, où $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}_a/I(V)$.

3.4.2 Anneaux locaux

Rappelons que si A est un anneau, $S = A \setminus \mathfrak{p}$, l'image $S^{-1}\mathfrak{p}$ de \mathfrak{p} par le morphisme canonique $A \rightarrow S^{-1}A$ est l'unique idéal maximal de $S^{-1}A$. En effet, $S^{-1}A \setminus S^{-1}\mathfrak{p}$ sont des inversibles de $S^{-1}A$. Ainsi $S^{-1}A$ est un anneau local.

Notation. On notera (A, \mathfrak{m}) les anneaux locaux, avec \mathfrak{m} leur unique idéal maximal. A/\mathfrak{m} est le corps résiduel de A .

|| **Proposition 3.4.2.** *Soit A un anneau noethérien intègre, $S \subseteq A$ un ensemble multiplicatif. Alors $S^{-1}A$ est noethérien.*

Démonstration. Soit $I \subseteq S^{-1}A$. Ainsi le morphisme $\varphi : A \rightarrow S^{-1}A$ est injectif. Alors $J := \varphi^{-1}(I)$ est un idéal de A , qui est de type fini. Ainsi il existe $P_1, \dots, P_r \in J$ tel que $J = (P_1, \dots, P_r)$. Montrons que $I = (\varphi(P_1), \dots, \varphi(P_r)) = (P_1/1, \dots, P_r/1)$. Soit $a/s \in I$, alors

$$\varphi(a) = \frac{a}{1} = \frac{a}{s} \frac{s}{1}$$

donc il existe $f_1, \dots, f_r \in A$ tq $a = \sum f_i P_i \in A$. Et donc

$$\frac{a}{s} = \sum \frac{f_i}{s} \frac{P_i}{1}$$

et donc $a/s \in (P_1/1, \dots, P_r/1)$. □

|| **Corollaire 3.4.1.** *Soit V une variété algébrique. Alors $k[V]_a$ est un anneau noethérien.*

Démonstration. $k[V]$ est noethérien et intègre car V est une variété algébrique. Ainsi $k[V]_a$ est noethérien comme localisation de $k[V]$. □

|| **Lemme 3.4.1.** *(Nakayama) (A, \mathfrak{m}) anneau local noethérien, et M un A -module de type fini. Si $\mathfrak{m}M = M$, alors $M = 0$.*

|| **Corollaire 3.4.2.** $\mathfrak{m}^i/\mathfrak{m}^{i+1} = 0 \iff \mathfrak{m}^i = 0$. En particulier, $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 0 \iff \mathfrak{m} = 0 \iff A$ est un corps.

Rq 3.4.3. Soit (A, \mathfrak{m}) un anneau local noethérien. $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ est un A -module, mais aussi un k -ev où $k = A/\mathfrak{m}$ de type fini (en tant que A -module et en tant que k -ev)

Théorème 3.4.1. (A, \mathfrak{m}) anneau local noethérien, $k = A/\mathfrak{m}$. Alors

$$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \geq \dim A$$

où $\dim A$ est la dimension e krull de A . De plus, si on a égalité (on note $d = \dim A$), alors $\mathfrak{m} = (x_1, \dots, x_d)$ avec $x_i \in A$, et on dit que (A, \mathfrak{m}) est un anneau régulier.

3.4.3 Espace tangent de Zariski

Soit V une variété affine, $a \in V$. Comme $k[V]_a$ est la localisation de $k[V]$ en l'idéal maximal $\mathfrak{m}_a/I(V)$. C'est donc un anneau local d'idéal maximal noté \mathfrak{m} .

Exercice. Considérons le morphisme

$$\begin{aligned} ev_a : k[V]_a &\rightarrow k \\ \alpha &\mapsto ev_a(\alpha) = \alpha(a) \end{aligned}$$

Alors $\ker(ev) = \mathfrak{m}$ idéal maximal de $k[V]_a$, et $k[V]_a/\mathfrak{m} \simeq k$

Définition 3.4.2. $V \subseteq \mathbb{A}^n$ variété affine, $a \in V$. Soit $A = k[V]_a$ l'anneau local associé à a . L'espace tangent de V en a est le k -ev

$$T_a V := (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^\vee := \mathbf{Hom}_k(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2, k)$$

l'espace tangent à V en a .

Rq 3.4.4. $\mathfrak{m}_a/\mathfrak{m}_a^2 \simeq M_a/M_a^2$ où $M_a = \ker ev_a : k[V] \rightarrow k \xrightarrow{\text{id}} k[V]$.

Théorème 3.4.2. $\dim k[V] = \dim k[V]_a$

Donc (A, \mathfrak{m}) est régulier ssi $\dim V = \dim A = \dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \dim_k T_a V$. On va montrer que (A, \mathfrak{m}) est régulier si et seulement si $a \in V$ est régulier.

Théorème 3.4.3. $\dim_k T_a V \geq \dim V$ avec égalité si et seulement si $a \in V$ est un point régulier.

Pour montrer ce théorème, nous devons parler d'espace tangent géométrique.

3.4.4 Espace tangent géométrique

Soit $V = V(P_1, \dots, P_r) \subseteq \mathbb{A}^n$, avec $P_1, \dots, P_r \in k[X_1, \dots, X_n]$, et $a \in V$.

Définition 3.4.3. (Espace tangent géométrique) L'espace tangent géométrique de V en a est défini comme

$$T_a^{\text{geom}}V = V(P_1^1, \dots, P_r^1) \subseteq \mathbb{A}^n$$

où

$$P_i^1 = \sum_{j=1}^n \frac{\partial P_i}{\partial X_j}(a)(X_j - a_j)$$

Rq 3.4.5. Soit $P \in k[X_1, \dots, X_n]$, on peut décomposer P en $P = \sum_{i=0}^d P^i$ où les P^i sont des polynômes homogènes de degré i (tous les monômes sont de la forme X^α avec $|\alpha| = i$) en réalisant l'expansion de Taylor de P en 0. Ainsi,

$$P^1 = \sum_{j=1}^n \frac{\partial P}{\partial X_j}(0)X_j$$

Maintenant si $a \in \mathbb{A}^n$, alors on peut réaliser l'expansion de Taylor de P en a , $P = \sum P^i$, et alors

$$P^1 = \sum_{j=1}^n \frac{\partial P}{\partial X_j}(a)(X_j - a_j)$$

Ex 3.4.2. 1. Soit $V = \{(x, y) \mid y^2 = x\} \subseteq \mathbb{A}^2$. Alors $V = V(P)$ avec $P = Y^2 - X$. Alors soit $a = (a_1, \dots, a_2) \in V$ (donc $a_2^2 = a_1$), on a

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial X} &= -1 \\ \frac{\partial P}{\partial Y} &= 2Y \end{aligned}$$

On a donc

$$T_a^{\text{geom}} = V(-(X - a_1) + 2a_2(Y - a_2))$$

est la droite tangente au point (a_1, a_2) , qui est isomorphe à k . En effet, $\dim T_a^{\text{geom}} = 1$ (c'est le translaté d'un sous-espace de k^2 de dimension 1). De même, $\dim V = 1$ vu que $k[V] = k[Y]$, puis V est lisse donc tout point est régulier.

2. Cas particulier : $a = (0, 0)$, alors $T_a^{\text{geom}}V = V(x)$. Maintenant $k[V] \simeq k[X]$, et $k[V]_a = k[x, y]_{(x, y)} \simeq k[x]/(x)$. Finalement, $\mathfrak{m} = (X/1)$ et donc $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 1$ ($X/1$ est une base de ce k -ev). Ainsi $\dim T_a V = 1$ en 0.

Soit $a \in V$, considérons l'application

$$\begin{aligned} \tau_a : \mathbb{A}^n &\rightarrow \mathbb{A}^n \\ x &\mapsto x - a \end{aligned}$$

C'est un isomorphisme, et alors on peut considérer l'image par τ_a de $T_a^{\text{geom}}V$. Elle est alors munie d'une structure canonique d'espace vectoriel. Alors on a les deux résultats suivants :

|| **Théorème 3.4.4.** *Pour tout $a \in V$,*

$$\tau_a(T_a^{\text{geom}}V) \simeq T_aV$$

|| **Théorème 3.4.5.** *Pour tout $a \in V$,*

$$\dim T_a^{\text{geom}}V = n - \text{rk} d\varphi(a)$$

Ces deux théorèmes permettent de faire le lien entre les deux notions d'espace tangent, ainsi qu'entre leur dimension et la notion de point régulier. Nous résumons cela dans le corollaire suivant :

|| **Corollaire 3.4.3.** *Soit $a \in V$. Alors $\dim T_aV = \dim T_a^{\text{geom}}V \geq d$, avec égalité si et seulement si a est un point régulier.*

Démonstration. (3.4.3) Ce résultat découle directement du fait que $\text{rk} d\varphi(a) \leq n - d$, avec égalité si et seulement si a est régulier, par définition. \square

Avant de prouver les deux théorèmes précédents, vérifions les sur un exemple :

Ex 3.4.3. $k = \bar{k}$, $\text{char} k = 0$. Soit $V = V(Y^2 - X^3) \subseteq \mathbb{A}^2$, on a $\dim V = 1$. Ainsi

$$\begin{aligned} \frac{\partial P}{\partial X} &= -3X^2 \\ \frac{\partial P}{\partial Y} &= 2Y \end{aligned}$$

Alors $(a, b) \in V$ est singulier si et seulement si $(a, b) = 0$. Maintenant soit $(a, b) \in V$, alors

$$T_a^{\text{geom}}V = \{(x, y) \in \mathbb{A}^2 \mid -3a^2(x - a) + 2b(Y - b) = 0\}$$

droite dans \mathbb{A}^2 si $(a, b) \neq 0$. Si $(a, b) = 0$, alors $T_0^{\text{geom}}V = \mathbb{A}^2$ est de dimension 2. On peut aussi calculer l'espace tangent de Zariski :

$$\begin{aligned} K[V]_{(a,b)} &= (k[X, Y]/(Y^2 - X^3))_{(X-a, Y-b)} \\ &= k[x, y]_{(x-a, y-b)} \\ &= \left\{ \frac{P}{Q} \mid P, Q \in k[x, y], Q(a, b) \neq 0 \right\} \end{aligned}$$

Alors on peut voir que $\mathfrak{m}_{(a,b)} = (x-a, y-b) \subseteq K[V]_{(a,b)}$. Maintenant $(x-a, y-b)$ engendre $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ en tant que k -ev, donc $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \leq 2$. Maintenant si $(a, b) \neq 0$, alors $\{x-a, y-b\}$ n'est pas libre modulo \mathfrak{m}^2 : en effet, dans $k[x, y]$,

$$3a^2(x-a) - 2b(y-b) = (y-b)^2 - 3a(x-a)^2 - (x-a)^3 \in \mathfrak{m}^2$$

et $3a, 2b \neq 0, 0$. Maintenant, si $(a, b) = 0$, alors $\mathfrak{m} := \mathfrak{m}_0 = (x, y)$, montrons que $\{x, y\}$ est libre sur k modulo \mathfrak{m}^2 . Soient $\alpha, \beta \in k$ tels que $\alpha x + \beta y = 0 \pmod{\mathfrak{m}^2}$. Ainsi $\alpha x + \beta y \in \mathfrak{m}^2 \subseteq k[V]_0$, et donc il existe $P_i/Q_i \in k[V]_0$ avec

$$\alpha x + \beta y = \frac{P_1}{Q_1}x^2 + \frac{P_2}{Q_2}xy + \frac{P_3}{Q_3}y^2$$

dans $k[V]_0$. Maintenant $Q_i(0) \neq 0$, donc $\exists Q \in k[x, y]$ tel que $Q(0) \neq 0$ et $Q(\alpha x + \beta y) \in (x^2, xy, y^2)$ dans $k[x, y]$ cette fois. Ainsi $\exists R_i \in k[x, y]$ tels que

$$Q(X, Y)(\alpha X + \beta Y) - R_1X^2 - R_2XY - R_3Y^2 \in I(V) = (Y^2 - X^3)$$

dans $k[X, Y]$. Ainsi $Q(X, Y)(\alpha X + \beta Y) \in (X^2, XY, Y^2)$ car $Y^2 - X^3 \in (X^2, XY, Y^2)$. Remarquons qu'en général, si $P \in k[X_1, \dots, X_n]$, alors $P^0 = 0 \iff P \in (X_1, \dots, X_n)$, $P^0 = P^1 = 0 \iff P \in (X_1, \dots, X_n)^2$. Mais alors Q a un terme constant car $Q(0) = 0$, et donc le terme linéaire de $Q(\alpha X + \beta Y)$ doit être $Q^0(\alpha X + \beta Y)$ et doit être 0 car $Q(\alpha X + \beta Y) \in (X, Y)^2$. Ainsi $Q^0\alpha, Q^0\beta = 0 \in k$ et donc $\alpha, \beta = 0$ ce qui prouve la liberté de $\{x, y\}$.

Soit $a \in V$, notons

$$H_a := \{x \in \mathbb{A}^n \mid \sum \alpha^j(x_j - a_j) = 0\} \subseteq \mathbb{A}^2$$

Remarquons alors que $a \in H_a$. Alors on a

$$\tau_a(H_a) = \{z \in \mathbb{A}^n \mid \sum \alpha^j z_j = 0\} \subseteq \mathbb{A}^n$$

et c'est un sev de k^n . Ainsi

$$\tau_a(T_a^{\text{geom}}V) = \{z \in k^n \mid \forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \sum_j \frac{\partial P_i}{\partial X_j}(a) z_j = 0\}$$

Si $V = V(P_1, \dots, P_r)$. C'est le noyau de l'application $k^n \rightarrow k^r$ correspondant à la matrice jacobienne $d\varphi(a)$, et ainsi $\dim T_a^{\text{geom}} V = n - rkd\varphi(a)$.

Montrons maintenant que $\tau_a(T_a^{\text{geom}} V) \simeq T_a V$ en tant que k -ev. On peut supposer que $a = 0 \in \mathbb{A}_k^n$, montrons que

$$\mathbf{Hom}_k(T_a^{\text{geom}} V, k) \simeq \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

On note $x_i = [X_i] \in k[V]$, $M = (x_1, \dots, x_n)$.

Exercice. $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \simeq M/M^2$ en tant que k -ev (\mathfrak{m} est l'image de M par $k[V] \rightarrow k[V]_a$ où $M = (x_i - a_i)$)

Ainsi prouver le point précédent revient à prouver qu'il existe un isom

$$M/M^2 \simeq \mathbf{Hom}_k(T_a^{\text{geom}} V, k)$$

Notons ainsi $V = V(P_1, \dots, P_r)$, $W := T_a^{\text{geom}} V$. Comme $a = 0 \in V$, alors $P_i(0) = 0$ pour tout i . Alors soit

$$\begin{aligned} \varphi : M &\rightarrow \mathbf{Hom}_k(W, k) \\ [P] &\mapsto P|_W : x \in W \mapsto P^1(x) \in k \end{aligned}$$

1. Montrons que φ est bien définie : soient $P, Q \in k[X_1, \dots, X_n]$ tels que $[P] = [Q]$, alors $P - Q \in I(V)$. Mais écrivons $P, Q = P^1, Q^1 + \dots + P^d, Q^e$ avec P^i, Q^j homogènes. Alors $P - Q = (P^1 - Q^1) + \dots$ et $(P - Q)^1 = P^1 - Q^1$. Maintenant $P - Q \in I(V) \Rightarrow P^1 - Q^1 \in I(W)$ et donc $P^1 - Q^1$ est nul sur W . Précisons l'implication précédente : si $R \in I(V)$, alors $R^1 \in I(W)$. EN effet, écrivons $R = \sum P_i Q_i$, puis écrivons $P_i = P_i^1 + P_i^2 + \dots$, $Q_i = Q_i^0 + Q_i^1 + \dots$. Mais alors $(P_i Q_i)^1 = P_i^1 Q_i^0$ donc $R^1 = \sum P_i^1 Q_i^0 \in I(W)$.
2. Montrons que φ est surjective. Soit $f : W \rightarrow k$ k -linéaire. Alors $\exists \tilde{f} : k^n \rightarrow k$ k -linéaire telle que $\tilde{f}|_W = f$, puis

$$\tilde{f}(x) = \sum \alpha_i x_i$$

Ainsi $\varphi([\sum \alpha_i X_i]) = \tilde{f}|_W = f$.

3. Montrons que $\ker \varphi = M^2$: **flemme**

Chapitre 4

Courbes algébriques affines

4.1 Rappels d'algèbre commutative

k corps algébriquement clos. Une courbe est une variété affine de dimension 1. $a \in C$ dans une courbe est régulier ssi $\dim \mathfrak{m}_a / \mathfrak{m}_a^2 = 1$.

|| **Définition 4.1.1.** Un anneau de valuation discrète (DVR) est un anneau local (A, \mathfrak{m}) tel que A intègre et principal, et pas un corps ;

En particulier, un tel anneau est

1. noethérien
2. $\mathfrak{m} = (t)$ (on appelle $t \in A$ une uniformisante). Un tel t est irréductible.
3. factoriel
4. $\dim A = 1$

|| **Proposition 4.1.1.** (A, \mathfrak{m}) DVR, $K = \text{Frac} A$, $\mathfrak{m} = (t)$.

1. Les idéaux non nuls de A sont les $\mathfrak{m}^i = (t^i)$, $i \in \mathbb{N}$.
2. $\bigcap_{i \geq 0} \mathfrak{m}^i = \{0\}$
3. $\forall x \in K \setminus 0, \exists ! n \in \mathbb{Z}$ tel que $x = t^n u$, $u \in A^\times$ et l'application

$$\begin{aligned} v : K \setminus 0 &\rightarrow \mathbb{Z} \\ x &\mapsto v(x) = n \end{aligned}$$

satisfait

$$\begin{cases} v(xy) = v(x) + v(y) \\ v(x+y) \geq \min\{v(x), v(y)\} \end{cases}$$

(v est une valuation de K)

De plus,

$$\begin{aligned} A &= \{x \in k \setminus 0 \mid v(x) \geq 0\} \cup \{0\} \\ \mathfrak{m} &= \{x \in k \setminus 0 \mid v(x) > 0\} \cup \{0\} \end{aligned}$$

Exercice. Si $v : K \setminus 0 \rightarrow \mathbb{Z}$ est une valuation d'un corps K , alors $A = \{x \in K \setminus 0 \mid v(x) \geq 0\} \cup \{0\}$ est un DVR d'idéal maximal $\{x \in K \setminus 0 \mid v(x) > 0\} \cup \{0\}$.

Démonstration. 1. A factoriel, t irréductible. Pour tout $x \in A \setminus 0$, $\exists N \geq 0$ maximal avec la propriété que $t^N \mid x$ dans A . Alors $x = t^N y$, $y \in A^\times$ (vu que A est local donc $A^\times = A \setminus \mathfrak{m}$, et N est maximal). Maintenant soit $I \subseteq A$ idéal, alors $\exists x \in A$ non nul tq $I = (x)$; Alors on a que $x = t^N y$ avec $y \in A^\times$, et donc $I = (t^N)$.

2. On a $0 \subseteq \mathfrak{m}^i \not\subseteq \mathfrak{m}^{i-1} \subseteq A$. Alors soit $x \in \bigcap_{\mathbb{N}} \mathfrak{m}^i$ non nul. Alors $x = t^N y$, $y \in A^\times$. Mais $x \in \mathfrak{m}^{N+1}$ donc $t^{N+1} \mid t^N y$ absurde.

3. Soit $x \in K \setminus 0$. Alors $x = y/z$, $y, z \in A$ et $z \neq 0$. Alors $\exists N, M \in \mathbb{N}$ t.q. $y = t^N u$, $z = t^M v$ avec $u, v \in A^\times$. Ainsi $x = t^{N-M} (uv^{-1})$. Maintenant vérifions que la valuation est bien définie : si $x = t^i u = t^j v$, alors ops $i > j$ et alors $t^{i-j} \in A^\times$, absurde. Anis $i = j$ et $u = v$. Il est finalement facile de voir que v est une valuation. \square

Théorème 4.1.1. C courbe, $a \in C$. Alors $a \in C$ est un point régulier ssi $k[V]_a$ est un DVR.

Théorème 4.1.2. C courbe affine. C est lisse ssi $k[C]$ est intégralement clos dans $k(C)$.

Définition 4.1.2. A anneau intègre, $K = \text{Frac} A$. Alors

1. $x \in K$ est entier sur A s'il existe $P \in A[X]$ unistaire tel que $P(x) = 0$ (dans K).
2. A intégralement clos dans K si $x \in K$ entier sur A implique que $x \in A$.

Ex 4.1.1. 1. \mathbb{Z} est intégralement clos dans \mathbb{Q} .
2. $\mathbb{Z}[i]$ est intégralement clos dans \mathbb{Q} .

3. $A = k[X, Y]/(Y^2 - X^3) = k[x, y]$ n'est pas int grale-
ment clos. Par exemple, y/x est
entier sur A car $(y/x)^2 - x = 0$ mais pas dans A .

|| **Th or me 4.1.3.** *A int gre. A int gralement clos ssi $A_{\mathfrak{p}}$ est int gralement clos, pour tout $\mathfrak{p}^{\text{premier}} \subseteq A$.*

|| **Th or me 4.1.4.** *A anneau local int gre, $\dim A = 1$. Alors A int gralement clos ssi A est un DVR*

|| **D finition 4.1.3.** *A anneau de dedekind si int gre, noeth, int gralement clos, de dimension 1.*

Ex 4.1.2. $\mathbb{Z}, \mathbb{Z}[i], k[C]$ pour C une courbe lisse.

|| **Th or me 4.1.5.** *C courbe affine.*

$$\text{Sing}(C) = \{a \in C \mid a \text{ singulier}\}$$

|| *est un ensemble propre de C*

Exercice. $\text{Sing}(C)$ est un sous-ensemble alg brique.

|| **Proposition 4.1.2.** *C courbe affine. Les sous-ensembles propres de C sont finis.*

|| **Corollaire 4.1.1.** $|\text{Sing}(C)| < \infty$

D monstration. (proposition) Soit $V \subseteq C \subseteq \mathbb{A}^n$ ensemble alg brique propre. OPS V irr ductible (sinon on consid re une composante de V). Alors $V \subsetneq C$ implique que $I(C) \subsetneq I(V) \subseteq k[X_1, \dots, X_n]$. Montrons que $I(V) = \mathfrak{m}_a, a \in \mathbb{A}^n$. Maintenant

$$0 \subseteq I(V)/I(C) \subseteq k[C]$$

est un id al premier. Mais $\dim k[C] = 1$, donc $I(V)/I(C)$ est maximal, donc $I(V)$ maximal. Ainsi $I(V) = \mathfrak{m}_a$ car $k = \bar{k}$, donc V doit  tre un point. \square