

Feuille 2,

Courbes algébriques

Ensembles Algébriques Affines

Exercice 1 Pour $f \in k[X_1, \dots, X_n]$ on note $D(f) := \mathbb{A}^n \setminus V(f)$.

1. Montrer que $D(f) \cap D(g) = D(fg)$.
2. Montrer que les ensembles $D(f)$ (pour tout $f \in k[X_1, \dots, X_n]$) forment une base pour la topologie de Zariski sur \mathbb{A}^n .
On suppose que le corps k est infini.
3. Montrer que $D(f) = \emptyset$ si et seulement si $f = 0$.
4. Montrer que si $U, V \neq \emptyset$ sont des ensembles ouverts dans \mathbb{A}^n , on a $U \cap V \neq \emptyset$.

Exercice 2 Soient $P_1, \dots, P_r \in k[X_1, \dots, X_n]$ tels que

$$P_1 + \dots + P_r = 1.$$

Montrer que $(D(P_i))_{i \in [1, r]}$ est un recouvrement ouvert de \mathbb{A}^n .

Exercice 3 Soit $V \subsetneq \mathbb{A}^n$ un ensemble algébrique et soit $x \in \mathbb{A}^n \setminus V$. Montrer qu'il existe un polynôme $P \in k[X_1, \dots, X_n]$ tel que $P(x) = 1$ et $P(y) = 0$ pour tout $y \in V$.

Exercice 4 Soit X un espace topologique. On suppose qu'il existe des ouverts U_1 et U_2 non vide et irréductibles de X tels que $X = U_1 \cup U_2$ und $U_1 \cap U_2 \neq \emptyset$. Montrer que X est irréductible.

Exercice 5 Soit k un corps algébriquement clos.

1. Soient I et J des idéaux $k[X_1, \dots, X_n]$. Montrer que $\sqrt{I} = \sqrt{J}$ si et seulement si $V(I) = V(J)$.
2. Soient V_1 et V_2 des sous-ensembles algébriques de \mathbb{A}^n . Montrer que

$$I(V_1 \cap V_2) = \sqrt{I(V_1) + I(V_2)}.$$

Exercice 6 Soit $V = V(Y^2 - X^2(X+1))$. Montrer que l'application $f : \mathbb{A}^1 \rightarrow V$, $f(t) = (t^2 - 1, t(t^2 - 1))$ est régulière, bijective, mais n'est pas un isomorphisme.

On pose $k[V] := k[X_1, \dots, X_n]/I(V)$.

Exercice 7 Soit V l'image de l'application $f : \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^3$ donné par $f(t) = (t, t^2, t^3)$. Montrer que $k[V]$ est isomorphe à $k[T]$ de deux façons différentes.

Exercice 8 Dans les cas suivants, construire un isomorphisme $f : V \rightarrow W$ des ensembles algébriques affines. Calculer sa réciproque et le morphisme f^* .

1. $V = V(X - Y) \subseteq \mathbb{A}^2$, $W = V(X + Y) \subseteq \mathbb{A}^2$.
2. $V = V(X - Y^2) \subseteq \mathbb{A}^2$, $W = V(Y - X^2) \subseteq \mathbb{A}^2$.
3. $V = V(Z - X, Y - X^2) \subseteq \mathbb{A}^3$, $W = \mathbb{A}^1$.
4. $V = V(Z - XY) \subseteq \mathbb{A}^3$, $W = \mathbb{A}^2$.