

Exercices

Alexandre Guillemot

7 octobre 2022

Exercice 10, feuille 2

Avant de résoudre les questions, il faut prouver que C est bien une variété algébrique, i.e. $Y^2 - X(X-1)(X-a)$ est irréductible. Pour cela, utilisons le résultat suivant :

Lemme 0.1. *Soit A un anneau commutatif, et $a \in A$. Alors le polynôme $X^2 - a \in A[X]$ est irréductible si et seulement si a est un carré dans A .*

Démonstration.

Si a est un carré, disons $a = b^2$ avec $b \in A$, alors $X^2 - a = (X - b)(X + b)$ et donc $X^2 - a$ est réductible.

Supposons maintenant que $X^2 - a$ est réductible, écrivons $X^2 - a = PQ$ avec $P, Q \in A[X]$ qui ne sont pas des unités dans A . Alors 3 cas se présentent :

1. $\deg P = 0$, $\deg Q = 2$, écrivons $P = \lambda_1 X^2 + \lambda_2 X + \lambda_3$, et $Q = \lambda$. Alors $\lambda \lambda_1 = 1$ donc λ est inversible dans A , absurde.
2. $\deg P = 2$, $\deg Q = 0$, c'est le même cas que dans le point précédent.
3. $\deg P = \deg Q = 1$: écrivons $P = \lambda_1 X + \lambda_2$, $Q = \lambda_3 X + \lambda_4$. Comme $\lambda_1 \lambda_3 = 1$, on peut se ramener au cas où $\lambda_1 = \lambda_3 = 1$. Mais alors on dispose des équations $\lambda_2 + \lambda_4 = 0$ et $\lambda_2 \lambda_4 = -a$, d'où $a = \lambda_2^2$ est bien un carré dans A .

□

Maintenant considérons f comme un élément de $k[X][Y]$, alors par analyse de degré en X on remarque que $X(X-1)(X-a)$ n'est pas un carré dans $k[X]$, et ainsi par le lemme précédent f est irréductible dans $k[X][Y] = k[X, Y]$.

1. Comme k est algébriquement clos et f est irréductible,

$$K[V] = k[X, Y]/I(C) = k[X, Y]/I(V(f)) = k[X, Y]/\sqrt{(f)} = k[X, Y]/(f) =: k[x, y]$$

où $x = [X], y = [Y] \in k[X, Y]/(f)$ (et donc $y^2 = x(x-1)(x-a)$).

Exercice 6, feuille 3

Exercice 7, feuille 3