Binôme 2:

COMPTE RENDU - TP N°1 Prise en main de TRIPOLI et DRAGON

Date

25/10/2013

Nom du répertoire :

7	T)	n	T	n	0	T	T
J	U	K	Ш	Г	0	L	L

Document de référence : Manuel Utilisateur TRIPOLI4

Travaillez dans un dossier « tripoli »

1/ Prise en main du jdd A - expérience GODIVA (boule critique - 94%wtU235)

Consignes

La commande de lancement de TRIPOLI est un alias : « tripoli »

L'argument « -c <bib_path_file> » spécifie la bibliothèque de données nucléaires à utiliser :

- <bib_path_file> = t4path.jef2 ⇒ utilisation de la bibliothèque européenne JEF2
- <bib_path_file> = t4path.endl ⇒ utilisation de la bibliothèque japonaise ENDL
- <bib_path_file> = t4path.endfb6 ⇒ utilisation de la bibliothèque américaine B6

L'argument « -s <autopModel> » spécifie le modèle d'autoprotection à utiliser :

- < autopModel > = NJOY ⇒ utilisation de sections sans tables de probabilités
- < autopModel > = TABPROB \Rightarrow utilisation de sections avec tables de probabilités

L'argument « -d <jddFile >» spécifie le nom du fichier de jdd à calculer : <jddFile>

Exécutez le calcul TRIPOLI avec les options suivantes :

- Bibliothèque : JEF2
- Autoprotection : Tables de Probabilités

<u>Questions</u>	<u>Réponses</u>
Quel est le Keff obtenu avec l'estimateur KSTEP?	
Quel est l'écart statistique associé?	
Indiquez la réactivité de cette configuration et son incertitude à 1 σ	

Consignes

Pour connaître la durée réelle d'exécution d'un processus, une méthode simple est de précéder l'appel au processus par la commande « **time** ». Par exemple :

« time tripoli –c <...> -s <...> -d <...>

Le nombre d'histoires d'un code stochastique est représentatif du nombre de particules dont la « vie » sera simulée : de la naissance par une fission à la mort par une absorption. Le nombre d'histoires est spécifié dans

Binôme 2:

COMPTE RENDU - TP N°1 Prise en main de TRIPOLI et DRAGON

Date

25/10/2013

2

Nom du répertoire :

les « paramètres de simulation » (voir slide 18)

Chronométrez le jdd avec 1 000 000 d'histoires (1000 batch de 1000 histoires).

Chronométrez le jdd avec 4 000 000 d'histoires.

Chronométrez le jdd avec 100 000 d'histoires.

<u>Questions</u>	<u>Réponses</u>
Comparez les temps d'exécution obtenus	
Comparez les écarts statistiques obtenus	
Combien faudrait-il d'histoires pour avoir un écart statistique de 5 pcm ?	

2/ Etude du Cas

Consignes

Les densités atomiques sont données dans la « définition des compositions » du jdd (voir slide 18). Leur unité est 10²⁴at/cm³.

L'enrichissement isotopique ou atomique en U235 est défini par :

$$E_{isot} = \frac{[U235]}{[U235] + [U238] + [U234]}$$

$$E_{isot} = \frac{[U235]}{[U235] + [U238] + [U234]}$$
 L'enrichissement massique en U235 est défini par :
$$E_{wt} = \frac{M_{vol}^{U235}}{M_{vol}^{U235} + M_{vol}^{U238}} = \frac{235[U235]}{235[U235] + 238[U238] + 234[U234]}$$

On note:

$$M_{vol}^{U} = M_{vol}^{U235} + M_{vol}^{U238} + M_{vol}^{U234}$$

Rappel:

Laplacien géométrique en géométrie sphérique :

$$B_g^2 = \left(\frac{\pi}{R_{sph\`ere}}\right)^2$$

Laplacien matière :

$$B_m^2 = \frac{\nu \Sigma_f - \Sigma_a}{D}$$

Où:

- D est le coefficient de diffusion dans le cadre de cette approximation, on peut écrire $D \approx \frac{1}{3\Sigma}$
- Σ_a est la section macroscopique d'absorption, c'est notablement : $\Sigma_a = \Sigma_{tot} \Sigma_d$

Binôme 2:

COMPTE RENDU - TP N°1 Prise en main de TRIPOLI et DRAGON

Date

25/10/2013

Nom du répertoire :

<u>Questions</u>	<u>Réponses</u>
Que vaut l' <u>enrichissement isotopique</u> en U235 de la sphère du cas A?	
Que vaut l' <u>enrichissement massique</u> en U235 de la sphère du cas A?	

Consignes

Créez 5 jdd différents avec les noms et les enrichissements massiques E_{wt} suivants :

Nom du fichier	E _{wt}
hmf001.05	5%
hmf001.10	10%
hmf001.20	20%
hmf001.50	50%
hmf001.90	90%

Calculez ces 5 jdd avec Tripoli.

Questions

Quel est le Keff obtenu pour chaque enrichissement ?

Nom du fichier	E _{wt}	Keff
hmf001.05	5%	
hmf001.10	10%	
hmf001.20	20%	
hmf001.50	50%	
hmf001.90	90%	

Consignes

Le rayon de la sphère est donné dans la « **définition de la géométrie**» du jdd (voir slide 18). L'unité de distance en vigueur dans Tripoli est le cm.

Pour chaque enrichissement, recherchez le rayon R_{crit} de la sphère permettant d'obtenir la criticité.

Questions

Indiquez **l'enrichissement isotopique** et **le rayon critique** pour les 5 enrichissements massiques considérés.

<u>Réponses</u>

Nom du fichier	E _{wt}	E_{isot}	R _{crit} (cm)
hmf001.05	5%		
hmf001.10	10%		
hmf001.20	20%		
hmf001.50	50%		
hmf001.90	90%		

Binôme 2:

COMPTE RENDU - TP N°1 Prise en main de TRIPOLI et DRAGON

Date

25/10/2013

Nom du répertoire :	IRIPO
---------------------	-------

Tracez R _{crit} en fonction de l'enrichissement	
isotopique	
(un tableur : libreofficecalc ou bien google doc)	
(un tablear . iibi comice care oa sien 5005ie 2007	
Ecrivez l'équation du transport à symétrie	
sphérique (invariance selon \overrightarrow{arO}) dans le cadre de	
l'approximation monocinétique (un seul groupe).	
(voir slide 8)	
(Voli Slide 5)	
Intégrez cette équation sur la sphère unité et faites	
apparaitre le courant neutronique (voir slide 15)	
Analizura Panarovimation de la diffusion	
Appliquez l'approximation de la diffusion.	
$\vec{I}(\vec{r}) = \frac{1}{avad\phi(\vec{r})}$	
$\vec{J}(\vec{r}) = -\frac{1}{3\Sigma_{tot}}.\overrightarrow{grad}\phi(\vec{r})$	
52 tot	
Quelle est la forme du flux solution de cette	
équation ?	
Entropy to the Company to the state of the s	
En introduisant le flux solution, identifiez dans	
l'équation la notion de laplacien géométrique et la	
notion de laplacien matière.	
Calculez R _{crit} en fonction des sections efficaces	
macroscopiques	
(indiquez le raisonnement suivi)	

Binôme 1 : Binôme 2 : Nom du répertoire :	COMPTE RENDU - TP N°1 Prise en main de TRIPOLI et DRAGON		Date 25/10/2013
En négligeant la contributio décomposez les différentes macroscopiques en fonction La section microscopiqu La rombre de neutrons L'enrichissement isotop	sections efficaces n de : le totale de l'U238 le de capture de l'U238 le totale de l'U235 le de fission de l'U235 par fission de l'U235 ique en U235		
$egin{array}{ccc} \sigma_{\text{tot,U}} & 1 \ \sigma_{\text{f,U5}} & 1 \ \upsilon_{\text{U5}} & 2 \ \end{array}$			
Question Super-Bonus à faire chez soi : Comparez les valeurs de sections efficaces microscopiques indiquées ci-dessus avec les valeurs de JEF2 consultables avec l'outil JANIS (google). Qu'en pensez vous ?		$\begin{array}{c c} \textbf{Section} & \textbf{Valeu} \\ \hline \sigma_{tot,U} & \\ \hline \sigma_{f,U5} & \\ \upsilon_{U5} & \\ \hline \sigma_{c,U8} & \\ \end{array}$	ur JEF2 (barns)

5

Binôme 2:

COMPTE RENDU - TP N°1 Prise en main de TRIPOLI et DRAGON

Date

25/10/2013

Nom du répertoire :

3/ Etude du cas Homogène Infini

Consignes

Par défaut dans Tripoli, la condition limite à la surface de la géométrie est du vide.

A l'aide du manuel, introduisez une condition limite de réflexion en surface de la sphère dans de nouveaux fichiers (suffixe « _refl »)

Questions	<u>Réponses</u>
Quel est le Kinf obtenu pour chaque enrichissement ?	
	Nom du fichier E _{wt} Kinf
	hmf001.05_refl 5%
	hmf001.10_refl
	hmf001.20_refl 20%
	hmf001.50_refl 50%
	hmf001.90_refl 90%
Recherchez enrichissement massique conduisant à	
un Kinf égal à 1.	
Quelle est la valeur de l'enrichissement massique ?	
Quelle est la valeur du laplacien matière ?	
Exprimez le Kinf en fonction des sections	
macroscopiques.	
En reprenant l'équation du transport, exprimez le	
lien entre le Keff et le Kinf en faisant apparaitre le	
laplacien géométrique et l'aire de migration (rapport du coefficient de diffusion sur la section	
d'absorption)	
a absorption)	

Binôme 2 :

COMPTE RENDU - TP N°1 Prise en main de TRIPOLI et DRAGON

Date

25/10/2013

Nom du répertoire :

Pour chaque enrichissement, calculez l'aire de migration de la sphère critique.
Concluez.

Nom du fichier	E _{wt}	Aire de migration
hmf001.05	5%	
hmf001.10	10%	
hmf001.20	20%	
hmf001.50	50%	
hmf001.90	90%	

DRAGON

Document de référence : Manuel Utilisateur DRAGON-VERSION4

Travaillez dans un dossier « dragon »

1/ Prise en main du jdd A - expérience GODIVA (boule critique - 94%wtU235)

Consignes

La commande de lancement de DRAGON est un alias : « ./dragon.sh <jddFile> », où « <jddFile >» spécifie le nom du fichier de jdd à calculer qui doit être impérativement contenu dans un dossier nommé « data » dans le répertoire courant.

Lancer le jdd

Questions	<u>Réponses</u>
Quel est le Keff obtenu ? Comparez-le au Keff obtenu avec TRIPOLI.	

Consignes

Pour chaque enrichissement massique parmi 5%, 10%, 20%, 50% et 90%, calculer un problème identique à celui modélisé sous TRIPOLI au cours des étapes précédentes avec la condition de <u>VIDE</u> (même géométrie et même composition).

Binôme 2:

COMPTE RENDU - TP N°1
Prise en main de
TRIPOLI et DRAGON

Date

25/10/2013

Nom du répertoire :

Questions Réponses

Quels sont les Keff obtenus ? Quels sont les Kinf obtenus ? Comment interprétez-vous les écarts obtenus avec TRIPOLI ?

Nom du fichier	E _{wt}	Keff		
		TRIPOLI	DRAGON	
hmf001.05	5%			
hmf001.10	10%			
hmf001.20	20%			
hmf001.50	50%			
hmf001.90	90%			

Nom du fichier	E _{wt}	Kinf		
		TRIPOLI	DRAGON	
hmf001.05	5%			
hmf001.10	10%			
hmf001.20	20%			
hmf001.50	50%			
hmf001.90	90%			

A l'aide du manuel, introduisez une condition limite de réflexion en surface de la sphère.

Pour chaque enrichissement massique parmi 5%, 10%, 20%, 50% et 90%, calculer un problème identique à celui modélisé sous TRIPOLI au cours des étapes précédentes avec la condition de <u>REFLEXION</u> (même géométrie et même composition).

Questions Réponses

Quels sont les Kinf obtenus ? Comment interprétez-vous les écarts obtenus avec TRIPOLI ?

Nom du fichier	E _{wt}	Kinf		
		TRIPOLI	DRAGON	DRAGON
		REFL.	VIDE	REFL.
hmf001.05_refl	5%			
hmf001.10_refl	10%			
hmf001.20_refl	20%			
hmf001.50_refl	50%			
hmf001.90_refl	90%			

Binôme 1 : COMPTE RENDU - TP N°1

Binôme 2 : Prise en main de

TRIPOLI et DRAGON

Date

25/10/2013

Question Super-Bonus à faire chez soi :

Expliquez quel est l'impact des fuites neutroniques sur l'énergie moyenne des neutrons dans la boule ?

Avec l'aide de l'outil JANIS, commentez l'évolution du nombre de neutrons émis par fission de l'U235 avec l'énergie moyenne des neutrons dans le spectre rapide ?

Concluez.