

Preparo para Colonoscopia → Pacientes Internados

Disclaimer: Protocolo Gastroclínica → HSPE / IAMSPE Transcrição organizada a partir do protocolo impresso afixado no setor, incluindo as anotações manuscritas (correções de dose, divisão em fases e observações finais).

Visão geral

Momento	Dieta	Laxativo / Preparo	Outros
D-2 (antivéspera)	Líquida sem resíduos a partir da merenda	Bisacodil (Dulcolax) 1 cp 8/8h	—
D-1 (véspera)	Líquida sem resíduos	Bisacodil 1 cp 8/8h + 1ª fase às 17h	Puncionar acesso venoso periférico
D0 (dia do exame)	Líquidos até 4h antes → jejum absoluto 4h	2ª fase (horário conforme período do exame)	Enterocлизма/clister S/N · Soroterapia conforme prescrição

D-2 — Antivéspera do exame

- ☐ **Dieta:** líquida sem resíduos a partir da merenda
- ☐ **Bisacodil (Dulcolax)** 5 mg — 1 comprimido VO de 8/8h

D-1 — Véspera do exame

- ☐ **Dieta:** líquida sem resíduos (manter)
- ☐ **Bisacodil (Dulcolax)** 5 mg — 1 comprimido VO de 8/8h
- ☐ **Puncionar acesso venoso periférico**

1ª fase — às 17h

Componente	Volume
Manitol	500 mL
Suco de Limão	500 mL
Simeticona (Luftal)	1 frasco

- Administrar **1 copo a cada 30 minutos** até completar o volume.

D0 — Dia do exame

Dieta e jejum

- ☐ Líquidos permitidos **até 4h antes** do exame
- ☐ **Jejum absoluto nas 4h** que antecedem o exame

2ª fase — iniciar 6h antes do exame

Componente	Volume
Manitol	500 mL
Suco de limão	500 mL
Simeticona (Luftal)	1 frasco

- Administrar **1 copo a cada 30 minutos**.
-  **Não administrar manitol nas 4h que antecedem o exame** — a ingestão deve estar concluída antes do início do jejum absoluto.

Horário da 2ª fase conforme o período do exame

Período do exame	Condição	Horário do manitol
Manhã	Com anestesia	22h da véspera (D-1)
Manhã	Sem anestesia	02h da madrugada (D0)
Tarde	—	06h da manhã (D0)

Medidas complementares

- ☐ **Soroterapia** conforme prescrição médica
- ☐ **Se preparo inadequado:**

- Clister glicerinado 12% — 500 mL
ou
 - Enterocлизма com SF 0,9% 1000 mL ou glicerol S/N
-

Linha do tempo resumida

D-2 merenda — dieta líquida sem resíduos
8/8h — Dulcolax 1 cp

D-1 8/8h — Dulcolax 1 cp
—— acesso venoso periférico
17h — 1ª FASE: manitol 500 mL + suco 500 mL + Luftal 1 fr
22h — [exame manhã COM anestesia] 2ª FASE

D0 02h — [exame manhã SEM anestesia] 2ª FASE
06h — [exame à tarde] 2ª FASE
T-6h — início da 2ª fase (regra geral)
T-4h — fim da ingestão de manitol e líquidos → jejum absoluto
S/N — clister glicerinado 12% 500 mL / enterocлизма
T — COLONOSCOPIA
