

Preparo para Colonoscopia → Paciente Internado

Disclaimer: Protocolo institucional → HSPE / IAMSPE Documento criado em 01/2012 · Formatação: NAFEE Transcrição organizada cronologicamente a partir do documento original (3 páginas).

D-2 e D-1 — Dieta (antivéspera e véspera)

- ☐ **Dieta líquida sem resíduo** por 2 dias
 - **Permitido, à vontade, o dia todo:**
 - Água e chá
 - Sucos de **cor clara e coados**: maracujá, caju, laranja, limão
 - Gelatinas de **cor clara**
 - **Proibido:** leite e derivados
- ☐ **Meta hídrica: 2 a 3 litros** de líquidos por dia

Esquema 1 — Exame pela MANHÃ (08–13h)

D-1 — Véspera

Horário	Conduta
08h	Bisacodil 2 cp V0
14h	Bisacodil 2 cp V0 (<i>total do dia: 4 cp</i>)
17h	Solução de manitol V0, em 1 hora (ver composição abaixo)
Após o manitol	Ingerir 1 a 2 L de líquidos, principalmente água, até 4h antes do exame
20h	Enterocлизма (ver técnica abaixo)

D0 — Dia do exame

- ☐ Líquidos (água, chá, suco) **até 4h antes** do exame
- ☐ Sem leite ou derivados
- ☐ **Jejum absoluto nas 4h** que antecedem o exame

Esquema 2 — Exame à TARDE (13–19h)

D-1 — Véspera

Horário	Conduta
17h	Bisacodil 2 cp V0
21h	Bisacodil 2 cp V0 (<i>total do dia: 4 cp</i>)

D0 — Dia do exame

Horário	Conduta
06h	Solução de manitol V0, em 1 hora (ver composição abaixo)
Após o manitol	Ingerir 2 a 3 L de líquidos, principalmente água, até 4h antes do exame
08h	Enterocлизма (ver técnica abaixo)
T-4h	Início do jejum absoluto

- ☐ Líquidos (água, chá, suco) somente **até 4h antes** do exame
- ☐ Sem leite ou derivados

Solução de manitol (comum aos dois esquemas)

Componente	Volume
Manitol 20%	500 mL
Suco de limão	500 mL
Dimeticona (simeticona)	1 frasco

- Misturar tudo em **uma jarra**
- Tomar **1 copo a cada 5 a 10 minutos**, completando em **1 hora**

Enterocлизма (comum aos dois esquemas)

Solução — escolher uma

Opção	SF 0,9%	Glicerina
A	500 mL	40 mL
B	1000 mL	80 mL

Técnica

1. Introduzir **sonda alta** com equipo e solução glicerinada, paciente em **decúbito lateral esquerdo**
2. Em seguida, posicionar em **Trendelenburg a 40°**
3. **Correr aberto**
4. Solicitar que o paciente **aguarde 20 minutos** para evacuar
5. **Repetir o enterocлизма até limpar**

Preparo ideal: fezes líquidas, sem resíduos (grumos), de coloração amarelo-claro.

 **Paciente deambulante:** estimular deambulação no setor.

Linhas do tempo resumidas

Exame pela manhã

D-2 ———— dieta líquida sem resíduo · 2-3 L/dia · sem laticínios

D-1 ———— dieta líquida sem resíduo · 2-3 L/dia

08h ———— bisacodil 2 cp

14h ———— bisacodil 2 cp

17h ———— MANITOL 20% 500 mL + suco de limão 500 mL + dimeticona (em 1h)

17-18h+ — 1-2 L de líquidos (até T-4h)

20h ———— ENTEROCLISMA glicerinado (repetir até limpar)

D0 T-4h ———— fim dos líquidos → jejum absoluto

T-2h ———— limite para anti-hipertensivos/cardiológicos

T ———— COLONOSCOPIA (08-13h)

Exame à tarde

D-2 ———— dieta líquida sem resíduo · 2-3 L/dia · sem laticínios

D-1 ———— dieta líquida sem resíduo · 2-3 L/dia

17h — bisacodil 2 cp
21h — bisacodil 2 cp

D0 06h — MANITOL 20% 500 mL + suco de limão 500 mL +
dimeticona (em 1h)

07h+ — 2-3 L de líquidos (até T-4h)

08h — ENTEROCLISMA glicerinado (repetir até limpar)

T-4h — fim dos líquidos → jejum absoluto

T-2h — limite para anti-hipertensivos/cardiológicos

T — COLONOSCOPIA (13-19h)
