

DROGAS VASOATIVAS

DROGA (APRESENTAÇÃO)	DILUIÇÃO	CONCENTRAÇÃO	CONVERSÃO	DOSE RECOMENDADA
Noradrenalina (4mg/4ml)	16ml (04 amp) + SG 234ml	64mcg/ml	(ml/h ÷ Peso) x 1,07 = mcg/kg/min	0,01 - 3,0 mcg/kg/min
	Dose concentrada: 32 ml (08 amp) + SG 218ml	128mcg/ml	Dose concentrada: Dobro	
Vasopressina (20U/ml)	20U + SF 99ml	0,2U/ml	ml/h ÷ 300 = U/min	0,01 - 0,04 U/min = 3 - 12 ml/h 0,01 - 0,04 U/min = 1,5 - 6 ml/h
	40U + SF 98ml	0,4U/ml	ml/h ÷ 150 = U/min	
Adrenalina (1mg/1ml)	16 amp + SG 250ml	60mcg/ml	(ml/h ÷ Peso) = mcg/kg/min	Inicial: 0,05 - 2 mcg/kg/min Titula dose pela resposta
Dobutamina (250mg/20ml)	0,48 x Peso = droga em ml. Completar c/ SF 0,9% até 100ml	Variável	1ml/h = 1mcg/kg/min ("DOSE DANTE")	2,5 - 20 mcg/kg/min
	2 amp (500 mg) + 210 ml SF ou SG		Mcg/Kg/min= ml/h ÷ Peso x33,33	
Dopamina (50mg/10ml)	05 amp + SF 200ml	1mg/ml	(ml/h ÷ Peso) x 16,7 = mcg/kg/min	0,2 - 0,4 mcg/kg/min = D2 = vasodilatação periférica + náuseas 0,5 - 3,0 mcg/kg/min = D1 = vasodilatação central + filtração renal 5 - 10 mcg/kg/min = B1 = Dobutamina (Inotrópico e + FC) 10 - 20 mcg/kg/min = Alfa = Noradrenalina (Vasoconstrição)
Nipride/Nitroprossiato (50mg/2ml)	01 amp + SG 248ml	200mcg/ml	(ml/h ÷ Peso) x 3,3 = mcg/kg/min	0,3 - 10 mcg/kg/min
Tridil/Nitroglicerina (50mg/10ml)	01 amp + SG 240ml	200mcg/ml	ml/h x 3,3 = mcg/min	10 - 200 mcg/min

BLOQUEIO NEUROMUSCULAR

DROGA (APRESENTAÇÃO)	DILUIÇÃO	CONCENTRAÇÃO	CONVERSÃO / INDICAÇÃO	DOSE RECOMENDADA
Rocurônio (50mg/5ml)	05 amp + SF 225ml	1mg/ml	(ml/h ÷ Peso) = mg/kg/h	Ataque: 0,6 - 1 mg/kg 0,48 - 0,72 mg/kg/h
Cisatracúrio (2mg/ml)	20 amp sem diluição	2mg/ml	PARA SDRA (Esquema alternativo)	40mg 8/8h em BIC
Pancurônio (4mg/2ml)	01 amp sem diluição	2mg/ml	Bloqueio intermitente	0,1 - 0,2 mg/kg EV 3/3h

INTUBAÇÃO DE SEQUÊNCIA RÁPIDA

DROGA (APRESENTAÇÃO)	DILUIÇÃO	CONCENTRAÇÃO	EFEITO	DOSE RECOMENDADA
Lidocaína (400mg/20ml)	Sem diluição	20mg/ml	Broncodilatação Pode aumentar PIC	1,5 mg/kg (~5ml)
Fentanil (500mcg/10ml)	Sem diluição	50mcg/ml	Analgesia Hipotensão Pulmão Rígido (Se Rápido)	1 - 3 mcg/kg (~4ml)
Quetamina (500mg/10ml)	Sem diluição	50mg/ml	Analgesia Amnésia Sedação Cardioestimulante	1,5 mg/kg (~2ml)
Midazolan (15mg/3ml)	1 amp + SF 12ml	1mg/ml	Hipnose Amnésia Anticonvulsivante Hipotensão	0,1 - 0,3 mg/kg (~2 - 3ml sem diluição) (~10 - 15ml diluído)
Etomidato (20mg/10ml)	Sem diluição	2mg/ml	Hipnose Cardioestável	0,3 mg/kg (~10ml)
Propofol (200mg/20ml)	Sem diluição	10mg/ml	Hipnose Broncodilatação Hipotensão (PAM: - 10mmHg)	1,5 - 3 mg/kg (~10ml)
Succinilcolina (100mg/10ml)	Diluyente próprio (ou AD 10ml)	10mg/ml	Bloqueio Muscular (2-10min) Evitar se Hipercalemia, grande queimado	1 - 2 mg/kg (~5-10ml)
Rocurônio (50mg/5ml)	Sem diluição	10mg/ml	Bloqueio Muscular (45- 80min)	1 - 1,2 mg/kg (~5ml)

SEDAÇÃO / ANALGESIA CONTÍNUA

DROGA (APRESENTAÇÃO)	DILUIÇÃO	CONCENTRAÇÃO	CONVERSÃO	DOSE RECOMENDADA
Propofol (10mg/ml)	05 amp sem diluição	10mg/ml	(ml/h ÷ Peso) x 10 = mg/kg/h	0,3 - 3,0 (-4,8*) mg/kg/h
Midazolan (50mg/10ml)	03 amp + SF 120ml	1mg/ml	ml/h ÷ Peso = mg/kg/h	0,02 - 0,1(-0,6*) mg/kg/h
Dexmedetomidina/Precedex (200mcg/2ml)	01 amp + SF 48ml	4mcg/ml	(ml/h ÷ Peso) x 4 = mcg/kg/h	0,2 - 1,5 mcg/kg/h
Fentanil (500mcg/10ml)	05 amp sem diluição	50mcg/ml	(ml/h ÷ Peso) x 50 = mcg/kg/h	1 - 2 mcg/kg/h
Morfina (10mg/1ml)	10 amp + SF 90ml	1mg/ml	ml/h ÷ Peso = mg/kg/h	0,07 - 0,5 mg/kg/h

FIBRILAÇÃO ATRIAL

Controle agudo de FC

DROGA (APRESENTAÇÃO)	DILUIÇÃO	TEMPO DE INFUSÃO	INDICAÇÃO	CONTRAINDICAÇÃO	DOSE RECOMENDADA
Amiodarona (150mg/3ml)	02 amp + SG 250ml	1 hora	Geral	-	300mg
Metoprolol (5mg/5ml)	-	Bolus	FA Aguda	IC descompensada Broncoespasmo	5mg (Máx: 15mg)
Diltiazem (5mg/1ml)	-	Bolus (2 min)		FE < 40% IC descompensada	5-10mg Repetir 10mg após 30min
Verapamil (2,5mg/1ml)	-	2 minutos		FE < 40% IC descompensada	2,5-10mg Repetir se necessário
Digoxina (0,5mg/2ml)	-	Bolus	IC de VE	IRC TV Vias acessórias	Digitalização rápida: 0,25mg bolus (0,75 - 1,5 mg/24h em doses divididas) Manutenção: 0,125 - 0,25 mg VO 1x/dia

Cardioversão Farmacológica

DROGA (APRESENTAÇÃO)	DILUIÇÃO	TEMPO DE INFUSÃO	INDICAÇÃO	CONTRAINDICAÇÃO	DOSE RECOMENDADA
Amiodarona (150mg/3ml)	01 amp + SG 100ml	10 minutos	-	-	150mg

DROGA (APRESENTAÇÃO)	DILUIÇÃO	TEMPO DE INFUSÃO	INDICAÇÃO	CONTRAINDICAÇÃO	DOSE RECOMENDADA
Propafenona (Comp: 150mg - 300mg)	-	-	-	Cardiopatía estrutural DAC	450mg VO (<70kg) 600mg VO (>70kg)

Manutenção

DROGA (APRESENTAÇÃO)	DILUIÇÃO	TEMPO DE INFUSÃO	DOSE RECOMENDADA
Amiodarona (150mg/3ml)	900mg + SG 282ml	24 horas	1mg/min (20ml/h) por 6h 0,5mg/min (10ml/h) por 18h

Obs: Cardiopatía estrutural → IC FE reduzida / Estenose aórtica significativa / DAC / HVE anormal

ANTICOAGULAÇÃO

DROGA	DOSE	VIA	POSOLOGIA	AJUSTES
Enoxaparina Profilática	40mg	SC	1x/Noite	-
Enoxaparina Plena	1mg/kg	SC	12/12h	>75anos: 0,75mg/kg SC 12/12h ClCr 15-30: 1mg/kg SC 1x/dia – dosar fator Xa
Heparina Sódica Profilática	5.000U	SC	12/12h ou 8/8h	-
Heparina Sódica Plena (25.000 U/5ml)	Ataque (TEV/SCA/FA): 80U/kg (Máx 5000 U) Manutenção: 25.000 U + SF 245ml	IV IV	Bolus BIC (100U/ml) (ml/h ÷ Peso) x 100 = U/kg/h	Inicial: 18 U/kg/h (Max 10 ml/h) + TTPA 6/6h ESCALA DE RASCHKE Relação <1,2: Aumentar 4U/kg/h + Bolus 80U/kg Relação 1,2-1,5: Aumentar 2U/kg/h + Bolus 40U/kg Relação 1,5-2,3: Manter Relação 2,3-3,0: Reduzir 2U/kg/h Relação >3: Desligar por 1h, então reduzir 4U/kg/h
Heparina Sódica Plena (25.000 U/5ml)	Ataque (IAM C/SUPRA): 60U/kg (Máx 4000 U)	IV IV	Bolus BIC = (100U/ml) (ml/h ÷ Peso) x 100 = U/kg/h	Inicial: 12 U/kg/h (Max 10 ml/h) + TTPA 6/6h

DROGA	DOSE	VIA	POSOLOGIA	AJUSTES
	Manutenção: 25.000 U + SF 245ml			

INSULINO-TERAPIA

DROGA	VIA	DOSE	POSOLOGIA	AJUSTES
Insulina Regular 100U + SF 99ml (HIPERGLICEMIA DO PACIENTE CRÍTICO)	IV	Dx > 180: Iniciar 2ml/h Dx > 220: Iniciar 4ml/h Dextro 1/1h	BIC	Dx <60: Desligar + Glicose 50% 4amp IV Dx <100: Desligar a bomba Dx 101-180: Manter a infusão Dx >180: Aumentar 2ml/h

ANTI-CONVULSIVANTE

DROGA	VIA	DOSE	POSOLOGIA
Diazepan	IV/IM	10mg bolus	Repetir até efeito ou 40mg.
Fenitoína/Hidantal (250mg/5ml)	IV IV/VO	Ataque: 15-20mg/kg + SF 250ml Manutenção: 100mg 8/8h	Ataque: 50mg/min Manutenção: Ajuste por Fenitoínemia
Midazolan/Dormonid (50mg/10ml)	BIC	03 amp + SF 120ml	0,02 - 0,6 mg/kg/h
Propofol (10mg/ml)	BIC	05 amp sem diluição	0,3 - 4,8 mg/kg/h
Sulfato de Magnésio 50% (5g/10ml) - Em gestantes	IV BIC	Ataque: 8ml + SG 100ml (4-6g) Manutenção: 12ml + SG 500ml	Ataque: IV em 20min Manutenção: BIC em 6h (1-2g/h) 84ml/h BIC ou 28gts/min, por 24-72h, até controlar.
Pentobarbital (50mg/ml)	IV BIC	Ataque: 10-15mg/kg Manutenção: BIC sem diluição	Ataque: 50mg/min Manutenção: 0,5 a 5 mg/kg/h
Tiopental (1g)	IV BIC	4g em SF 250ml (16mg/ml)	3 - 5 mg/kg/h

APORTE BASAL

NUTRIENTE	APRESENTAÇÃO	CONCENTRAÇÃO	NECESSIDADE DIÁRIA	DOSE DIÁRIA
Água livre (H ₂ O)	-	-	30-35 ml/kg	~2.000 ml
Sódio (Na ⁺)	NaCl 20% 10ml NaCl 0,9% 1.000ml	34mEq 154mEq	1-2mEq/Kg/dia	2 amp
Potássio (K ⁺)	KCl 19,1% 10ml	25mEq	40-80mEq/dia	2 amp
Magnésio (Mg ²⁺)	MgSO4 10% 10ml	8mEq	10-20mEq/dia	2 amp
Calorias (Kcal)	SG5% 500ml Glicose 50% 10ml	25g = 100Kcal 5g = 20Kcal	400-600Kcal (100-150g de Glicose)	2.000ml ou 20 amp

EXEMPLO: (SG 5% 1.000ml + NaCl 20% 10ml + KCl 19,1% 10ml + MgSO4 10% 10ml), IV, 12/12h

AJUSTES

500ml/24h = 7gts/min = 21ml/h
1ml = 20gotas = 60microgotas

1gota/min = 3 micro gts/min = 3ml/h
1mg = 1.000mcg

CORREÇÃO HIDROELETROLÍTICA

DISTÚRBIO	AVALIAÇÃO	SOLUÇÕES	CORREÇÃO
HIPONATREMIA (Na < 130)	ΔNa =([Na]Solução(1L) - [Na]Pct)/(ACT+1)	NaCl 3% - 513mEq/L (SF0,9% 445ml + NaCl20% 55ml) NaCl 2% - 340mEq/L (AD 450ml + NaCl20% 50ml)	Até 10mEq/24h
HIPERNATREMIA (Na > 145)	ΔNa =([Na]Solução(1L) - [Na]Pct)/(ACT+1)	NaCl 0,45% - 77mEq/L RL - 130mEq/L SG 5% - 0mEq	(Corrigir volemia) Até 12mEq/24h

DISTÚRPIO	AVALIAÇÃO	SOLUÇÕES	CORREÇÃO
HIPOCALEMIA (K < 3,5)	K+: 3,0 - 3,5 K+: <3,0	Xarope de Potássio 6% KCl 19,1% 10ml	10-20ml VO 8/8h 02amp/500ml/4h --- 02amp/250ml/4h (veia central)
HIPERCALEMIA (K > 5,0)	ECG (T Apiculada, alargamento QRS) Gluconato de Cálcio 10% 10ml IV em 10min	-	-Furosemida, IV, 40-80mg (1mg/kg), 4/4h -Sorcal (Poliestireno de cálcio) 30g + Manitol 100ml, VO, 8/8h -Berotec (Fenoterol), NBZ, 10gts, 4/4h -Insulina Regular 10U + Glicose 50% 10 amps, IV em 1h, 4/4h
HIPOCALCEMIA (Ca2+ < 8,5 ou Ca-ionizável < 1,0)	Ca2+ Real = Ca2+Sérico + [(4,0-Albumina)x0,8]	-	Gluconato de cálcio 10%, 10-20ml em 30min
HIPOMAGNESEMIA (Mg2+ <1,5)			Sulfato de Magnésio 10%, 20ml em 4h
ACIDOSE METABÓLICA (pH < 7,20 / BIC < 10)	Déficit (ml) = Peso x 0,6 x (Bic Desejado – Bic Sérico)	BicNa 8,4% (1ml = 1mEq) BicNa Pó (1g = 12mEq)	Não exceder 100mEq/h

Água Corporal Total (ACT) = Peso x 0,6 (♂) ou 0,5 (♀). Se >65a: 0,5 (♂) ou 0,45(♀)

Próximo formato: Markdown corrido, tabelas ou fichas?