## ドナー適格性判定基準(BMH/PBSCH)(2020/12/8)

## 【臨床的な問題】P7

旧				新		
	詳細	ВМ	РВ	詳細	ВМ	РВ
血迷神反管走経射	過去に VVR を起こした場合、血管迷走神経反射(VVR) 判定基準において、			以下、血管迷走神経反射(VVR)判定基準において判断 i)必須症状・所見がなければ VVR とはいわない。 ii) II 度では意識喪失の症状を認めることを必須とする。		
	I度: 血圧低下 顔面蒼白、冷汗 徐脈(>40/分)、 悪心などの症状を伴うもの	В	В	I度 必須症状・所見 : 血圧低下,徐脈(>40/分) 他の症状 : 顔面蒼白,冷汗悪心などの症状を伴うもの	В	В
	Ⅱ度 : I度に加えて意識喪失 嘔吐、徐脈(≦40/分) 血圧低下(<90Pa)	С	С	Ⅱ度 必須症状・所見 : I度に加えて意識喪失,徐脈(≦40/分),血圧低下(<90Pa) 他の症状 : 嘔吐	В	В
	Ⅲ度 : Ⅱ度に加えて痙攣、失禁	С	С	Ⅲ度 必須症状・所見 : Ⅱ度に加えて痙攣、失禁	D	D