

2015 年 12 月 15 日

非血縁者間骨髄採取認定施設  
採取責任医師 各 位  
麻酔責任医師 各 位

公益財団法人 日本骨髄バンク  
ドナー安全委員会

## **骨髄バンクドナーの術前水分補給について**

拝啓

時下、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素より骨髄バンク事業の推進に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、待機的全身麻酔下手術では、麻酔導入時の嘔吐および誤嚥の発現が危惧されるため、手術前は長時間の絶飲食が行われてきました。

このたび、ドナーに対する水分補給について複数の骨髄採取施設責任医師より、お問い合わせをいただきました。

これを受け、当法人(ドナー安全委員会)で検討した結果、下記とすることとしました。

つきましては、内容をご確認いただき、適切なご対応をお願い申し上げます。

敬具

記

### ■基本方針

骨髄バンクドナーの骨髄採取術前に水分補給を実施する場合は、公益社団法人日本麻酔科学会の術前絶飲食ガイドラインを遵守の上、年齢を問わず麻酔導入 2 時間前まで可とします。

これ以外についても、同学会ガイドラインを遵守の上、適切な対応をお願いします。

なお、上記については診療報酬上算定できないので、ご注意ください。

以上

■本件に関する問い合わせ先  
公益財団法人 日本骨髄バンク  
ドナーコーディネート部 折原  
TEL 03-5280-2200