非血縁者間骨髓/末梢血幹細胞採取認定施設

採取責任医師 各 位輸血責任医師 各 位

公益財団法人 日本骨髄バンク 事 務 局

フォローアップ関連帳票の変更について(通知)

拝啓

時下、ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。

平素より骨髄バンク事業の推進に格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、下記フォローアップ関連帳票が変更となります。別紙ご確認の上、ご対応をお願いいたします。

今後とも骨髄バンク事業の推進にご協力の程お願い申し上げます。

敬具

記

- 1. 2019年4月15日 帳票変更分より順次
- 2. 骨髓採取関連
 - ・採取計画書、採取報告書(速報)、非血縁者間・採取報告書、採取後健康診断報告書
- 3. DLI 採血計画書
- 4. 末梢血幹細胞採取関連
 - ・採取計画書、G-CSF 投与報告書、採取報告書(速報)、非血縁者間・採取報告書 採取後健康診断報告書
 - ・末梢血幹細胞採取完了報告書(ハーベストレポート)

以上

◆別紙 新旧対照表

<u>本件に関する問い合わせ先</u> (公財) 日本骨髄バンク ドナーコーディネート部 杉村・窪田 TEL 03-5280-2200

【骨髄採取関連】帳票変更新旧対照表(2019/4/15)

帳票名称	項目名	変更前	変更後
骨髄採取計画書	術前健康診断 Data	GOT	AST (GOT)
	【生化学】	GPT	ALT (GPT)
		γ-GTP	γ-GT
		【新規】	UA
		CPK	CK
非血縁者間・骨髄採取報		GOT	AST (GOT)
告書		GPT	ALT (GPT)
		CPK	CK
採取後健康診断報告書	7. 生化学 Data	GOT	AST (GOT)
		GPT	ALT (GPT)
		γ-GTP	γ-GT
		CPK	CK

【DLI 関連】帳票変更新旧対照表 (2019/4/15)

帳票名称	項目名	変更前	変更後
DLI 採血計画書	採血前健康診断Data	GOT	AST (GOT)
	【生化学】	GPT	ALT (GPT)
		γ-GTP	γ-GT
		CPK	CK

【末梢血幹細胞採取関連】帳票変更 新旧対照表 (2019/4/15)

帳票名称	項目名	変更前	変更後
末梢血幹細胞採	5. 術前健康診断実	6. 術前健康診断 Data	術前健康診断結果
取計画書	施日	【バイタルサイン(VS)】: 血圧(BP) / mmHg 脈拍(P) 体温(BT) °C	【バイタルサイン】: 血圧 / mmHg 脈拍 回/分 (体温削除)
		【脾腫】異常なし ・ 異常あり	なし ・ あり
		【感染症】HTLV-1	HTLV-1 抗体
		HIV1/2	HIV1/2 抗体
		【その他・理学所見】	【身体所見】
		▼検査値は施設正常範囲内であれば WNL に〇 範囲外であれば、	▼検査値は施設基準範囲内であれば WNL (施設基準範囲) に〇
		施設正常値を記入して下さい	範囲外であれば、施設基準範囲を記入してください。
		施設正常値	施設基準範囲
		GOT	AST (GOT)
		GPT	ALT (GPT)
		γ-GTP	γ−GT
		СРК	СК
		LDH	LD
		Ca <u>mEq/I</u>	Ca mg/dl
	7. 今後のスケジュ	(2回目採取を行った場合: 月 日() 泊()日)	<削除>
	ール		

項目名	変更前	変更後
1. 実施日時	20 年 月 日 午前·午後 時 分	投与1回目 20 年 月 日 時 分
		2 回目 時 分
2. G-CSF 投与前	3. G-CSF 投与前身体所見	2. G-CSF 投与前
		※2回に分けて投与する場合は、1回目投与前の測定値をご記
		入下さい。
	【バイタルサイン(VS)】: 血圧(BP) / mmHg 脈拍(P) 体温(BT) °C	【バイタルサイン】: 血圧 / mmHg 脈拍 回/分 体温 °C
0 0 005 +11	4 0 00F th F ** TE C +> * te	2 0 00C HI L ** L ** A * # B
		3. G-CSF 投与前検査結果 <削除>
宜 和未	ガ回の英吊 なし・ めり	< 的
	GOT GPT Y-GTP CPK LDH Ca mEq/L	AST (GOT)、ALT (GPT)、 γ-GT、CK、LD、Ca mg/dl
	dory drive of the Epite out IIIEq/ 1	ing/ar
5. 併用薬	□その他 NSAID	口その他
6. G-CSF 投与後	【投与後バイタルサイン(VS)】血圧(BP) / mmHg 脈拍(P) 体温(BT)℃	【バイタルサイン】: 血圧 / mmHg 脈拍 回/分 体温 ℃
7. 特記事項	8. 投与後の特記事項	7. 特記事項
	▼大きな合併症が発生した場合は、Hot Line で報告して下さい。	▼健康上の問題、G-CSF 投与中止等が発生した場合は、下記緊
		急連絡先へ報告してください。
	G-CSF 投与報告書(2 日目)(3 日目)(4 日目)	G-CSF 投与報告書(2~6 日目)
		<u>※報告書を集約し、用紙を縦から横へ変更</u>
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°	CAV ニナー 抗巨数フ後 まめかに担当地反声数 P。 却チェテノギナ	
		木相川軒細胞採取報告書(I ロ日/2 ロ日建報)と共に担当地区事務局へ FAX してください。
о ц ц / 1/0	···	1分向・・I AA してくたでい。
	 実施日時 G-CSF 投与前 G-CSF 投与前検査結果 併用薬 G-CSF 投与後 特記事項 	20 年 月 日 午前・午後 時 分 2. G-CSF 投与前 3. G-CSF 投与前身体所見 【パイタルサイン(VS)】: 血圧(BP) / mmHg 脈拍(P) 体温(BT) ℃ 4. G-CSF 投与前陰 査結果 GOT、GPT、アーGTP、CPK、LDH、Ca mEq/1 □その他 NSAID 【投与後パイタルサイン(VS)】 血圧(BP) / mmHg 脈拍(P) 体温(BT)℃ 7. 特記事項 ▼大きな合併症が発生した場合は、Hot Lineで報告して下さい。 G-CSF 投与報告書(2 日目)(3 日目)(4 日目) G-CSF 投与報告書(2 FAXにて、投与終了後速やかに担当地区事務局へ報告してくださ

帳票名称	項目名	変更前	変更後
		3. G-CSF 投与前身体所見	G-CSF 投与前評価
			<追加>
			◆身体所見 □なし □あり
			→□ありの場合、2/6-4/6 へご記入して下さい。
			◆疼痛 □なし □あり
			→□ありの場合、5/6-6/6 へご記入して下さい。
		【バイタルサイン(VS)】: 血圧(BP) / mmHg 脈拍(P) 体温(BT) °C	G-CSF 投与前バイタルサイン 血圧 / mmHg 脈拍 回/分 体温 °C
		4. G-CSF 投与可否	G-CSF 投与
		□投与可⇒G-CSF 減量の有無:□なし □あり/□投与中止	G-CSF 減量の有無:口減量なし 口あり
			口投与中止
			<追加>
			▼G-CSF 投与で、投与中止となった場合は、緊急連絡先に報告
			してください。
		6. 併用薬 口その他 NSAIDS	併用薬 口その他
	■身体所見(1/3)	【投与後バイタルサイン (VS)】血圧(BP) / mmHg 脈拍(P) 体温(BT)℃	G-CSF 投与後バイタルサイン 血圧 / mmHg 脈拍 回/分 体温 ℃
		7. 投与後の特記事項	特記事項
			 □ありの場合、以下ご記入の上、報告してください。
		 発熱	·
		□軽度 (~39°C)	□軽度 (38°C~39.0°C)
		□中程度 (39.0℃以上 40.0℃未満)	□中程度 (>39.0~40.0)
		□重度 (40.0℃以上が 24 時間以内)	□重度 (>40.0°C ≦24 時間 <u>未満</u>)
		□重篤 (40.0℃以上が 24 時間以上)	□重篤 (>40.0℃ >24 時間以上)

帳票名称	項目名	変更前	変更後
		不眠	不眠
		□軽度 (特に睡眠障害はあるが機能障害はない)	□軽度 (<u>時に</u> 睡眠障害があるが機能障害はない)
		口中程度(睡眠障害はあるが日常生活に支障はない)	□中程度 (機能障害はあるが日常生活に支障はない)
		めまい	めまい(平衡失調、ふらつき、回転性めまい含む)
	■身体所見(2/3)	嘔吐	嘔吐
		□重篤 (活動不能/機能不能)	□重篤 (生命を脅かす)
		皮疹	皮疹
		□中程度 (掻痒や随伴症状を伴う斑状/丘疹状の皮疹	□中程度 (掻痒や随伴症状を伴う斑状/丘疹状の皮疹
		または紅疹:体表面積 50%以下)	または紅疹:体表面積 50% <u>未満</u>)
		程度基準∶	評価基準:
	■疼痛	 骨痛	骨(胸骨、肋骨含む)
	_/>///	頭痛	頭部
		背中	背部
		腰	腰部
		穿刺部位	<削除>
		関節、腕、手足、筋肉	上肢
			下肢
		首	頸部

帳票名称	項目名	変更前	変更後
		▼大きな合併症が発生した場合は、Hot Line で報告して下さい	▼重度もしくは重篤な症状が確認された場合は、緊急連絡先へ
			報告してください。
			<追加>
			【疼痛に対する処置】
			その他特記事項
末梢血幹細胞採		G-CSF 投与報告書兼末梢血幹細胞採取報告書(1 日目、2 日目速報)	末梢血幹細胞採取報告書(1 日目速報)(2 日目速報)
取報告書(1日目	1. 実施日時	2. 採取日	1. 実施日時
速報)(2日目速			<追加>
報)			G-CSF 投与期間: 20 年 月 日 ~ 月 日
		3. G-CSF 投与前身体所見	G-CSF 投与報告書(2~6 日目)へ記載
	 2. 採取前検査結果	│ │4. G-CSF 投与前臨床検査値(年(西暦) 月 日)	2. 採取前検査結果
		 分画の異常 なし · あり	<削除>
		GOT, GPT, γ -GTP, CPK, LDH, Ca mEq/I	AST(GOT), ALT(GPT) γ -GT, CK, LD, Ca mg/dl
		5. G-CSF 投与可否	G-CSF 投与報告書(2~6 日目)へ記載
		6. 投与量	G-CSF 投与報告書(2~6 日目)へ記載
		0. 1文字里 7. 併用薬	G-CSF 投与報告書(2~6 日目)へ記載
		8. 投与後の特記事項	G-CSF 投与報告書(2~6 日目) へ記載
	3. 末梢血幹細胞採	 9. 末梢血幹細胞採取	3. 末梢血幹細胞採取
	取	【採取前バイタルサイン(VS)】血圧(BP) / mmHg 脈拍(P) 体温(BT) °C	【採取前バイタルサイン】: 血圧 / mmHg 脈拍 回/分 体温 ℃

帳票名称	項目名	変更前	変更後
		【アフェレーシス】	【アフェレーシス】
		遠心速度	<削除>
		採血速度(mL/h·mL/m)	<削除>
		返血速度	<削除>
		サイクル数	<削除>
		採取血液量(mL)	採取 PBSC 量 (mL)
		採取有核細胞数(測定方法:	採取有核細胞数 測定方法:口自動血球計算
			□目視算
		採取単核球数	<削除>
		穿刺針の種類及びゲージ数:(G)	穿刺針の種類・名称及びゲージ数
			□単回使用透析用針
			口透析用留置針(G)
	4. 採取後検査結果	10. 採取後臨床検査値	4. 採取後検査結果
		分画の異常 なし・ あり	<削除>
		【生化学】	<削除>
		【電解質】	<削除>
		【バイタルサイン(VS)】: 血圧(BP) / mmHg 脈拍(P) 体温(BT) °C	【バイタルサイン】: 血圧 / mmHg 脈拍 回/分 体温 ℃
	5. 投薬の有無	11. 治療薬(併用薬)の必要性	5. 投薬の有無
		▼大きな合併症が発生した場合は、Hot Line で報告して下さい	
			へ報告してください。

帳票名称	項目名	変更前	変更後
末梢血幹細胞採		非血縁者間・末梢血幹細胞採取報告書	末梢血幹細胞採取退院時報告書
取退院時報告書		1.ドナー 体重 Kg 血液型 患者 体重 Kg 血液型	<削除>
	2. 退院時検査結果	4. 退院時臨床検査値	2. 退院時検査結果
		【バイタルサイン(VS)】: 血圧(BP) / mmHg 脈拍(P) 体温(BT) ℃	【バイタルサイン】: 血圧 / mmHg 脈拍 回/分 体温 ℃
		分画の異常 なし ・ あり	<削除>
		GOT、GPT、γ-GTP、CPK、LDH、Ca mEq/I	AST(GOT), ALT(GPT), γ -GT, CK, LD, Ca $\frac{\text{mg/dl}}{}$
		70. ±4	20x ±4
	3. 退院時身体所見	発熱	発熱
		□軽度 (~39°C)	□軽度 (38°C~39.0°C)
		□中程度 (39.0℃以上~40.0℃未満)	□中程度 (>39.0~40.0)
		不眠	不眠
		□軽度 (特に睡眠障害はあるが機能障害はない) □ 中報度 (時間除害はまるが見覚は近にも除けない)	□軽度 (時に睡眠障害があるが機能障害はない) □ 中田
		│ □中程度 (睡眠障害はあるが日常生活に支障はない) │	□中程度(<u>機能</u> 障害があるが日常生活に支障はない)
		 発熱、疲労、不眠、めまい、食欲不振、悪心、嘔吐、皮疹	
		□重度 □重篤	<削除>
			N.M.a.o
		 注射部位の反応 □重度	注射部位の反応 <削除>
		脾腫 □高度	脾腫 <削除>
			<追加>【大腿静脈穿刺について】

帳票名称	項目名	変更前	変更後
	4. 退院時疼痛	【疼痛】	4. 退院時疼痛
		程度基準: 口重度 口重篤	評価基準: <削除>
		背中	背 <u>部</u>
		骨痛	骨(胸骨、肋骨含む)
		頭痛	頭部
		腰	腰部
		関節、腕、手足、筋肉	上肢 下肢
		穿刺部位	<削除>
		首	頸部
		背中、骨痛、頭痛、腰、関節、腕、手足、筋肉、穿刺部位、首、	背部、骨、頭部、腰部、上肢、下肢、頸部、喉
		喉	
		□重度 □重篤	<削除>
		部位(<削除>
		処置内容:	<削除>
		その他特記事項	【疼痛 処置内容】
	5. 投薬の有無	5. 治療薬(併用薬)の必要性	5. 投薬の有無
採取後 健康診	3. 検査結果	4. 臨床検査値	3. 検査結果
断報告書		分画の異常 なし ・ あり	<削除>
		GOT, GPT, γ -GTP, CPK, LDH, Ca $\underline{mEq/I}$	AST(GOT), ALT(GPT), γ -GT, CK, LD, Ca $\frac{\text{mg/dl}}{}$
		【バイタルサイン(VS)】: 血圧(BP) / mmHg 脈拍(P) 体温(BT) °C	【バイタルサイン】: 血圧 / mmHg 脈拍 回/分 体温 °C

帳票名称	項目名	変更前	変更後
	4. 採取後評価	5. 身体所見	4. 採取後評価
			<追加>
			身体所見 □なし□あり⇒2/3へ記入の上、報告ください。
			疼痛 □なし□あり⇒3/3へ記入の上、報告ください。
	■身体所見		1ページにて身体所見口ありの場合、以下ご記入ください。
		発熱	発熱
		□軽度 (~39°C	□軽度 (38°C-39.0°C)
		口中程度 (39.0℃以上 40.0℃未満)	□中程度 (>39.0-40.0)
		□重度 (40.0℃以上が24時間以内)	□重度 (>40.0°C ≤24 時間 <u>未満</u>)
		□重篤 (40.0℃以上が24時間以上)	□重篤 (>40.0℃ >24 時間以上)
		不眠	不眠
		口軽度 (特に睡眠障害はあるが機能障害はない)	□軽度 (<u>時に</u> 睡眠障害があるが機能障害はない)
		口中程度(睡眠障害はあるが日常生活に支障はない)	□中程度(<u>機能</u> 障害があるが日常生活に支障はない)
		めまい	めまい(平衡失調、ふらつき、回転性ふらつき含む)
		嘔吐	嘔吐
		□重篤 (活動不能/機能不能)	口重篤 (生命を脅かす)
		皮疹	皮疹
		口中程度 (掻痒や随伴症状を伴う斑状/丘疹状の皮疹	□中程度 (掻痒や随伴症状を伴う斑状/丘疹状の皮疹
		または紅疹:体表面積 50%以下)	または紅疹:体表面積 50% <u>未満</u>)

帳票名称	項目名	変更前	変更後
		【大腿静脈穿刺実施後の場合】	<削除>
	■疼痛		1ページにて身体所見口ありの場合、以下ご記入ください。
		【疼痛】	■疼痛
		程度基準:	評価基準:
		背中	背 <u>部</u>
		骨痛	骨(胸骨、肋骨含む)
		頭痛	頭部
		腰	腰部
		関節、腕、手足、筋肉	上肢 下肢
		首	頸部
	6. 投薬の有無	7. 治療薬(併用薬)の必要性	6. 投薬の有無
		9. ドナーからの希望・提言(もしあれば)	<削除>
末梢血幹細胞採	4. 細胞数		<追加>
取完了報告書			│
(ハーベストレ			い。
ポート・1 日目、2		│ │測定方法 : □自動血球計算 □目視算	~。 <削除>
日目)		MCCA . DIAMENT DI MA	Sianes