

ドナーリンパ球輸注(DLI)マニュアル第3版 (2019/6/14 改訂)

新 旧 対 照 表																	
項目	ページ	旧	ページ	新													
目次				(追加) 5.DLI 採血後の造血幹細胞採取(自己血採血)間隔について・・・P7 (以下ページ数変更あり)													
5.DLI 採血後の造血幹細胞採取(自己血採血)間隔について		【新規】	P7	5.DLI 採血後の造血幹細胞採取(自己血採血)間隔について 【DLI 全血採血の場合】 <table><tr><th>採取方法</th><th>DLI 200ml 全血採血後の場合</th><th>DLI 400ml 全血採血後の場合</th></tr><tr><td>骨髄採取</td><td rowspan="2">男女共 DLI の 4 週間後より採取可能 ※自己血採血がある場合は、自己血採血日を基準とする</td><td>男性は DLI の 12 週間後、女性は、16 週間後より採取可能 ※自己血採血がある場合は、自己血採血日を基準とする</td></tr><tr><td>末梢血幹細胞採取</td><td>男女共 DLI の 8 週間後より採取可能</td></tr></table> 【DLI 成分採血の場合】 <table><tr><th>採取方法</th><th>DLI 成分採血後の場合</th></tr><tr><td>骨髄採取</td><td rowspan="2">男女共 DLI の 2 週間後より採取可能</td></tr><tr><td>末梢血幹細胞採取</td></tr></table>	採取方法	DLI 200ml 全血採血後の場合	DLI 400ml 全血採血後の場合	骨髄採取	男女共 DLI の 4 週間後より採取可能 ※自己血採血がある場合は、自己血採血日を基準とする	男性は DLI の 12 週間後、女性は、16 週間後より採取可能 ※自己血採血がある場合は、自己血採血日を基準とする	末梢血幹細胞採取	男女共 DLI の 8 週間後より採取可能	採取方法	DLI 成分採血後の場合	骨髄採取	男女共 DLI の 2 週間後より採取可能	末梢血幹細胞採取
採取方法	DLI 200ml 全血採血後の場合	DLI 400ml 全血採血後の場合															
骨髄採取	男女共 DLI の 4 週間後より採取可能 ※自己血採血がある場合は、自己血採血日を基準とする	男性は DLI の 12 週間後、女性は、16 週間後より採取可能 ※自己血採血がある場合は、自己血採血日を基準とする															
末梢血幹細胞採取		男女共 DLI の 8 週間後より採取可能															
採取方法	DLI 成分採血後の場合																
骨髄採取	男女共 DLI の 2 週間後より採取可能																
末梢血幹細胞採取																	
裏表紙		平成 15 年 11 月 1 日第 2 版第 1 刷発行 平成 30 年 11 月 15 日第 3 版作成		(発行日追加) 2019 年 6 月 14 日第 3 版改訂													