非血縁者間末梢血幹細胞採取認定施設

採取責任医師 各 位

調整医師各位

公益財団法人 日本骨髄バンク

コーディネーター 各 位

公益財団法人 日本骨髄バンク ドナーコーディネート部

総コレステロール検査の追加検査および適格性判定について(通知)

非血縁者間 PBSCT の条件緩和により、今後、非血縁者間 PBSCT を含むドナーコーディネートが増加することが予想されます。これを踏まえて、確認検査時に実施している総コレステロール検査の適格性判定を明確化するため、要検討となった場合は確認検査時の残検体を用いて HDL コレステロール (HDL-C) および LDL コレステロール (LDL-C) の追加検査を行い、適格性を判定することとしました。

下記および別紙をご確認のうえ、ご対応をお願いします。

記

- 1. ドナー適格性判定基準について
 - ○確認検査時

【現行基準】

総コレステロール 220mg/d1 (要検討)

【新基準】

確認検査の結果、総コレステロール値が $220 mg/d1 < \chi \le 240 mg/d1$ の場合は、残検体を用いて追加検査を実施し、以下となった場合は、PBSC の提供は原則 1 年間保留とする。

HDL-C 40 mg/dl 未満 かつ LDL-C 140 mg/dl 以上は不適格

- 2. 運用方法および判定について
 - ① 確認検査の結果、総コレステロール値が 221mg/dl 以上 240mg/dl 以下のドナーについては、残検体を用いて追加検査を行い適格性を判定します。
 - ② 総コレステロール値が 241mg/dl 以上は追加検査を実施せず不適格とします。
- 3. 変更日

2015年12月18日 (確認検査結果取得分から)

以上

公益財団法人 日本骨髄バンク

ドナーコーディネート部 担当:折原

〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目19番地 廣瀬第2ビル 7階 TEL 03-5280-2200/FAX 03-5283-5629

ドナー適格性判定基準(BMH/PBSCH) 改訂(2015/12/15)

【代謝·栄養疾患】 P20

旧				新		
詳細		BMT	PBSCT	詳細	BMT	PBSCT
脂質異常症	確認検査時			確認検査時		
	総コレステロール 220mg/dl < 要検討		В	総コレステロール 220mg/dl <		
	240mg/dl < 不可		С	<u>≦ 240mg/dl の時</u>		
				残検体を用いて、以下検査を実施する。		
	術前健診時は施設判断とする。	В	В	HDL-C 40mg/dl 未満 かつ		
				LDL-C 140mg/dl 以上は不適格		<u>C</u>
				240mg/dl < 不可		С
				術前健診時は施設判断とする。	В	В