

MedikTest - база вопросов и ответов

PDF с текстовым слоем: работает поиск по документу на компьютере и телефоне.

Блок 1

Блок: Блок 1 | № 1

1. БИСОПРОЛОЛ И ЕГО АНАЛОГИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ ИБС, ТАК КАК ОНИ

- ☐ снижают потребность миокарда в кислороде

Блок: Блок 1 | № 2

2. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЖАЛОБАМ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТ

- ☐ одышку

Блок: Блок 1 | № 3

3. ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ АДДИСОНОВОЙ БОЛЕЗНИ (ПЕРВИЧНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ) ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ гиперпигментация кожи

Блок: Блок 1 | № 4

4. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ТРАНСАБДОМИНАЛЬНЫМ ДАТЧИКОМ СТЕНКА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ В НОРМЕ ВЫГЛЯДИТ В ВИДЕ СТРУКТУРЫ

- ☐ однослойной изоэхогенной, формирующей контур желчного пузыря

Блок: Блок 1 | № 5

5. ОСНОВНЫМ ЛЕЧЕБНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ВЫРАЖЕННОЙ ГИПОТОНИИ ИЛИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ШОКА У БОЛЬНЫХ С ПРИЗНАКАМИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ внутривенное введение жидкости (реополиглюкин, 5% р-р глюкозы)

Блок: Блок 1 | № 6

6. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА РЕДКО НАБЛЮДАЕТСЯ

- ☐ высокая лихорадка

Блок: Блок 1 | № 7

7. ТУБЕРКУЛЕМУ ЛЕГКОГО ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С

- ☐ периферическим раком

Блок: Блок 1 | № 8

8. СНИЖЕНИЕ ПАМЯТИ, ЗАПОР, БРАДИКАРДИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ

- ☐ гипотиреоза

9. ПРЕПАРАТОМ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ К IgE ЯВЛЯЕТСЯ

☐ омализумаб

10. ПРИЗНАКОМ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ высокий ретикулоцитоз

11. ПРИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ РИТМ СЕРДЦА

☐ правильный

12. ЛУЧШИМ МЕТОДОМ ВЕРИФИКАЦИИ РЕНОВАСКУЛЯРНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ селективная ангиография почечных сосудов

13. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАРФАРИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НОРМАЛИЗОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 2,0-3,0

14. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО МИОКАРДИТА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ вирусные инфекции

15. ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КОЛИТ ЯВЛЯЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕМ ТЕРАПИИ

☐ антибиотиками

16. ГРУППОЙ ПРЕПАРАТОВ, ДОКАЗАВШИХ СПОСОБНОСТЬ К СНИЖЕНИЮ СМЕРТНОСТИ И ЧИСЛУ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПРИ ХСН ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингибиторы АПФ

17. НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАН БОЛЬНОМУ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И АДЕНОМОЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

☐ доксазозин

18. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эхокардиография

Блок: Блок 1 | № 19

19. ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ

☐ ДВС-синдроме

Блок: Блок 1 | № 20

20. ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ САХАРОСНИЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стимуляция секреции инсулина

Блок: Блок 1 | № 21

21. ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВУЕТ

☐ бессрочно

Блок: Блок 1 | № 22

22. У ЛИЦ С СИНДРОМОМ ПРИОБРЕТЕННОГО ИММУНОДЕФИЦИТА НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пневмоциста

Блок: Блок 1 | № 23

23. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ХСН I СТАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ скрытая недостаточность кровообращения, проявляющаяся только при физической нагрузке

Блок: Блок 1 | № 24

24. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЁЗНОГО КОМПЛЕКСА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ фокуса в лёгком, связанного «дорожкой» с увеличенным корнем лёгкого

Блок: Блок 1 | № 25

25. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ (В ДНЯХ)

☐ 10-14

Блок: Блок 1 | № 26

26. НОРМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ ДО (В МЛ)

☐ 18

Блок: Блок 1 | № 27

27. МАКСИМАЛЬНО БЫСТРОЕ СНИЖЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПОКАЗАНО, ЕСЛИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ ОСЛОЖНЯЕТСЯ

☐ расслаивающей аневризмой аорты

Блок: Блок 1 | № 28

28. АНТРОПОМЕТРИЯ В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ

☐ всех, подлежащих диспансеризации

Блок: Блок 1 | № 29

29. К ПРОЯВЛЕНИЯМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ОТНОСЯТ

☐ жажду

Блок: Блок 1 | № 30

30. К ЭТИОТРОПНЫМ СРЕДСТВАМ ЛЕЧЕНИЯ РОЖИ ОТНОСЯТСЯ

☐ антибиотики

Блок: Блок 1 | № 31

31. ДЛЯ МИЛИАРНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ХАРАКТЕРНО ____ ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

☐ острое

Блок: Блок 1 | № 32

32. ЖАЛОБЫ НА СЛАБОСТЬ И БОЛИ В ПОЗВОНОЧНИКЕ, ГЕМОГЛОБИН КРОВИ 65 Г/Л, ПРОТЕИНУРИЯ 22 Г В СУТКИ, УРОВЕНЬ ОБЩЕГО БЕЛКА СЫВОРОТКИ 103 Г/Л И КРЕАТИНИН КРОВИ 280 МКМОЛЬ/Л НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ миеломной болезни

Блок: Блок 1 | № 33

33. В ПРОВЕДЕНИИ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ ПРИ

☐ малом объеме плеврального выпота у больного с пневмонией

Блок: Блок 1 | № 34

34. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АПИКСАБАНА В ДОЗЕ 10 МГ ДВА РАЗА В СУТКИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ВЕНОЗНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ СОСТАВЛЯЕТ (В ДНЯХ)

☐ 21

Блок: Блок 1 | № 35

35. ЖАЛОБЫ НА СЛАБОСТЬ, ОБМОРОКИ, ИЗВРАЩЕНИЕ ВКУСА И ОБОНЯНИЯ ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО УКАЗЫВАЮТ НА АНЕМИЮ

☐ железодефицитную

Блок: Блок 1 | № 36

36. К ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ГЕМОВОГО ЖЕЛЕЗА В ПИЩЕВОМ РАЦИОНЕ ОТНОСЯТ

☐ мясо

Блок: Блок 1 | № 37

37. САМЫМ ЧАСТЫМ ТИПОМ ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ миксома

Блок: Блок 1 | № 38

38. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ МЕТОТРЕКСАТА УСИЛИВАЕТ

☐ оксациллин

39. ГРАНУЛЕМАТОЗНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ

☐ туберкулёза

40. ПРИ УГРОЗЕ ПЕЧЁНОЧНОЙ КОМЫ В ДИЕТЕ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ

☐ белки

41. ГАПТЕНОВЫЙ АГРАНУЛОЦИТОЗ МОЖЕТ БЫТЬ СЛЕДСТВИЕМ ПРИЕМА

☐ анальгина

42. АНГУЛЯРНЫЙ СТОМАТИТ И ТРЕЩИНЫ КОЖИ ПРИ ОСМОТРЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ

☐ сидеропеническом синдроме

43. ТРЕХРОСТКОВАЯ ЦИТОПЕНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ дефицита витамина B12

44. ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ФЛУКОНАЗОЛА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ увеличение QT

45. ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЖИРОВОЙ СКЛАДКИ ТЕЛА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ калипер

46. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМИ КЛЕТОЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ САРКОИДНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ клетки Пирогова-Лангханса, эпителиоидные клетки

47. ПРИЧИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ КАМНЕЙ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инфекция *Helicobacter pylori*

48. ПО ХАРАКТЕРИСТИКЕ ЛИКВОРА ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ МЕНИНГИТ НЕОБХОДИМО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С МЕНИНГИТОМ

☐ серозно-вирусным

49. ПРИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ

☐ аторвастатин

Блок: Блок 1 | № 50

50. ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА О ПРОДОЛЖЕНИИ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА ОЦЕНИВАЮТ УРОВЕНЬ

☐ ферритина

Блок: Блок 1 | № 51

51. НАГРУЗОЧНЫЙ ЭКГ-ТЕСТ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ НАЛИЧИЕ

☐ ишемической болезни сердца

Блок: Блок 1 | № 52

52. К ВЕДУЩЕМУ ЭТИОЛОГИЧЕСКОМУ ФАКТОРУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ОТНОСЯТ

☐ *Helicobacter pylori*

Блок: Блок 1 | № 53

53. К ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМАМ БРЮШНОГО ТИФА ОТНОСЯТ

☐ розеолезную сыпь

Блок: Блок 1 | № 54

54. ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО

☐ постепенное развитие

Блок: Блок 1 | № 55

55. ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНЫ ГИПОХРОМИЯ, МИКРОЦИТОЗ

☐ повышение железосвязывающей способности сыворотки

Блок: Блок 1 | № 56

56. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИЕРСИНИОЗОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ иммуноферментный анализ

Блок: Блок 1 | № 57

57. МОКРОТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ВНЕ ОБОСТРЕНИЯ

☐ имеет слизистый характер и белесоватый цвет

Блок: Блок 1 | № 58

58. К БАЗИСНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ОТНОСЯТ

☐ метотрексат

Блок: Блок 1 | № 59

59. ОСНОВНОЙ ГРУППОЙ ПРЕПАРАТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПИЕЛОНЕФРИТА, ЯВЛЯЮТСЯ

☐ антибиотики

Блок: Блок 1 | № 60

60. ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ диффузно неоднородной структурой

Блок: Блок 1 | № 61

61. ПРОГРАММА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ХОБЛ ВКЛЮЧАЕТ

☐ спирометрию

Блок: Блок 1 | № 62

62. ДЛЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ПУЛЬСОВОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение

Блок: Блок 1 | № 63

63. К ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕРЫ ОТНОСЯТ

☐ регидратацию в сочетании с антибактериальной терапией

Блок: Блок 1 | № 64

64. ПРИ СИНДРОМЕ КОННА ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ спиронолактон

Блок: Блок 1 | № 65

65. УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ II СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ (ММ РТ.СТ.)

☐ 170/100

Блок: Блок 1 | № 66

66. ВНЕЗАПНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ГОЛОВНОЙ БОЛИ, РЕЗКОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ТАХИКАРДИЯ, ПОСЛЕ ПРИСТУПА – ПОЛИУРИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ феохромоцитомы

Блок: Блок 1 | № 67

67. ТЕСТОМ ПЕРВОГО УРОВНЯ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АКРОМЕГАЛИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ УРОВНЯ

☐ инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1)

Блок: Блок 1 | № 68

68. ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ С АГ, ПОЛУЧАЮЩИМ ЛЕЧЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА И СТЕПЕНИ РИСКА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ СНИЖАТЬ АД ДО ЗНАЧЕНИЙ МЕНЕЕ (В ММ РТ. СТ)

☐ 140/90

Блок: Блок 1 | № 69

69. ЦВЕТ МОЧИ «МЯСНЫЕ ПОМОИ» ХАРАКТЕРИЗУЕТ

☐ острый гломерулонефрит

Блок: Блок 1 | № 70

70. К ЗАЩИТНОЙ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ОТ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ

☐ клеточный фактор иммунитета

Блок: Блок 1 | № 71

71. ПРОИЗВОДНЫМ АМАНТАДИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тромантадин

Блок: Блок 1 | № 72

72. ДЛЯ ХОБЛ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ (GOLD) ХАРАКТЕРНО ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 (%)

☐ 30-50

Блок: Блок 1 | № 73

73. УВЕЛИЧЕНИЕ PLT БОЛЕЕ 500×10⁹ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ эссенциальной тромбоцитемии

Блок: Блок 1 | № 74

74. ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА ТИФНО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ СОСТАВЛЯЕТ < (В %)

☐ 70

Блок: Блок 1 | № 75

75. МЕТОДОМ СКРИНИНГА РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ

☐ кала на скрытую кровь

Блок: Блок 1 | № 76

76. ГИПЕРСПЛЕНИЗМОМ НАЗЫВАЮТ

☐ интенсификацию элиминации форменных элементов крови

Блок: Блок 1 | № 77

77. ПРИЧИНОЙ ВТОРИЧНОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СЛУЖИТ

☐ снижение секреции адренокортикотропного гормона гипофизом

Блок: Блок 1 | № 78

78. К ПРИЗНАКАМ ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ОТНОСЯТ

☐ наличие гиперхромной анемии в общем анализе крови

Блок: Блок 1 | № 79

79. ДЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ удлиненного выдоха

Блок: Блок 1 | № 80

80. НАИМЕНЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ поликистоз почек

Блок: Блок 1 | № 81

81. ДИСУЛЬФИРАМОПОДОБНАЯ РЕАКЦИЯ НА ФОНЕ ПРИЕМА АЛКОГОЛЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ цефоперазона

Блок: Блок 1 | № 82

82. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА ТУБЕРКУЛЁЗ ПРОВОДИТСЯ С ____ ЛЕТ

☐ 15

Блок: Блок 1 | № 83

83. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕСАДКИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ

☐ ганцикловир

Блок: Блок 1 | № 84

84. КАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ НЕХАРАКТЕРНО ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА?

☐ кристаллы мочевой кислоты в поляризационном свете

Блок: Блок 1 | № 85

85. ПРИЕМ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ У БОЛЬНЫХ ХСН ПРОТИВОПОКАЗАН ПРИ

☐ а-в блокаде II ст.

Блок: Блок 1 | № 86

86. ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ

☐ гломерулонефрита

Блок: Блок 1 | № 87

87. ПОСТЕПЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ИНТЕРВАЛА P-Q(R) С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫПАДЕНИЕМ ЖЕЛУДОЧКОВОГО КОМПЛЕКСА НАЗЫВАЕТСЯ

☐ периодами Самойлова — Венкебаха

Блок: Блок 1 | № 88

88. ТЕРАПИЮ БРОНХОДИЛАТАТОРАМИ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ ХОБЛ ПРОВОДЯТ ДЛЯ

☐ контроля симптомов - краткосрочного или продолжительного уменьшения симптомов

Блок: Блок 1 | № 89

89. К НАРУШЕНИЮ РЕЖИМА ОТНОСИТСЯ

☐ несвоевременная явка на прием

Блок: Блок 1 | № 90

90. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КАРДИОВЕРСИЯ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ОБЫЧНО ЭФФЕКТИВНА, ЕСЛИ ОТ НАЧАЛА ПАРОКСИЗМА ПРОШЛО НЕ БОЛЕЕ (СУТКИ)

☐ 2

Блок: Блок 1 | № 91

91. ДИАГНОЗ «НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ» НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ

☐ болях в эпигастральной области до приема пищи

Блок: Блок 1 | № 92

92. В ОСНОВЕ СИНДРОМА ЗОЛЛИНГЕРА – ЭЛЛИСОНА ЛЕЖИТ ГИПЕРПРОДУКЦИЯ

☐ гастрина

Блок: Блок 1 | № 93

93. К ХАРАКТЕРНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ОСТЕОАРТРОЗА ОТНОСЯТ

☐ субхондральный склероз и остеофиты

Блок: Блок 1 | № 94

94. МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (ФОРМА №025/У), ХРАНИТСЯ

☐ в регистратуре

Блок: Блок 1 | № 95

95. ДЛЯ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА МАЛОХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кровохарканье

Блок: Блок 1 | № 96

96. ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ ДВУСТОРОННЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ТОЛЩИНЫ КОРКОВОГО СЛОЯ ПОЧЕК ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ отека почек

Блок: Блок 1 | № 97

97. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ИНГАЛЯЦИОННЫМИ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ В СТАНДАРТНЫХ ДОЗАХ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ

☐ дисфонии

Блок: Блок 1 | № 98

98. КОЛХИЦИН ПРИ ПОДАГРЕ НАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ

☐ купирования острого артрита

Блок: Блок 1 | № 99

99. ОСНОВОЙ МОРФОГЕНЕЗА САРКОИДОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ иммунная гранулема

Блок: Блок 1 | № 100

100. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ протеинурия более 3,5 г/сут

Блок 2

Блок: Блок 2 | № 101

101. ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ Ig A - НЕФРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ рецидивирующая макрогематурия

Блок: Блок 2 | № 102

102. ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ

☐ глюкозы крови

Блок: Блок 2 | № 103

103. ОСНОВНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингаляционные глюкокортикостероиды

Блок: Блок 2 | № 104

104. НАЛИЧИЕ ЗОБА У ЗНАЧИТЕЛЬНОГО ЧИСЛА ЛИЦ, ЖИВУЩИХ В ОДНОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ЗОБ

☐ эндемический

Блок: Блок 2 | № 105

105. ТЕНДИНИТ И/ЛИ РАЗРЫВ АХИЛЛОВА СУХОЖИЛИЯ МОГУТ РАЗВИТЬСЯ НА ФОНЕ ПРИМЕНЕНИЯ

☐ фторхинолонов

Блок: Блок 2 | № 106

106. ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЮТ

☐ обратившимся за медицинской помощью в медицинскую организацию, если выявлены признаки временной нетрудоспособности

Блок: Блок 2 | № 107

107. ДЛЯ ГРИППА ХАРАКТЕРНЫ

☐ высокая температура, головная боль, миалгии, трахеит

Блок: Блок 2 | № 108

108. ПОД ПАННУСОМ ПОНИМАЮТ

☐ агрессивную грануляционную ткань

Блок: Блок 2 | № 109

109. ЗДОРОВОГО ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В РОДДОМЕ ВАКЦИНИРУЮТ ОТ

☐ гепатита В и туберкулеза

Блок: Блок 2 | № 110

110. ПОБОЧНУЮ РЕАКЦИЮ В ВИДЕ ОТЕКА ЛОДЫЖЕК И СТОП МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ

☐ амлодипин

Блок: Блок 2 | № 111

111. ДЛЯ АКРОМЕГАЛИИ ХАРАКТЕРНО

- ☐ увеличение размеров кистей и стоп

Блок: Блок 2 | № 112

112. ДЕЙСТВИЕМ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ ГРУППЫ ПРОИЗВОДНЫХ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ усиление секреции инсулина поджелудочной железой

Блок: Блок 2 | № 113

113. ПРИ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ АУСКУЛЬТАТИВНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- ☐ ослабленный I тон, систолический шум

Блок: Блок 2 | № 114

114. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОГО ТИПА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- ☐ феохромоцитоме

Блок: Блок 2 | № 115

115. ОДНИМ ИЗ "БОЛЬШИХ" КРИТЕРИЕВ ДИАГНОЗА "ОСТРАЯ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА" ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ полиартрит

Блок: Блок 2 | № 116

116. СПИРОНОЛАКТОН ПРИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СУТОЧНОЙ ДОЗЕ (В МГ)

- ☐ 100-200

Блок: Блок 2 | № 117

117. «МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА (ВРАЧЕБНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)» (ФОРМА N 086/У) ЗАПОЛНЯЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ

- ☐ несовершеннолетних 15 - 17 лет, поступающих на работу

Блок: Блок 2 | № 118

118. МОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ ожирение

Блок: Блок 2 | № 119

119. БЕРОДУАЛ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ комбинацией адреномиметика и холинолитика

Блок: Блок 2 | № 120

120. К АНТИСЕКРЕТОРНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСЯТ

- ☐ H2-гистаминоблокаторы

Блок: Блок 2 | № 121

121. ОДНИМ ИЗ ПЕРВИЧНЫХ БОЛЬШИХ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиподинамия

Блок: Блок 2 | № 122

122. ПРИ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НЕОБХОДИМО НАЗНАЧАТЬ КОМБИНИРОВАННУЮ ТЕРАПИЮ: СТИМУЛЯТОРЫ ЭРИТРОПОЭЗА С ПРЕПАРАТАМИ

☐ железа

Блок: Блок 2 | № 123

123. ДЛЯ ЗАДНЕДИАФРАГМАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОСТРОГО ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНО ПОЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭКГ В ОТВЕДЕНИЯХ

☐ отведениях V1-V6

Блок: Блок 2 | № 124

124. КЛИНИЧЕСКИ ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПОЗВОЛЯЮТ

☐ нарастание желтухи, геморрагический синдром

Блок: Блок 2 | № 125

125. К РАЗВИТИЮ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ГЕНЕЗА МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ

☐ Домперидон

Блок: Блок 2 | № 126

126. ДИАГНОЗ «ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ» ПОДТВЕРЖДЕН ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В БИОПСИЙНОМ МАТЕРИАЛЕ

☐ нарушенного долькового строения

Блок: Блок 2 | № 127

127. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ курение

Блок: Блок 2 | № 128

128. ДОСТОВЕРНЫМ КРИТЕРИЕМ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПРИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ депрессия сегмента ST более чем на 0,1 мВ

Блок: Блок 2 | № 129

129. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ПРИЗНАКОМ ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ <вираж> туберкулиновой пробы

Блок: Блок 2 | № 130

130. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ЭФФЕКТАМИ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ жаропонижающий и противовоспалительный

Блок: Блок 2 | № 131

131. РЕКОМЕНДОВАННАЯ РАЗОВАЯ ДОЗА ИБУПРОФЕНА СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИГРАММАХ)

☐ 200-400

Блок: Блок 2 | № 132

132. ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО БИЛИАРНОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ СПЕЦИФИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение уровня антимитохондриальных антител

Блок: Блок 2 | № 133

133. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ГИБКОЙ БРОНХОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ острый инсульт

Блок: Блок 2 | № 134

134. НЕ СЧИТАЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ РЕЖИМА ПАЦИЕНТОМ, ИМЕЮЩИМ ЛИСТОК ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПРИ

☐ отказе от госпитализации

Блок: Блок 2 | № 135

135. К ТАБЛЕТИРОВАННЫМ САХАРОСНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

☐ Метформин

Блок: Блок 2 | № 136

136. ДИАГНОЗ «ПОДАГРА» МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ НА ОСНОВАНИИ

☐ артрита плюснефалангового сустава

Блок: Блок 2 | № 137

137. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ХОЛЕЦИСТОГРАФИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ непереносимость йодсодержащего контрастного препарата

Блок: Блок 2 | № 138

138. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ВТОРИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ флюорография

Блок: Блок 2 | № 139

139. К ФАКТОРАМ ОБРАЗА ЖИЗНИ, УХУДШАЮЩИМ ЗДОРОВЬЕ ПАЦИЕНТА, ОТНОСЯТ

☐ социальный и психологический дискомфорт

Блок: Блок 2 | № 140

140. СТРАХОВЩИКОМ ПРИ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Блок: Блок 2 | № 141

141. КРОВОХАРКАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

☐ инфарктной пневмонии

Блок: Блок 2 | № 142

142. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ БЕССИМПТОМНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ КАРОТИДНЫХ АРТЕРИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингибиторы АПФ

Блок: Блок 2 | № 143

143. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПРИ НАЛИЧИИ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST НА ЭКГ ПРОВОДИТСЯ МЕЖДУ ИНФАРКТМ МИОКАРДА И

☐ перикардитом

Блок: Блок 2 | № 144

144. ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРИНЯТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КЛАССИФИКАЦИЮ

☐ Killip

Блок: Блок 2 | № 145

145. ПРОДЛЕННАЯ ТРОМБОПРОФИЛАКТИКА ПОКАЗАНА ПРИ

☐ повторном эпизоде неспровоцированной ТЭЛА

Блок: Блок 2 | № 146

146. ДЛЯ БУБОННОЙ ФОРМЫ ЧУМЫ ХАРАКТЕРНЫ

☐ гиперемия кожи над бубоном и болезненность при пальпации

Блок: Блок 2 | № 147

147. ГРАЖДАНИНУ, ПРИЗНАННОМУ БЕЗРАБОТНЫМ, ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ

☐ справка

Блок: Блок 2 | № 148

148. ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ, НАЗЫВАЕТСЯ

☐ патологической пораженностью

Блок: Блок 2 | № 149

149. К ИСТОЧНИКАМ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ОТНОСЯТ

☐ оливковое масло

Блок: Блок 2 | № 150

150. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА НАЛИЧИЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ПРОВОДИТСЯ _____ ИССЛЕДОВАНИЕ

☐ эндоскопическое

Блок: Блок 2 | № 151

151. ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ, ОСЛОЖНЕННОМ ГИПОВОЛЕМИЧЕСКИМ ШОКОМ, НЕОБХОДИМО

☐ струйное введение полиионных растворов

Блок: Блок 2 | № 152

152. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ЛЕГКИХ - ФОРСИРОВАННЫЙ ВЫДОХ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ

☐ выявления скрытой бронхиальной обструкции

Блок: Блок 2 | № 153

153. ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ отягощенная наследственность

Блок: Блок 2 | № 154

154. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 39 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В ____

☐ 3 года

Блок: Блок 2 | № 155

155. УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

☐ Фенотерола

Блок: Блок 2 | № 156

156. У БОЛЬНЫХ С ИБС, ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ НИЗКИХ ДОЗ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ

☐ уменьшает риск повторных ИМ

Блок: Блок 2 | № 157

157. В БЛОКЕ «ПО УХОДУ» ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 2 СТРОКИ В СЛУЧАЕ УХОДА ЗА ДВУМЯ ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ, В КАЖДОЙ СТРОКЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО

☐ возраст, родственная связь, фамилия, имя, отчество

Блок: Блок 2 | № 158

158. К АЛЬВЕОЛИТАМ ОТНОСИТСЯ

☐ токсический альвеолит

Блок: Блок 2 | № 159

159. НАИБОЛЬШИМ УЛЬЦЕРОГЕННЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ

☐ кеторолак

Блок: Блок 2 | № 160

160. ПРИЧИНОЙ ОДНОСТОРОННЕГО СМОРЩИВАНИЯ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пиелонефрит

Блок: Блок 2 | № 161

161. ПОЯВЛЕНИЕ В МОЧЕ БЕЛКА БЕНС-ДЖОНСА СЧИТАЕТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ИНФОРМАТИВНЫМ ДЛЯ

☐ миеломной нефропатии

Блок: Блок 2 | № 162

162. ОСТРУЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ В «ПЕРИОДЕ СЕРОЛОГИЧЕСКОГО ОКНА» МОЖНО ПОДТВЕРДИТЬ ПО

☐ наличию белка р24 и РНК ВИЧ в сыворотке крови

Блок: Блок 2 | № 163

163. ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ АКРОМЕГАЛИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

☐ аналоги соматостатина

Блок: Блок 2 | № 164

164. МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ СИСТЕМНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА У

☐ бетаметазона дипропионата

Блок: Блок 2 | № 165

165. К БОЛЬШИМ ФАКТОРАМ РИСКА (ПО ШКАЛЕ CHA2DS2-VASC 2 БАЛЛА) ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ОТНОСЯТ

☐ возраст 75 лет и старше

Блок: Блок 2 | № 166

166. АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К ГЕМОДИАЛИЗУ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ уровень К крови более 6,0 ммоль/л на фоне ЭКГ- изменений

Блок: Блок 2 | № 167

167. МЕТОТРЕКСАТ ВЫЗЫВАЕТ ДЕФИЦИТ

☐ фолиевой кислоты

Блок: Блок 2 | № 168

168. МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ МАЛОЙ ВЫБОРКЕ СОСТАВЛЯЕТ

☐ менее 30

Блок: Блок 2 | № 169

169. КЛОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВКА Т-ЛИМФОЦИТОВ ПРОИСХОДИТ В

☐ тимусе

Блок: Блок 2 | № 170

170. СИДЕРОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ pica chlorotica

Блок: Блок 2 | № 171

171. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ИСХОДНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА В ПОЧКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ сосочковая зона

Блок: Блок 2 | № 172

172. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХОЛЕРОЙ I СТЕПЕНИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ Глюкосолан

Блок: Блок 2 | № 173

173. К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОТНОСЯТ

☐ лейкоцитоз, абсолютный лимфоцитоз

Блок: Блок 2 | № 174

174. НАИБОЛЕЕ РАННИМ СИМПТОМОМ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ РАКА В КАРДИАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дисфагия

Блок: Блок 2 | № 175

175. ШУМ ПРИ МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

☐ проводится в левую подмышечную область

Блок: Блок 2 | № 176

176. ВЕДУЩИМ ИНФЕКЦИОННЫМ АГЕНТОМ В РАЗВИТИИ ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кишечная палочка

Блок: Блок 2 | № 177

177. ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ЗАРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ больные туберкулезом люди

Блок: Блок 2 | № 178

178. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА ЦЕЛЕСООБРАЗНО СДЕЛАТЬ РЕНТГЕНОГРАММЫ

☐ позвоночника

Блок: Блок 2 | № 179

179. ВРЕМЯ НАЧАЛА АНТИАНГИНАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ПРИ СУБЛИНГВАЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ НИТРОГЛИЦЕРИНА СОСТАВЛЯЕТ (В МИНУТАХ)

☐ 2-3

Блок: Блок 2 | № 180

180. РЕЗКО ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ И ГАММАГЛУТАМИНТРАНСПЕПТИДАЗЫ ПРИ

☐ билиарном циррозе печени

Блок: Блок 2 | № 181

181. НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ЗОЛЛИНГЕРА-ЭЛЛИСОНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ уровень гастрина в крови

Блок: Блок 2 | № 182

182. ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ЛПНП ДЛЯ ПАЦИЕНТА, ПЕРЕНЕСШЕГО ИНФАРКТ МИОКАРДА, СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ (В ММОЛЬ/Л)

☐ 1,4

Блок: Блок 2 | № 183

183. ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ выраженная синусовая брадикардия

Блок: Блок 2 | № 184

184. ПРЕПАРАТОМ, НАЗНАЧАЕМОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Цианокобаламин

Блок: Блок 2 | № 185

185. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДОМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ У ЛИЦ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА КАРДИОМИОПАТИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ трансторакальная ЭхоКГ

Блок: Блок 2 | № 186

186. К ВРОЖДЕННЫМ СИСТЕМНЫМ ФАКТОРАМ ТРОМБОЗА ВОРОТНОЙ ВЕНЫ И ЕЕ ВЕТВЕЙ ОТНОСИТСЯ ДЕФИЦИТ

☐ протеинов С и S

Блок: Блок 2 | № 187

187. ПРИ ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ СТЕНОКАРДИИ ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ БЛОКАТОРЫ

☐ медленных кальциевых каналов

Блок: Блок 2 | № 188

188. К ОГРАНИЧЕНИЮ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ ОТНОСЯТ _____ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ

☐ неспособность и полную зависимость от других лиц

Блок: Блок 2 | № 189

189. БОЛИ В ЭПИГАСТРИИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ ПРИЕМА ПИЩИ, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ язвы двенадцатиперстной кишки

Блок: Блок 2 | № 190

190. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАЦИОНАРЕ НА ВТОРОМ УРОВНЕ ПРОВОДИТСЯ

☐ заведующим отделением

Блок: Блок 2 | № 191

191. «БОЛЬШИМ» КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА «ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ» ЯВЛЯЕТСЯ

☐ выявление вегетации на клапанах при ЭхоКГ-исследовании

Блок: Блок 2 | № 192

192. ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ ВЫЗЫВАЕТСЯ

☐ герпесвирусами

Блок: Блок 2 | № 193

193. НАПРАВЛЕНИЕ НА СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЫДАЕТСЯ БЕРЕМЕННОЙ ПРИ НАЛИЧИИ

☐ артериальной гипертензии

Блок: Блок 2 | № 194

194. ПОКАЗАТЕЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ОПЕРАТИВНОСТЬ РАБОТЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ своевременность выезда бригад скорой медицинской помощи

Блок: Блок 2 | № 195

195. К ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ПОВЫШАЮЩИМ РИСК РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА, ОТНОСИТСЯ

☐ язвенная болезнь желудка и ДПК

Блок: Блок 2 | № 196

196. НЕОБРАТИМЫМ МЕХАНИЗМОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фиброз бронхов

Блок: Блок 2 | № 197

197. ОСНОВНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ДОКУМЕНТОМ СТАЦИОНАРА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ медицинская карта стационарного больного

Блок: Блок 2 | № 198

198. СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ, ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, КОРОНАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ОДЫШКА ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ

☐ гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) с обструкцией выносящего тракта левого желудочка (ЛЖ)

Блок: Блок 2 | № 199

199. ЗАСТРАХОВАННЫМ В СИСТЕМЕ ОМС ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гражданин РФ

Блок: Блок 2 | № 200

200. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ прибавка массы тела

Блок 3

Блок: Блок 3 | № 201

201. ПРОБА МАНТУ СЧИТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРИ РАЗМЕРАХ ПАПУЛЫ БОЛЕЕ (ММ)

☐ 5

Блок: Блок 3 | № 202

202. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ инсулина

Блок: Блок 3 | № 203

203. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ВАЖНО ОПРЕДЕЛЯТЬ

☐ метанефрины в крови или в моче

Блок: Блок 3 | № 204

204. КАЗЕОЗНЫЙ НЕКРОЗ СПЕЦИФИЧЕН ДЛЯ

☐ туберкулёза

Блок: Блок 3 | № 205

205. К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ДИФТЕРИИ НОСА ОТНОСЯТ

☐ сукровичное выделения из носового хода

Блок: Блок 3 | № 206

206. НАИБОЛЕЕ ВЕРНОЙ ТАКТИКОЙ ПРИ ОСТРОМ ПЕРЕДНЕМ ТРАНСМУРАЛЬНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА, ОСЛОЖНИВШЕМСЯ РАЗВИТИЕМ ПОЛНОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ С ЧАСТОТОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОГО РИТМА 24 В МИНУТУ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ установка эндокардиального электрода и проведение временной кардиостимуляции

Блок: Блок 3 | № 207

207. ОДНИМ ИЗ КРИТЕРИЕВ ГИПЕРТРОФИИ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ выраженное отклонение оси QRS вправо

Блок: Блок 3 | № 208

208. НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ К ПРИНЦИПАМ ЛЕЧЕНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ОТНОСЯТ

☐ борьбу с гипераммониемией

Блок: Блок 3 | № 209

209. ПРИ ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШЕМ ПАРОКСИЗМЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ, ДЛЯЩЕМСЯ 2 ЧАСА, ПРАВИЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ активное восстановление синусового ритма в течение первых двух суток (вплоть до электроимпульсной терапии)

Блок: Блок 3 | № 210

210. ДЛЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ (СКВ) ВЕРНО УТВЕРЖДЕНИЕ

☐ болезнь молодых женщин

Блок: Блок 3 | № 211

211. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ» БОЛЬНОГО СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В ЦЕНТР

☐ профпатологии

Блок: Блок 3 | № 212

212. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕПРЯМЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ

☐ международное нормализованное отношение

Блок: Блок 3 | № 213

213. ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЮТ ОСТРУЮ ПОЧЕЧНУЮ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

☐ аминогликозиды

Блок: Блок 3 | № 214

214. ПРИ ОРВИ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

☐ Парацетамола

Блок: Блок 3 | № 215

215. НАЧАЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ образование микроаневризм сосудов сетчатки

Блок: Блок 3 | № 216

216. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ беременность

Блок: Блок 3 | № 217

217. СУХИЕ СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ НАД ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЁГКИХ ВЫСЛУШИВАЮТСЯ ПРИ

☐ нарушении бронхиальной проходимости

Блок: Блок 3 | № 218

218. ПОКАЗАНИЯМИ К ИМПЛАНТАЦИИ ПОСТОЯННОГО ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ паузы более 3 секунд (при отсутствии ятрогений), сопровождающиеся синкопальными состояниями

Блок: Блок 3 | № 219

219. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ МИОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ биопсия миокарда

Блок: Блок 3 | № 220

220. К ВИДАМ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОТНОСЯТ

☐ федеральную, территориальную

Блок: Блок 3 | № 221

221. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ТРАХЕОБРОНХИАЛЬНОЙ ДИСКИНЕЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фибробронхоскопия

Блок: Блок 3 | № 222

222. ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ВАРФАРИНОМ ОПРЕДЕЛЯЮТ

☐ МНО

Блок: Блок 3 | № 223

223. СЕМЕЙНАЯ ЭМФИЗЕМА ЛЕГКИХ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНА С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

☐ **α1-антитрипсина**

Блок: Блок 3 | № 224

224. НАИБОЛЬШЕЙ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ **парацетамол**

Блок: Блок 3 | № 225

225. ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ПАЦИЕНТА 35 ЛЕТ НЕСПОРТИВНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ РАВНЫЙ 34,0 КГ/М² СООТВЕТСТВУЕТ СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ

☐ **I**

Блок: Блок 3 | № 226

226. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ

☐ **влажных звучных мелкопузырчатых хрипов**

Блок: Блок 3 | № 227

227. К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ОТНОСЯТ ЛИХОРАДКУ И

☐ **тонзиллит, гепатоспленомегалию, полилимфаденопатию**

Блок: Блок 3 | № 228

228. ТОЛЕРАНТНОСТЬ К УГЛЕВОДАМ УХУДШАЮТ

☐ **глюкокортикостероиды**

Блок: Блок 3 | № 229

229. КУРЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ У ПЛОДА

☐ **внутриутробной гипоксии**

Блок: Блок 3 | № 230

230. ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ РАЗНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ

☐ **критерий Стьюдента**

Блок: Блок 3 | № 231

231. НАИБОЛЕЕ РЕСУРСООЕМКИМ ВИДОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОМОЩЬ

☐ **специализированная**

Блок: Блок 3 | № 232

232. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В СОМНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД

☐ **коронарографии**

Блок: Блок 3 | № 233

233. ПРИЗНАКОМ СОПУТСТВУЮЩЕГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С НИЖНИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА МОЖЕТ БЫТЬ

☐ подъем сегмента ST в отведении V4 (R)

Блок: Блок 3 | № 234

234. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ АРИТМОГЕННОЙ ПРИРОДЫ СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ В ТЕЧЕНИЕ (В ЧАСАХ)

☐ 72

Блок: Блок 3 | № 235

235. ТРЕТЬЕЙ А СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ХБП 3А) СООТВЕТСТВУЕТ СКФ (МЛ/МИН/1,73 М²)

☐ 45-59

Блок: Блок 3 | № 236

236. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ АБСЦЕССА ЛЕГКИХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ С

☐ кавернозным туберкулёзом лёгких

Блок: Блок 3 | № 237

237. ФОРМОЙ ТУБЕРКУЛЕЗА, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ РАЗВИТИЮ ИНФИЛЬТРАТА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ очаговая

Блок: Блок 3 | № 238

238. ИЗ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ДЛЯ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ

☐ эзофагита

Блок: Блок 3 | № 239

239. ПРИ СНИЖЕНИИ СРЕДНЕЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ БОЛЬНОГО НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОЙКЕ (ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ) ОБОРОТ КОЙКИ

☐ увеличится

Блок: Блок 3 | № 240

240. ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ БУБОНА ПРИ ЧУМЕ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ гиперемия кожи, периденит, резкая болезненность

Блок: Блок 3 | № 241

241. АСИММЕТРИЧНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ гипертрофической кардиомиопатии

Блок: Блок 3 | № 242

242. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДИАГНОСТИКЕ НЕКЛАССИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ 17-гидроксипрогестерон

Блок: Блок 3 | № 243

243. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ФОРМЫ ЭРИТРОЦИТОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ЖДА?

☐ микроциты, пойкилоцитоз

Блок: Блок 3 | № 244

244. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВЕСТИ

☐ тонкоигольную пункционную биопсию

Блок: Блок 3 | № 245

245. ЕСЛИ НА ЭКГ ИНТЕРВАЛЫ МЕЖДУ КОМПЛЕКСАМИ QRS СОСЕДНИХ ЦИКЛОВ ОТЛИЧАЮТСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%, ЗУБЦЫ R ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕД КАЖДЫМ КОМПЛЕКСОМ QRS, МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ РИТМ

☐ синусовый, регулярный

Блок: Блок 3 | № 246

246. ТИРЕОЛИБЕРИН СИНТЕЗИРУЕТСЯ В

☐ гипоталамусе

Блок: Блок 3 | № 247

247. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С СИНДРОМОМ ГИПЕРСПЛЕНИЗМА ОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение содержания тромбоцитов менее $50 \times 10^9/\text{л}$

Блок: Блок 3 | № 248

248. СУХИЕ СВИСТЯЩИЕ ХРИПЫ НАД ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ФЕНОМЕНОМ

☐ нарушения бронхиальной проходимости

Блок: Блок 3 | № 249

249. К ПОЗДНО ВЫЯВЛЕННОЙ ФОРМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ ____ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

☐ фиброзно-кавернозный

Блок: Блок 3 | № 250

250. ВЫЯВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ АД ДО 160/100 ММ РТ.СТ., ЧСС 76 В МИН, ИЗВИСТОСТИ СОСУДОВ ГЛАЗНОГО ДНА И СУЖЕНИЯ АРТЕРИОЛ, ПРИЗНАКОВ ГЛЖ НА ЭКГ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ САХ, КРЕАТИНИНА И ЭЛЕКТРОЛИТОВ КРОВИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ В ПОЛЬЗУ

☐ эссенциальной артериальной гипертензии (гипертоническая болезнь) II стадии

Блок: Блок 3 | № 251

251. К РЕСПИРАТОРНЫМ ФТОРХИНОЛОНАМ ОТНОСИТСЯ

☐ левофлоксацин

Блок: Блок 3 | № 252

252. ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ СЕНСОРНОГО ТИПА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижением чувствительности

Блок: Блок 3 | № 253

253. НАИБОЛЕЕ РАННИМ ПРИ АМИЛОИДОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ протеинурия

Блок: Блок 3 | № 254

254. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ лучевой (флюорография)

Блок: Блок 3 | № 255

255. К ФАКТОРАМ РИСКА, ПОВЫШАЮЩИМ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТ

☐ артериальную гипертензию

Блок: Блок 3 | № 256

256. СТАРТОВАЯ ДОЗА ЭНАЛАПРИЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ ___ МГ ___ РАЗА В ДЕНЬ

☐ 2,5; 2

Блок: Блок 3 | № 257

257. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДВС СИНДРОМА ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ свежезамороженную плазму

Блок: Блок 3 | № 258

258. УЗЕЛКИ БУШАРА ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ ОСТЕОАРТРОЗА

☐ проксимальных межфаланговых суставов кисти

Блок: Блок 3 | № 259

259. ДЛЯ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ХАРАКТЕРНО

☐ частое присутствие крови в кале

Блок: Блок 3 | № 260

260. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА СОСТАВЛЯЮТ

☐ 45-50 дней

Блок: Блок 3 | № 261

261. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БИЛИАРНОГО СЛАДЖА (ПЕРВОЙ СТАДИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ) ЯВЛЯЕТСЯ

☐ урсодезоксихолевая кислота

Блок: Блок 3 | № 262

262. АССИМЕТРИЧНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ гипертрофической кардиомиопатии

Блок: Блок 3 | № 263

263. БАЗОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ВСЕХ БОЛЬНЫХ СО СТЕНОКАРДИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ, НАРЯДУ СО СТАНДАРТНЫМИ АНАЛИЗАМИ КРОВИ, ЭКГ В ПОКОЕ, ЭХОКГ, РЕНТГЕНОГРАФИЕЙ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ

☐ визуализирующий нагрузочный тест

Блок: Блок 3 | № 264

264. ПОКАЗАНИЕМ К ЭКСТРЕННОМУ ХИРУРГИЧЕСКОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ перфорация и/или кишечная обструкция

Блок: Блок 3 | № 265

265. ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИХОДИТСЯ С

☐ распадающимся раком легкого

Блок: Блок 3 | № 266

266. ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ

☐ распространённость заболеваний среди населения

Блок: Блок 3 | № 267

267. ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТА УДОСТОВЕРЯЕТ СПРАВКА

☐ Ф.095-у

Блок: Блок 3 | № 268

268. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ Фентоламин

Блок: Блок 3 | № 269

269. ПЕРЕДОЗИРОВКА СИМПАТОМИМЕТИКОВ ВЫЗЫВАЕТ

☐ выраженную вазоконстрикцию

Блок: Блок 3 | № 270

270. ПРИ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЛАБИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

☐ Лактулоза

Блок: Блок 3 | № 271

271. ПРИ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИИ ВРАЧУ-ТЕРАПЕВТУ УЧАСТКОВОМУ СЛЕДУЕТ

☐ направить больного на стационарное лечение

Блок: Блок 3 | № 272

272. ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ СТРЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА РАЗВИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ

☐ 2-3 недели

Блок: Блок 3 | № 273

273. АУТОИММУННЫЙ МЕХАНИЗМ ВОСПАЛЕНИЯ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ ревматоидного артрита

Блок: Блок 3 | № 274

274. НАИБОЛЬШИЙ РИСК РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ изолированной систолической АГ

Блок: Блок 3 | № 275

275. КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ FACIES NEFRITICA ЯВЛЯЕТСЯ

☐ отек лица и бледность кожи

Блок: Блок 3 | № 276

276. ОСНОВНОЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ИНВОЛЮТИВНОЙ ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ ИМЕЕТ

☐ деградация эластической ткани легкого

Блок: Блок 3 | № 277

277. КЛЕТКИ БОТКИНА-ГУМПРЕХТА ВЫЯВЛЯЮТСЯ ПРИ

☐ хроническом лимфолейкозе

Блок: Блок 3 | № 278

278. К ПРИЗНАКАМ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТНОСЯТ

☐ приступы сердечной астмы

Блок: Блок 3 | № 279

279. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ: ОСЛОЖНЕНИЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА В ВИДЕ

☐ вторичного амилоидоза

Блок: Блок 3 | № 280

280. ОСНОВНЫМ В ЛЕЧЕНИИ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

☐ противодифтерийной сыворотки

Блок: Блок 3 | № 281

281. СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ

☐ представляет собой единую систему учета и отчетности в здравоохранении

Блок: Блок 3 | № 282

282. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МОКРОТЫ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ВЫЯВЛЯЮТ

☐ кристаллы Шарко – Лейдена

Блок: Блок 3 | № 283

283. ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНУЮ РЕФЛЮКСНУЮ БОЛЕЗНЬ В ФОРМЕ

☐ рефлюкс-эзофагита

Блок: Блок 3 | № 284

284. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЦИТОСТАТИЧЕСКОГО АГРАНУЛОЦИТОЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ антибиотики, антисептики и колониестимулирующий фактор

Блок: Блок 3 | № 285

285. ПАЦИЕНТУ С ОТЕКОМ ЛЕГКИХ, РАЗВИВШЕМОУСЯ НА ФОНЕ ПАРОКСИЗМА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ, ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ электрокардиоверсии

Блок: Блок 3 | № 286

286. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ХАРАКТЕРНЫ

☐ рвота, жидкий, пенистый, зловонный водянистый стул зеленоватого цвета, диффузные боли в животе, высокая температура

Блок: Блок 3 | № 287

287. В БИОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК ОТРАЖАЕТ УРОВЕНЬ

☐ креатинина

Блок: Блок 3 | № 288

288. ОДНИМ ИЗ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИНВАЛИДОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма

Блок: Блок 3 | № 289

289. НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ определение уровня ферритина

Блок: Блок 3 | № 290

290. ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ПАРАЛИЧИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ полиомиелита

Блок: Блок 3 | № 291

291. К ОСТРО ПРОГРЕССИРУЮЩЕМУ ТУБЕРКУЛЁЗУ ЛЁГКИХ ОТНОСИТСЯ

☐ милиарный

Блок: Блок 3 | № 292

292. ТОЧКА БОТКИНА-ЭРБА, РАСПОЛАГАЮЩАЯСЯ В МЕСТЕ ПРИКРЕПЛЕНИЯ IV РЕБРА СЛЕВА ОТ ГРУДИНЫ, СЛУЖИТ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВЫСЛУШИВАНИЯ КЛАПАНА

☐ аортального

Блок: Блок 3 | № 293

293. СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ УРОВНЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ЕСЛИ ЗНАЧЕНИЯ САД И ДАД ПОПАДАЮТ В РАЗНЫЕ КАТЕГОРИИ, ТО СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО

☐ более высокой категории

Блок: Блок 3 | № 294

294. АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНАЯ БЛОКАДА 2 СТЕПЕНИ ТИПА МОБИТЦ 1 ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ постепенным удлинением PQ с периодическим выпадением QRS

Блок: Блок 3 | № 295

295. ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие отёков

Блок: Блок 3 | № 296

296. К ТИПИЧНОЙ ПРИЧИНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСЯТ

☐ тромбоз коронарной артерии вследствие надрыва атеросклеротической бляшки

Блок: Блок 3 | № 297

297. У БОЛЬНЫХ С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

☐ систолическое АД повышается, а диастолическое АД снижается

Блок: Блок 3 | № 298

298. ДВУСТОРОННЯЯ КРЕПИТАЦИЯ В ЛЁГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ПРИ

☐ фиброзирующем альвеолите

Блок: Блок 3 | № 299

299. ДЛИТЕЛЬНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ПОРОКА СЕРДЦА ПРИ СТЕНОЗЕ УСТЬЯ АОРТЫ ДОСТИГАЕТСЯ ЗА СЧЁТ ГИПЕРФУНКЦИИ

☐ левого желудочка

Блок: Блок 3 | № 300

300. В СЛУЧАЕ БЫТОВОЙ ТРАВМЫ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЁТСЯ С ____ ДНЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

☐ первого

Блок 4

Блок: Блок 4 | № 301

301. УВЕЛИЧЕНИЕ РЕТИКУЛОЦИТОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ гемолитических анемиях

Блок: Блок 4 | № 302

302. ВЕДУЩИМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ В РАЗВИТИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ окислительный стресс

Блок: Блок 4 | № 303

303. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ У 24-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ С ЛИХОРАДКОЙ, ОЗНОБОМ, БОЛЬЮ В ПОЯСНИЦЕ, УРОВНЕМ ГЕМОГЛОБИНА 7 Г/Л И ГАПТОГЛОБИНОМ НИЖЕ НОРМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ «внутрисосудистый гемолиз»

Блок: Блок 4 | № 304

304. К ПРЕПАРАТАМ, УЛУЧШАЮЩИМ СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА, ОТНОСЯТ

☐ добутамин

Блок: Блок 4 | № 305

305. ОБЪЕКТОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ все жители территории

Блок: Блок 4 | № 306

306. ПРИЁМ СТАТИНОВ СЛЕДУЕТ ОТМЕНИТЬ ЛИБО УМЕНЬШИТЬ ИХ ДОЗИРОВКУ ПРИ ПОВЫШЕНИИ АКТИВНОСТИ ТРАНСАМИНАЗ В КРОВИ ВЫШЕ НОРМЫ В

☐ 3 раза

Блок: Блок 4 | № 307

307. К АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ДАННЫМ ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ

☐ сухие свистящие хрипы

Блок: Блок 4 | № 308

308. ОСЛОЖНЕНИЕМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пенетрация

Блок: Блок 4 | № 309

309. СКРИНИНГ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ

☐ не позднее, чем через 5 лет от дебюта сахарного диабета

Блок: Блок 4 | № 310

310. К МЕТОДАМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСЯТ

☐ изготовление санитарных бюллетеней по профилактике инфекционных болезней

Блок: Блок 4 | № 311

311. ЧАСТОТА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ ЛЁГКОЙ И СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В

☐ год

Блок: Блок 4 | № 312

312. АУСКУЛЬТАТИВНАЯ КАРТИНА ПРИ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ СЕРДЦА ВКЛЮЧАЕТ

☐ усиление первого тона и диастолический шум

Блок: Блок 4 | № 313

313. К ОСНОВНЫМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ», НЕ ОТНОСИТСЯ

☐ дуоденальное зондирование

Блок: Блок 4 | № 314

314. ДЛЯ ПЕРВОГО ПОДАГРИЧЕСКОГО ПРИСТУПА ТИПИЧНО ПОРАЖЕНИЕ СУСТАВОВ

☐ плюснефаланговых

Блок: Блок 4 | № 315

315. ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ БРОНХИТОМ ЧАЩЕ ВСЕГО МОЖНО ВЫСЛУШАТЬ

☐ сухие хрипы

Блок: Блок 4 | № 316

316. ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРЫМ БОЛЬНОЙ СТРАДАЕТ В ТЕЧЕНИЕ РЯДА ЛЕТ И ЕЖЕГОДНО ОБРАЩАЕТСЯ К ВРАЧУ ПОЛИКЛИНИКИ, ВОЙДЁТ В СТАТИСТИКУ

☐ общей заболеваемости

Блок: Блок 4 | № 317

317. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК ДЛЯ ВЫПИСЫВАНИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЕН (ДНЕЙ)

☐ 15

Блок: Блок 4 | № 318

318. ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ СЕПСИСЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ билатеральными инфильтратами на рентгенограмме

Блок: Блок 4 | № 319

319. ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гастроэнтерит

Блок: Блок 4 | № 320

320. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

☐ на общих основаниях

Блок: Блок 4 | № 321

321. К ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДИФFUЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА ОТНОСЯТ

☐ тахикардию

Блок: Блок 4 | № 322

322. ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ВИДЕ

☐ сухих хрипов

323. ЛИПОПРОТЕИНЫ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

- ☐ обеспечивают выведение холестерина из периферических тканей

324. ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С ПРИМЕНЕНИЯ

- ☐ ингаляционных глюкокортикостероидов

325. ПРИ ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОКАРДИИ ПРОБА С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ СЧИТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРИ

- ☐ появлении боли или стеснения в груди в сочетании с депрессией сегмента ST $\geq 0,1$ мВ

326. В ЛЕЧЕНИИ ГИПОКИНЕТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

- ☐ холекинетики

327. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ спирометрия

328. ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ СНИЖЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ гипопротромбинемия

329. БРОНХОДИЛАТАЦИОННЫЙ ТЕСТ СЧИТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ, ЕСЛИ ПОСЛЕ ИНГАЛЯЦИИ БРОНХОДИЛАТОРА КОЭФФИЦИЕНТ БРОНХОДИЛАТАЦИИ (КБД) ДОСТИГАЕТ ИЛИ ПРЕВЫШАЕТ (%)

- ☐ 12

330. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ПРИ ПОВТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ ЗНАЧЕНИЯ АД 160/100 ММ РТ.СТ., 158/105 ММ РТ.СТ., 150/100 ММ РТ.СТ., 165/105 ММ РТ.СТ. СООТВЕТСТВУЮТ

- ☐ артериальной гипертензии 2 степени

331. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА КАКОЙ-ЛИБО ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ

- ☐ темп прироста

332. ОСНОВНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ МИОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ повышение титра миокардиальных ферментов

333. К I ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ПО ИТОГАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОТНОСЯТСЯ ПАЦИЕНТЫ

- ☐ здоровые, в том числе имеющие факторы риска при низком и среднем сердечно-сосудистом риске

334. НАИБОЛЬШУЮ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ ШОКЕ У БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ ИМЕЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- ☐ прокальцитонина

335. У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ, ВОЗРАСТАЕТ ЧАСТОТА ПНЕВМОНИЙ, ВЫЗВАННЫХ

- ☐ клебсиеллой

336. ТЯЖЕЛАЯ ТРАНСМУРАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НА ЭКГ

- ☐ элевацией сегмента ST

337. К ПЕРВИЧНОМУ ТУБЕРКУЛЕЗУ ОТНОСИТСЯ

- ☐ туберкулёзная интоксикация у детей и подростков

338. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОБШИРНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ нарушение ритма

339. ГРУППОЙ АНТИБИОТИКОВ, НЕ ПОКАЗАННЫХ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ, ЯВЛЯЮТСЯ

- ☐ аминогликозиды

340. ПРИ ПОСТАНОВКЕ ДИАГНОЗА «ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ» ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ

- ☐ спирометрии

341. ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ВТОРЫМ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ КЛАССОМ В ПОДОСТРЫЙ ПЕРИОД ИНФАРКТА МИОКАРДА ВКЛЮЧАЕТ КРАТКОВРЕМЕННОЕ

- ☐ (до 10 мин) участие в несостязательных спортивных играх (волейбол, настольный теннис, бадминтон)

342. ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ТИРЕОСТАТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ лейкопения

Блок: Блок 4 | № 343

343. А1-АНТИТРИПСИН МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ТЕРАПИИ

☐ первичной эмфиземы легких

Блок: Блок 4 | № 344

344. ГОРМОНОМ ПЕРЕДНЕЙ ДОЛИ ГИПОФИЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ соматотропный гормон

Блок: Блок 4 | № 345

345. ПРИ КВАШИОРКОРЕ ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЕТСЯ

☐ отёк

Блок: Блок 4 | № 346

346. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ЗОЛЛИНГЕРА-ЭЛЛИСОНА ВАЖНО ИССЛЕДОВАНИЕ

☐ уровня сывороточного гастрина

Блок: Блок 4 | № 347

347. ЭКССУДАТ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ ПЛЕВРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

☐ лимфоцитарным

Блок: Блок 4 | № 348

348. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КАЛЬПРОТЕКТИНА В КАЛЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

☐ воспалительном заболевании кишечника

Блок: Блок 4 | № 349

349. ВНУТРИВЕННАЯ ИНФУЗИЯ АМИОДАРОНА ПОКАЗАНА ПРИ

☐ желудочковой тахикардии

Блок: Блок 4 | № 350

350. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ НЕДИГИДРОПИРИДИНОВОГО РЯДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ атриовентрикулярная блокада 2-3 степени

Блок: Блок 4 | № 351

351. К ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА У ПАЦИЕНТА 55 ЛЕТ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ III СТАДИИ, ПЕРЕНЕСШЕГО НЕДАВНО ИНФАРКТ МИОКАРДА, ОТНОСЯТ

☐ В-адреноблокаторы

Блок: Блок 4 | № 352

352. ОСНОВНЫМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ В РАЗВИТИИ АУТОИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ выработка аутоантитромбоцитарных антител

Блок: Блок 4 | № 353

353. ПЕРВОЙ ЛИНИЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ МИКРОПРОЛАКТИНОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ медикаментозная терапия

Блок: Блок 4 | № 354

354. ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ СТИМУЛИРУЕТ

☐ гастрин

Блок: Блок 4 | № 355

355. ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКЕ ПОЛИКЛИНИК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ МЕТОД

☐ экспертных оценок

Блок: Блок 4 | № 356

356. НАИБОЛЕЕ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВИД РЕАБИЛИТАЦИИ ОКАЗЫВАЕТСЯ В

☐ поликлинике

Блок: Блок 4 | № 357

357. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИНУСОВОГО РИТМА БЕЗ ПОДГОТОВКИ АНТИКОАГУЛЯНТАМИ ВОЗМОЖНО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ МЕНЕЕ

☐ 48 часов

Блок: Блок 4 | № 358

358. В ПРОЦЕССЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОПРЕДЕЛЯЮТ УРОВЕНЬ

☐ гликированного гемоглобина

Блок: Блок 4 | № 359

359. СТАТИСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ число случаев ЗВУТ на 100 работающих

Блок: Блок 4 | № 360

360. СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - ЭТО

☐ комплекс мероприятий, направленный на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг

Блок: Блок 4 | № 361

361. ОСТОРОЖНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТИАЗИДНЫХ ДИУРЕТИКОВ ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ОБУСЛОВЛЕНО НАЛИЧИЕМ

☐ подагры

Блок: Блок 4 | № 362

362. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АСЦИТА НА ФОНЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ НЕОБХОДИМО

☐ соблюдение диеты с содержанием поваренной соли менее 3 г/сут

Блок: Блок 4 | № 363

363. ДИСПАНСЕРНОМУ ПАЦИЕНТУ ПЕРЕД НАПРАВЛЕНИЕМ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМО

☐ пройти обследование

Блок: Блок 4 | № 364

364. СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОПУХОЛИ ПОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ультразвуковое исследование

Блок: Блок 4 | № 365

365. ВЕРОЯТНОСТЬ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ

☐ гипокалиемии

Блок: Блок 4 | № 366

366. ЦЕЛЮ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ уменьшение скорости прогрессирования болезни

Блок: Блок 4 | № 367

367. ТИПИЧНЫМ ВАРИАНТОМ ТЕЧЕНИЯ ШИГЕЛЛЁЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ колитический

Блок: Блок 4 | № 368

368. ГИПОКАЛИЕМИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОЯВЛЯЕТСЯ У БОЛЬНЫХ С

☐ первичным гиперальдостеронизмом

Блок: Блок 4 | № 369

369. ПРЕПАРАТАМИ, СНИЖАЮЩИМИ ВНУТРИКЛУБОВОКУ ГИПЕРТЕНЗИЮ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ, ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингибиторы АПФ

Блок: Блок 4 | № 370

370. ИЗМЕРИТЕЛЕМ ОБЪЁМА ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ среднее число посещений поликлиники на одного жителя в год

Блок: Блок 4 | № 371

371. ОДНОЙ ИЗ ЖАЛОБ, КОТОРУЮ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ЖЕНЩИНА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОМ ТРИМЕСТРЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тошнота

Блок: Блок 4 | № 373

373. ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ПЕРВАЯ ДОЗА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ДОЛЖНА БЫТЬ ВВЕДЕНА НЕ ПОЗДНЕЕ 4 ЧАСОВ С МОМЕНТА УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА, ПОСКОЛЬКУ ЭТО

☐ увеличивает выживаемость и снижает летальность

Блок: Блок 4 | № 374

374. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ВИДАМ, УСЛОВИЯМ И ФОРМАМ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА УРОВНЕ

☐ федеральном

Блок: Блок 4 | № 376

376. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ протеинурия с суточной потерей более 3,5 г

Блок: Блок 4 | № 377

377. АДРЕНАЛИН, АМИОДАРОН И ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ В СОВОКУПНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

☐ фибрилляции желудочков

Блок: Блок 4 | № 379

379. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОПРАНОЛОЛА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бронхиальная астма

Блок: Блок 4 | № 380

380. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ

☐ порядками оказания медицинской помощи

Блок: Блок 4 | № 382

382. У ПАЦИЕНТА С АД 150/90 ММ РТ.СТ., ПЕРЕНЕСШЕГО КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ, ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ___ СТАДИИ

☐ III

Блок: Блок 4 | № 383

383. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ БОЛЬНОМУ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ХСН любой стадии и этиологии

Блок: Блок 4 | № 385

385. СТРАХОВАТЕЛЕМ ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ орган исполнительной власти субъектов РФ

Блок: Блок 4 | № 386

386. ПОД ДЕЛЕГИРОВАНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ ПОНИМАЮТ

☐ наделение правами и обязанностями какого-либо лица в сфере его компетенции

Блок: Блок 4 | № 387

387. ПАЦИЕНТУ 50 ЛЕТ С ОЖИРЕНИЕМ И ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ УРОВНЕМ ГЛЮКОЗЫ ПЛАЗМЫ НАТОЩАК 8,0 ММОЛЬ/Л НЕОБХОДИМО В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ПРОВЕСТИ

☐ повторное определение глюкозы плазмы натощак

Блок: Блок 4 | № 388

388. ВРЕМЕННАЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ ПРИ СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ГАСТРИТА В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (ДЕНЬ)

☐ 6-7

Блок: Блок 4 | № 389

389. КОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЭРИТЕМАТОЗНЫМИ ОЧАГАМИ НА ЛИЦЕ В ОБЛАСТИ СКУЛОВЫХ ДУГ И СПИНКИ НОСА (СИМПТОМ «БАБОЧКИ») ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ системной красной волчанки

Блок: Блок 4 | № 390

390. РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИНВАЛИДНОСТИ ПРИНИМАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

☐ заключения медико-социальной экспертной комиссии

Блок: Блок 4 | № 391

391. МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (ФОРМА №025/У), ОФОРМЛЯЕТСЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ НА ПАЦИЕНТА

☐ при первичном обращении

Блок: Блок 4 | № 392

392. СОСТОЯНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ УМЕНЬШЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА И/ЛИ КОЛИЧЕСТВА ЭРИТРОЦИТОВ В ЕДИНИЦЕ ОБЪЕМА КРОВИ, НАЗЫВАЕТСЯ

☐ анемией

Блок: Блок 4 | № 393

393. ДЛЯ НИЖНЕГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ ИНФАРКТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТВЕДЕНИЯХ

☐ II, III, aVF

Блок: Блок 4 | № 394

394. ПРЕПАРАТОМ, ТОРМОЗЯЩИМ СИНТЕЗ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Аллопуринол

Блок: Блок 4 | № 395

395. ПРЕИМУЩЕСТВОМ ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА ПЕРЕД ДВУХВАЛЕНТНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ меньшая частота осложнений

Блок: Блок 4 | № 396

396. АМОКСИЦИЛЛИН ВНУТРЬ ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ

☐ не показан

Блок: Блок 4 | № 397

397. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СРЕДНЕТЕЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ

☐ ежедневное использование противовоспалительных препаратов

Блок: Блок 4 | № 398

398. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ

☐ специализированной помощи

399. К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА ОТНОСЯТ

- ☐ постоянные лихорадку и потливость

400. ПРОТЕИНУРИЯ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

- ☐ миеломной болезни

. №025/У), ЗАПОЛНЯЮТСЯ

- ☐ лечащим врачом

Блок 5

401. СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

- ☐ первичная медико-санитарная, скорая, специализированная, паллиативная

402. ПРОТИВОТРОМБОТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИКОАГУЛЯНТОВ КУМАРИНОВОЙ ГРУППЫ ОПТИМАЛЬНА ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ МНО В ПРЕДЕЛАХ

- ☐ 2,0-3,0

403. К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГИПОТИРЕОЗА НЕ ОТНОСЯТ

- ☐ сердцебиение

404. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ЛИЦ РАЗНОГО ВОЗРАСТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

- ☐ интенсивности

405. ВИДОМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СОВОКУПНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ генеральная

406. ИСПРАВЛЕНИЯ В УЧЕТНОЙ ФОРМЕ N 025/У «МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ» ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ

- ☐ подписью врача, заполнившего карту

407. К СЕРОЛОГИЧЕСКИМ МАРКЕРАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ БОЛЕЗНИ, ОТНОСЯТ

- ☐ anti-HAV IgM

Блок: Блок 5 | № 408

408. ПРИ ПОВЫШЕНИИ БИЛИРУБИНА, ТИПИЧНОМ ДЛЯ СИНДРОМА ЖИЛЬБЕРА, НАДО ИСКЛЮЧИТЬ

☐ гемолитическую анемию

Блок: Блок 5 | № 409

409. ПРИ НАЛИЧИИ БРАДИКАРДИИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ амлодипин

Блок: Блок 5 | № 410

410. НАРУШЕНИЯ А-V ПРОВОДИМОСТИ ПРИ НИЖНЕМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СВЯЗАНЫ С

☐ нарушением кровотока по артерии АВ узла

Блок: Блок 5 | № 411

411. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ВРАЧА) ВКЛЮЧЕНЫ В

☐ порядки оказания медицинской помощи

Блок: Блок 5 | № 412

412. ДЛЯ ГРИППА ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ

☐ высокой температуры тела, головной боли, миалгии, трахеита

Блок: Блок 5 | № 413

413. СОГЛАСНО КРИТЕРИЯМ ВОЗ, ДИАГНОЗУ АНЕМИИ У МУЖЧИН СООТВЕТСТВУЕТ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА МЕНЕЕ (В Г/Л)

☐ 130

Блок: Блок 5 | № 414

414. ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ НЕФРОПРОТЕКТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение внутриклубочковой гипертензии

Блок: Блок 5 | № 415

415. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С ПРЕПАРАТАМИ ИНТЕРФЕРОНА В СОЧЕТАНИИ С РИБАВИРИНОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ цирроз печени класс С по Чайлду-Пью

Блок: Блок 5 | № 416

416. ЭКСЕНАТИД ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ

☐ агонистов рецепторов ГПП-1

Блок: Блок 5 | № 417

417. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ _____ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ

☐ тромбоз

Блок: Блок 5 | № 418

418. БРОНХИАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЯВЛЕНА С ПОМОЩЬЮ

☐ спирографии

Блок: Блок 5 | № 419

419. В НОРМАЛЬНОМ ЛИМФОУЗЛЕ ПРИСУТСТВУЮТ

☐ В- и Т-лимфоциты

Блок: Блок 5 | № 420

420. ПАЦИЕНТАМИ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА МОГУТ БЫТЬ

☐ все возрастно-половые группы населения

Блок: Блок 5 | № 421

421. НЕХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ДЛЯ ПЕРИОДА БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ склонность к задержке жидкости, периодическим отёкам

Блок: Блок 5 | № 422

422. БОЛЬНОМУ С ОКРУГЛЫМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ В ЛЁГКОМ НЕУТОЧНЁННОЙ ЭТИОЛОГИИ СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ

☐ противотуберкулезную терапию

Блок: Блок 5 | № 423

423. ОСТЕОАРТРОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

☐ нормальных показателей крови

Блок: Блок 5 | № 424

424. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ временная утрата трудоспособности

Блок: Блок 5 | № 425

425. ВОПРОСАМИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАНИМАЮТСЯ

☐ медицинские организации

Блок: Блок 5 | № 426

426. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЧУМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ антибиотикотерапия

Блок: Блок 5 | № 427

427. К АССОЦИИРОВАННЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЯМ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ОТНОСЯТ

☐ ИБС: инфаркт миокарда, стенокардию, коронарную реваскуляризацию

Блок: Блок 5 | № 428

428. ОТЕК ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ ШЕИ ПРИ НАЛИЧИИ ТОНЗИЛЛИТА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ дифтерии

429. БРОНХОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ХОБЛ

☐ является дополнительным методом при диагностике для исключения других заболеваний и состояний, протекающих с аналогичными симптомами.

430. К АССОЦИИРОВАННЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЯМ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ОТНОСЯТ

☐ ХБП с рСКФ < 30мл/мин/1,73 м² или протеинурию > 300 мг в сутки

431. ПРИ ПЕРВИЧНОМ АЛЬДОСТЕРОНИЗМЕ (СИНДРОМЕ КОННА) ОТМЕЧАЮТ

☐ гипокалиемию, полидипсию, полиурию, судороги

432. К МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА ОТНОСЯТ

☐ методы на основе ПЦР

433. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АНЕВРИЗМЫ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ длительный подъем ST выше изолинии («застывшая» ЭКГ)

434. ПО ДАННЫМ ВОЗ, ЛЮДЯМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА СЧИТАЮТСЯ ЛИЦА СТАРШЕ (ГОД)

☐ 60

435. НИЗКИЙ РОСТ, КОРОТКАЯ ШЕЯ С КРЫЛОВИДНЫМИ КОЖНЫМИ СКЛАДКАМИ С НИЗКОЙ ЛИНИЕЙ РОСТА ВОЛОС НА ЗАТЫЛКЕ И НАЛИЧИЕ ДИСГЕНЕЗИИ ГОНАД ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ СИНДРОМА___ С НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ КАРИОТИПОМ ____

☐ Шерешевского-Тернера; 45 XO

436. КЛЮЧЕВЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ рентгенография органов грудной клетки

437. К АРТЕРИАЛЬНЫМ ВАЗОДИЛАТАТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

☐ дигидропиридины

438. ПРИ БОТУЛИЗМЕ ОСНОВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СИНДРОМ

☐ паралитический

Блок: Блок 5 | № 439

439. ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К САХАРНОМУ ДИАБЕТУ 1 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

☐ антигенов HLA DR-3, DR-4

Блок: Блок 5 | № 440

440. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ МАЛЯРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ паразитологический

Блок: Блок 5 | № 441

441. АНТИСТАФИЛОКОККОВЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРОИЗВОДНЫМ ИЗОКСАЗОЛПЕНИЦИЛЛИНОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ оксациллин

Блок: Блок 5 | № 442

442. ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ТИПИЧНЫМ ДЛЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ лейкопения

Блок: Блок 5 | № 443

443. ИЗОЛИРОВАННАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ ГИПЕРТОНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ аортальной недостаточности

Блок: Блок 5 | № 444

444. ЧУМНОЙ БУБОН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ резкой болезненностью, спаянностью с окружающими тканями

Блок: Блок 5 | № 445

445. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ КЛОПИДОГРЕЛА У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ непереносимость ацетилсалициловой кислоты

Блок: Блок 5 | № 446

446. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ наркотические анальгетики

Блок: Блок 5 | № 447

447. РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ ПОКАЗАНА ПРИ ____ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ

☐ любой

Блок: Блок 5 | № 448

448. ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ГЕПАТИТА ВКЛЮЧАЮТ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

☐ отмену провоцирующего препарата

Блок: Блок 5 | № 449

449. ЛЕЧЕНИЕ НЕОСЛОЖНЕННОГО ОСТРОГО БРОНХИТА ОБЫЧНО ПРОВОДИТСЯ

☐ амбулаторно

Блок: Блок 5 | № 450

450. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА СЧИТАЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ В АНАЛИЗАХ МОЧИ

☐ гематурии

Блок: Блок 5 | № 451

451. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СРОК ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ____ ДНЕЙ

☐ 85-90

Блок: Блок 5 | № 452

452. ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ АНЕМИИ У МУЖЧИНЫ 55 ЛЕТ, ПЕРЕНЕСШЕГО 7 ЛЕТ НАЗАД РЕЗЕКЦИЮ ЖЕЛУДКА (В МАЗКЕ КРОВИ МАКРОЦИТОЗ) ЯВЛЯЕТСЯ ДЕФИЦИТ

☐ цианокобаламина

Блок: Блок 5 | № 453

453. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЯМЫХ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ (ПОАК) В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ДОЗАХ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ

☐ появление геморрагических осложнений

Блок: Блок 5 | № 454

454. ВЕС БЕЗВОДНОЙ ГЛЮКОЗЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА У ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ (Г)

☐ 75

Блок: Блок 5 | № 455

455. ПЛЕТОРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ЭРИТРЕМИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ В ОСНОВНОМ

☐ гиперемией кожных покровов, головными болями

Блок: Блок 5 | № 456

456. НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО КАЛИЯ СОДЕРЖИТСЯ В 100 Г

☐ картофеля

Блок: Блок 5 | № 457

457. ПРИ СОЧЕТАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРОТИВОПОКАЗАН

☐ атенолол

Блок: Блок 5 | № 458

458. КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ

☐ исправления различных деформаций

Блок: Блок 5 | № 459

459. ВЕЗИКУЛЯРНОЕ ДЫХАНИЕ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ

☐ на вдохе и первую треть выдоха

Блок: Блок 5 | № 460

460. ТЯЖЕСТЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА ОБУСЛОВЛЕНА

☐ выраженностью осложнений

Блок: Блок 5 | № 461

461. ЛЕЧЕНИЕ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТА 77 ЛЕТ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ПРОВОДИТСЯ В

☐ общетерапевтическом стационаре

Блок: Блок 5 | № 462

462. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПРИ ВСПЫШКЕ ОЧАГОВОЙ ПНЕВМОНИИ В КОЛЛЕКТИВЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ микоплазма

Блок: Блок 5 | № 463

463. МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ШТАММОВ E.COLI К АМИНОПЕНИЦИЛЛИНАМ И ЦЕФАЛОСПОРИНАМ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

☐ выработка бета-лактамаз широкого спектра действия

Блок: Блок 5 | № 464

464. К СИСТЕМНЫМ ВАСКУЛИТАМ, ПОВРЕЖДАЮЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО КРУПНЫЕ СОСУДЫ, ОТНОСЯТ

☐ болезнь Такаясу

Блок: Блок 5 | № 465

465. ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ, БЕЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, НАГРУЗОЧНАЯ ДОЗА КЛОПИДОГРЕЛА СОСТАВЛЯЕТ (В МГ)

☐ 300

Блок: Блок 5 | № 466

466. ДЛЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ ХАРАКТЕРНО УВЕЛИЧЕНИЕ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ЛИЦ

☐ пожилого возраста

Блок: Блок 5 | № 467

467. ДЫХАНИЕ БИОТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ частым глубоким дыханием, чередующимся с дыхательными паузами

Блок: Блок 5 | № 468

468. ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ОСНОВНОЙ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дезинтоксикационная

Блок: Блок 5 | № 469

469. АНАЛИЗ МОЧИ ЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАТИВНЫМ ТЕСТОМ ПРИ ОСЛОЖНЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

☐ амилоидозом

Блок: Блок 5 | № 470

470. НОРМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ МИТРАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ СОСТАВЛЯЕТ (В СМ2)

☐ 4-6

Блок: Блок 5 | № 471

471. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА ПРЕДНИЗОН НАЗНАЧАЮТ В ДОЗЕ 40 МГ/СУТ

☐ перорально

Блок: Блок 5 | № 472

472. НЕПРЯМЫЕ ОРАЛЬНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ

☐ кардиоэмболических осложнений

Блок: Блок 5 | № 473

473. БОЛЬШОЕ ПУЛЬСОВОЕ ДАВЛЕНИЕ, ДВОЙНОЙ ТОН ТРАУБЕ, ШУМ ДЮРОЗЬЕ НА СОСУДАХ, БЫСТРЫЙ И ВЫСОКИЙ ПУЛЬС, ПОКАЧИВАНИЕ ГОЛОВЫ ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ

☐ недостаточности аортального клапана

Блок: Блок 5 | № 474

474. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фебрильная лихорадка

Блок: Блок 5 | № 475

475. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ

☐ хронической гипергликемии

Блок: Блок 5 | № 476

476. ВТОРОЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

☐ в соответствии с показаниями, определенными на 1 этапе

Блок: Блок 5 | № 477

477. ЛЕВАЯ ГРАНИЦА СЕРДЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА ОБРАЗОВАНА

☐ левым желудочком

Блок: Блок 5 | № 478

478. ИНГАЛЯЦИОННЫМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Флутиказон

Блок: Блок 5 | № 479

479. ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ПРОВЕДЕНИИ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

☐ регулярные анализы крови

Блок: Блок 5 | № 480

480. МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КРАПИВНИЦЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ волдырь

Блок: Блок 5 | № 481

481. ПИКОФЛОУМЕТРИЕЙ НАЗЫВАЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

☐ пиковой скорости выдоха

Блок: Блок 5 | № 482

482. ДЛЯ БОТУЛИЗМА ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ

☐ нарушения зрения и глотания

Блок: Блок 5 | № 483

483. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРАПИИ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ СОСТАВЛЯЕТ (В ДНЯХ)

☐ 14-21

Блок: Блок 5 | № 484

484. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЯМЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ПОКАЗАНО

☐ всем больным инфарктом миокарда в острый период

Блок: Блок 5 | № 485

485. СРОКИ ВЫДАЧИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЮТ С ____ НЕДЕЛИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ____ ДНЕЙ

☐ 30 140

Блок: Блок 5 | № 486

486. ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ

☐ амиодарон

Блок: Блок 5 | № 487

487. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ДИАГНОЗОМ У ЖЕНЩИНЫ 22 ЛЕТ С АСИММЕТРИЕЙ ПУЛЬСА И АД НА РУКАХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ болезнь Такаясу

Блок: Блок 5 | № 488

488. К ПРОЯВЛЕНИЯМ ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ ОТНОСЯТ

☐ артралгию

Блок: Блок 5 | № 489

489. КЛИНИЧЕСКИ МАЛОСИМПТОМНО, БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ПРОТЕКАЕТ ____ ТУБЕРКУЛЁЗ ЛЁГКИХ

☐ очаговый

Блок: Блок 5 | № 490

490. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ СЛУЖИТ

☐ бронхиальная астма

Блок: Блок 5 | № 491

491. ПРИ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ПОВЫШЕН

☐ адренокортикотропный гормон

Блок: Блок 5 | № 492

492. БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ каптоприла

Блок: Блок 5 | № 493

493. ПРИ КАКОМ ИЗ ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ КРИТЕРИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ, РЕЗУЛЬТАТЫ ПОСЛЕДНЕЙ НАИБОЛЕЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫ?

☐ хронический гепатит D

Блок: Блок 5 | № 494

494. ОСНОВНЫМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА, ПРОТЕКАЮЩЕГО С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ МЕЛКИХ БРОНХОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ одышка

Блок: Блок 5 | № 495

495. ВНУТРЕННИЙ ФАКТОР КАСТЛА ОБРАЗУЕТСЯ В

☐ фундальной части желудка

Блок: Блок 5 | № 496

496. НЕРЕДКО ОСЛОЖНЯЕТСЯ РАЗВИТИЕМ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

☐ геморрагическая лихорадка

Блок: Блок 5 | № 497

497. ПРИ ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ ОТДАЮТ

☐ фуросемиду

Блок: Блок 5 | № 498

498. К АТИПИЧНЫМ НЕЙРОЛЕПТИКАМ ОТНОСИТСЯ

☐ клозапин

499. В КАЧЕСТВЕ ТЕСТА ПЕРВОГО УРОВНЯ В ДИАГНОСТИКЕ АКРОМЕГАЛИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- ☐ оценка уровня инсулиноподобного фактора-1 (ИФР-1)

500. ЛОКАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫЯВЛЯЮТСЯ У ДЕТЕЙ В

- ☐ лимфатической системе

Блок 6

501. К ПРИЗНАКАМ ВНУТРИСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ ОТНОСЯТ

- ☐ гипергликемию

502. ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ кандидоз ротовой полости

503. ФИНАНСОВЫЕ СРЕДСТВА ФОНДОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ

- ☐ государства

504. УСИЛЕНИЕ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПРИ СОЧЕТАНИИ ПЕРОРАЛЬНЫХ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ С

- ☐ бета-адреноблокаторами

505. ПОТЕМНЕНИЕ МОЧИ, ИКТЕРИЧНОСТЬ КОЖИ И СКЛЕР, БОЛИ В ЖИВОТЕ, УМЕРЕННАЯ ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ АНЕМИИ

- ☐ гемолитической

506. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- ☐ активное динамическое наблюдение за состоянием здоровья населения

507. ФЕНОТИП ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ОПРЕДЕЛЯЕТ РИСК РАЗВИТИЯ

- ☐ язвенной болезни

508. ДЛЯ РАСЧЁТА ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕОБХОДИМЫ ДАННЫЕ О

- ☐ заболеваемости в данном году и предыдущие годы

Блок: Блок 6 | № 509

509. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНЕ ПЕРВИЧНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ГИПОКОРТИЦИЗМА ОТНОСЯТ

☐ аутоиммунную атрофию коры надпочечников

Блок: Блок 6 | № 510

510. ПОКАЗАНИЕМ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ впервые возникшая стенокардия II фк

Блок: Блок 6 | № 511

511. МАРКЕРОМ ИНФИЦИРОВАННОСТИ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ

☐ HBsAg

Блок: Блок 6 | № 512

512. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПНЕВМОНИИ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ

☐ наличие острой дыхательной недостаточности и/или сепсиса

Блок: Блок 6 | № 513

513. К ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, КОНТРОЛИРУЮЩИХ ТЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТНОСЯТ

☐ ингаляционные глюкокортикоиды

Блок: Блок 6 | № 514

514. ПОДБОР ДОЗЫ НЕФРАКЦИОНИРОВАННОГО ГЕПАРИНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

☐ активированного частичного тромбопластинового времени

Блок: Блок 6 | № 515

515. ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

☐ ацикловир

Блок: Блок 6 | № 516

516. ПОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЙ, ЖЖЕНИЯ, ОНЕМЕНИЯ, «ПОЛЗАНИЯ МУРАШЕК» В ДИСТАЛЬНЫХ ОТДЕЛАХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, НЕРЕДКО В ПАЛЬЦАХ, СНИЖЕНИЕ АХИЛЛОВА И КОЛЕННОГО РЕФЛЕКСОВ, ОСЛАБЛЕНИЕ ТАКТИЛЬНОЙ И БОЛЕВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

☐ периферической полинейропатии

Блок: Блок 6 | № 517

517. АНТИБИОТИКОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧУМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стрептомицин

Блок: Блок 6 | № 518

518. БОЛЬНОМУ 49 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕМУ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ III ФК, С НАЛИЧИЕМ НА ЭКГ СИНУСОВОГО РИТМА, ПОСТЕПЕННОГО УДЛИНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА PQ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫПАДЕНИЕМ КОМПЛЕКСА QRS, В КАЧЕСТВЕ АНТИАНГИНАЛЬНОГО СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ

☐ Изосорбида динитрат

Блок: Блок 6 | № 519

519. ПЯТНА РОТА (БЕЛЫЕ ПЯТНА НА ГЛАЗНОМ ДНЕ) ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ инфекционного эндокардита

Блок: Блок 6 | № 520

520. АБСОЛЮТНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ

☐ рентабельность

Блок: Блок 6 | № 521

521. МЕТОДОМ ОБЩЕДОСТУПНОЙ И СРОЧНОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ прямая бактериоскопия мазка мокроты

Блок: Блок 6 | № 522

522. ДЛЯ ОСТРОЙ ФОРМЫ АМЕБИАЗА ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ

☐ болей в правой подвздошной области и стула по типу «малинового желе»

Блок: Блок 6 | № 523

523. В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ И ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫДАЕТСЯ

☐ справка установленной формы

Блок: Блок 6 | № 524

524. ПРИ ГИПЕРТИРЕОЗЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ

☐ бета-адреноблокаторы

Блок: Блок 6 | № 525

525. БЕССРОЧНО 1 ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ У БОЛЬНОГО С

☐ ХСН ФК IV, нуждающегося в постоянном уходе

Блок: Блок 6 | № 526

526. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПАТОЛОГИЯ

☐ чаще проявляется в детском возрасте

Блок: Блок 6 | № 527

527. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ УСИЛЕНИЯ ОДЫШКИ, ПОЯВЛЕНИЯ ОТЕКОВ И УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ СЕРДЦА У БОЛЬНОГО ПОСЛЕ АКШ НА ФОНЕ ПРИЕМА АНТИКОАГУЛЯНТОВ ЯВИЛОСЬ РАЗВИТИЕ

☐ гемоперикарда

Блок: Блок 6 | № 528

528. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

☐ медико-социальная экспертная комиссия

Блок: Блок 6 | № 529

529. ОСЛОЖНЕНИЕ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стеноз

Блок: Блок 6 | № 530

530. ИНФУЗИЯ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПОКАЗАНА ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА, СОПРОВОЖДАЮЩЕМСЯ

☐ отёком лёгких

Блок: Блок 6 | № 531

531. ЭРИТРОПОЭТИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИИ ПРИ

☐ хронической болезни почек

Блок: Блок 6 | № 532

532. БОЛЬНЫЕ С ЦЕЛИАКИЕЙ МОГУТ УПОТРЕБЛЯТЬ

☐ картофель

Блок: Блок 6 | № 533

533. ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО

☐ повышение ОЖСС

Блок: Блок 6 | № 534

534. ПРИ КУПИРОВАНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА У БОЛЬНЫХ С ФЕОХРОМОЦИТОМОЙ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ

☐ альфа-адреноблокаторы

Блок: Блок 6 | № 535

535. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «ПЕРВИЧНЫЙ ГИПОТИРЕОЗ» НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ определение уровня ТТГ

Блок: Блок 6 | № 536

536. ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ СТЕНОКАРДИИ ОБЛАДАЮТ

☐ Бисопролол

Блок: Блок 6 | № 537

537. У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОВЫШЕНИЕ ЛЕЙКОЦИТОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

☐ выявляют через несколько часов от начала заболевания

Блок: Блок 6 | № 538

538. ИММУНОСУПРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

☐ кортикостероиды и цитостатики

Блок: Блок 6 | № 539

539. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ морфин

Блок: Блок 6 | № 540

540. ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ОБУСЛОВЛЕН

☐ развитием повышенной чувствительности замедленного типа

Блок: Блок 6 | № 541

541. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПОДОЗРЕНА ПО

☐ наличию боли в теменной и затылочной областях

Блок: Блок 6 | № 542

542. К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ БУБОННОЙ ФОРМЫ ЧУМЫ ОТНОСЯТСЯ

☐ лихорадка, резко болезненный бубон, гепатоспленомегалия

Блок: Блок 6 | № 543

543. В ОСНОВЕ ПАТОГЕНЕЗА ОСТРОГО ДВС-СИНДРОМА ЛЕЖИТ

☐ генерализованное повреждение эндотелия микрососудов

Блок: Блок 6 | № 544

544. НАИМЕНЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ВЕРИФИКАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ рентгенологическая диагностика

Блок: Блок 6 | № 545

545. КАЗЕОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВЫДЕЛЕНИЕМ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЁЗА

☐ обильным

Блок: Блок 6 | № 546

546. ВИРУСНАЯ ЭТИОЛОГИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ ТИРЕОИДИТА

☐ подострого

Блок: Блок 6 | № 547

547. ИНФОРМАЦИЮ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПАЦИЕНТУ

☐ по его желанию

Блок: Блок 6 | № 548

548. ПРИ СИНДРОМЕ СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА ПАЦИЕНТАМ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ моксонидина

Блок: Блок 6 | № 549

549. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингибиторы протонной помпы

Блок: Блок 6 | № 550

550. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ РЕТИНОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ лазерная коагуляция сетчатки

Блок: Блок 6 | № 551

551. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО НЕФРИТА НЕ ПРИМЕНЯЮТ

☐ нестероидные противовоспалительные средства

Блок: Блок 6 | № 552

552. ЗАПИСИ В МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЕ ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (ФОРМА №025/У), ВЕДУТСЯ НА ЯЗЫКЕ

☐ русском

Блок: Блок 6 | № 553

553. ВСАСЫВАНИЕ ЖЕЛЕЗА В КИШЕЧНИКЕ НАИБОЛЕЕ ИНТЕНСИВНО ПРОИСХОДИТ ИЗ

☐ мясных продуктов

Блок: Блок 6 | № 554

554. ПРИЧИНОЙ ЯТРОГЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

☐ бронхолитиков

Блок: Блок 6 | № 555

555. ЛЕВАЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА РАСШИРЕНА ПРИ

☐ артериальной гипертонии

Блок: Блок 6 | № 556

556. ПРИ ПЕРИКАРДИТЕ ЭЛЕВАЦИЯ СЕГМЕНТА ST МОЖЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ

☐ депрессией сегмента PQ

Блок: Блок 6 | № 557

557. К ИНГИБИТОРАМ НАТРИЙ-ГЛЮКОЗНОГО КОТРАНСПОРТЕРА 2 ТИПА ОТНОСЯТ

☐ канаглифлозин

Блок: Блок 6 | № 558

558. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ сартаны

559. К АНТАГОНИСТАМ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ОТНОСИТСЯ

☐ эплеренон

560. ПРИ КАКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ОСНОВНЫМ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ В КОЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГРАНУЛЁМА?

☐ красный плоский лишай

561. ПРАВИЛЬНЫЙ РИТМ ЖЕЛУДОЧКОВ С ЧСС 40 В МИН., ПРАВИЛЬНЫЙ РИТМ ПРЕДСЕРДИЙ С ЧСС 88 В МИН. И РИТМ ЖЕЛУДОЧКОВ, НЕ ЗАВИСИМЫЙ ОТ РИТМА ПРЕДСЕРДИЙ, НА ЭКГ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ

☐ III степени

562. ПО ДАННЫМ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО (ДОМАШНЕГО) КОНТРОЛЯ ДИАГНОЗ «АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ» УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПРИ УСРЕДНЕННОМ ЗНАЧЕНИИ АД БОЛЕЕ (В ММ РТ.СТ.)

☐ 135/85

563. МАЛЯРИЙНЫЙ ПАРОКСИЗМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ КЛИНИЧЕСКИМИ ФАЗАМИ

☐ озноб – жар – пот

564. ПРИ ГНОЙНОМ ГАЙМОРИТЕ, ВЫЗВАННОМ STAPHYLOCOCCUS AUREUS И BACTEROIDES FRAGILIS, ПОКАЗАН

☐ моксифлоксацин

565. СТЕПЕНЬ РЕГЕНЕРАТОРНОЙ АКТИВНОСТИ КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ОЦЕНИВАЮТ ПО СОДЕРЖАНИЮ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ

☐ ретикулоцитов

566. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ, ВНОСИМЫМ В ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЛЕЧЕНИЯ РИБАВИРИНОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ двойная контрацепция

567. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ОЖИРЕНИЯ I СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (КГ/М²)

☐ 30-34,9

568. КРИТЕРИЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРОБЫ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ горизонтальная депрессия сегмента ST более 2 мм

Блок: Блок 6 | № 569

569. ДЛЯ КОЛИТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА ШИГЕЛЛЕЗА ХАРАКТЕРЕН СТУЛ

☐ скудный со слизью и прожилками крови

Блок: Блок 6 | № 570

570. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НЕОБХОДИМА ОЦЕНКА УСВАИВАЕМЫХ УГЛЕВОДОВ ПО СИСТЕМЕ ХЛЕБНЫХ ЕДИНИЦ (ХЕ) ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДОЗЫ ИНСУЛИНА ПЕРЕД ЕДОЙ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ

☐ кефира

Блок: Блок 6 | № 571

571. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ В-12 ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ НА РАННЕМ ЭТАПЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ РАЗВИТИЕ _____ НА 7-8 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ

☐ ретикулоцитоза

Блок: Блок 6 | № 572

572. ПРЕПАРАТОМ, ПРОТИВОПОКАЗАННЫМ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гентамицин

Блок: Блок 6 | № 573

573. У БОЛЬНОГО С 5 СТАДИЕЙ ХБП, ПРОПУСТИВШЕГО ОЧЕРЕДНОЙ СЕАНС ГЕМОДИАЛИЗА, НА ЭКГ С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ МОЖНО ОЖИДАТЬ

☐ высокий остроконечный зубец Т

Блок: Блок 6 | № 574

574. ТОФУСЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ

☐ отложение в тканях уратов

Блок: Блок 6 | № 575

575. ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ *Clostridium difficile*

Блок: Блок 6 | № 576

576. БОЛЬНОМУ СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ, СТРАДАЮЩЕМУ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

☐ амлодипин

Блок: Блок 6 | № 577

577. ЭФФЕКТИВНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА ПРОПАФЕНОНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ)

☐ 450-900

Блок: Блок 6 | № 578

578. ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ протеинурия

Блок: Блок 6 | № 579

579. НА ВЕРХУШКЕ СЕРДЦА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРОВОДЯТСЯ ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КЛАПАНА

☐ митрального

Блок: Блок 6 | № 580

580. ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИСТУПА БОЛИ ПРИ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ ПРОВОЦИРУЮЩИМ ФАКТОРОМ

☐ прием вазодилататоров

Блок: Блок 6 | № 581

581. В СОМНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ДИАГНОЗ ХСН МОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ НОРМАЛЬНОМ УРОВНЕ В КРОВИ

☐ натрийуретических пептидов

Блок: Блок 6 | № 582

582. ЧАЩЕ ВСЕГО ВАЗОРЕНАЛЬНАЯ АГ У ПОЖИЛЫХ МУЖЧИН РАЗВИВАЕТСЯ НА ФОНЕ

☐ атеросклероза

Блок: Блок 6 | № 583

583. КРОВЬ ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ

☐ алая, пенистая

Блок: Блок 6 | № 584

584. ДЛЯ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ ЛИХОРАДКИ И

☐ тонзиллита, лимфаденопатии, гепатоспленомегалии

Блок: Блок 6 | № 585

585. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Преднизолон

Блок: Блок 6 | № 586

586. ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ гемолитической анемии

Блок: Блок 6 | № 587

587. В ДИАГНОСТИКЕ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ

☐ антитела к цитруллинированному пептиду

Блок: Блок 6 | № 588

588. АНГИОГРАФИЯ СОСУДОВ ПОЧЕК ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ

☐ поражения почечных сосудов

Блок: Блок 6 | № 589

589. ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ I СТЕПЕНИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЭКСПЕРТАМИ ВОЗ/МОГ, ХАРАКТЕРНЫ: САД ____ ММ РТ.СТ., ДАД (В ММ РТ. СТ.)

☐ 140-159; 90-99

Блок: Блок 6 | № 590

590. ПЕРВИЧНЫЙ МАНИФЕСТНЫЙ ГИПОТИРЕОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ____ ТТГ И ____ Т4 СВОБОДНОГО

☐ повышением; снижением

Блок: Блок 6 | № 591

591. СОЧЕТАНИЕ НА ЭКГ ПРИЗНАКОВ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ И ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИЗНАКОВ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

☐ о митральном стенозе

Блок: Блок 6 | № 592

592. К ПРЕДЪЯЗВЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОТНОСЯТ ГАСТРИТ, АССОЦИИРОВАННЫЙ С

☐ хеликобактер пилори

Блок: Блок 6 | № 593

593. К ЭКГ КРИТЕРИЯМ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ ОТНОСЯТ

☐ комплекс QRS преждевременный, расширен, деформирован

Блок: Блок 6 | № 594

594. ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИМ О ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ индекс массы миокарда левого желудочка

Блок: Блок 6 | № 595

595. КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПИЩЕВОДА БАРРЕТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ

☐ аденокарциномы пищевода

Блок: Блок 6 | № 596

596. ДЛЯ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ФИБРОЗИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛИТА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ прогрессирующей инспираторной одышки

Блок: Блок 6 | № 597

597. ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, РАБОТАЮЩИМ ПО ДОГОВОРУ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ, ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ

☐ листок нетрудоспособности

Блок: Блок 6 | № 598

598. НЕПРАВИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

☐ неинформативные записи в амбулаторной карте

Блок: Блок 6 | № 599

599. ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ КУШИНГА ЯВЛЯЕТСЯ ОПУХОЛЬ

☐ передней доли гипофиза

Блок: Блок 6 | № 600

600. ПЕНИЦИЛЛИНЫ МОГУТ ИМЕТЬ ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РЕАКЦИИ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ С

☐ цефалоспоринами

Блок 7

Блок: Блок 7 | № 601

601. ПОСТОЯННЫЙ ИНТЕРВАЛ PQ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,26 СЕК., РАВНЫЕ ИНТЕРВАЛЫ RR И ЗУБЕЦ Р, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ КАЖДОМУ КОМПЛЕКСУ QRS, ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ

☐ атриовентрикулярной блокады I степени

Блок: Блок 7 | № 602

602. ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ЮРИДИЧЕСКУЮ, ФИНАНСОВУЮ И

☐ государственную

Блок: Блок 7 | № 603

603. ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дилатация миокарда левого предсердия

Блок: Блок 7 | № 604

604. ЭНДОКРИННАЯ ОФТАЛЬМОПАТИЯ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

☐ аутоиммунного процесса в ретробульбарной клетчатке

Блок: Блок 7 | № 605

605. В ЗАДАЧИ ПОЛИКЛИНИКИ НЕ ВХОДИТ?

☐ экспертиза стойкой утраты трудоспособности

Блок: Блок 7 | № 606

606. ЭКВИВАЛЕНТОМ СТЕНОКАРДИИ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ

☐ изжога при быстрой ходьбе

Блок: Блок 7 | № 607

607. ПРИ МАНИФЕСТНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ, РАЗВИВШЕМСЯ В ИСХОДЕ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА, ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ____ В ____ ДОЗЕ

☐ левотироксина; заместительной

Блок: Блок 7 | № 608

608. НАЧАЛЬНЫМ ПЕРИОДОМ В КЛИНИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ лихорадочный

609. НАРУШЕНИЕ ЖИРОВОГО ОБМЕНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ дислипидемией

610. СИМПТОМЫ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТМЕЧАЮТСЯ В ПОКОЕ И РЕЗКО ВОЗРАСТАЮТ ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ____ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КЛАССОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

☐ IV

611. СОГЛАСНО ДАННЫМ ВОЗ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЗДОРОВЬЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ образ жизни

612. ИЗ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ НЕФРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ системной красной волчанки

613. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО БРОНХИТА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пневмония

614. ВЕЛИЧИНА ДОПЛАТЫ ЗА КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ

☐ умножения базового оклада на повышающий коэффициент

615. ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ ОТРАЖЕНИЕМ ЦИТОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА В БИОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ активность аланинаминотрансферазы

616. ОСНОВНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ глюкокортикоиды

617. УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ПЛАЗМЫ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ НАГРУЗКИ ГЛЮКОЗОЙ В ХОДЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ (В ММОЛЬ/Л)

☐ 7,8

Блок: Блок 7 | № 618

618. К СРЕДСТВАМ С ИНКРЕТИНОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОТНОСЯТ САХАРОСНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ ГРУППЫ

☐ глиптинов

Блок: Блок 7 | № 619

619. ЭОЗИНОФИЛЬНЫЕ ВЫПОТЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБНАРУЖИВАЮТСЯ ПРИ

☐ глистной инвазии

Блок: Блок 7 | № 620

620. ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ УСТАНАВЛИВАЮТ НА ОСНОВАНИИ

☐ ОФВ 1

Блок: Блок 7 | № 621

621. НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ И ДОСТУПНЫМ СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТОМ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ определение уровня ТТГ

Блок: Блок 7 | № 622

622. ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОСТЕЙ ДЕСТРУКЦИИ В ЛЕГКИХ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ

☐ стафилококком

Блок: Блок 7 | № 623

623. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ОСТРОЙ ПЕЧЁНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ В ЯВЛЯЕТСЯ

☐ геморрагический синдром

Блок: Блок 7 | № 624

624. ПРИСТУПЫ МОРГАНЬИ-ЭДЕМСА-СТОКСА ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ

☐ полной атриовентрикулярной блокаде

Блок: Блок 7 | № 625

625. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ СИМПТОМАТИЧЕСКИМ ЯЗВАМ ОТНОСЯТСЯ

☐ лекарственные (применение НПВС, глюкокортикостероидов)

Блок: Блок 7 | № 626

626. САМЫМ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ АСЦИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ спонтанный бактериальный асцит-перитонит

Блок: Блок 7 | № 627

627. СКОВАННОСТЬ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ

☐ периода покоя

Блок: Блок 7 | № 628

628. У ВЗРОСЛЫХ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ФОРМА ТУБЕРКУЛЁЗА

☐ инфильтративная

Блок: Блок 7 | № 629

629. ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ стимуляторы эритропоэза

Блок: Блок 7 | № 630

630. БРОНХОСПАСТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЕТ

☐ пропранолол

Блок: Блок 7 | № 631

631. НЕБИВОЛОЛ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ высокоселективным b1 –адреноблокатором

Блок: Блок 7 | № 632

632. ПАЦИЕНТУ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НЕОБХОДИМО УМЕНЬШИТЬ ДОЗУ БАЗАЛЬНОГО ИНСУЛИНА ПРИ ВЫСОКОЙ ГЛИКЕМИИ

☐ натошак и гипогликемии в ночное время

Блок: Блок 7 | № 633

633. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРТОВОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПРИ ПНЕВМОНИИ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ (В СУТКАХ)

☐ 2-3

Блок: Блок 7 | № 634

634. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ПОДАГРЕ СОСТАВЛЯЮТ (ДЕНЬ)

☐ 15 – 20

Блок: Блок 7 | № 635

635. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИНТЕРФЕРОНА МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ

☐ лихорадочный синдром

Блок: Блок 7 | № 636

636. ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ТРЕБУЮЩЕМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СО СТЕНОКАРДИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ диафрагмальная грыжа

Блок: Блок 7 | № 637

637. НАИБОЛЕЕ РАННИМ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение активности аланиновой аминотрансферазы

Блок: Блок 7 | № 638

638. МАММОГРАФИЯ С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОКАЗАНА ЖЕНЩИНАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ (В ГОДАХ)

☐ 40

Блок: Блок 7 | № 639

639. КАКОЕ РЕВМАТИЧЕСКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОСЛОЖНЯЕТСЯ АМИЛОИДОЗОМ ПОЧЕК?

☐ ревматоидный артрит

Блок: Блок 7 | № 640

640. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бронхологическое исследование (бронхоскопия)

Блок: Блок 7 | № 641

641. ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ПЕРВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ВРАЧУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СТАЖ РАБОТЫ ПО

☐ соответствующей врачебной специальности не менее 5 лет

Блок: Блок 7 | № 642

642. ВЫДАЧА ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ

☐ документа, удостоверяющего личность

Блок: Блок 7 | № 643

643. ХАРАКТЕРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ БОЛЕЙ В ЖИВОТЕ ПРИ ГАСТРОЭНТЕРИТИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эпи-мезогастральная область

Блок: Блок 7 | № 645

645. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ РАКА ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ антральный отдел

Блок: Блок 7 | № 646

646. ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ курение

Блок: Блок 7 | № 647

647. ТРЕХСЛОЙНОСТЬ МОКРОТЫ ПОСЛЕ ОТСТАИВАНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ абсцесса легкого и бронхоэктазов

Блок: Блок 7 | № 648

648. ПЕРЕЧЕНЬ, ЧАСТОТА И КРАТНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПАЦИЕНТАМ ПРИ РАЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ стандартом оказания медицинской помощи при данном заболевании

Блок: Блок 7 | № 649

649. IIA ТИП ГИПЕРЛИПИДЕМИИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕМ В ПЛАЗМЕ КРОВИ

☐ липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)

Блок: Блок 7 | № 650

650. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ АТОРВАСТАТИНА УСИЛИВАЕТ

☐ эритромицин

Блок: Блок 7 | № 651

651. ПРОТИВОГРИППОЗНЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ осельтамивир

Блок: Блок 7 | № 652

652. ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЕ

☐ число мегакариоцитов в костном мозге увеличено

Блок: Блок 7 | № 653

653. ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ ПРЕПАРАТОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ НАРУШЕНИЕ ЦВЕТООЩУЩЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ этамбутол

Блок: Блок 7 | № 654

654. ПОСЛЕ ПОЛНОЙ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В В КРОВИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ анти-HBs и отсутствие анти-HBcor

Блок: Блок 7 | № 655

655. ЛЕЧЕНИЕ СЛАБОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛИ ВОЗМОЖНО НАЧИНАТЬ С ПРИМЕНЕНИЯ

☐ НПВП или парацетамола

Блок: Блок 7 | № 656

656. НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫМ НЕФРОПРОТЕКТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ОБЛАДАЮТ

☐ ингибиторы АПФ

Блок: Блок 7 | № 657

657. НАИБОЛЕЕ РАННИМ СПЕЦИФИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У БОЛЬНЫХ РАКОМ БИЛИОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ механическая желтуха

Блок: Блок 7 | № 658

658. НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ ГИПОТЕНЗИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПРИ СОЧЕТАНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2 ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

Блок: Блок 7 | № 659

659. ДЛЯ УРОГЕННОГО РЕАКТИВНОГО АРТРИТА (БОЛЕЗНИ РЕЙТЕРА) ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ конъюнктивит

Блок: Блок 7 | № 660

660. ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОБУ

☐ Штанге

Блок: Блок 7 | № 661

661. ПРИ НАЛИЧИИ ПОХОЛОДАНИЯ, БОЛИ И ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА ПАЛЬЦЕВ РУК ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХОЛОДА В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ВРЕМЕНИ, ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ АРТРИТА МЕЛКИХ СУСТАВОВ КИСТЕЙ И ЗАПЯСТИЙ, УПЛОТНЕНИИ КОЖИ ЛИЦА, ЗАТРУДНЕНИИ ПРИ ГЛОТАНИИ ТВЕРДОЙ ПИЩИ И НАЛИЧИИ ЕДИНИЧНЫХ ВОЛЧАНОЧНЫХ КЛЕТОК НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ БУДЕТ

☐ системная склеродермия

Блок: Блок 7 | № 662

662. ДЛЯ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА ХАРАКТЕРНО

☐ повышение активности АЛТ, АСТ

Блок: Блок 7 | № 663

663. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ИБС ЯВЛЯЕТСЯ

☐ артериальная гипертензия

Блок: Блок 7 | № 664

664. РЕШАЮЩИМ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ МСЭК ЗАКЛЮЧЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИНВАЛИДОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ неблагоприятный трудовой прогноз

Блок: Блок 7 | № 665

665. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ПРИЁМОМ ПРИ МАССАЖЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ вибрация

Блок: Блок 7 | № 666

666. ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЮТСЯ СУСТАВЫ

☐ коленные

Блок: Блок 7 | № 667

667. В КОНСЕРВАТИВНУЮ ТЕРАПИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ

☐ кортикостероиды

Блок: Блок 7 | № 668

668. СТАРТОВАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПНЕВМОНИИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ВКЛЮЧАЕТ

☐ пенициллин полусинтетический

Блок: Блок 7 | № 669

669. ПРИ ТЯЖЕЛОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ И НЕЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОТРЕКСАТА ПРИМЕНЯЕТСЯ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ

☐ Инфликсимаб

Блок: Блок 7 | № 670

670. ДИФФУЗНЫЙ ПНЕВМОСКЛЕРОЗ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ У БОЛЬНЫХ

☐ хронической обструктивной болезнью легких

Блок: Блок 7 | № 671

671. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПОНЕНТОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ

☐ ларингоспазм

Блок: Блок 7 | № 672

672. НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ КОМБИНАЦИИ ДИГОКСИНА С

☐ цетиризином, омепразолом, деносумабом

Блок: Блок 7 | № 673

673. ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ предотвращение прогрессирования заболевания

Блок: Блок 7 | № 674

674. ОБЩИМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ДЛЯ МИОКАРДИТА И ЭКССУДАТИВНОГО ПЕРИКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кардиомегалия

Блок: Блок 7 | № 675

675. ГИПЕРСПЛЕНИЗМ ВСТРЕЧАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ

☐ циррозом печени

Блок: Блок 7 | № 676

676. УСРЕДНЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И КРАТНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РФ, ВКЛЮЧЕНЫ В

☐ стандарты медицинской помощи

Блок: Блок 7 | № 677

677. ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ГЛЮТЕНОВУЮ ЭНТЕРОПАТИЮ (ЦЕЛИАКИЮ) ПОКАЗАНО БОЛЬНЫМ

☐ сахарным диабетом 1 типа

Блок: Блок 7 | № 678

678. ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ МАММОГРАФИЯ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ ЕЕ 1 РАЗ В 2 ГОДА ПОКАЗАНА ЖЕНЩИНАМ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

☐ 40 и старше

Блок: Блок 7 | № 679

679. ЧАЩЕ ВСЕГО ВАЗОРЕНАЛЬНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ПОЖИЛЫХ МУЖЧИН РАЗВИВАЕТСЯ НА ФОНЕ

☐ атеросклероза

Блок: Блок 7 | № 680

680. РАННИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ уменьшение объема форсированного выдоха за первую секунду

Блок: Блок 7 | № 681

681. УСИЛЕНИЕ ГОЛОСОВОГО ДРОЖАНИЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ уплотнении легочной ткани в результате воспаления легких

Блок: Блок 7 | № 682

682. ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЮТСЯ СУСТАВЫ

☐ кистей

Блок: Блок 7 | № 683

683. УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ I СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ (ММ РТ.СТ.)

☐ 150/95

Блок: Блок 7 | № 684

684. ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМИ КРИТЕРИЯМИ КОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ увеличение индекса массы миокарда левого желудочка и относительной толщины стенок левого желудочка

Блок: Блок 7 | № 685

685. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ТУБЕРКУЛЁЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЛЕВРЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИОПСИИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ клеток Пирогова – Лангханса

Блок: Блок 7 | № 686

686. УЧЕТНАЯ ФОРМА N 030-13/У «ПАСПОРТ ВРАЧЕБНОГО УЧАСТКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ» ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА ПОДПИСЫВАЕТСЯ

☐ врачом-терапевтом участковым и специалистом организационно-методического кабинета

Блок: Блок 7 | № 687

687. ПАЦИЕНТЫ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ДОЛЖНЫ СОСТОЯТЬ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ

☐ пожизненно с разной периодичностью диспансерных осмотров

Блок: Блок 7 | № 688

688. РАСШИРЕННЫЕ ВЕНЫ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКОМ

☐ портальной гипертензии

Блок: Блок 7 | № 689

689. К ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОТНОСЯТСЯ

- ☐ муковисцидоз и дефицит α 1-антитрипсина

Блок: Блок 7 | № 690

690. К СКРИНИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТ

- ☐ маммографию

Блок: Блок 7 | № 691

691. КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОКОМПЛЕКСОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СИНДРОМА ДРЕССЛЕРА, ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ

- ☐ перикардита, плеврита, пневмонита

Блок: Блок 7 | № 692

692. К ПАТОГНОМОНИЧНЫМ СИМПТОМАМ ПРОДРОМАЛЬНОГО ПЕРИОДА КОРИ ОТНОСЯТ

- ☐ пятна Филатова- Коплика

Блок: Блок 7 | № 693

693. ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ЭТИОЛОГИИ ЭКСУДАТИВНОГО ПЛЕВРИТА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

- ☐ плевральную пункцию с микробиологическим и цитологическим исследованием экссудата

Блок: Блок 7 | № 694

694. ДИСПАНСЕРНОМУ БОЛЬНОМУ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ АНГИНОЗНОГО ПРИСТУПА ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ РЕКОМЕНДУЕТ

- ☐ Изосорбида динитрат короткодействующий

Блок: Блок 7 | № 695

695. ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ

- ☐ одному из членов семьи (опекуну), непосредственно осуществляющему уход

Блок: Блок 7 | № 696

696. ПРИ ЛОКАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ КРУПНОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ транслюминальная ангиопластика коронарных артерий

Блок: Блок 7 | № 697

697. СТАРЧЕСКИМ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ (ГОД)

- ☐ от 75 до 89

Блок: Блок 7 | № 698

698. ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ наличие вторичных бактериальных осложнений

Блок: Блок 7 | № 699

699. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ флудрокортизон, гидрокортизон

Блок: Блок 7 | № 700

700. ДОГОВОР СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (СМО) С МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (МО) СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ С МОМЕНТА

☐ подписания договора

Блок 8

Блок: Блок 8 | № 701

701. ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ РАНЬШЕ ДРУГИХ ВОЗРАСТАЕТ УРОВЕНЬ АКТИВНОСТИ

☐ миоглобина

Блок: Блок 8 | № 702

702. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ГИПОПЕРФУЗИИ ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ олигурия

Блок: Блок 8 | № 703

703. СЫПЬ НА КОЖЕ БОЛЬНОГО БРЮШНЫМ ТИФОМ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ____ ДЕНЬ БОЛЕЗНИ

☐ 8-10

Блок: Блок 8 | № 704

704. РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ СО СТОРОНЫ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ появление телеангиэктазий

Блок: Блок 8 | № 705

705. ПРИ ПОВЕРХНОСТНОЙ ПАЛЬПАЦИИ ЖИВОТА У ЛИЦ С ДИСКИНЕЗИЕЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ незначительная болезненность в правом подреберье

Блок: Блок 8 | № 706

706. К ИСТИННОМУ КАРДИОГЕННОМУ ШОКУ ЧАЩЕ ПРИВОДИТ

☐ трансмуральный инфаркт миокарда

Блок: Блок 8 | № 707

707. К ОСНОВНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ОТНОСЯТ

☐ ингаляционные глюкокортикостероидные гормоны

Блок: Блок 8 | № 708

708. ОСНОВНОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ СОСТОИТ В

☐ усилении высвобождения инсулина из поджелудочной железы

Блок: Блок 8 | № 709

709. «ЛОЖНОЙ» АНЕВРИЗМОЙ СЕРДЦА НАЗЫВАЮТ

☐ «прикрытую» перфорацию

Блок: Блок 8 | № 710

710. К ГЕОГЕЛЬМИНТОЗАМ ОТНОСИТСЯ

☐ аскаридоз

Блок: Блок 8 | № 711

711. РАЗДЕЛОМ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕМОГРАФИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ динамика

Блок: Блок 8 | № 712

712. ИЗ УСЛОВИЙ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ, НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ, СОГЛАСНО ДАННЫМ ВОЗ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ образ жизни

Блок: Блок 8 | № 713

713. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТЬ УЗЛА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ

☐ пункционную биопсию

Блок: Блок 8 | № 714

714. ПРИ ОСТРОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ

☐ коллапса

Блок: Блок 8 | № 715

715. РАЗВИТИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НИТРАТАМ ОБУСЛОВЛЕНО

☐ снижением чувствительности рецепторов сосудистой стенки

Блок: Блок 8 | № 716

716. ЗУД В ОБЛАСТИ АНАЛЬНОГО ОТВЕРСТИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ энтеробиозе

Блок: Блок 8 | № 717

717. РАЗВИТИЮ ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ЧАСТО ПРЕДШЕСТВУЕТ

☐ очаговый туберкулез легких

Блок: Блок 8 | № 718

718. ТАКТИКОЙ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ запись ЭКГ на месте, купирование болевого синдрома, Аспирин и тромболитики, срочная госпитализация по скорой помощи

Блок: Блок 8 | № 719

719. ДЛЯ РАСЧЁТА ИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕОБХОДИМЫ ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ДАННОМ ГОДУ, И

☐ среднегодовой численности населения

Блок: Блок 8 | № 720

720. ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЦИРРОЗА, ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС CHILD-PUGH НЕ ВКЛЮЧАЕТ КЛИНИКО- ЛАБОРАТОРНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

☐ количества тромбоцитов

Блок: Блок 8 | № 721

721. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВНЕЛЕГОЧНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ПНЕВМОНИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ БУДЕТ

☐ спутанность сознания

Блок: Блок 8 | № 722

722. В ТЕРАПИИ ХОБЛ СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ бронходилататоры

Блок: Блок 8 | № 723

723. САМЫМ РАННИМ БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ НЕКРОЗА ПРИ РАЗВИТИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ В КРОВИ

☐ миоглобина

Блок: Блок 8 | № 724

724. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРОБЫ ВАЛЬСАЛВЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ уменьшение венозного возврата

Блок: Блок 8 | № 725

725. ЭЛИМИНАЦИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ХАРАКТЕРИЗУЕТ

☐ биодоступность

Блок: Блок 8 | № 726

726. ШЕСТИМИНУТНЫЙ ТЕСТ ХОДЬБЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

☐ функционального класса сердечной недостаточности

Блок: Блок 8 | № 727

727. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ КОРИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ФОРМА

☐ 058/y

Блок: Блок 8 | № 728

728. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ГИПОТИРЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ брадикардия

Блок: Блок 8 | № 729

729. ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НЕОБХОДИМО РЕКОМЕНДОВАТЬ

☐ ограничение приема поваренной соли

Блок: Блок 8 | № 730

730. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНОЙ АДЕНОМОЙ ГИПОФИЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пролактинома

Блок: Блок 8 | № 731

731. ПРИ НАЛИЧИИ КРОВОТЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДВС-СИНДРОМОМ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ свежезамороженную плазму

Блок: Блок 8 | № 732

732. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингибиторы АПФ

Блок: Блок 8 | № 733

733. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ МЕНИНГОКОККЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ геморрагическая сыпь

Блок: Блок 8 | № 734

734. ОПТИМАЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХСН IIA СТ., ФК III ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ингибиторы АПФ, β -блокаторы, диуретики

Блок: Блок 8 | № 735

735. БИОДОСТУПНОСТЬ ФЕРМЕНТАТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В МИКРОГРАНУЛАХ СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

☐ 100

Блок: Блок 8 | № 736

736. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ БОЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ атриовентрикулярная блокада 2-3 степени

Блок: Блок 8 | № 737

737. К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ОТНОСЯТ

☐ эрозии суставной поверхности

Блок: Блок 8 | № 738

738. ПОД СИНКОПАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ ПОНИМАЮТ

☐ преходящую потерю сознания вследствие общей гипоперфузии головного мозга

Блок: Блок 8 | № 739

739. ПРИ ПОДБОРЕ ДОЗ ИНСУЛИНА С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ

☐ содержание глюкозы в плазме крови

Блок: Блок 8 | № 740

740. АНТИФИБРОЗНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИФфуЗНОЙ ФОРМЫ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Д-пеницилламин

Блок: Блок 8 | № 741

741. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ морфин

Блок: Блок 8 | № 742

742. ПРОТИВОЛЕЙКОЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ

☐ доксорубицин

Блок: Блок 8 | № 743

743. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ спирография

Блок: Блок 8 | № 744

744. КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ БРОНХОЛОБУЛЯРНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ, ОКРУГЛЫЙ ИНФИЛЬТРАТ, ОБЛАКОВИДНЫЙ ИНФИЛЬТРАТ И

☐ перциссиссурит, лобит

Блок: Блок 8 | № 745

745. ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ

☐ амилазы

Блок: Блок 8 | № 746

746. ДЛЯ СКРИНИНГА НА ТУБЕРКУЛЕЗНУЮ ИНФЕКЦИЮ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ ДИАСКИНТЕСТ ПРОВОДИТСЯ В ВОЗРАСТЕ ____ ЛЕТ

☐ 8-17

Блок: Блок 8 | № 747

747. В РАЗВИТИИ СЕКРЕТОРНОЙ ДИАРЕИ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ ОСНОВНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ

☐ активация аденилатциклазы

Блок: Блок 8 | № 748

748. К ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ АКТИВНОСТИ ОЧАГОВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ

☐ обнаружение микобактерий туберкулеза в мокроте

Блок: Блок 8 | № 749

749. ДЛЯ ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХАРАКТЕРНО

☐ снижение протромбинового индекса, повышение билирубина, снижение альбумина

Блок: Блок 8 | № 750

750. К ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВАРИАНТНОЙ СТЕНОКАРДИИ ОТНОСЯТ

☐ антагонисты кальция

Блок: Блок 8 | № 751

751. ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ КАШЛЯ МОЖЕТ БЫТЬ

☐ нарушение ритма сердца

Блок: Блок 8 | № 752

752. БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБА СЧИТАЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРИ НАЛИЧИИ

☐ 100000 бактерий/мл мочи и более

Блок: Блок 8 | № 753

753. ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ «ИЗОЛИРОВАННАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО УРОВНЮ АД В ММ РТ.СТ.

☐ ниже 140 и выше 85

Блок: Блок 8 | № 754

754. ПРОТИВОВИРУСНЫМ СРЕДСТВОМ, АКТИВНЫМ В ОТНОШЕНИИ ШТАММОВ ГРИППА А, В, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ осельтамивир

Блок: Блок 8 | № 755

755. ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПОКАЗАНА ДЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

☐ оральными антикоагулянтами

Блок: Блок 8 | № 756

756. В РОССИИ ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ болезни системы кровообращения, новообразования, внешние причины

Блок: Блок 8 | № 757

757. К ФАКТОРАМ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЫЗЫВАЮЩИМ ПОРАЖЕНИЕ КЛУБОЧКОВ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ, ОТНОСЯТ

☐ комплемент

Блок: Блок 8 | № 758

758. НАРУШЕНИЕ ДИФфуЗИИ ГАЗОВ ЧЕРЕЗ АЛЬВЕОЛО-КАПИЛЛЯРНУЮ МЕМБРАНУ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ диффузном фиброзе легких

Блок: Блок 8 | № 759

759. ЖИРОВАЯ ИНФИЛЬТРАЦИЯ ПЕЧЕНИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ сахарного диабета 2 типа

Блок: Блок 8 | № 760

760. ПРИ ОПЕРАТИВНОМ РОДРАЗРЕШЕНИИ У РОЖЕНИЦЫ С АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ПЕРЕЛИВАНИЕ

☐ эритроцитарной и тромбоцитарной массы

Блок: Блок 8 | № 761

761. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВОЙ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л

Блок: Блок 8 | № 762

762. ПОД УВЕЛИЧЕНИЕМ АБСОЛЮТНОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕЙКОЦИТОВ ПОДРАЗУМЕВАЮТ

☐ количество лейкоцитов в 1 л крови

Блок: Блок 8 | № 763

763. СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ КРИТЕРИЯМИ ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ II СТЕПЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ СИСТОЛИЧЕСКОЕ АД ____, ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ АД

☐ 160-179; 100-109

Блок: Блок 8 | № 764

764. ОСНОВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ УИППЛА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ антибиотики

Блок: Блок 8 | № 765

765. ДЛЯ ВЫБОРА МЕСТА ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ РЕКОМЕНДОВАНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШКАЛУ

☐ CRB-65

Блок: Блок 8 | № 766

766. В ФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ИБС ВХОДЯТ

☐ лечебная физкультура, дозированная ходьба, специальные физические тренировки

Блок: Блок 8 | № 767

767. ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ (СКРИНИНГ) ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ У ГРАЖДАН ПРИЗНАКОВ

☐ онкологических заболеваний

Блок: Блок 8 | № 768

768. ВОЗМОЖНЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЕМ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение сократительной способности миокарда

Блок: Блок 8 | № 769

769. ПРОДЛЕНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА СРОК БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

☐ врачебная комиссия

Блок: Блок 8 | № 770

770. МЕДИЦИНСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ВЫДАЮТСЯ БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЕГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

☐ суду

Блок: Блок 8 | № 771

771. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТРОМБОЦИТОПАТИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СВЯЗАНА С ПРИЕМОМ

☐ нестероидных противовоспалительных препаратов

Блок: Блок 8 | № 772

772. ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПОКАЗАНА ПРИ

☐ только при остром коронарном синдроме с подъемом ST

Блок: Блок 8 | № 773

773. ПАЦИЕНТУ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ НЕ РЕКОМЕНДОВАН

☐ метопролол

Блок: Блок 8 | № 774

774. ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ

☐ лекарственные средства, содержащие йод

Блок: Блок 8 | № 775

775. СИНДРОМ АНОРЕКСИИ-КАХЕКСИИ НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕН ПРИ РАКЕ

☐ желудка, поджелудочной железы

Блок: Блок 8 | № 776

776. САНДОСТАТИН ЛАР ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

☐ аналогов соматостатина

Блок: Блок 8 | № 777

777. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ АМИОДАРОНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дисфункция щитовидной железы

Блок: Блок 8 | № 778

778. К МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ АКТИВНОСТИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ОТНОСЯТ

☐ наличие нейтрофильных лейкоцитов в собственной пластинке слизистой оболочки кишечной стенки

Блок: Блок 8 | № 779

779. ТЕЛЕАНГИЭКТАЗИИ, НОСОВЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ И ОТСУТСТВИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ болезни Рандо-Ослера

Блок: Блок 8 | № 780

780. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ АНТИТЕЛ К ТКАНЕВОЙ ТРАНСГЛЮТАМИНАЗЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ глютенной энтеропатии

Блок: Блок 8 | № 781

781. ПРИЧИНОЙ РОТОГЛОТОЧНОЙ ДИСФАГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ перенесенный инсульт

Блок: Блок 8 | № 782

782. РАННЯЯ ПОСТИНФАРКТНАЯ СТЕНОКАРДИЯ ВОЗНИКАЕТ ОТ НАЧАЛА РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЧЕРЕЗ

☐ 48 часов – 2 недели

Блок: Блок 8 | № 783

783. ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ ревматоидного фактора

Блок: Блок 8 | № 784

784. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ

☐ первичного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) в течение 90-120 минут от первого контакта с медицинским персоналом

Блок: Блок 8 | № 785

785. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОЗИРОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КЛАССИЧЕСКОЙ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С *Helicobacter PYLORI*, СОСТАВЛЯЮТ

☐ омепразола 40 мг в сутки, амоксициллина 2000 мг в сутки, кларитромицина 1000 мг в сутки

Блок: Блок 8 | № 786

786. ИЗ ВСЕХ ВАРИАНТОВ НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ ЧАЩЕ ВСЕГО РЕГИСТРИРУЕТСЯ

☐ менингоэнцефалитический синдром

Блок: Блок 8 | № 787

787. ПРИ ОППОРТУНИСТИЧЕСКИХ МИКОЗАХ ЭФФЕКТИВЕН

☐ флуконазол

Блок: Блок 8 | № 788

788. ПРЕДРАКОВЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ диффузный семейный полипоз, лейкоплакия пищевода, множественные полипы желудка

Блок: Блок 8 | № 789

789. ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗНЫЙ КОМПЛЕКС ЯВЛЯЕТСЯ

☐ клинической формой первичного туберкулёза

Блок: Блок 8 | № 790

790. ПРИ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ ингибиторов АПФ

Блок: Блок 8 | № 791

791. К СПЕЦИАЛЬНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ОСАНКИ ОТНОСЯТСЯ

☐ корригирующие

Блок: Блок 8 | № 792

792. ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО ЗАСТОЯ ТОЛЬКО В МАЛОМ КРУГЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ МОГУТ ОТМЕЧАТЬСЯ ПРИ ____ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

☐ III

Блок: Блок 8 | № 793

793. ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ВЫБОРА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА У ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ возраст и наличие макрососудистых осложнений сахарного диабета

Блок: Блок 8 | № 794

794. ФАКТОРОМ, УМЕНЬШАЮЩИМ РИСК РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ «средиземноморская» диета

Блок: Блок 8 | № 795

795. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЕЗНИ КРОНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кишечная непроходимость

Блок: Блок 8 | № 796

796. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ транссфеноидальная аденомэктомия

Блок: Блок 8 | № 797

797. К ОГРАНИЧЕНИЮ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ ОТНОСЯТ ____ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ

☐ способность, с использованием вспомогательных средств

Блок: Блок 8 | № 798

798. ПРЕПАРАТОМ, СНИЖАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фамотидин

799. К НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЦИТОЛИЗА ГЕПАТОЦИТОВ ОТНОСЯТ

☐ повышение активности АЛТ и АСТ

800. ПРИ ОТСУТСТВИИ НА ФОНЕ ПРИЁМА БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ НЕОБХОДИМОГО СНИЖЕНИЯ ЧСС У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С СИНУСОВЫМ РИТМОМ К ТЕРАПИИ МОЖНО ДОБАВИТЬ

☐ ивабрадин

Блок 9

801. КАРДИОСПЕЦИФИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ НЕКРОЗА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тропонин I

802. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗОМ У МУЖЧИНЫ 68 ЛЕТ С ВЫЯВЛЕННОЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ЛИМФАДЕНОПАТИЕЙ, СПЛЕНОМЕГАЛИЕЙ И ЛЕЙКОЦИТАМИ $84 \times 10^9/\text{л}$ (П/Я 2, С/Я 18, Л 72, М 8) ЯВЛЯЕТСЯ

☐ хронический лимфолейкоз

803. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ усиление глюконеогенеза

804. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТА ДОСТОВЕРНЫМ КРИТЕРИЕМ ИШЕМИИ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ депрессия сегмента ST более 2 мм в точке J

805. СТЕРОИДНАЯ ТЕРАПИЯ ПРОТИВОПОКАЗАНА ПРИ

☐ диабетическом нефротическом синдроме

806. ПРОТИВООПУХОЛЕВЫМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ доксорубицин

807. ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХОЛЕСТАТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ВКЛЮЧАЮТ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

☐ щелочной фосфатазы

Блок: Блок 9 | № 808

808. СТРАХОВАТЕЛЕМ ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ работодатель

Блок: Блок 9 | № 809

809. НЕЙТРОФИЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ бактериальной инфекции

Блок: Блок 9 | № 810

810. ПРИ ТЯЖЕЛОМ ГИПОТИРЕОЗЕ У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОКАРДИЕЙ НЕОБХОДИМО

☐ назначить лечение начиная с малых доз левотироксина

Блок: Блок 9 | № 811

811. АД 160/90 ММ РТ.СТ. СООТВЕТСТВУЕТ ____ СТЕПЕНИ ПОВЫШЕНИЯ

☐ 2

Блок: Блок 9 | № 812

812. ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ Орлистат

Блок: Блок 9 | № 813

813. ВНЕЗАПНОЕ НАЧАЛО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРОЯВЛЯЮЩЕЕСЯ ОЗНОБОМ, ИНТЕНСИВНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ, ВОЗБУЖДЕНИЕМ, РИГИДНОСТЬЮ ЗАТЫЛОЧНЫХ МЫШЦ, СУДОРОГАМИ, ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ менингита

Блок: Блок 9 | № 814

814. РЕЖИМ И ФОРМЫ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ, НАГРУЗКА ПЕРСОНАЛА ДОЛЖНЫ УТВЕРЖДАТЬСЯ НА УРОВНЕ ____ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

☐ руководителя

Блок: Блок 9 | № 815

815. ВЕРИФИКАЦИИ ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА БОЛЕЙ В ОБЛАСТИ СЕРДЦА НАИБОЛЬШЕЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ И СПЕЦИФИЧНОСТЬЮ ОБЛАДАЕТ

☐ нагрузочный тест

Блок: Блок 9 | № 816

816. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингибиторы АПФ

Блок: Блок 9 | № 817

817. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ПЕРВИЧНОЙ ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ ИМЕЕТ

☐ дефицит α_1 -антитрипсина

Блок: Блок 9 | № 818

818. ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОЙ КИШКИ ОТМЕЧАЮТСЯ

☐ нарушения моторики

Блок: Блок 9 | № 819

819. ПРЕПАРАТОМ, ОТНОсяЩИМСЯ К ГРУППЕ СЕЛЕКТИВНЫХ ИНГИБИТОРОВ ЦОГ-2, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Целекоксиб

Блок: Блок 9 | № 820

820. ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ МОЖЕТ ЗАПОДОЗРИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ

☐ бактериоскопического исследования мокроты

Блок: Блок 9 | № 821

821. ВЕДУЩИМ ЗВЕНОМ ПАТОГЕНЕЗА ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ поражение эндотелия сосудов

Блок: Блок 9 | № 822

822. КО ВТОРОЙ ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ ОНКОБОЛЬНЫХ ОТНОСЯТ ПАЦИЕНТОВ С

☐ предраковым заболеванием

Блок: Блок 9 | № 823

823. К МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ГИПЕРОСМОЛЯРНОЙ КОМЫ ОТНОСЯТ

☐ гипергликемию и гиперосмолярность

Блок: Блок 9 | № 824

824. С ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИ ЭКССУДАТИВНОМ ПЛЕВРИТЕ ВЫПОЛНЯЮТ

☐ рентгенографию, плевральную пункцию, фибробронхоскопию, торакоскопию

Блок: Блок 9 | № 825

825. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ФУРАЗОЛИДОНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ лямблиоз

Блок: Блок 9 | № 826

826. ИНФИЦИРОВАНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ СОПРОВОЖДАЕТСЯ

☐ развитием антрального гастрита

Блок: Блок 9 | № 827

827. ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОБЫ МАНТУ С 2ТЕ ППД-Л ЯВЛЯЕТСЯ

☐ уколочная реакция

Блок: Блок 9 | № 828

828. ОДНИМ ИЗ ХАРАКТЕРНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ АКРОМЕГАЛИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ диастема

Блок: Блок 9 | № 829

829. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ, НА КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ, СОСТАВЛЯЕТ

☐ 15

Блок: Блок 9 | № 830

830. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ СИМПТОМОМ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ боль в груди

Блок: Блок 9 | № 831

831. К МАЛОВЕРОЯТНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ОТНОСЯТ

☐ отеки

Блок: Блок 9 | № 832

832. УРОВЕНЬ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДИАГНОСТИРОВАТЬ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, СОСТАВЛЯЕТ (%)

☐ 6,5

Блок: Блок 9 | № 833

833. СИНДРОМ ДРЕССЛЕРА РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ

☐ острого инфаркта миокарда

Блок: Блок 9 | № 834

834. БЛОКАДА ПРЕВРАЩЕНИЯ ЛАНОСТЕРОЛА КЛЕТОК ГРИБОВ В МЕМБРАННЫЙ ЛИПИД - ЭРГОСТЕРОЛ ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ДЕЙСТВИЯ

☐ флуконазола

Блок: Блок 9 | № 835

835. ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО ____ ФЕРРИТИНА И ____ ОЖСС

☐ снижение; повышение

Блок: Блок 9 | № 836

836. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ механическая боль в суставе

Блок: Блок 9 | № 837

837. ПРИ АУТОИММУННОМ ГЕПАТИТЕ В КРОВИ ПОВЫШЕНО СОДЕРЖАНИЕ

☐ гамма-глобулина и IgG

Блок: Блок 9 | № 838

838. ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗДРАЖАЮЩИХ И ОСМОТИЧЕСКИХ СЛАБИТЕЛЬНЫХ МОЖЕТ СТАТЬ

☐ лаксативная болезнь

Блок: Блок 9 | № 839

839. БЕЛОК БЕНС-ДЖОНСА В МОЧЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ

- ☐ миеломной болезни

Блок: Блок 9 | № 840

840. К БЛОКАТОРАМ АЛЬФА1-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОВ ОТНОСИТСЯ

- ☐ доксазозин

Блок: Блок 9 | № 841

841. ПРОЛАКТИН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ КЛЕТКАМИ

- ☐ передней доли гипофиза

Блок: Блок 9 | № 842

842. ПОРЯДКИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УТВЕРЖДАЮТСЯ НА УРОВНЕ

- ☐ федеральном

Блок: Блок 9 | № 843

843. К ПРИЧИНЕ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

- ☐ гипертонический криз

Блок: Блок 9 | № 844

844. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ наличие нефротического синдрома без выраженной гематурии и гипертонии

Блок: Блок 9 | № 845

845. ДОСТОИНСТВО НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В МЕДИЦИНЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

- ☐ при любых распределениях признаков

Блок: Блок 9 | № 846

846. ГЕМОРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ГЕМОФИЛИИ А ОБУСЛОВЛЕН ДЕФИЦИТОМ

- ☐ VIII фактора

Блок: Блок 9 | № 847

847. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ почечная ангиография

Блок: Блок 9 | № 848

848. В ДИАГНОСТИКЕ АКРОМЕГАЛИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРОБА

- ☐ оральный глюкозотолерантный тест

849. БОЛЬНЫМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

- ☐ неселективных β -адреноблокаторов

850. ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В СОЧЕТАНИИ С СИНУСОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОТДАТЬ

- ☐ β -адреноблокаторам

851. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНОГО ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ПРИ СНИЖЕНИИ ПРОТРОМБИНОВОГО ИНДЕКСА ДО 40%, КОЛИЧЕСТВЕ ТРОМБОЦИТОВ $160 \times 10^9/\text{л}$ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- ☐ трансфузии донорской свежезамороженной плазмы

852. ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ УСПЕШНОЙ РЕПЕРFUЗИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМНОГО ТРОМБОЛИЗИСА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ снижение элевации сегмента ST на 50% и более от исходного

853. ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ТИРЕОТОКСИКОЗОМ ХАРАКТЕРНЫ ЖАЛОБЫ НА

- ☐ тремор рук, потливость, снижение веса, сердцебиение

854. БОЛЬШИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ полиартрит

855. ПАЦИЕНТУ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ СТЕНТА С ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ДВОЙНАЯ АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ ТЕРАПИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ КАК МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ (В МЕСЯЦАХ)

- ☐ 12

856. К ПРИЧИНАМ ВТОРИЧНОЙ ДИСЛИПИДЕМИИ ОТНОСЯТ

- ☐ сахарный диабет, тип 2

857. ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ острая сердечная недостаточность

858. ПАТОГНОМОНИЧНЫМ ДЛЯ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ИЗМЕНЕНИЕМ ИММУНОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ снижение уровня комплемента

Блок: Блок 9 | № 859

859. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ У 38-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ, АРАБА, С ЭПИЗОДАМИ БОЛЕЙ В ЖИВОТЕ С ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С ПОДЪЕМОМ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПОЯВЛЕНИЕМ В АНАЛИЗАХ МОЧИ ПРОТЕИНУРИИ ДО 1,5 Г/Л, ОТЕЦ КОТОРОГО УМЕР ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ «семейная средиземноморская лихорадка, амилоидоз»

Блок: Блок 9 | № 860

860. ДАТОЙ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дата поступления в бюро направления на МСЭ

Блок: Блок 9 | № 861

861. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ХАРАКТЕРНЫ

☐ сердцебиение, ослабление I тона на верхушке, систолический шум, проводящийся в левую аксиллярную область

Блок: Блок 9 | № 862

862. ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ГЕПАРИНА НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ

☐ Протамин

Блок: Блок 9 | № 863

863. ПРИ ОСТРОМ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ ПЛЕВРИТЕ ПЛЕВРАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ

☐ серозная

Блок: Блок 9 | № 864

864. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ МЕТФОРМИНА ПАЦИЕНТУ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ВЫРАЖЕННОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ВОЗРАСТАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ

☐ лактоацидоза

Блок: Блок 9 | № 865

865. БАЗИСНОЙ ТЕРАПИЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингаляционные глюкокортикоиды

Блок: Блок 9 | № 866

866. АНТИТОКСИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

☐ дифтерии

Блок: Блок 9 | № 867

867. ПЕРВЫЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА (В ПЕРЕСЧЕТЕ НА ТРЕХВАЛЕНТНОЕ) В ДОЗЕ (В МГ)

☐ 200-300

Блок: Блок 9 | № 868

868. ДИАГНОЗ «ПЕРВИЧНЫЙ ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМ» МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ ПРИ

☐ спонтанной гипокалиемии

Блок: Блок 9 | № 869

869. ЭРИТРОПОЭЗСТИМУЛИРУЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ НА БЕЛКОВОЙ ОСНОВЕ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ эритропоэтины (альфа, бета, дельта, омега)

Блок: Блок 9 | № 870

870. К ПРЕПАРАТАМ ЗАМЕДЛЕННОГО МОДИФИЦИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА ОТНОСЯТ

☐ хондропротекторы

Блок: Блок 9 | № 871

871. К ХАРАКТЕРНОМУ ПРИЗНАКУ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

☐ сочетание ринофарингита и конъюнктивита с лимфаденопатией

Блок: Блок 9 | № 872

872. ТРАНСБРОНХИАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ НАИБОЛЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНА ПРИ

☐ саркоидозе

Блок: Блок 9 | № 873

873. ВЫЯВЛЕНИЕ ЭРОЗИЙ В АНТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ФИБРОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ хеликобактерной инфекции

Блок: Блок 9 | № 874

874. В ЛАВАЖНОЙ ЖИДКОСТИ У БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРЕОБЛАДАЮТ

☐ лимфоциты

Блок: Блок 9 | № 875

875. ВОЗБУДИТЕЛЕМ КИШЕЧНОГО ИЕРСИНИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ *Yersinia enterocolitica*

Блок: Блок 9 | № 876

876. ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КОНТРОЛИРУЮТ

☐ рост, развитие, энергообеспечение клеток

Блок: Блок 9 | № 877

877. ДЛЯ ОСТРОГО МИЛИАРНОГО ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ ХАРАКТЕРНО

☐ отсутствие бактериовыделения

Блок: Блок 9 | № 878

878. ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ ХАРАКТЕРНЫ ЖАЛОБЫ НА

☐ утолщение пальцев рук, прогнатизм, увеличение размера стопы

Блок: Блок 9 | № 879

879. ПОКАЗАНИЕМ К САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ период ремиссии

Блок: Блок 9 | № 880

880. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ИНАКТИВИРОВАННОЙ ГРИППОЗНОЙ ВАКЦИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиперчувствительность к яичному белку

Блок: Блок 9 | № 881

881. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ПЕРИНДОПРИЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ двусторонний стеноз почечных артерий

Блок: Блок 9 | № 882

882. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ОСТЕОАРТРОЗА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ сужение суставной щели, субхондральный остеосклероз, остеофиты

Блок: Блок 9 | № 883

883. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, ПРОТЕКАЮЩАЯ С КРИЗАМИ, СОПРОВОЖДАЮЩИМИ ТАХИКАРДИЕЙ, ПОТООТДЕЛЕНИЕМ, БЛЕДНОСТЬЮ ЛИЦА, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ феохромоцитомы

Блок: Блок 9 | № 884

884. ИНВАЛИДНОСТЬ II ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА (В ГОДАХ)

☐ 1

Блок: Блок 9 | № 885

885. СУТОЧНАЯ ПРОТЕИНУРИЯ БОЛЕЕ 3,5 Г, НАЛИЧИЕ БЕЛКА БЕНС-ДЖОНСА, ГИПЕРПРОТЕИНЕМИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ миеломной болезни

Блок: Блок 9 | № 886

886. ЛИМФОЦИТАРНЫЙ СОСТАВ И НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕЗОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК В ПЛЕВРАЛЬНОМ ЭКСКУДАТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ туберкулеза

Блок: Блок 9 | № 887

887. ПРИ СПОНТАННОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ НА СТОРОНЕ ПОРАЖЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ АУСКУЛЬТАТИВНО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ ослабленное дыхание

Блок: Блок 9 | № 888

888. ЧЕРЕЗ 20 ДНЕЙ ПОСЛЕ УШИВАНИЯ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ФЕБРИЛЬНОЙ ЛИХОРАДКИ, БОЛИ В ПРАВОМ БОКУ, ВЫСОКОМ СТОЯНИИ ПРАВОГО КУПОЛА ДИАФРАГМЫ МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ РАЗВИТИЕ

☐ поддиафрагмального абсцесса

Блок: Блок 9 | № 889

889. КАКОВО ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТА С ВЫРАЖЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЕМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ II- III СТЕПЕНИ?

☐ признать инвалидом 2-й группы

Блок: Блок 9 | № 890

890. ТРЕТИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА

☐ предотвращение ухудшения течения заболевания, возможных осложнений после того, как болезнь проявилась

Блок: Блок 9 | № 891

891. ПРИ ГЕМАТУРИИ, СВЯЗАННОЙ С БОЛЕЗНЬЮ БЕРЖЕ, В ИММУНОГРАММЕ НАБЛЮДАЕТСЯ

☐ повышение IgA

Блок: Блок 9 | № 892

892. К ЧЕТВЕРТОЙ ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ ОНКОБОЛЬНЫХ ОТНОСЯТ ПАЦИЕНТОВ С

☐ запущенными формами рака

Блок: Блок 9 | № 893

893. БОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА СЧИТАЕТСЯ

☐ определение антител к циклическому цитруллинированному пептиду

Блок: Блок 9 | № 894

894. ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ УРОВЕНЬ

☐ тиреотропного гормона

Блок: Блок 9 | № 895

895. ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ

☐ эритематозных высыпаний

Блок: Блок 9 | № 896

896. К ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ В ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ ТЕРАПИЮ

☐ антибактериальную

Блок: Блок 9 | № 897

897. ТРЕУГОЛЬНАЯ ИНФИЛЬТРАТИВНАЯ ТЕНЬ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ ТЭЛА

Блок: Блок 9 | № 898

898. ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ СЛЕДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ

☐ асептические условия, трансфузиологическую помощь

Блок: Блок 9 | № 899

899. В ЛЕЧЕНИИ КАНДИДОЗНОГО ЭЗОФАГИТА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИМЕНЯЕТСЯ

☐ флуконазол

Блок: Блок 9 | № 900

900. У МУЖЧИНЫ 38 ЛЕТ ЛИХОРАДКА, БОЛИ В СУСТАВАХ, СЛИЗИСТО-ГНОЙНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НОСА, ПРОТЕИНУРИЯ 1 Г/СУТКИ, ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ЛЕГКИХ ВЫЯВЛЕНЫ НЕСКОЛЬКО ПОЛОСТЕЙ БЕЗ СОДЕРЖИМОГО. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТЕН ДИАГНОЗ

☐ гранулематоз Вегенера

Блок 10

Блок: Блок 10 | № 901

901. МАРКЕРАМИ ХРОНИЧЕСКОГО АУТОИММУННОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ревматоидные факторы

Блок: Блок 10 | № 902

902. ДИАГНОЗ «СИНДРОМ РАЗДРАЖЁННОГО КИШЕЧНИКА» ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ

☐ наличии крови в кале

Блок: Блок 10 | № 903

903. МЕТОДОМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ГЕПАТИТА С ЯВЛЯЕТСЯ

☐ полимеразная цепная реакция

Блок: Блок 10 | № 904

904. СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ РКО ДЛЯ ОЦЕНКИ ДЕСЯТИЛЕТНЕГО РИСКА ФАТАЛЬНЫХ И НЕФАТАЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ шкалу SCORE

Блок: Блок 10 | № 905

905. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТОКСИЧЕСКОЙ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ отёк подкожной клетчатки шеи

Блок: Блок 10 | № 906

906. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРУЦЕЛЛЕЗЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТСЯ

☐ опорно-двигательный аппарат

Блок: Блок 10 | № 907

907. ПОКАЗАТЕЛЬ ДОСУТОЧНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕМ ЧИСЛА УМЕРШИХ В ПЕРВЫЕ СУТКИ К ЧИСЛУ

☐ поступивших в стационар

Блок: Блок 10 | № 908

908. ПОКАЗАТЕЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ АКТИВНОСТЬ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ АЛТ

Блок: Блок 10 | № 909

909. УСИЛЕНИЕ 1 ТОНА НА ВЕРХУШКЕ СЕРДЦА ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ митральном стенозе

Блок: Блок 10 | № 910

910. УЧЕТНАЯ ФОРМА N 025/У «МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ»

☐ заполняется на каждого впервые обратившегося за медицинской помощью в амбулаторных условиях пациента(ку)

Блок: Блок 10 | № 911

911. УЛУЧШАЮТ ПРОГНОЗ У БОЛЬНЫХ ИБС, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА

☐ бета-блокаторы

Блок: Блок 10 | № 912

912. ТЕМНАЯ И ЖЕЛТОВАТАЯ ОКРАСКА КОЖИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОБУСЛОВЛЕНА

☐ нарушением выделения урохромов

Блок: Блок 10 | № 913

913. «ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ПУЛЬС» У БОЛЬНЫХ С ПЕРИКАРДИТОМ ВОЗНИКАЕТ ВСЛЕДСТВИЕ

☐ снижения сердечного выброса на вдохе

Блок: Блок 10 | № 914

914. О ДЕСТРУКЦИИ ТКАНИ ЛЕГКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБНАРУЖЕНИЕ В МОКРОТЕ

☐ эластических волокон

Блок: Блок 10 | № 915

915. ФЕНОМЕН «ПЛЯСКА КАРОТИД» ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ

☐ недостаточности аортального клапана

Блок: Блок 10 | № 916

916. ПРИЧИНОЙ КРОВОТЕЧЕНИЯ ИЗ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение давления в портальной вене

Блок: Блок 10 | № 917

917. ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ ОКАЗЫВАЮТ ДЕЙСТВИЕ

☐ противовоспалительное

Блок: Блок 10 | № 918

918. ДЕРМАТОМИОЗИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

☐ кожи, поперечно-полосатых мышц

Блок: Блок 10 | № 919

919. К АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ III КЛАССА (УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ) ОТНОСЯТ

☐ амиодарон, соталол, дронедазон

Блок: Блок 10 | № 920

920. ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ВЫСТУПАЕТ

☐ уменьшение сердечного выброса

Блок: Блок 10 | № 921

921. ОДНИМ ИЗ КОМПОНЕНТОВ АСПИРИНОВОЙ ТРИАДЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ полипоз носа

Блок: Блок 10 | № 922

922. ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ДОМУ ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ ОБЯЗАН

☐ обеспечить раннее выявление заболевания

Блок: Блок 10 | № 923

923. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ДОЗ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ГЕПАРИНОВ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

☐ гепарин-индуцированная тромбоцитопения

Блок: Блок 10 | № 924

924. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ОЧАГА РОЖИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ нижние конечности

Блок: Блок 10 | № 925

925. ПИКОФЛОУМЕТРИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ

☐ вариабельность ПСВ в течение промежутка времени

Блок: Блок 10 | № 926

926. ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ» СТАВИТСЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ (В МЕСЯЦАХ)

☐ 6

Блок: Блок 10 | № 927

927. БОЧКООБРАЗНАЯ ФОРМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ НОГТЕЙ ПАЛЬЦЕВ РУК («ЧАСОВЫЕ СТЕКЛА») ПРИ НЕАТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О РАЗВИТИИ У БОЛЬНОГО

☐ эмфиземы лёгких

Блок: Блок 10 | № 928

928. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ НАЕМОРИЛUS INFLUENZAE, ЯВЛЯЮТСЯ

☐ аминопенициллины

Блок: Блок 10 | № 929

929. НАИБОЛЬШУЮ ИНФОРМАЦИЮ ПРИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОПУХОЛЯХ ЛЁГКИХ ПОЛУЧАЮТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ

☐ материала трансторакальной пункции

Блок: Блок 10 | № 930

930. ОРТОСТАТИЧЕСКАЯ ГИПОТОНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИЗМЕРЕНИЕМ АД ПРИ ПЕРЕХОДЕ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ

☐ 3 минуты и снижением САД более чем на 20 мм рт.ст. и ДАД более чем на 10 мм рт.ст.

Блок: Блок 10 | № 931

931. ОГРАНИЧЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПЕРЕДВИЖЕНИЮ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ НАЗЫВАЮТ ____ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПЕРЕДВИЖЕНИЮ

☐ способность: с использованием вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц

Блок: Блок 10 | № 932

932. ОСНОВНОЙ ЖАЛОБОЙ ПАЦИЕНТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ одышка

Блок: Блок 10 | № 933

933. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ «СИНДРОМ РАЗДРАЖЕННОЙ КИШКИ» МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН НА ОСНОВАНИИ ПОЛНОГО КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ И

☐ исключения других заболеваний

Блок: Блок 10 | № 934

934. ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ гипертрофической кардиомиопатии

Блок: Блок 10 | № 935

935. РАННИМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К САХАРНОМУ ДИАБЕТУ 2 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ исчезновение ранней фазы секреции инсулина

Блок: Блок 10 | № 936

936. ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИИ H. PYLORI ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дыхательный уреазный тест

Блок: Блок 10 | № 937

937. ТЕМПЕРАТУРНАЯ РЕАКЦИЯ ПРИ ЛЮБОЙ ФОРМЕ ЧУМЫ В НАЧАЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ потрясающим ознобом, лихорадкой 39-40°C

Блок: Блок 10 | № 938

938. ОСОБЕННОСТЬЮ МАРКЕТИНГА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ анализ потребности в медицинских услугах

Блок: Блок 10 | № 939

939. ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ В ВИДЕ КАШЛЯ ПРИ ПРИЕМЕ ИНГИБИТОРОВ АПФ СВЯЗАН С

☐ увеличением продукции брадикинина в бронхах

Блок: Блок 10 | № 940

940. НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ХАРАКТЕРИЗУЕТ СКОРОСТЬ ВЫВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ИЗ ОРГАНИЗМА

☐ общий клиренс

Блок: Блок 10 | № 941

941. ДЛЯ II СТЕПЕНИ ОЖИРЕНИЯ ХАРАКТЕРЕН ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА (КГ/М²)

☐ 35,0-39,9

Блок: Блок 10 | № 942

942. ГИПЕРТОНИЯ НИЖНЕГО ПИЩЕВОДНОГО СФИНКТЕРА ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ ахалазии кардии

Блок: Блок 10 | № 943

943. МАССОВЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ флюорографическое обследование органов дыхания

Блок: Блок 10 | № 944

944. ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА «ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ» ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие маркеров вирусных гепатитов в крови

Блок: Блок 10 | № 945

945. ВОЗБУДИТЕЛЕМ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ β-гемолитический стрептококк группы А

Блок: Блок 10 | № 946

946. К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ МИКРОАНГИОПАТИИ ОТНОСЯТ

☐ гипергликемию

Блок: Блок 10 | № 947

947. У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОБКРАДЫВАНИЯ НЕ РЕКОМЕНДОВАН К ПРИМЕНЕНИЮ

☐ дипиридамол

948. ВЫПИСОВКА ИЗ ЛИСТОВ НАЗНАЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ

- ☐ ночной постовой медсестрой

949. В ОТНОШЕНИИ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА

- ☐ антибактериальная терапия должна проводиться парентерально

950. ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОГО БРОНХИТА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ очаговая пневмония

951. МЕТОДОМ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ вакцинация

952. МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ____ УРОВНЕ

- ☐ федеральном

953. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ СИНДРОМА ОТМЕНЫ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВ СЧИТАЮТ

- ☐ нарушение циркадного ритма «сон-бодрствование»

954. ОСЛОЖНЕНИЕ «ЛОЖНЫЙ КРУП» ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- ☐ парагриппа

955. СОГЛАСНО СПИРОМЕТРИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ, ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНО ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ____ ОТ ДОЛЖНОГО

- ☐ $30 \% \leq \text{ОФВ1} < 50\%$

956. НЕРАЦИОНАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ КОМБИНАЦИЯ

- ☐ α -адреноблокаторов и антагонистов кальция

957. ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМИ К ТРОМБОЗУ, ЯВЛЯЮТСЯ

- ☐ повреждение эндотелия, турбулентный ток крови, гиперкоагуляция

Блок: Блок 10 | № 958

958. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРУЦЕЛЛЁЗА ПРИМЕНЯЮТ

☐ реакцию Райта

Блок: Блок 10 | № 959

959. ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ 60-ЛЕТНЕГО ПАЦИЕНТА С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ, ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ГИПЕРСПЛЕНИЗМОМ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ

☐ асцит

Блок: Блок 10 | № 960

960. КАКИМ БОЛЬНЫМ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ?

☐ молодым больным АГ I ст. в течение 6-12 мес.

Блок: Блок 10 | № 961

961. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эндоскопия с прицельной биопсией

Блок: Блок 10 | № 962

962. ВНЕГРУДНАЯ ОБСТРУКЦИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В ОБЛАСТИ ШЕИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ частым поверхностным дыханием

Блок: Блок 10 | № 963

963. В СОСТАВ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НЕ ВХОДИТ

☐ теофиллин

Блок: Блок 10 | № 964

964. ЧАСТОТА СЖАТИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ ____ В МИНУТУ

☐ менее 100

Блок: Блок 10 | № 965

965. ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ НАБЛЮДАЕТСЯ

☐ гипохромия

Блок: Блок 10 | № 966

966. РАННИМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение уровня антител к циклическому цитруллинированному пептиду

Блок: Блок 10 | № 967

967. ПРИ БОЛИ В ЖИВОТЕ, ТОШНОТЕ, ИЗЖОГЕ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

☐ эзофагогастродуоденоскопию

968. ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДИФТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ коринобактерия

969. ДИАГНОЗ «ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ» МОЖЕТ БЫТЬ ТОЧНО УСТАНОВЛЕН ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ

☐ более 20% бластных клеток в костном мозге

970. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ У БОЛЬНОЙ 46 ЛЕТ С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ НОЧЬЮ ПРИСТУПАМИ ЗАГРУДИННЫХ БОЛЕЙ, ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ПРЕХОДЯЩИЙ ПОДЪЕМ СЕГМЕНТА ST, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ вариантная стенокардия

971. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИШЕМИИ МИОКАРДА НА ЭКГ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ

☐ сегмента ST

972. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ КОЖНОГО ЗУДА ПРИ БИЛИАРНОМ ЦИРРОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ урсодезоксихолевая кислота

973. ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ УРОВЕНЬ АЛЬБУМИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ СНИЖАЕТСЯ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, ВСЛЕДСТВИЕ

☐ нарушения синтетической функции гепатоцитов

974. ИНФОРМАТИВНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ определение D-димера

975. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ МИОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ субэндомиокардиальная биопсия

976. ОСНОВНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ азотемия

977. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

☐ ингаляционные глюкокортикостероиды и β_2 -агонисты

Блок: Блок 10 | № 978

978. ПРИ МАЛЯРИИ OVALE ЛИХОРАДОЧНЫЕ ПАРОКСИЗМЫ ВОЗНИКАЮТ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

☐ 48

Блок: Блок 10 | № 979

979. К БЕТА2-АГОНИСТАМ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

☐ сальбутамол

Блок: Блок 10 | № 980

980. ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ

☐ развитием первичной медико-санитарной помощи

Блок: Блок 10 | № 981

981. К ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ОТНОСЯТ

☐ физическое упражнение

Блок: Блок 10 | № 982

982. ПОНЯТИЕ «ЭКЗОГЕННАЯ СУПЕРИНФЕКЦИЯ» ВКЛЮЧАЕТ

☐ проникновение извне инфекции в уже инфицированный организм

Блок: Блок 10 | № 983

983. ПРОФИЛАКТИКА КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ГЕМОФИЛИИ ПРОВОДИТСЯ

☐ путем регулярного введения расчетных доз препаратов факторов свертывания крови

Блок: Блок 10 | № 984

984. ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ЛЕВОТИРОКСИНА СЛЕДУЕТ

☐ временно отменить препарат

Блок: Блок 10 | № 985

985. ПРИ РЕЦИДИВЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВВЕДЕНИЯ НЕ РАЗРЕШЕНО ПРИМЕНЕНИЕ

☐ стрептокиназы

Блок: Блок 10 | № 986

986. РЕКОМЕНДОВАННОЕ ВРЕМЯ ОТ ПЕРВОГО КОНТАКТА С МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ ДО ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОВОТОКА В ИНФАРКТ-СВЯЗАННОЙ АРТЕРИИ ПРИ ПЕРВИЧНОМ ЧРЕСКОЖНОМ КОРОНАРНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ СОСТАВЛЯЕТ (В МИНУТАХ)

☐ 120

Блок: Блок 10 | № 987

987. ОТЁК ЛЁГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ

☐ инфаркта миокарда

Блок: Блок 10 | № 988

988. ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ отсутствием зубцов Р

Блок: Блок 10 | № 989

989. К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ ТИАМАЗОЛА ОТНОСЯТ

☐ лейкопению, агранулоцитоз

Блок: Блок 10 | № 990

990. БОЛЬ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ТОШНОТА, РВОТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ локализации инфаркта миокарда в области нижней стенки ЛЖ

Блок: Блок 10 | № 991

991. ПРОЛИВНОЙ ПОТ С СУБФЕБРИЛЬНОЙ ЛИХОРАДКОЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ МЕСЯЦА, КОЖНЫЙ ЗУД И ЛИМФОАДЕНОПАТИИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ лимфогранулематоза

Блок: Блок 10 | № 992

992. ОДНИМ ИЗ ПРЕПАРАТОВ СТАРТОВОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ БЕЗ ЗНАЧИМЫХ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ампициллин

Блок: Блок 10 | № 993

993. АДЕКВАТНАЯ РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА ПРОБУ С НАГРУЗКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

☐ нормотоническая

Блок: Блок 10 | № 994

994. К ВТОРИЧНЫМ КАРДИОМИОПАТИЯМ ОТНОСИТСЯ

☐ перипартальная

Блок: Блок 10 | № 995

995. ПРИ ТЯЖЕЛОЙ АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ПУЛЬС

☐ быстрый высокий

Блок: Блок 10 | № 996

996. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ ПРИМЕНЯЮТ

☐ антибиотики, отхаркивающие

Блок: Блок 10 | № 997

997. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОПРАВДАНО ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ АНЕМИИ ПРИ

☐ хроническом гломерулонефрите с периодической макрогематурией

Блок: Блок 10 | № 998

998. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВЕН МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФАЗЫ РАСПАДА ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ ЛЁГКИХ

☐ компьютерная томография

999. К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ БОТУЛИЗМЕ ОТНОСЯТ

☐ офтальмоплегию

1000. ИНТОКСИКАЦИЯ ПРЕПАРАТАМИ ДИГОКСИНА СОПРОВОЖДАЕТСЯ

☐ тошнотой и рвотой

Блок 11

1001. ПРЕДНАГРУЗКУ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СНИЖАЮТ

☐ диуретики

1002. СКРИНИНГ-МЕТОДОМ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ иммуноферментный анализ (ИФА)

1003. К ОСНОВНЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ОТНОСЯТСЯ РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И

☐ физическая активность

1004. БОЛЬНЫЕ С ХРОНИЧЕСКИМ ЛИМФОЛЕЙКОЗОМ ДОЛЖНЫ

☐ избегать условий высокого риска респираторных инфекций

1005. ЭКСПЕРТИЗУ СТОЙКОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

☐ бюро медико-социальной экспертизы

1006. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА И БЛОКАТОРОВ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II ЯВЛЯЕТСЯ

☐ двусторонний значимый стеноз почечных артерий

1007. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ТЕРАПИИ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА ПРИВОДИТ К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ____ % ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА БОЛЬНЫХ

☐ 80-85

1008. ТАКТИКОЙ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ РАЗВИТИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ТРАНСМУРАЛЬНЫМ ПЕРЕДНЕ-ПЕРЕГОРОДОЧНЫМ ИНФАРКТМ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ проведение дефибрилляции

Блок: Блок 11 | № 1009

1009. В ЛЕЧЕНИИ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ спазмолитические средства

Блок: Блок 11 | № 1010

1010. ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ климатический

Блок: Блок 11 | № 1011

1011. ПИКФЛОУМЕТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗМЕРЕНИЕМ

☐ пиковой скорости выдоха

Блок: Блок 11 | № 1012

1012. ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ В АНАЛИЗАХ КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ анемия, лейкоцитоз, ускорение СОЭ

Блок: Блок 11 | № 1013

1013. ДЛЯ РАСЧЕТА СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМЫ ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ СЛУЧАЕВ

☐ конкретного заболевания и числе случаев всех заболеваний

Блок: Блок 11 | № 1014

1014. ПРИ ВЫБОРЕ ДИЕТИЧЕСКОГО РЕЖИМА БОЛЬНЫМ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ

☐ мясные продукты

Блок: Блок 11 | № 1015

1015. ПЛЕТОРИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ ярко-красным оттенком кожи и слизистых

Блок: Блок 11 | № 1016

1016. КАЛОВЫЕ МАССЫ ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА СОДЕРЖАТ ХОРОШО ЗАМЕТНУЮ ПРИМЕСЬ

☐ слизи

Блок: Блок 11 | № 1017

1017. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ КОРОНАРНОЙ ОККЛЮЗИИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ____ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

☐ тромбоз

Блок: Блок 11 | № 1018

1018. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ α -агонисты центрального действия

Блок: Блок 11 | № 1019

1019. ЛИХОРАДКА, БОЛЬ В МЫШЦАХ ПРИ ДВИЖЕНИИ И В ПОКОЕ, ОДУТЛОВАТОСТЬ ЛИЦА, ЭОЗИНОФИЛИЯ В КРОВИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ трихинеллёза

Блок: Блок 11 | № 1020

1020. К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ОТНОСЯТ

☐ нарушение кровотока

Блок: Блок 11 | № 1021

1021. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА ПРОВОДИТСЯ

☐ не зависимо от приема пищи

Блок: Блок 11 | № 1022

1022. ОДНИМ ИЗ АБСОЛЮТНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ острый перикардит

Блок: Блок 11 | № 1023

1023. К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИМСЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ РЕАКЦИЯМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ОТНОСЯТ

☐ снижение толерантности к глюкозе

Блок: Блок 11 | № 1024

1024. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ

☐ повышенного образования глюкокортикостероидов

Блок: Блок 11 | № 1025

1025. ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ЯЗЫК СТАНОВИТСЯ

☐ «фулигинозным»

Блок: Блок 11 | № 1026

1026. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТНОГО БАЛАНСА ХАРАКТЕРИЗУЮТ БОЛЕЗНЬ АДДИСОНА?

☐ гиперкалиемия

Блок: Блок 11 | № 1027

1027. ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ КРУПНЫХ СУСТАВОВ ПОКАЗАНЫ ЗАНЯТИЯ

☐ плаванием

Блок: Блок 11 | № 1028

1028. ПРИ ОЧЕВИДНОМ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ И ТРУДОВОМ ПРОГНОЗЕ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ И ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА СРОК НЕ БОЛЕЕ ____ МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ НАЧАЛА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

☐ 7

Блок: Блок 11 | № 1029

1029. БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВКЛЮЧАЕТ

- ☐ виды оказания медицинской помощи

Блок: Блок 11 | № 1030

1030. ПЕРВИЧНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ СЧИТАЮТ

- ☐ заболевание ранее неинфицированного человека

Блок: Блок 11 | № 1031

1031. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА ПРИМЕНЯЮТ

- ☐ фиброгастроскопию с биопсией

Блок: Блок 11 | № 1032

1032. ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ В РЕМИССИИ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА

- ☐ не требуются ограничения физической нагрузки

Блок: Блок 11 | № 1033

1033. ИССЛЕДОВАНИЕ СУТОЧНОЙ ЭКСКРЕЦИИ ФРАКЦИОНИРОВАННЫХ МЕТАНЕФРИНОВ (МЕТЕНЕФРИНА И НОРМЕТАНЕФРИНА) В МОЧЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДТВЕРДИТЬ ИЛИ ОПРОВЕРГНУТЬ ДИАГНОЗ

- ☐ феохромоцитомы

Блок: Блок 11 | № 1034

1034. ПЕРВИЧНЫЙ ГИПОТИРЕОЗ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

- ☐ аутоиммунного тиреоидита

Блок: Блок 11 | № 1035

1035. СИБИРЕЯЗВЕННЫЙ КАРБУНКУЛ ИМЕЕТ ВИД

- ☐ черного струпа, окруженного венчиком гиперемии, без болевой чувствительности

Блок: Блок 11 | № 1036

1036. ДЕФИЦИТ АРТЕРИАЛЬНОГО ПУЛЬСА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ БОЛЬНЫХ С

- ☐ фибрилляцией предсердий

Блок: Блок 11 | № 1037

1037. ВЕРНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, КАСАЮЩИМСЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ наличие кашля с мокротой на протяжении, по крайней мере, 3 месяцев в году в течение 2 лет и более

Блок: Блок 11 | № 1038

1038. ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ПРОВОДИТСЯ

- ☐ анализ мочи на микроальбуминурию

Блок: Блок 11 | № 1039

1039. ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ДИАГНОЗА «ПЕРВИЧНЫЙ ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМ» ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ нестимулируемый уровень ренина

Блок: Блок 11 | № 1040

1040. ВЕРОЯТНОСТЬ ТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ КОМБИНАЦИИ ГЕНТАМИЦИНА С

☐ фуросемидом

Блок: Блок 11 | № 1041

1041. ЭКГ-КРИТЕРИЕМ БЛОКАДЫ ПЕРЕДНЕЙ ВЕТВИ ЛЕВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ резкое отклонение электрической оси влево

Блок: Блок 11 | № 1042

1042. ВЫСЛУШИВАНИЕ СУХИХ СВИСТЯЩИХ ХРИПОВ НАД ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СИНДРОМА

☐ нарушения бронхиальной проходимости

Блок: Блок 11 | № 1043

1043. ВЫСОКО-НОРМАЛЬНОЕ АД ДИАГНОСТИРУЮТ ПРИ АД (В ММ РТ.СТ.)

☐ 139/89

Блок: Блок 11 | № 1044

1044. БОЛЬНОМУ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, 4В СТАДИЕЙ ПОКАЗАНА ____ ТЕРАПИЯ

☐ антиретровирусная

Блок: Блок 11 | № 1045

1045. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА МОГУТ БЫТЬ

☐ генетические

Блок: Блок 11 | № 1046

1046. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЛЕЧЕНИЕ ВИТАМИНОМ В12 НАЧИНАЮТ С ДОЗЫ (В МКГ В СУТКИ)

☐ 200-400

Блок: Блок 11 | № 1047

1047. ОБОСТРЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПРИЁМЕ

☐ НПВС

Блок: Блок 11 | № 1048

1048. СЫПЬ У БОЛЬНЫХ БРЮШНЫМ ТИФОМ ПОЯВЛЯЕТСЯ НА ____ ДЕНЬ БОЛЕЗНИ

☐ 8-10

Блок: Блок 11 | № 1049

1049. ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТА С НЕОСЛОЖНЕННОЙ АГ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ

☐ ЭХО-КГ

Блок: Блок 11 | № 1050

1050. НА ЭКГ РИТМ ЖЕЛУДОЧКОВ 35 В 1 МИН., РЕГУЛЯРНЫЙ, ЗУБЕЦ Р НЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, КОМПЛЕКС QRS УШИРЕН ДО 0,18 СЕК., ДЕФОРМИРОВАН, СЕГМЕНТ ST И ВОЛНА Р ДИСКОРДАНТНЫ НАЧАЛЬНОЙ ЧАСТИ ЖЕЛУДОЧКОВОГО КОМПЛЕКСА, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ идиовентрикулярного ритма

Блок: Блок 11 | № 1051

1051. ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ПАРЕНХИМЫ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

☐ активация ренин-ангиотензиновой системы

Блок: Блок 11 | № 1052

1052. ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТАКТИКОЙ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ПОСЛЕ НОРМАЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, НО ПРИ НАРАСТАНИИ ЯВЛЕНИЙ ВЫРАЖЕННОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ направление на хирургическое лечение

Блок: Блок 11 | № 1053

1053. ПОД ПИКФЛОУМЕТРИЕЙ ПОНИМАЮТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

☐ пиковой скорости выдоха

Блок: Блок 11 | № 1054

1054. ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ДОЛЖНЫ ПРОВОДИТЬ

☐ все диагностические и лечебно-профилактические учреждения общей лечебной сети

Блок: Блок 11 | № 1055

1055. ДЛЯ СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ СОБЫТИЙ У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ тредмил-тест (с определением индекса Дьюка), ЭхоКГ, стресс-ЭхоКГ, коронароангиографию

Блок: Блок 11 | № 1056

1056. ПАСПОРТНАЯ ЧАСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (ФОРМА №025/У), ЗАПОЛНЯЕТСЯ

☐ медицинским регистратором

Блок: Блок 11 | № 1057

1057. ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ ТЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА (ДЕНЬ)

☐ 140

Блок: Блок 11 | № 1058

1058. БАЗОВЫМ ПОНЯТИЕМ В ЭКОНОМИКЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эффективность

Блок: Блок 11 | № 1059

1059. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСТРОГО ПРИСТУПА БОЛИ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ И ЗА ГРУДИНОЙ У МУЖЧИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ОБСЛЕДОВАНИЕ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

☐ электрокардиографии покоя

Блок: Блок 11 | № 1060

1060. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тонкоигольная аспирационная биопсия

Блок: Блок 11 | № 1061

1061. ГЛЮКАГОН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ

☐ α -клетками поджелудочной железы

Блок: Блок 11 | № 1062

1062. ЭКГ-ДИАГНОСТИКУ ИНФАРКТА МИОКАРДА УСЛОЖНЯЕТ

☐ блокада левой ножки Гиса

Блок: Блок 11 | № 1063

1063. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ боль за грудиной продолжительностью более 20 минут

Блок: Блок 11 | № 1064

1064. НОРМА КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛЮКОЗЫ В ЦЕЛЬНОЙ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ ПРИЁМА 75 Г ГЛЮКОЗЫ СОСТАВЛЯЕТ ДО (ММОЛЬ/Л)

☐ 7,8

Блок: Блок 11 | № 1065

1065. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКОГО НА СТАДИИ CARCINOMA IN SITU ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фибробронхоскопия

Блок: Блок 11 | № 1066

1066. ЦЕЛЮЮ РАБОТЫ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ

☐ диагностического обследования и лечения, профилактических и реабилитационных мероприятий

Блок: Блок 11 | № 1067

1067. К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ТИРЕОТОКСИКОЗА НЕ ОТНОСЯТ

☐ запоры

Блок: Блок 11 | № 1068

1068. КРАТКОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТ

☐ врач-терапевт участковый

Блок: Блок 11 | № 1069

1069. К ФАКТОРАМ РИСКА, ПРОВОЦИРУЮЩИМ РАЗВИТИЕ ПЕРВИЧНОГО ОЖИРЕНИЯ, ОТНОСИТСЯ

☐ дисбаланс между поступлением и расходом энергии

Блок: Блок 11 | № 1070

1070. ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТ ХОБЛ СОСТОИТ В

☐ обратимости бронхиальной обструкции

Блок: Блок 11 | № 1071

1071. В КЛИНИЧЕСКОМ ДИАГНОЗЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА В ЛЁГКИХ ПРИНЯТО ПО

☐ долям и сегментам

Блок: Блок 11 | № 1072

1072. СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ К ВИДУ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

☐ паллиативная

Блок: Блок 11 | № 1073

1073. У ПАЦИЕНТКИ С АГ ПРИ РАЗНИЦЕ АД НА ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ РУКАХ В 20 ММ РТ.СТ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЛЕДУЕТ ЗАПОДОЗРИТЬ

☐ болезнь Такаясу

Блок: Блок 11 | № 1074

1074. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ НЕФРИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ

☐ интерстициальной ткани

Блок: Блок 11 | № 1075

1075. ТАЛАССЕМИЯ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ У

☐ жителей Средиземноморья

Блок: Блок 11 | № 1076

1076. ЛЕЧЕНИЕ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ НАЧИНАЮТ С ВВЕДЕНИЯ

☐ изотонического раствора хлорида натрия и инсулина

Блок: Блок 11 | № 1077

1077. В КАЧЕСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПАЦИЕНТАМ ПОКАЗАНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ

☐ натрийуретических пептидов

Блок: Блок 11 | № 1078

1078. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА БОЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ беременность

Блок: Блок 11 | № 1079

1079. ПЕРСПЕКТИВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4)

Блок: Блок 11 | № 1080

1080. ПРИЗНАКОМ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ изменение длительности и интенсивности болевых приступов

Блок: Блок 11 | № 1081

1081. ГЕМОГРАММА: WBC – $36 \times 10^9/\text{л}$, МИЕЛОЦИТОВ – 10%; МЕТАМИЕЛОЦИТОВ – 12%; ПАЛОЧКОЯДЕРНЫХ – 10%; СЕГМЕНТОЯДЕРНЫХ – 8%; ЭОЗИНОФИЛОВ – 8%; ЛИМФОЦИТОВ – 21%; БАЗОФИЛОВ – 3%; МОНОЦИТОВ – 6% - ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ начальной стадии хронического миелолейкоза

Блок: Блок 11 | № 1082

1082. СИНДРОМ ПОЛИЛИМФАДЕНОПАТИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ аденовирусной инфекции

Блок: Блок 11 | № 1083

1083. ТЕСТОМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ УРОВЕНЬ ГЛИКЕМИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гликированный гемоглобин

Блок: Блок 11 | № 1084

1084. У БОЛЬНОГО 44 ЛЕТ С ПОСТОЯННЫМИ НОСОВЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ, ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИЯМИ НА КОНЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ РУК, ЯЗЫКЕ И ДЕСНАХ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ болезнь Рандо-Ослера

Блок: Блок 11 | № 1085

1085. ИНГИБИТОРЫ ПРОТОННОГО НАСОСА ОБЕСПЕЧИВАЮТ УРОВЕНЬ ВНУТРИЖЕЛУДОЧНОГО PH НА УРОВНЕ ____ И ВЫШЕ БОЛЕЕ 18 ЧАСОВ В СУТКИ

☐ 6,0

Блок: Блок 11 | № 1086

1086. В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕЖДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ И РАКОМ ЖЕЛУДКА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эндоскопическое исследование с биопсией

Блок: Блок 11 | № 1087

1087. СОЧЕТАНИЕ ДИСФАГИИ, ДИПЛОПИИ, СУХОСТИ ВО РТУ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ ботулизма

Блок: Блок 11 | № 1088

1088. КРОВОХАРКАНЬЕМ НАЗЫВАЮТ

☐ обнаружение прожилок, вкраплений крови в мокроте

Блок: Блок 11 | № 1089

1089. СПЕЦИФИЧЕСКИМ ИММУНОГЛОБУЛИНОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ НАЛИЧИЕ У БОЛЬНОГО БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Ig E

Блок: Блок 11 | № 1090

1090. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ НЕФРОГЕННОЙ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДВУСТОРОННЕГО СТЕНОЗА ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ИЛИ СТЕНОЗА АРТЕРИИ ЕДИНСТВЕННОЙ ПОЧКИ) АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента и диуретики

Блок: Блок 11 | № 1091

1091. ИЗ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПАЦИЕНТ ОПЛАЧИВАЕТ

☐ дополнительные и сервисные услуги

Блок: Блок 11 | № 1092

1092. ДЛЯ СТЕНОКАРДИИ ХАРАКТЕРНЫ БОЛИ

☐ кратковременные, купирующиеся приёмом нитратов

Блок: Блок 11 | № 1093

1093. ОГРАНИЧЕНИЕМ СПОСОБНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПЕРЕДВИЖЕНИЮ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ НАЗЫВАЮТ ____ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПЕРЕДВИЖЕНИЮ

☐ неспособность, и полную зависимость от других лиц

Блок: Блок 11 | № 1094

1094. ВЫРАЖЕННОЕ СМЕЩЕНИЕ ВЕРХУШЕЧНОГО ТОЛЧКА ВЛЕВО И ВНИЗ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ

☐ дилатации левого желудочка

Блок: Блок 11 | № 1095

1095. К ПРЕПАРАТАМ, СНИЖАЮЩИМ МАССУ ТЕЛА, ОТНОСИТСЯ

☐ Лираглутид

Блок: Блок 11 | № 1096

1096. ПРОТИВПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ГРИЗЕОФУЛЬВИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ порфирия

Блок: Блок 11 | № 1097

1097. РИСК АДЕНОКАРЦИНОМЫ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ МАКСИМАЛЬНЫМ ПРИ

☐ кишечной метаплазии эпителия пищевода с дисплазией высокой степени

Блок: Блок 11 | № 1098

1098. ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ И ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИСТУПОВ СТЕНОКАРДИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ бета-адреноблокаторы и антагонисты кальция

1099. ПРОТИВПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ НИТРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ закрытоугольная глаукома

1100. ДЛЯ ДЕСТРУКТИВНОГО ТИРЕОИДИТА ХАРАКТЕРНО

- ☐ снижение захвата радиофармпрепарата по данным сцинтиграфии щитовидной железы

Блок 12

101. ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ ГИПОТИРЕОЗА ЯВЛЯЮТСЯ

- ☐ отеки, зябкость, заторможенность, сухость кожи

102. ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ, ОТЯГОЩЕННОМ МУЧИТЕЛЬНЫМ НЕПРОДУКТИВНЫМ КАШЛЕМ (ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДОЗРЕНИЯ НА КОКЛЮШ), НЕ ПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

- ☐ антибиотиков

103. АНЕМИЕЙ, ДЛЯ КОТОРОЙ ХАРАКТЕРНЫ ГИПОХРОМИЯ, СНИЖЕНИЕ СЫВОРОТОЧНОГО ЖЕЛЕЗА, ПОВЫШЕННАЯ ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СЫВОРОТКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ железодефицитная

104. ПОРАЖЕНИЕМ СЕРДЦА, НЕ ТИПИЧНЫМ ДЛЯ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ бородавчатый эндокардит

105. ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОСТУПЛЕНИЯ С ПИЩЕЙ ВИТАМИНА В12 КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА В12 РАЗВИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ

- ☐ 4-5 лет

106. ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ ОТМЕЧАЕТСЯ, ЧТО ЗУБЕЦ

- ☐ RV5, V6 > RV4

107. ОСЛОЖНЕНИЕМ ИНФАРКТА МИОКАРДА В ПЕРВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ синдром Дресслера

108. ПРИМЕНЕНИЕ ВАГУСНЫХ ПРОБ МОЖЕТ ПРЕРВАТЬ ПРИСТУП

- ☐ предсердной пароксизмальной тахикардии

109. ТЕСТОМ ПЕРВОГО УРОВНЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

☐ тиреотропного гормона

110. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бактериоскопический

111. ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАНДИДОЗОВ ПРИ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ, ОБЛАДАЮЩИМ ВЫСОКОЙ БИОДОСТУПНОСТЬЮ И БОЛЬШИМ ПЕРИОДОМ ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ флуконазол

112. АТЕНОЛОЛ И ЕГО АНАЛОГИ ПРИ ИБС СПОСОБСТВУЮТ

☐ снижению потребности миокарда в кислороде

113. СИМПТОМОМ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гипопротеинемия

114. НАЛИЧИЕ КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАЗИИ В ДИСТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ПИЩЕВОДА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ пищевода Баррета

115. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ коробочный перкуторный звук

116. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЕМОЙ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ГРУППОЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ шейная

117. ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ОБНАРУЖИТЬ КИСТУ ЛЁГКОГО, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ компьютерная томография лёгкого

118. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВЫЗВАННЫХ НЕИЗВЕСТНЫМ ТИПОМ ТОКСИНА (ВОЗБУДИТЕЛЯ) БОТУЛИЗМА, ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ смесь моновалентных сывороток

119. УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ 058/У ЯВЛЯЕТСЯ

☐ экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку

120. ТОЛЕРАНТНОСТЬ (СНИЖЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПОВТОРНОМ ПРИМЕНЕНИИ) К ПРЕПАРАТУ СУЩЕСТВЕННО ОГРАНИЧИВАЕТ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

☐ нитратов

121. ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИНГИБИТОРОВ ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ-4 ОБУСЛОВЛЕНО

☐ усилением эндогенной стимуляции секреции инсулина из В-клеток поджелудочной железы

122. ЭКГ-ПРИЗНАКОМ АВ-БЛОКАДЫ II СТЕПЕНИ ТИПА МОБИТЦ I ЯВЛЯЕТСЯ

☐ постепенное удлинение интервала P-Q при каждом сердечном цикле с последующим выпадением комплекса QRS

1123. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМОМ ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ «летучий» артрит

1124. ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗАПАСОВ ЖЕЛЕЗА ПРИ НАЛИЧИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ТЕРАПИЮ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В ТЕЧЕНИЕ

☐ 3-6 месяцев

1125. ЛИПОФИЛЬНО-ГИДРОФИЛЬНЫМ В1 АДРЕНОБЛОКАТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бисопролол

1126. ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРЮШНЫМ ТИФОМ И ПАРАТИФАМИ ПРИМЕНЯЕТСЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

☐ крови

1127. КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ CREST-СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ телеангиэктазия

1128. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕКИШЕЧНОЙ ФОРМЫ АМЕБИАЗА (АБСЦЕССА ПЕЧЕНИ) ЯВЛЯЮТСЯ

☐ метронидазол, орнидазол, тинидазол

Блок: Блок 12 | № 1129

1129. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА 40 ЛЕТ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ I СТЕПЕНИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧАТЬ С

☐ УЗИ почек и сердца

Блок: Блок 12 | № 1130

1130. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДЕЗАГРЕГАНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ неконтролируемая АГ

Блок: Блок 12 | № 1131

1131. ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С ЧАСТО ВЫЗЫВАЕТ

☐ миалгию

Блок: Блок 12 | № 1132

1132. НЕ РЕКОМЕНДОВАНО СОВМЕСТНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ (ИЗ-ЗА СНИЖЕНИЯ АБСОРБЦИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ) С

☐ кетоконазолом

Блок: Блок 12 | № 1133

1133. СДВИГ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ ВЛЕВО ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ

☐ бактериальной инфекции

Блок: Блок 12 | № 1134

1134. ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ТРАВМ), ОТРАВЛЕНИЙ И ИНЫХ СОСТОЯНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВРЕМЕННОЙ ПОТЕРЕЙ ГРАЖДДАНАМИ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ЕДИНОЛИЧНО ВЫДАЕТ (ФОРМИРУЕТ) ГРАЖДДАНАМ ЛИСТКИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

☐ сроком не более 15 дней

Блок: Блок 12 | № 1135

1135. ПОЯВЛЕНИЕ ОДЫШКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ОБУСЛОВЛЕНО ПОРАЖЕНИЕМ

☐ бронхиол

Блок: Блок 12 | № 1136

1136. НЕСООТВЕТСТВИЕ КОРОНАРНОГО КРОВотоКА МЕТАБОЛИЧЕСКИМ НУЖДАМ МИОКАРДА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ ишемической болезни сердца

Блок: Блок 12 | № 1137

1137. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ОБРАЗОВАНИЯ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ У ПАЦИЕНТА С ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИЕЙ, СНИЖЕНИЕМ УРОВНЯ ФОСФОРА В КРОВИ И ЕГО УСИЛЕННОЙ ЭКСКРЕЦИИ С МОЧОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиперпаратиреоз

Блок: Блок 12 | № 1138

1138. НАИБОЛЬШИЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТ ПРИ ПРИЕМЕ

☐ розувастатина

Блок: Блок 12 | № 1139

1139. РЕТИКУЛОЦИТОЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ АНЕМИИ

☐ гемолитической

Блок: Блок 12 | № 1140

1140. ПРИ РАССЛОЕНИИ АОРТЫ НА ФОНЕ АГ ПОКАЗАНЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

☐ бета-адреноблокаторы

Блок: Блок 12 | № 1141

1141. МЕТОДОМ ВЫБОРА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ФИБРОКОЛОНОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ приём макрогола

Блок: Блок 12 | № 1142

1142. БРОНХОСКОПИЯ ПРИ ХОБЛ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ

☐ выявить обструкцию периферических бронхов

Блок: Блок 12 | № 1143

1143. ДИАГНОЗ «ОСТРЫЙ ГЕПАТИТ В» ПОДТВЕРЖДАЕТ ВЫЯВЛЕНИЕ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ

☐ HBsAg, анти-HBc IgM

Блок: Блок 12 | № 1144

1144. ФЕНОМЕНОМ «УТРЕННЕЙ ЗАРИ» СЧИТАЮТ

☐ утреннюю гипергликемию, обусловленную повышением секреции контринсулярных гормонов

Блок: Блок 12 | № 1145

1145. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПОДОЗРЕНА У ПАЦИЕНТА С ЖАЛОБАМИ НА

☐ боль в теменной и затылочной областях

Блок: Блок 12 | № 1146

1146. СКОРАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПОМОЩИ

☐ скорой

Блок: Блок 12 | № 1147

1147. СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ ЭКГ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СУДИТЬ О

☐ снижении сократительной функции миокарда.

Блок: Блок 12 | № 1148

1148. ГЕМОМРАГИЧЕСКАЯ СЫПЬ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ С НЕКРОЗАМИ В ЦЕНТРЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ менингококковой инфекции

Блок: Блок 12 | № 1149

1149. ЛЕЙКЕМОИДНЫЕ РЕАКЦИИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ

☐ септических состояниях

Блок: Блок 12 | № 1150

1150. ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ГРИЗЕОФУЛЬВИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кандидозный стоматит

Блок: Блок 12 | № 1151

1151. ДЛЯ ОРАЛЬНОЙ РЕГИДРАТАЦИИ БОЛЬНЫХ ЛЁГКИМИ ФОРМАМИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ Глюкосолан

Блок: Блок 12 | № 1152

1152. СТРАТЕГИЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

☐ предупреждении прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний как за счет коррекции факторов риска, так и за счет своевременного проведения лечения и мер реабилитации

Блок: Блок 12 | № 1153

1153. ПРИЧИНОЙ АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бактериальный эндокардит

Блок: Блок 12 | № 1154

1154. МОКРОТА ПРИ ЛЕГОЧНОМ АМЕБИАЗЕ

☐ обильная, «шоколадная»

Блок: Блок 12 | № 1155

1155. OVERLAP-ФЕНОТИПОМ НАЗЫВАЮТ СОЧЕТАНИЕ У ОДНОГО ПАЦИЕНТА

☐ ХОБЛ и бронхиальной астмы

Блок: Блок 12 | № 1156

1156. ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ, ВРАЧ

☐ сельской врачебной амбулатории

Блок: Блок 12 | № 1157

1157. В СТАНДАРТЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УСРЕДНЁННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ УСЛУГИ, РАВНЫЙ 1, ОЗНАЧАЕТ, ЧТО УСЛУГА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ____% ПАЦИЕНТОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ ДАННОЙ МОДЕЛИ

☐ 100

Блок: Блок 12 | № 1158

1158. РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДЛЕНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ БОЛЕЕ 15 ДНЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ врачебной комиссией

Блок: Блок 12 | № 1159

1159. ПОТЕМНЕНИЕ МОЧИ, ИКТЕРИЧНОСТЬ КОЖИ И СКЛЕР, УВЕЛИЧЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКАМИ АНЕМИИ

☐ гемолитической

Блок: Блок 12 | № 1160

1160. ПРИ ХОБЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ВАКЦИНОЙ

☐ противогриппозной

Блок: Блок 12 | № 1161

1161. БОЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ С II ФК

☐ может лечиться в местных кардиологических санаториях

Блок: Блок 12 | № 1162

1162. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА НЕОБХОДИМО РЕГУЛЯРНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА В ТЕЧЕНИЕ ____ ПЕРИОДОВ ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ

☐ 5

Блок: Блок 12 | № 1163

1163. СОВРЕМЕННЫМ МЕТОДОМ ЛАБОРАТОРНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ иммуноферментный анализ

Блок: Блок 12 | № 1164

1164. ТИПИЧНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ ШИГЕЛЛЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ колит

Блок: Блок 12 | № 1165

1165. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА «СТЕНОКАРДИЯ» ОБЫЧНО ДОСТАТОЧНО

☐ типичных жалоб при расспросе больного

Блок: Блок 12 | № 1166

1166. АБСЦЕССЫ ПРИ ВНЕКИШЕЧНОМ АМЕБИАЗЕ ЧАЩЕ ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В

☐ печени

Блок: Блок 12 | № 1167

1167. В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЕТСЯ ____ ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

☐ аэрогенный

Блок: Блок 12 | № 1168

1168. ПРЕПАРАТОМ, БЛОКИРУЮЩИМ H₂-ГИСТАМИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Ранитидин

Блок: Блок 12 | № 1169

1169. ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ МАЛИГНИЗАЦИИ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эндоскопическое исследование с биопсией

Блок: Блок 12 | № 1170

1170. СИНДРОМ МОРГАНЬИ-ЭДАМСА-СТОКСА

☐ сопровождается нарушением ритма с резким снижением сократительной способности сердца, потерей сознания, развитием судорожного синдрома

Блок: Блок 12 | № 1171

1171. ПРИ "ЛЕГКОМ ФЕРМЕРА" В КАЧЕСТВЕ АЛЛЕРГЕНА ВЫСТУПАЮТ

☐ актиномицеты

Блок: Блок 12 | № 1172

1172. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ БРОНХО-ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ курение

Блок: Блок 12 | № 1173

1173. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ У БОЛЬНОГО С СИММЕТРИЧНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, КОРОБОЧНЫМ ЗВУКОМ ПРИ ПЕРКУССИИ, ОСЛАБЛЕННЫМ ВЕЗИКУЛЯРНЫМ ДЫХАНИЕМ С УДЛИНЕННЫМ ВЫДОХОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ «эмфизема легких»

Блок: Блок 12 | № 1174

1174. ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН

☐ если он является застрахованным

Блок: Блок 12 | № 1175

1175. ОСНОВНЫМ ОРГАНОМ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ И ОНТОГЕНЕЗА В-ЛИМФОЦИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ КОСТНЫЙ МОЗГ

Блок: Блок 12 | № 1176

1176. БИОХИМИЧЕСКИМ ТЕСТОМ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ АЛТ

Блок: Блок 12 | № 1177

1177. ОПТИМАЛЬНЫМ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ В КОМБИНАЦИИ С

☐ пролонгированными бронхолитиками

Блок: Блок 12 | № 1178

1178. К МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ОТНОСЯТ

☐ сахарный диабет

Блок: Блок 12 | № 1179

1179. ВНЕКИШЕЧНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ БОЛЕЗНИ КРОНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ узловатая эритема

Блок: Блок 12 | № 1180

1180. СРЕДСТВОМ ПЕРВОГО ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВЕНОЗНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ (ВТЭ) У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ низкомолекулярные гепарины

Блок: Блок 12 | № 1181

1181. КЛИНИЧЕСКИ МАЛОСИМПТОМНО ПРОТЕКАЕТ

☐ очаговый туберкулез легких

Блок: Блок 12 | № 1182

1182. К НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ

☐ атопию

Блок: Блок 12 | № 1183

1183. ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ МОКРОТА

☐ вязкая

Блок: Блок 12 | № 1184

1184. ПОКАЗАНИЕМ К ПЛАНОВОЙ ФИБРОГАСТРОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ обострение хронического гастрита

Блок: Блок 12 | № 1185

1185. ИССЛЕДОВАНИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ВНУТРИСЕКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гликемический профиль

Блок: Блок 12 | № 1186

1186. ПРИ ОСТРОМ ПРИСТУПЕ ПОДАГРЫ НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧИТЬ

☐ НПВС

Блок: Блок 12 | № 1187

1187. К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ ПРИ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА ОТНОСЯТ

☐ тошноту, рвоту, боли в эпигастрии, понос, запоры

Блок: Блок 12 | № 1188

1188. ДЛЯ ХОЛЕРЫ ХАРАКТЕРНЫ

☐ обильный водянистый стул без запаха, рвота, отсутствие болей в животе

Блок: Блок 12 | № 1189

1189. ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ абсолютная гиповолемия

Блок: Блок 12 | № 1190

1190. ПРЕПАРАТАМИ, ОБЛАДАЮЩИМИ ВЫРАЖЕННЫМИ АНГИОПРОТЕКТИВНЫМИ И АНТИАТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ, ЯВЛЯЮТСЯ

☐ антагонисты кальция

Блок: Блок 12 | № 1191

1191. ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ЛП (А) В ПЛАЗМЕ КРОВИ БОЛЬНОМУ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

☐ фибраты

Блок: Блок 12 | № 1192

1192. НАИБОЛЬШЕЙ ОТОТОКСИЧНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

☐ аминогликозиды

Блок: Блок 12 | № 1193

1193. ПАЦИЕНТУ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ БЕЗ ЗНАЧИМЫХ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ РИСКА, НО С УКАЗАНИЕМ В АНАМНЕЗЕ НА АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ НА ПЕНИЦИЛЛИН СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

☐ кларитромицин

Блок: Блок 12 | № 1194

1194. К ТИПИЧНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ОТНОСИТСЯ

☐ лейкопения

Блок: Блок 12 | № 1195

1195. ДВОЙНЫМ ПУТЕМ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ ОРГАНИЗМА ОБЛАДАЕТ

☐ фозиноприл

Блок: Блок 12 | № 1196

1196. ОСНОВНОЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ ПЕРВИЧНОЙ ЭМФИЗЕМЫ ЛЕГКИХ ИМЕЕТ

☐ дефицит альфа1-антитрипсина

Блок: Блок 12 | № 1197

1197. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ астматическое состояние

Блок: Блок 12 | № 1198

1198. БОЛЬНОЙ С НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ В СУТКИ СОЛИ (В ГРАММАХ)

☐ до 4

Блок: Блок 12 | № 1199

1199. ДЕФЕКТЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В РАБОТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УСТРАНЯЮТСЯ ПУТЕМ

☐ проведения регулярных экспертных оценок качества преемственности

Блок: Блок 12 | № 1200

1200. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО АЛКОГОЛЬНОГО ГЕПАТИТА ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тяжелое течение гепатита

Блок 13

Блок: Блок 13 | № 1201

1201. ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ

☐ акцент 2 тона над аортой

Блок: Блок 13 | № 1202

1202. ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОБУСЛОВЛЕНО

☐ повышенным уровнем инсулина в крови

Блок: Блок 13 | № 1203

1203. ДЛЯ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА В СОВОКУПНОСТИ С ВЫСОКОЙ ЛИХОРАДКОЙ ХАРАКТЕРНЫ

☐ диффузные боли в животе, зловонный обильный стул

Блок: Блок 13 | № 1204

1204. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

☐ ингибиторы АПФ

Блок: Блок 13 | № 1205

1205. ПРИ ОСМОТРЕ БОЛЬНОГО РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ

☐ пальцы в виде «шеи лебедя»

Блок: Блок 13 | № 1206

1206. ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ

☐ начинается при возникновении риска

Блок: Блок 13 | № 1207

1207. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ НЕОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ

☐ обструкция воздухоносных путей не выявляется ни клинически, ни при спирографии, как в период обострения, так и в период ремиссии заболевания

Блок: Блок 13 | № 1208

1208. ОБОСТРЕНИЕ В ПЕРВОМ ПЛЮСНЕФАЛАНГОВОМ СУСТАВЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ подагры

Блок: Блок 13 | № 1209

1209. ВОЗБУДИТЕЛЕМ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Legionella

Блок: Блок 13 | № 1210

1210. ТЯЖЕЛАЯ СУБЭНДОКАРДИАЛЬНАЯ ИШЕМИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ НА ЭКГ

- ☐ депрессией сегмента ST

Блок: Блок 13 | № 1211

1211. КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ нормализация температуры через 48-72 часа

Блок: Блок 13 | № 1212

1212. ПРОТРОМБИНОВОЕ ВРЕМЯ УВЕЛИЧИВАЕТ СОВМЕСТНЫЙ ПРИЕМ ВАРФАРИНА С

- ☐ флуконазолом

Блок: Блок 13 | № 1213

1213. ПРЕПАРАТОМ С КОМБИНАЦИЕЙ ИНГАЛЯЦИОННОГО ГЛЮКОКОРТИКОИДА И БЕТА2-АГОНИСТА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ Саламетерол+Флутиказон

Блок: Блок 13 | № 1214

1214. К АССОЦИИРОВАННОМУ КЛИНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ОТНОСИТСЯ

- ☐ расслаивающая аневризма аорты

Блок: Блок 13 | № 1215

1215. ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

- ☐ дилатационной кардиомиопатии

Блок: Блок 13 | № 1216

1216. ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ГОРМОНОВ В КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ повышение тиреотропного гормона и снижение тироксина

Блок: Блок 13 | № 1217

1217. ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ устойчивая горизонтальная и медленная косовосходящая депрессия сегмента ST не менее 1 мм

Блок: Блок 13 | № 1218

1218. ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЯ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНА ДИАГРАММА

- ☐ секторная

Блок: Блок 13 | № 1219

1219. НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ТЕСТОМ ДЛЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ЯВЛЯЮТСЯ АНТИТЕЛА

- ☐ к двуспиральной дезоксирибонуклеиновой кислоте

Блок: Блок 13 | № 1220

1220. ПРИ РАЗВИТИИ НЕОТЛОЖНОГО СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТА НА ПРИЕМЕ ВРАЧУ-ТЕРАПЕВТУ УЧАСТКОВОМУ СЛЕДУЕТ

☐ вызвать бригаду скорой медицинской помощи или реанимационную бригаду

Блок: Блок 13 | № 1221

1221. ПРИ НАЛИЧИИ ОСТРОЙ ЛАКУНАРНОЙ АНГИНЫ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ

☐ дифтерию

Блок: Блок 13 | № 1222

1222. АУТОИММУННЫЙ ГЕПАТИТ ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТСЯ

☐ Преднизолоном

Блок: Блок 13 | № 1223

1223. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ выявление бактериурии

Блок: Блок 13 | № 1224

1224. ИНСУЛИН УСИЛИВАЕТ

☐ синтез белка в мышцах и печени

Блок: Блок 13 | № 1225

1225. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ ВРАЧАМ И СРЕДНИМ МЕДРАБОТНИКАМ ПРИСВАИВАЕТСЯ

☐ квалификационная категория

Блок: Блок 13 | № 1226

1226. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ язвенная болезнь желудка в стадии обострения

Блок: Блок 13 | № 1227

1227. ДЕЙСТВИЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ ОБУСЛОВЛЕНО

☐ прямым миолитическим действием на гладкую мускулатуру коронарных артерий

Блок: Блок 13 | № 1228

1228. ВОЗМОЖНАЯ СХЕМА НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ В ТАБЛЕТИРОВАННОЙ ФОРМЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

☐ 2/3 дозы утром + 1/3 дозы в обед

Блок: Блок 13 | № 1229

1229. К ТРОМБОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТ

☐ Тенектеплазу

Блок: Блок 13 | № 1230

1230. ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ МУКОВИСЦИДОЗА С ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кашель с вязкой мокротой

Блок: Блок 13 | № 1231

1231. К ЭКГ КРИТЕРИЯМ НЕКРОЗА МИОКАРДА ОТНОСЯТ

☐ патологический зубец Q

Блок: Блок 13 | № 1232

1232. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЫПНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Доксциклин

Блок: Блок 13 | № 1233

1233. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ ПРИМЕНЯЮТ

☐ бортезамиб

Блок: Блок 13 | № 1234

1234. АНЕМИЯ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ ____ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

☐ хронической почечной

Блок: Блок 13 | № 1235

1235. ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ В КРОВИ УРОВЕНЬ

☐ глюкозы и инсулина натощак

Блок: Блок 13 | № 1236

1236. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ИЗМЕРЕНИЮ СТАНОВОЙ СИЛЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ беременность

Блок: Блок 13 | № 1237

1237. ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

☐ оценка состояния глазного дна

Блок: Блок 13 | № 1238

1238. ПРИ СОЧЕТАНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И САХАРНОГО ДИАБЕТА РЕКОМЕНДОВАНА КОМБИНАЦИЯ

☐ ингибитора АПФ и антагониста кальция

Блок: Блок 13 | № 1239

1239. В ОСНОВЕ МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ НПВС ЛЕЖИТ

☐ ингибирование активности циклооксигеназы

Блок: Блок 13 | № 1240

1240. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ПУЛЬМИКОРТ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

☐ ингаляционных глюкокортикоидов

Блок: Блок 13 | № 1241

1241. ПОКАЗАНИЕМ К ТРОМБОЛИЗИСУ ИЛИ ЭМБОЛЭКТОМИИ ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ СЛУЖАТ

☐ шок или артериальная гипотензия

Блок: Блок 13 | № 1242

1242. ПРИЗНАКОМ ЛИМФАТИЧЕСКИХ ОТЕКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ болезненность

Блок: Блок 13 | № 1243

1243. ЭКСТЕНСИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ХАРАКТЕРИЗУЕТ

☐ структуру явления

Блок: Блок 13 | № 1244

1244. ПРИ ОСТРОМ ИНФЕКЦИОННОМ ГЕПАТИТЕ ЭХОГЕННОСТЬ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ

☐ пониженная

Блок: Блок 13 | № 1245

1245. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЕПАРИНА ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

☐ активированного частичного тромбопластинового времени

Блок: Блок 13 | № 1246

1246. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА ТОЛСТОЙ КИШКИ У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дисплазия слизистой оболочки толстой кишки

Блок: Блок 13 | № 1247

1247. ИНСУЛИН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ____ КЛЕТКАМИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

☐ β

Блок: Блок 13 | № 1248

1248. РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К D-КСИЛОЗЕ ЗАВИСИТ ОТ

☐ всасывающей функции тонкой кишки

Блок: Блок 13 | № 1249

1249. К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ ОТНОСЯТ

☐ недостаточность дозы инсулина

Блок: Блок 13 | № 1250

1250. ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гемолитический стрептококк группы А

Блок: Блок 13 | № 1251

1251. К НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТ

☐ ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, бета-адреноблокаторы, тиазидные диуретики

Блок: Блок 13 | № 1252

1252. ПЕРВЫЙ ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

☐ всем подлежащим диспансеризации

Блок: Блок 13 | № 1253

1253. ЛЕЙКОПЕНИЯ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ СЛЕДСТВИЕМ

☐ хронического гепатита

Блок: Блок 13 | № 1254

1254. ОРГАНАМИ-МИШЕНЯМИ ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ лёгкие, сердце, пищеварительный тракт, почки, кожа

Блок: Блок 13 | № 1255

1255. КЛАПАННЫМ ПОРОКОМ, ХАРАКТЕРНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ С ЭПИЦЕНТРОМ ВО II МЕЖРЕБЕРЬЕ СПРАВА ОТ ГРУДИНЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аортальная недостаточность

Блок: Блок 13 | № 1256

1256. ПАЦИЕНТУ, СТРАДАЮЩЕМУ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ПРИСТУПАМИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ТАХИКАРДИИ, ПОКАЗАНО САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

☐ в местном санатории вне курорта

Блок: Блок 13 | № 1257

1257. К ГРУППЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

☐ муковисцидоз

Блок: Блок 13 | № 1258

1258. ОСНОВНЫМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ β -гемолитический стрептококк группы А

Блок: Блок 13 | № 1259

1259. РАЦИОНАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ ПЕРОРАЛЬНЫХ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ

☐ метформина и вилдаглиптина

Блок: Блок 13 | № 1260

1260. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕПАРИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ геморрагический инсульт менее чем 6 месяцев назад

Блок: Блок 13 | № 1261

1261. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ АНЕМИИ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА (В Г/Л)

☐ 70-90

Блок: Блок 13 | № 1262

1262. ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ОТЛИЧАЕТ НАЛИЧИЕ

☐ синдрома портальной гипертензии

Блок: Блок 13 | № 1263

1263. ПРИЗНАКОМ ДЕРМАТОМИОЗИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ супраорбитальный отек и гиперемия кожи около глаз

Блок: Блок 13 | № 1264

1264. ПРИ ПРАВИЛЬНОМ РИТМЕ С ЧСС 170 УДАРОВ В МИНУТУ И НЕИЗМЕНЕННЫХ КОМПЛЕКСАХ QRS СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ О

☐ пароксизмальной наджелудочковой тахикардии

Блок: Блок 13 | № 1265

1265. ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШИХ КОРЬЮ В ЭПИДЕМИЧЕСКОМ ОЧАГЕ

☐ противоэпидемические мероприятия не проводятся

Блок: Блок 13 | № 1266

1266. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА ЛЕКАРСТВА ВОЗНИКАЮТ ВСЛЕДСТВИЕ

☐ повышенной чувствительности к химическим веществам, имеющим схожую структуру

Блок: Блок 13 | № 1267

1267. МНОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАВМЫ, ОБШИРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА, СЕПТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ МОГУТ БЫТЬ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ

☐ ДВС-синдрома

Блок: Блок 13 | № 1268

1268. ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кишечная палочка

Блок: Блок 13 | № 1269

1269. ЯРКАЯ ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ С ЧЕТКИМИ ГРАНИЦАМИ, НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ В СОЧЕТАНИИ С ЛИХОРАДКОЙ СВОЙСТВЕННА

☐ роже

Блок: Блок 13 | № 1270

1270. К ИНГАЛЯЦИОННЫМ КОРТИКОСТЕРОИДАМ НЕ ОТНОСИТСЯ

☐ дексаметазон

Блок: Блок 13 | № 1271

1271. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПРИ ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВИТАМИНА В12 В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА РАЗВИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ

☐ 4-5 лет

Блок: Блок 13 | № 1272

1272. ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ХАРАКТЕРНЫМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ алиментарный

Блок: Блок 13 | № 1273

1273. ПРИ СУБФЕБРИЛИТЕТЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 НЕДЕЛИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ

☐ клинический анализ крови

Блок: Блок 13 | № 1274

1274. МИТРАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ СЕРДЦА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ смещением вверх верхней границы и сглаживанием «тали» сердца

Блок: Блок 13 | № 1275

1275. В ТАБЛИЦЕ SCORE ДЛЯ ОЦЕНКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ОТСУТСТВУЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ

☐ глюкозы крови

Блок: Блок 13 | № 1276

1276. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ В ДИАГНОСТИКЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИ НЕГАТИВНОЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ суточное мониторирование внутрипищеводного pH

Блок: Блок 13 | № 1277

1277. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ОЦЕНКИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ спирометрия

Блок: Блок 13 | № 1278

1278. НАИБОЛЬШИЙ АНТИСЕКРЕТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ОКАЗЫВАЕТ

☐ омепразол

Блок: Блок 13 | № 1279

1279. В ДИАГНОСТИКЕ АКРОМЕГАЛИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ пероральный глюкозо-толерантный тест с определением соматотропного гормона

Блок: Блок 13 | № 1280

1280. ПРИ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ МИКОПЛАЗМОЙ, СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

☐ макролиды

Блок: Блок 13 | № 1281

1281. ПРИ ДВУСТОРОННЕМ СТЕНОЗЕ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ

- ☐ ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

Блок: Блок 13 | № 1282

1282. ПРИ АЛГИДНОЙ ФОРМЕ ХОЛЕРЫ ПОТЕРЯ МАССЫ ТЕЛА НА (%)

- ☐ 10 и более

Блок: Блок 13 | № 1283

1283. АВ БЛОКАДА I СТЕПЕНИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- ☐ замедлением предсердножелудочковой проводимости

Блок: Блок 13 | № 1284

1284. К ПЕРВИЧНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ

- ☐ курение

Блок: Блок 13 | № 1285

1285. РИСК РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ВЕЛИК ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПОВЫШЕНИИ В ПЛАЗМЕ КРОВИ

- ☐ ЛПОНП

Блок: Блок 13 | № 1286

1286. ФЕРМЕНТОМ, МЕТАБОЛИЗИРУЮЩИМ АЛКОГОЛЬ В ОРГАНИЗМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ алкогольдегидрогеназа

Блок: Блок 13 | № 1287

1287. НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОБОЧНОЙ РЕАКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ вредный и непредвиденный эффект вследствие применения лекарственного средства в терапевтических дозах для профилактики, лечения, диагностики или изменения физиологической функции человека

Блок: Блок 13 | № 1288

1288. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ГЕМОФИЛИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- ☐ времени свертываемости

Блок: Блок 13 | № 1289

1289. ДЛЯ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА – КОНОВАЛОВА ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ

- ☐ печени и головного мозга

Блок: Блок 13 | № 1290

1290. ОЦЕНКУ РИСКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ ПРИ

- ☐ фибрилляции предсердий

Блок: Блок 13 | № 1291

1291. ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ И ПРОХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПОСЛЕ ЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

☐ типичной стенокардией

Блок: Блок 13 | № 1292

1292. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДИАГНОЗОМ У БОЛЬНОЙ 28 ЛЕТ С ЖАЛОБАМИ НА МЫШЕЧНУЮ СЛАБОСТЬ, ЖАЖДУ, СТОЙКУЮ АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ, ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ КОТОРОЙ ВЫЯВЛЕНА ГИПОКАЛИЕМИЯ, СНИЖЕНИЕ РЕНИНА ПЛАЗМЫ ДО 0, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ первичный альдостеронизм

Блок: Блок 13 | № 1293

1293. СЫПЬ ПРИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ ложным полиморфизмом

Блок: Блок 13 | № 1294

1294. ПРИ НАЛИЧИИ АЛЛЕРГИИ НА ПЕНИЦИЛЛИН У БОЛЬНОГО НЕТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИЕЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ азитромицин

Блок: Блок 13 | № 1295

1295. РАЗМЕР ОЧАГОВ В ЛЕГКИХ ПРИ ОСТРОМ МИЛИАРНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ

☐ мелкий

Блок: Блок 13 | № 1296

1296. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ЭТАМБУТОЛА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ подагра

Блок: Блок 13 | № 1297

1297. НОРМА НАГРУЗКИ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА ПОЛИКЛИНИКИ СОСТАВЛЯЕТ ____ В ЧАС

☐ 4 посещения

Блок: Блок 13 | № 1298

1298. ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИ ЛЕЧЕНИИ

☐ противосудорожными препаратами

Блок: Блок 13 | № 1299

1299. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ МОРФИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ отек легкого

Блок: Блок 13 | № 1300

1300. РАЗВИТИЕ АСИСТОЛИИ ВОЗМОЖНО ПРИ КОМБИНАЦИИ ПРОПРАНОЛОЛА С

☐ Верапамилом

Блок 14

Блок: Блок 14 | № 1301

1301. ТИПИЧНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ СИДЕРОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА СО СТОРОНЫ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ ангулярного стоматита

Блок: Блок 14 | № 1302

1302. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ САРТАНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ беременность

Блок: Блок 14 | № 1303

1303. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инфекция *Helicobacter pylori*

Блок: Блок 14 | № 1304

1304. К ПЕТЛЕВЫМ ДИУРЕТИКАМ ОТНОСИТСЯ

☐ торасемид

Блок: Блок 14 | № 1305

1305. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЖДУ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ И ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ спирометрия

Блок: Блок 14 | № 1306

1306. ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ ХАРАКТЕРНО УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЩЕГО УРОВНЯ БЕЛКА ЗА СЧЕТ

☐ парапротеина

Блок: Блок 14 | № 1307

1307. К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ СТОЛБНЯКА ОТНОСЯТ

☐ тризм жевательной мускулатуры, опистотонус, генерализованные судороги

Блок: Блок 14 | № 1308

1308. ПРИЧИНОЙ ГИПЕРПРОДУКЦИИ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ увеличение секреции гастрина

Блок: Блок 14 | № 1309

1309. ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГАЛЬНОМ РЕФЛЮКСЕ НЕОБХОДИМО

☐ дробное питание

Блок: Блок 14 | № 1310

1310. СРЕДИ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ АРТЕРИАЛЬНЫХ ГИПЕРТЕНЗИЙ, ПОМИМО ФЕОХРОМОЦИТОМЫ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО «ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ» АГ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

☐ реноваскулярной

1311. К БАЗИСНЫМ СРЕДСТВАМ ЛЕЧЕНИЯ АСТМЫ ОТНОСЯТСЯ

☐ антилейкотриеновые препараты

1312. ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОБРАТИМОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ПРИ ПРОБЕ С ИНГАЛЯЦИОННЫМИ БРОНХОДИЛАТАТОРАМИ ЯВЛЯЕТСЯ ____ ОФВ1 БОЛЕЕ ЧЕМ НА ____ %

☐ прирост; 12

1313. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ЭПИЗОДА ВЕНОЗНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ (ВТЭ) СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ (В МЕСЯЦАХ)

☐ 3

1314. К ДОСТОВЕРНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКАМ МУКОВИСЦИДОЗА ОТНОСЯТ

☐ повышение концентрации натрия и хлора в потовой жидкости

1315. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ТУБЕРКУЛЁЗА У ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ *M. tuberculosis humanus*

1316. ГЛАВНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ В КОСТНОМ МОЗГЕ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ более 10% плазматических клеток с чертами атипии

1317. В СЛУЧАЕ ОЧЕВИДНОГО НЕБЛАГОПРИЯТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО И ТРУДОВОГО ПРОГНОЗА ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ВЫДАВАТЬ (ФОРМИРОВАТЬ) И ПРОДЛЕВАТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА СРОК НЕ БОЛЕЕ ____ МЕСЯЦЕВ

☐ 4

1318. ГАНЦИКЛОВИР С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В РЕЖИМЕ ____ Г 3 РАЗА В СУТКИ

☐ 1

1319. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМОЙ

☐ социальной защиты интересов населения в охране здоровья

1320. К ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИТОСТАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕМОБЛАСТОЗОВ ОТНОСИТСЯ

☐ агранулоцитоз

Блок: Блок 14 | № 1321

1321. БОЛЬНОМУ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С АД 170/110 ММ РТ. СТ., У КОТОРОГО ОТМЕЧАЕТСЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ ТЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧИТЬ

☐ Метопролол

Блок: Блок 14 | № 1322

1322. СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ ВЛИЯЮТ НА ГЕМОДИНАМИКУ

☐ оказывая положительное инотропное действие

Блок: Блок 14 | № 1323

1323. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНОГО С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

☐ пропранолола

Блок: Блок 14 | № 1324

1324. НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ТРИГЛИЦЕРИДОВ КРОВИ У БОЛЬНЫХ БЕЗ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЬШЕ (ММОЛЬ/Л)

☐ 1,7

Блок: Блок 14 | № 1325

1325. ХАРАКТЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (ЛЕВОЦЕТИРИЗИН, ФЕКСОФЕНАДИН) ЯВЛЯЕТСЯ

☐ длительная блокада H1-гистаминовых рецепторов, подавление высвобождения лейкотриена; противоэкссудативное, спазмолитическое действие; отсутствие седативного и кардиотоксического эффектов

Блок: Блок 14 | № 1326

1326. БОЛЬНОЙ, ПЕРЕНЕСШИЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА, СОСТОЯЩИЙ НА «Д» УЧЕТЕ У ВРАЧА-КАРДИОЛОГА ПОЛИКЛИНИКИ, ПЕРЕДАЕТСЯ НА УЧЕТ К ВРАЧУ-ТЕРАПЕВТУ УЧАСТКОВОМУ ЧЕРЕЗ (МЕС.)

☐ 12

Блок: Блок 14 | № 1327

1327. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ СЛЕПОТЫ У БОЛЬНОГО, ДЛИТЕЛЬНО СТРАДАЮЩЕГО САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пролиферативная ретинопатия

Блок: Блок 14 | № 1328

1328. ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ, НАБЛЮДАЮЩИМСЯ ПРИ БРОНХОГЕННОМ РАКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ синдром Иценко-Кушинга

Блок: Блок 14 | № 1329

1329. ПРИ ЛОБАРНОЙ ПНЕВМОКОККОВОЙ ПНЕВМОНИИ НА РЕНТГЕНОГРАММАХ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНА

☐ интенсивная гомогенная доленая инфильтрация

Блок: Блок 14 | № 1330

1330. ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ЧАСТОТУ ИЛИ УРОВЕНЬ РАСПРОСТРАНЁННОСТИ ЯВЛЕНИЯ В СРЕДЕ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРОДУЦИРУЮЩЕЙ ДАННОЕ ЯВЛЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

☐ интенсивный

Блок: Блок 14 | № 1331

1331. ПРИЧИНОЙ АНЕМИИ У БОЛЬНОЙ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ, ИМЕЮЩЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ПРОБУ КУМБСА, СЛУЖИТ

☐ гемолиз

Блок: Блок 14 | № 1332

1332. ФАКТОРОМ РИСКА ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ злоупотребление алкоголем

Блок: Блок 14 | № 1333

1333. ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ снижением СКФ

Блок: Блок 14 | № 1334

1334. ОСНОВНЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ вегетация на створке

Блок: Блок 14 | № 1335

1335. ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОСОБУЮ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ ПРИ ПОРАЖЕНИИ

☐ мягкой мозговой оболочки

Блок: Блок 14 | № 1336

1336. НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ ПРОГНОСТИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНА В ПЛАНЕ

☐ развития инфаркта миокарда

Блок: Блок 14 | № 1337

1337. ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩИЙ ВРАЧ ИМЕЕТ ПРАВО ПРОДЛИТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДО (В ДНЯХ)

☐ 15

Блок: Блок 14 | № 1338

1338. ПОЯВЛЕНИЕ УСТАЛОСТИ, СЕРДЦЕБИЕНИЯ, ОДЫШКИ ПРИ ЧРЕЗМЕРНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ____ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ КЛАССОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

☐ I

Блок: Блок 14 | № 1339

1339. СТЕПЕНЬ УТРАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ В

☐ процентах

Блок: Блок 14 | № 1340

1340. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПАЛЬМАРНАЯ ЭРИТЕМА ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ гепатите

Блок: Блок 14 | № 1341

1341. В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ

☐ поваренной соли

Блок: Блок 14 | № 1342

1342. ИНТЕНСИВНОСТЬ И СРОКИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

☐ типом медицинского учреждения

Блок: Блок 14 | № 1343

1343. РЕВМАТОИДНЫЕ УЗЕЛКИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЛОКАЛИЗУЮТСЯ

☐ в области локтевых суставов

Блок: Блок 14 | № 1344

1344. ГОРМОНЫ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ

☐ стероидов

Блок: Блок 14 | № 1345

1345. ГЕМОГРАММА: WBC $390 \times 10^9/\text{л}$, МИЕЛОБЛАСТОВ - 17%, ПРОМИЕЛОЦИТОВ - 15%, МИЕЛОЦИТОВ - 10%, МЕТАМИЕЛОЦИТОВ - 8%, ПАЛОЧКОЯДЕРНЫХ 6%; СЕГМЕНТОЯДЕРНЫХ - 10%, ЭОЗИНОФИЛОВ - 10%; ЛИМФОЦИТОВ - 3%; БАЗОФИЛОВ - 21%; ТРОМБОЦИТОВ $90 \times 10^9/\text{л}$ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ фазы акселерации хронического миелолейкоза

Блок: Блок 14 | № 1346

1346. ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ диспепсического синдрома

Блок: Блок 14 | № 1347

1347. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО МАНИФЕСТНОГО ГИПОТИРЕОЗА?

☐ свободный Т4 – снижен; ТТГ – повышен

Блок: Блок 14 | № 1348

1348. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ (ОМС) РЕГУЛИРУЕТСЯ

☐ государством

Блок: Блок 14 | № 1349

1349. В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 29.11.2010 326-ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ В РФ» ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИМЕЕТ СИЛУ

☐ на всей территории РФ

Блок: Блок 14 | № 1350

1350. МЕТОДОМ ОСТАНОВКИ КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ДВС-СИНДРОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ переливание достаточных объемов свежезамороженной плазмы

Блок: Блок 14 | № 1351

1351. К ЧАСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ АНЕМИИ НЕЗАВИСИМО ОТ ГЕНЕЗА ОТНОСЯТСЯ

☐ одышка, бледность

Блок: Блок 14 | № 1352

1352. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ СТРЕСС-ТЕСТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аортальный стеноз тяжелой степени

Блок: Блок 14 | № 1353

1353. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ остро возникшая митральная регургитация

Блок: Блок 14 | № 1354

1354. БОЛЬНЫМ, ПЕРЕНЕСШИМ ИНФАРКТ МИОКАРДА, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ

☐ ЭТМОЗИН

Блок: Блок 14 | № 1355

1355. УЧЕТНОЙ ФОРМОЙ 090/У ЯВЛЯЕТСЯ

☐ извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования

Блок: Блок 14 | № 1356

1356. ЛАБОРАТОРНЫМ МЕТОДОМ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИФТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бактериологический

Блок: Блок 14 | № 1357

1357. НАЛИЧИЕ ФИБРОЗНОЙ КАВЕРНЫ, ФИБРОЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ КАВЕРНУ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ, ОЧАГОВ БРОНХОГЕННОГО ОТСЕВА РАЗЛИЧНОЙ ДАВНОСТИ, ФИБРОЗНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ И ДРУГИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

☐ фиброзно-кавернозного

Блок: Блок 14 | № 1358

1358. СРОК ФОРМИРОВАНИЯ МИТРАЛЬНЫХ ПОРОКОВ ПОСЛЕ ЭПИЗОДА ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 6-12 месяцев

Блок: Блок 14 | № 1359

1359. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ТИРЕОИДНЫХ И ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ МАНИФЕСТНОГО ТИРЕОТОКСИКОЗА?

☐ Т3 – повышен; Т4 – повышен; ТТГ – снижен

Блок: Блок 14 | № 1360

1360. ЛЕЙКОПЕНИЯ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ

☐ цитостатиков

Блок: Блок 14 | № 1361

1361. ЗАПОДОЗРИТЬ ПЕЧЕНОЧНУЮ ЭНЦЕФАЛОПАТИЮ СЛЕДУЕТ ПРИ

☐ «печеночном» запахе

Блок: Блок 14 | № 1362

1362. СУСТАВ ШАРКО ФОРМИРУЕТСЯ ПРИ

☐ сахарном диабете

Блок: Блок 14 | № 1363

1363. ОПТИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ХОЛЕСТЕРИНА ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ СОСТАВЛЯЕТ ДО (ММОЛЬ/Л)

☐ 5

Блок: Блок 14 | № 1364

1364. АНТИТИРЕОИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ЛЕЧЕНИИ

☐ диффузного токсического зоба

Блок: Блок 14 | № 1365

1365. АБДОМИНАЛЬНЫЙ СОСУДИСТЫЙ ШУМ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ

☐ реноваскулярной артериальной гипертензии

Блок: Блок 14 | № 1366

1366. ПОКАЗАНИЕМ К ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В ОБЪЕМЕ 4 СТУПЕНИ ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тяжелая персистирующая бронхиальная астма

Блок: Блок 14 | № 1367

1367. ПРЕПАРАТОМ С КОМБИНАЦИЕЙ БЕТА2-АГОНИСТА И М-ХОЛИНОЛИТИКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Фенотерол+Ипратропия бромид

Блок: Блок 14 | № 1368

1368. ОПИСАНИЮ «FACIES NEPHRITICA» СООТВЕТСТВУЕТ

☐ одутловатое, бледное лицо с отеками под глазами, припухшими веками, узкими глазными щелями

Блок: Блок 14 | № 1369

1369. НА В2-АДРЕНОРЕЦЕПТОРЫ ЛЕГКИХ ДЕЙСТВУЕТ

☐ фенотерол

Блок: Блок 14 | № 1370

1370. К ОСНОВНОМУ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОМУ МЕХАНИЗМУ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ОТНОСИТСЯ

☐ инсулинорезистентность

Блок: Блок 14 | № 1371

1371. ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ЭМБОЛИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ ВОЗМОЖНЫ В

☐ ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Блок: Блок 14 | № 1372

1372. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГ У БЕРЕМЕННЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ ИАПФ и сартанов

Блок: Блок 14 | № 1373

1373. НАГРУЗКА ВРАЧЕБНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ СТАЦИОНАРА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ ЧИСЛОМ КОЕК НА ОДНУ ДОЛЖНОСТЬ

Блок: Блок 14 | № 1374

1374. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАРФАРИНА ТРЕБУЕТСЯ ЛАБОРАТОРНЫЙ КОНТРОЛЬ

☐ МЕЖДУНАРОДНОГО НОРМАЛИЗОВАННОГО ОТНОШЕНИЯ

Блок: Блок 14 | № 1375

1375. В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ В РОССИИ ПЕРВОЕ РАНГОВОЕ МЕСТО ПРИНАДЛЕЖИТ

☐ БОЛЕЗНЯМ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Блок: Блок 14 | № 1376

1376. ПРОТЕИНУРИЯ БЕНС-ДЖОНСА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ

Блок: Блок 14 | № 1377

1377. БОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЁЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ КУЛЬТУРАЛЬНЫЙ

Блок: Блок 14 | № 1378

1378. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗЕКЦИЯ

☐ ТОНКОЙ КИШКИ

Блок: Блок 14 | № 1379

1379. ТИПИЧНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНГАЛЯЦИОННЫХ СТЕРОИДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТНОЙ ДОЗЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ КАНДИДОЗ ПОЛОСТИ РТА

Блок: Блок 14 | № 1380

1380. ПРИЧИНОЙ УРЕМИЧЕСКОЙ ОСТЕОДИСТРОФИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ УВЕЛИЧЕНИЕ УРОВНЯ ПАРАТИРЕОИДНОГО ГОРМОНА

Блок: Блок 14 | № 1381

1381. ПОЖИЛЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ (ГОД)

☐ от 60 до 74

Блок: Блок 14 | № 1382

1382. НА ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ НАПРАВЛЯЮТ ПАЦИЕНТОВ

☐ у которых выявлен повышенный уровень общего холестерина крови

Блок: Блок 14 | № 1383

1383. К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ДЕКОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 1, ОТНОСЯТ

☐ несоответствие дозы инсулина уровню гликемии

Блок: Блок 14 | № 1384

1384. АНТИКОАГУЛЯЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ И РИСК ГЕМОМРАГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ СОЧЕТАНИИ АНТИКОАГУЛЯНТОВ С

☐ нестероидными противовоспалительными средствами

Блок: Блок 14 | № 1385

1385. ЛОЖНЫЙ КРУП ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ парагриппа

Блок: Блок 14 | № 1386

1386. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ метотрексат

Блок: Блок 14 | № 1387

1387. ПРЕДПОЛОЖИТЬ НАЛИЧИЕ НА ЭКГ ПОСТИНФАРКТНОЙ АНЕВРИЗМЫ МОЖНО НА ОСНОВАНИИ

☐ «застывшего» подъема сегмента ST

Блок: Блок 14 | № 1388

1388. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СТАТИНОВ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ЯВЛЕНИЕМ БЫВАЕТ

☐ гепатотоксичность

Блок: Блок 14 | № 1389

1389. ПРИ РАЗВИТИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА НОРМАЛИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ МВ КФК В КРОВИ НАБЛЮДАЕТСЯ ЧЕРЕЗ (В СУТКАХ)

☐ 2-3

Блок: Блок 14 | № 1390

1390. ПРОГНОЗ ПАЦИЕНТОВ С НЕКРОТИЗИРУЮЩИМИ ВАСКУЛИТАМИ УЛУЧШАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

☐ цитостатиков

Блок: Блок 14 | № 1391

1391. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ТИПА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ острым началом заболевания

Блок: Блок 14 | № 1392

1392. ИМПЛАНТАЦИЯ КАВА-ФИЛЬТРА ДОЛЖНА БЫТЬ РАССМОТРЕНА ПРИ

☐ рецидивирующей ТЭЛА на фоне приема антикоагулянтов

Блок: Блок 14 | № 1393

1393. ПРИЕМЫ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА ИСКЛЮЧАЮТ

☐ выкручивание

Блок: Блок 14 | № 1394

1394. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТАМИ ПО АНГИНЕ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 1

☐ месяца

Блок: Блок 14 | № 1395

1395. ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 030/У «КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ» НОМЕР КАРТЫ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ НОМЕРУ

☐ медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях (форма N 025/у)

Блок: Блок 14 | № 1396

1396. НА БЕССИМПТОМНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ У БОЛЬНОГО С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ УКАЗЫВАЕТ

☐ индекс Соколова-Лайона $>3,5$ мВ, $RaVL >1,1$ мВ

Блок: Блок 14 | № 1397

1397. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ В ПЕРВЫЕ 2 ЧАСА ДОЛЖНО СНИЖАТЬСЯ НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА __ % ОТ ИСХОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ

☐ 25

Блок: Блок 14 | № 1398

1398. ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРЕПАРАТОВ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ диарея

Блок: Блок 14 | № 1399

1399. ПОКАЧИВАНИЕ ГОЛОВЫ В ТАКТ СЕРДЦЕБИЕНИЮ (СИМПТОМ МЮССЕ) ТИПИЧНО ДЛЯ

☐ недостаточности аортального клапана

Блок: Блок 14 | № 1400

1400. БОЧКООБРАЗНАЯ ФОРМА ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, ОГРАНИЧЕНИЕ ЕЁ ПОДВИЖНОСТИ ПРИ ДЫХАНИИ, ОДЫШКА ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЫМИ ПРИЗНАКАМИ

☐ эмфиземы лёгких

Блок 15

Блок: Блок 15 | № 1401

1401. ПОД ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОНИМАЮТ

- ☐ степень достижения конкретных результатов при оказании медицинской помощи при соответствующих ресурсных затратах

Блок: Блок 15 | № 1402

1402. ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО, ОБРАТИВШЕГОСЯ С ЖАЛОБАМИ НА НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ КИШЕЧНИКА, СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

- ☐ ректального пальцевого исследования

Блок: Блок 15 | № 1403

1403. РЕНТГЕНОГРАММУ В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ СЧИТАЮТ ВЫПОЛНЕННОЙ С ПОВЫШЕНИЕМ ЖЁСТКОСТИ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ, ЕСЛИ ВИДНЫ _____ ВЕРХНИХ ГРУДНЫХ

- ☐ отчётливо 2-3; позвонка

Блок: Блок 15 | № 1404

1404. АНАЛИЗ МОЧИ ПО ЗИМНИЦКОМУ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- ☐ объема и удельной плотности мочи каждые три часа в течение суток

Блок: Блок 15 | № 1405

1405. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВНЕТОРАКАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ДИССЕМНИРОВАННОМ ТУБЕРКУЛЁЗЕ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ кишечник

Блок: Блок 15 | № 1406

1406. ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ оценка состояния здоровья

Блок: Блок 15 | № 1407

1407. ЦИРРОТИЧЕСКИЙ ТУБЕРКУЛЁЗ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ клинической формой туберкулёза легких

Блок: Блок 15 | № 1408

1408. ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ПРИ ОПУХОЛЯХ, ЛОКАЛИЗУЮЩИХСЯ В НАДПОЧЕЧНИКАХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ первичный гиперальдостеронизм

Блок: Блок 15 | № 1409

1409. КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ кризовое повышение АД

Блок: Блок 15 | № 1410

1410. НАИБОЛЕЕ ПОЛНЫМ И ПРАВИЛЬНЫМ НАБОРОМ СРЕДСТВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ БОТУЛИЗМОМ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ промывание желудка и кишечника, энтеросорбенты, введение антитоксической сыворотки, дезинтоксикационные средства, хлорамфеникол

Блок: Блок 15 | № 1411

1411. НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АГ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ возраст

Блок: Блок 15 | № 1412

1412. ПРИ КАРАНТИНЕ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ

☐ врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия – лечащим врачом

Блок: Блок 15 | № 1413

1413. ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ КАНДИДОЗНОГО ЭЗОФАГИТА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ белых и беловато-желтых бляшек на слизистой оболочке пищевода, налета с трудом снимаемого биопсийными щипцами, после удаления которого остаются участки осадения

Блок: Блок 15 | № 1414

1414. ОЧАГОВЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ малой формой туберкулёза

Блок: Блок 15 | № 1415

1415. ВЕДУЩАЯ РОЛЬ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ

☐ участковым терапевтам, педиатрам, семейным врачам

Блок: Блок 15 | № 1416

1416. КАНЦЕРОГЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ В ОТНОШЕНИИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА МОГУТ ОБЛАДАТЬ

☐ жареное мясо

Блок: Блок 15 | № 1417

1417. ДЛЯ РАСЧЁТА ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕОБХОДИМЫ ДАННЫЕ О СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ЧИСЛЕ

☐ заболеваний, выявленных впервые в данном году

Блок: Блок 15 | № 1418

1418. К КАРДИОСПЕЦИФИЧНЫМ ИЗОФЕРМЕНТАМ ОТНОСЯТ

☐ фракцию МВ креатинфосфокиназы

Блок: Блок 15 | № 1419

1419. ГИПЕРГЛИКЕМИЯ ПРИ ДЕФИЦИТЕ ИНСУЛИНА НАРАСТАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

☐ гликогенолиза

Блок: Блок 15 | № 1420

1420. УВЕЛИЧЕНИЕ СЫВОРОТОЧНОГО А-ФЕТОПРОТЕИНА НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕНО ПРИ

☐ гепатоцеллюлярном раке

Блок: Блок 15 | № 1421

1421. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение продукции эритропоэтина

Блок: Блок 15 | № 1422

1422. ДО УСТАНОВЛЕНИЯ ТОЧНОГО ДИАГНОЗА ЛЕЧЕНИЕ АРТРИТА МОЖНО НАЧАТЬ С

☐ нестероидных противовоспалительных препаратов

Блок: Блок 15 | № 1423

1423. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВЕН В ДИАГНОСТИКЕ СТЕНОКАРДИИ ПРИНЦМЕТАЛА МЕТОД

☐ холтеровского мониторирования ЭКГ

Блок: Блок 15 | № 1424

1424. ПРИ СПОНТАННОМ ПНЕВМОТОРАКСЕ НА СТОРОНЕ ПОРАЖЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ отставание при дыхании

Блок: Блок 15 | № 1425

1425. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СИСТЕМНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ геморрагический инсульт в анамнезе

Блок: Блок 15 | № 1426

1426. НА НАЛИЧИЕ ХОЛЕСТАЗА УКАЗЫВАЕТ

☐ повышение щелочной фосфатазы, билирубина, холестерина

Блок: Блок 15 | № 1427

1427. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ ТЕРАПИИ НЕСТЕРОИДНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ЯВЛЯЮТСЯ _____ ОСЛОЖНЕНИЯ

☐ желудочно-кишечные

Блок: Блок 15 | № 1428

1428. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВРАЧЕБНЫМИ КАДРАМИ НА 10000 НАСЕЛЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО

☐ численности врачей (физических лиц)

Блок: Блок 15 | № 1429

1429. ОГРАНИЧЕННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ ИЛИ ХАЙРОПАТИЯ У ПОДРОСТКОВ С ПЛОХО КОМПЕНСИРОВАННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА СВЯЗАНА С

☐ избыточным гликированием коллагена

Блок: Блок 15 | № 1430

1430. АНТИТЕЛА К ОБКЛАДОЧНЫМ КЛЕТКАМ ЖЕЛУДКА ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ ____ ГАСТРИТЕ

☐ аутоиммунном

Блок: Блок 15 | № 1431

1431. НЕРАЦИОНАЛЬНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОМБИНАЦИЯ

☐ глимепирида и алоглиптина

Блок: Блок 15 | № 1432

1432. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ДИАГНОЗА «ПОРОК СЕРДЦА» НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эхокардиография

Блок: Блок 15 | № 1433

1433. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УМЕРЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ трамадол или кодеин

Блок: Блок 15 | № 1434

1434. ЗВУК РАЗЛИПАНИЯ АЛЬВЕОЛ, ВЫСЛУШИВАЕМЫЙ НА ВЫСОТЕ ВДОХА ПРИ ЭКССУДАТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ, НАЗЫВАЕТСЯ

☐ крепитацией

Блок: Блок 15 | № 1435

1435. У БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ

☐ бронхиальная астма

Блок: Блок 15 | № 1436

1436. МЕТОДОМ ВЫБОРА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ПЕЧЕНОЧНОКЛЕТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЛЮБОГО ГЕНЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ проведение трансплантации печени

Блок: Блок 15 | № 1437

1437. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ПРОТЕКАЮЩИЙ С АБСОЛЮТНОЙ ИНСУЛИНОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ОТНОСИТСЯ К

☐ 1 типу

Блок: Блок 15 | № 1438

1438. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА ЗАБОЛЕВАНИЯ, СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ ПОДЪЕМОМ ТЕМПЕРАТУРЫ, СЛЕДУЕТ

☐ увеличить получаемую суточную дозу инсулина

Блок: Блок 15 | № 1439

1439. БАЗИСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингаляционные глюкокортикостероиды

Блок: Блок 15 | № 1440

1440. ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТНОШЕНИЕМ

- ☐ веса в килограммах к росту в метрах в квадрате

Блок: Блок 15 | № 1441

1441. ВЕДУЩЕЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ЖАЛОБОЙ ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ сухой кашель

Блок: Блок 15 | № 1442

1442. ДЛЯ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА НЕ ХАРАКТЕРНО

- ☐ наличие артрита плюснефалангового сустава

Блок: Блок 15 | № 1443

1443. НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ МЕТОДОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПЕЧЕНОЧНОЙ И ПОДПЕЧЕНОЧНОЙ ЖЕЛТУХИ СЛУЖИТ

- ☐ ультразвуковое исследование органов брюшной полости

Блок: Блок 15 | № 1444

1444. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ

- ☐ 3 - 4 месяца

Блок: Блок 15 | № 1445

1445. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ТЕСТОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ТИРЕОТОКСИКОЗА И НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- ☐ уровня трийодтиронина и тироксина в крови

Блок: Блок 15 | № 1446

1446. CREST-СИНДРОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ РАЗВИТИЕМ

- ☐ синдрома Рейно

Блок: Блок 15 | № 1447

1447. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ДЛЯ МИТРАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ СЕРДЦА, ВЫЯВЛЯЕМЫМ ПРИ ПЕРКУССИИ СЕРДЦА, ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ смещение вверх верхней границы и сглаживание «тали» сердца

Блок: Блок 15 | № 1448

1448. СТУЛ ПРИ ХОЛЕРЕ

- ☐ обильный, водянистый, без калового запаха и окраски

Блок: Блок 15 | № 1449

1449. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЖЕЛТУХИ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ОТ ЖЕЛТУХИ ПРИ АКТИВНОМ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- ☐ ретикулоцитоза

Блок: Блок 15 | № 1450

1450. ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЁЗОМ ПРИ АСПИРАЦИОННОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИОННОЙ БИОПСИИ, ПОДВЕРГАЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЮ

☐ цитологическому и бактериологическому

Блок: Блок 15 | № 1451

1451. ГИПОХРОМИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ АНЕМИИ

☐ железодефицитной

Блок: Блок 15 | № 1452

1452. ЛЕЧЕНИЕ НЕОСЛОЖНЕННОГО ГРИППА ДОЛЖНО ПРОВОДИТСЯ

☐ противовирусными препаратами

Блок: Блок 15 | № 1453

1453. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА ПОКАЗАН

☐ метронидазол

Блок: Блок 15 | № 1454

1454. КАПТОПРИЛ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

☐ ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента

Блок: Блок 15 | № 1455

1455. ПОДАГРА СЛУЖИТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ

☐ тиазидных диуретиков

Блок: Блок 15 | № 1456

1456. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОЙ С ДИФфуЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ (ПОСЛЕ ОТМЕНЫ МЕРКАЗОЛИЛА РАЗВИЛСЯ РЕЦИДИВ ДИФфуЗНОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА) ВКЛЮЧАЕТ ЛЕЧЕНИЕ

☐ радиоактивным йодом или оперативное лечение

Блок: Блок 15 | № 1457

1457. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ УЗЕЛКОВОГО ПОЛИАРТЕРИИТА НАЗНАЧАЮТ

☐ преднизолон и циклофосфамид

Блок: Блок 15 | № 1458

1458. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВАРФАРИНА У БОЛЬНЫХ С НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ЦЕЛЕВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ НОРМАЛИЗОВАННОЕ ОТНОШЕНИЕ ДОЛЖНО НАХОДИТСЯ В ДИАПАЗОНЕ ЗНАЧЕНИЙ

☐ 2,0-3,0

Блок: Блок 15 | № 1459

1459. ФОРМОЙ ТУБЕРКУЛЕЗА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙСЯ ВЫРАЖЕННЫМИ ЭКСУДАТИВНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ В ЛЕГКОМ, ВЫСОКОЙ ЧАСТОТОЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОСТЕЙ РАСПАДА И ВЫДЕЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА, ОБРАТИМОСТЬЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ В ПРОЦЕССЕ ХИМИОТЕРАПИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инфильтративная

Блок: Блок 15 | № 1460

1460. КЛАПАННАЯ МИТРАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ В СЛУЧАЕ

- ☐ неполного смыкания створок митрального клапана вследствие их органического изменения

Блок: Блок 15 | № 1461

1461. МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА МОЖНО ВЫЯВИТЬ ПРИ МИКРОСКОПИИ ОКРАШЕННОГО ПРЕПАРАТА ПО

- ☐ Цилю – Нельсену

Блок: Блок 15 | № 1462

1462. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ЛЕГКОГО ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ВВЕДЕНИЕ

- ☐ симпатомиметиков через небулайзер

Блок: Блок 15 | № 1463

1463. ПРИЗНАКОМ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СОГЛАСНО ИНДЕКСУ СОКОЛОВА – ЛАЙОНА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ $SV1+RV5/V6 > 35$ мм

Блок: Блок 15 | № 1464

1464. ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ И СИНДРОМА КУШИНГА ПРОВОДЯТ ПРОБУ С

- ☐ дексаметазоном

Блок: Блок 15 | № 1465

1465. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ В ОБЫЧНЫХ ДОЗАХ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ

- ☐ кандидоза ротоглотки, дисфонии

Блок: Блок 15 | № 1466

1466. ДЕСТРУКЦИЯ ПЛОСКИХ КОСТЕЙ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРИ

- ☐ множественной миеломе

Блок: Блок 15 | № 1467

1467. ВЕДУЩИМ ЗВЕНОМ ПАТОГЕНЕЗА ХОЛЕРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ дегидратация

Блок: Блок 15 | № 1468

1468. ПАРАЦЕТАМОЛ ОБЛАДАЕТ ДЕЙСТВИЕМ

- ☐ жаропонижающим

Блок: Блок 15 | № 1469

1469. ПОКАЗАТЕЛЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БОЛЬНИЦЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДНЕЙ РАБОТЫ КОЙКИ В ГОДУ, ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ занятость койки

Блок: Блок 15 | № 1470

1470. ГАПТЕНОВЫЙ АГРАНУЛОЦИТОЗ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ СЛЕДСТВИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ

☐ метамизол натрия

Блок: Блок 15 | № 1471

1471. ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ САРКОИДОЗА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ неказеифицирующейся эпителиоидноклеточной гранулемы

Блок: Блок 15 | № 1472

1472. ФУНГИСТАТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ГРИЗЕОФУЛЬВИНА СНИЖАЕТ

☐ рифампицин

Блок: Блок 15 | № 1473

1473. ПОВЫШЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ТРОПОНИНОВ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ

☐ 7-14 дней

Блок: Блок 15 | № 1474

1474. К ИЗМЕНЕНИЯМ В КОСТНОМ МОЗГЕ ПРИ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ОТНОСЯТ

☐ снижение клеточности костного мозга, преобладание жировой ткани

Блок: Блок 15 | № 1475

1475. СУТОЧНАЯ ДОЗА ПЕНИЦИЛЛИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ У БОЛЬНОГО ВЕСОМ 80 КГ СОСТАВЛЯЕТ (МЛН. ЕД)

☐ 24

Блок: Блок 15 | № 1476

1476. О КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

☐ депрессия сегмента ST

Блок: Блок 15 | № 1477

1477. ПНЕВМОНИЯ, РАЗВИВШАЯСЯ В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ ГРИППА, С БЫСТРО ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ДЕСТРУКЦИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ВЫЗВАНА

☐ стафилококком

Блок: Блок 15 | № 1478

1478. ДОСТОВЕРНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ

☐ снижение индекса Тиффно

Блок: Блок 15 | № 1479

1479. ИЗМЕНЕНИЕМ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ депрессия сегмента ST

Блок: Блок 15 | № 1480

1480. ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПО

☐ количеству обслуживаемого населения на территории

Блок: Блок 15 | № 1481

1481. ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ НА МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ БОЛЬНЫХ С

☐ хроническими заболеваниями легких

Блок: Блок 15 | № 1482

1482. СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИ СОЧЕТАНИИ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН ПИЩЕВОДА И ____ СЕЛЕЗЕНКИ

☐ увеличения

Блок: Блок 15 | № 1483

1483. АКТИВНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РАБОТАЮЩИХ ЛИЦ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОФЕССИЙ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВРЕДНЫХ, НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА, ОТНОСИТСЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ____ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ

☐ периодическим

Блок: Блок 15 | № 1484

1484. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ И ДОСТОВЕРНЫМ МЕТОДОМ ОБНАРУЖЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД

☐ культуральный

Блок: Блок 15 | № 1485

1485. ОСНОВНОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ НИТРАТОВ ОБУСЛОВЛЕН

☐ уменьшением венозного возврата к сердцу

Блок: Блок 15 | № 1486

1486. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНЕ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА ОТНОСЯТ

☐ полипы кишечника

Блок: Блок 15 | № 1487

1487. О НАЛИЧИИ ОБРАТИМОЙ БРОНХООБСТРУКЦИИ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРИРОСТ ОФВ1 ОТ ИСХОДНОГО ПОСЛЕ БРОНХОДИЛАТАЦИОННОГО ТЕСТА НЕ МЕНЕЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

☐ 12

Блок: Блок 15 | № 1488

1488. В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЗВЕНЕ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА НАЛИЧИЕ У ПАЦИЕНТА НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА ЕГО НАПРАВЛЯЮТ НА

☐ ЭКГ

Блок: Блок 15 | № 1489

1489. ФОРМОЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙСЯ БЫСТРЫМ ПРОГРЕССИРОВАНИЕМ С ОБРАЗОВАНИЕМ МНОГОЧИСЛЕННЫХ ПОЛОСТЕЙ РАСПАДА ИЛИ ГИГАНТСКИХ КАВЕРН, ТЯЖЕЛЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ, ВЫРАЖЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ казеозная пневмония

Блок: Блок 15 | № 1490

1490. ПРИ ПЕРВИЧНОМ ЗАРАЖЕНИИ МИКОБАКТЕРИЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ФАГОЦИТОЗ НОСИТ ХАРАКТЕР

☐ незавершенный

Блок: Блок 15 | № 1491

1491. К АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ III КЛАССА ОТНОСИТСЯ

☐ Амiodарон

Блок: Блок 15 | № 1492

1492. ГЕМАТОШИЗОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

☐ всех форм малярии

Блок: Блок 15 | № 1493

1493. ПРИ I ТИПЕ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ II СТЕПЕНИ

☐ наблюдается постепенное, от одного комплекса к другому, замедление проводимости по АВ-узлу вплоть до полной задержки одного электрического импульса

Блок: Блок 15 | № 1494

1494. ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ИЦЕНКО-КУШИНГА ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ блокаторы стероидогенеза

Блок: Блок 15 | № 1495

1495. ЛЕЧЕНИЕ СТАТИНАМИ СЛЕДУЕТ ПРЕКРАТИТЬ, ЕСЛИ АКТИВНОСТЬ ТРАНСАМИНАЗ ПРЕВЫШАЕТ НОРМУ В (РАЗ)

☐ 3

Блок: Блок 15 | № 1496

1496. НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛО СТРАДАЕТ ОТ ДИФТЕРИЙНОГО ЭКЗОТОКСИНА СИСТЕМА

☐ сердечно-сосудистая

Блок: Блок 15 | № 1497

1497. РЕВЕРСИВНЫЙ ТЗ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТОМ ПРЕВРАЩЕНИЯ

☐ свободного Т4

Блок: Блок 15 | № 1498

1498. УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ЭРИТРОЦИТОВ И СНИЖЕНИЕ В НИХ ГЕМОГЛОБИНА ЯВЛЯЮТСЯ ХАРАКТЕРНЫМИ ЛАБОРАТОРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ АНЕМИИ

☐ железодефицитной

Блок: Блок 15 | № 1499

1499. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА ВОЗБУДИТЕЛЯ МАЛЯРИИ ПРОВОДЯТ

☐ микроскопический анализ

Блок: Блок 15 | № 1500

1500. БОЛЬНЫЕ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 1 СТАДИИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ РАБОТЫ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗАХ НА (ДЕНЬ)

☐ 5

Блок: Блок 15 | №

. длительность жизни железодефицитной анемии у пожилых пациентов будет составлять

☐ 3 – 4 месяца

Блок 16

Блок: Блок 16 | № 1501

1501. К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ОТНОСЯТ

☐ остеопороз и гипергликемию

Блок: Блок 16 | № 1502

1502. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЛОСКОСТОПИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ

☐ плантография

Блок: Блок 16 | № 1503

1503. СОГЛАСНО НОВЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПРОВОДИТСЯ В ____ ЭТАП/ЭТАПА

☐ два

Блок: Блок 16 | № 1504

1504. АНТАБУСОПОДОБНЫМ (НАРУШЕНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ЭТАНОЛУ) ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

☐ метронидазол

Блок: Блок 16 | № 1505

1505. ЭМФИЗЕМА ЛЁГКИХ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

☐ хронической обструктивной болезни легких

Блок: Блок 16 | № 1506

1506. О СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ ГАСТРИТА СУДЯТ ПО КЛЕТОЧНОЙ ИНФИЛЬТРАЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА

☐ лейкоцитами

Блок: Блок 16 | № 1507

1507. ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ОБУСЛОВЛЕННЫ

☐ гиперчувствительностью замедленного типа

Блок: Блок 16 | № 1508

1508. ШКАЛА GRACE ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ

☐ острым коронарным синдроме без подъема сегмента ST

Блок: Блок 16 | № 1509

1509. ИСХОДОМ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А ЯВЛЯЕТСЯ

☐ выздоровление

Блок: Блок 16 | № 1510

1510. ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НЕ НАЗНАЧАЮТ

☐ инъекции Дибазола

Блок: Блок 16 | № 1511

1511. КАТЕХОЛАМИНОВЫЙ КРИЗ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

☐ феохромоцитоме

Блок: Блок 16 | № 1512

1512. ГЕМАТОМНЫЙ ТИП КРОВОТОЧИВОСТИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ гемофилии

Блок: Блок 16 | № 1513

1513. ОСНОВНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ СИНДРОМОМ БИЛИАРНОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ холестатический

Блок: Блок 16 | № 1514

1514. ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРЕПАРАТ

☐ Экстенциллин

Блок: Блок 16 | № 1515

1515. ПРИ МЕНИНГОКОККЦЕМИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ВЫСЫПАНИЙ НА КОЖЕ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ геморрагические, неправильной формы

Блок: Блок 16 | № 1516

1516. РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О ПРОДЛЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИЕЙ ПРИ СРОКЕ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ (В ДНЯХ)

☐ 15

Блок: Блок 16 | № 1517

1517. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА МАЛЪАБСОРБЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ДИАРЕЕ БОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНО ИССЛЕДОВАНИЕ

☐ биохимическое крови

Блок: Блок 16 | № 1518

1518. К ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ОТНОСИТСЯ

☐ материнская смертность

Блок: Блок 16 | № 1519

1519. ПРИСТУПЫ МОРГАНЬИ-ЭДАМСА-СТОКСА ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ

☐ атриовентрикулярной блокаде III степени

Блок: Блок 16 | № 1520

1520. АНТИБИОТИКОМ ДЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ШТАММЫ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ цефотаксим

Блок: Блок 16 | № 1521

1521. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТРИГЛИЦЕРИДОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

☐ колестиполом

Блок: Блок 16 | № 1522

1522. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КОСТНОГО МОЗГА У БОЛЬНОГО СИДЕРОАХРЕСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ ВЫЯВЛЯЕТСЯ

☐ увеличение содержания сидеробластов

Блок: Блок 16 | № 1523

1523. ПОД КИСТОЙ БЕЙКЕРА ПОНИМАЮТ

☐ скопление жидкости в заднем завороте коленного сустава

Блок: Блок 16 | № 1524

1524. К ФАКТОРАМ РИСКА У ПОЖИЛЫХ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛИЯЮЩИМ НА СМЕРТНОСТЬ, ОТНОСИТСЯ

☐ высокое систолическое АД на плечевой артерии

Блок: Блок 16 | № 1525

1525. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ расширение вен нижней трети пищевода

Блок: Блок 16 | № 1526

1526. ВЛАЖНЫЕ ХРИПЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКОМ

☐ бронхиальной гиперсекреции

Блок: Блок 16 | № 1527

1527. ПОКАЗАНИЕМ К СРОЧНОМУ ПРОВЕДЕНИЮ ГЕМОДИАЛИЗА ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение уровня калия сыворотки 6,5 ммоль/л и более

Блок: Блок 16 | № 1528

1528. ПОКАЗАНИЕМ К ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ симптоматика декомпенсации

Блок: Блок 16 | № 1529

1529. ПРИ БОТУЛИЗМЕ ПОРАЖАЮТСЯ

☐ двигательные ядра продолговатого мозга

Блок: Блок 16 | № 1530

1530. ЦЕЛЬЮ НАЗНАЧЕНИЯ СЕРДЕЧНЫХ ГЛИКОЗИДОВ БОЛЬНОМУ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ И ПОСТОЯННОЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ замедление частоты сокращений желудочков

Блок: Блок 16 | № 1531

1531. БРОНХОЛЁГОЧНЫЙ АСПЕРГИЛЛЕЗ ОТНОСИТСЯ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

☐ грибковым

Блок: Блок 16 | № 1532

1532. ПРИ ВЫБОРЕ ИНГИБИТОРА АПФ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО С ХСН И НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПОЧЕК СЛЕДУЕТ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ

☐ фозиноприлу

Блок: Блок 16 | № 1533

1533. ТЯЖЕЛЫМ СИСТЕМНЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРОТЕКАЮЩИМ С РАЗРУШЕНИЕМ КЛАПАНОВ СЕРДЦА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инфекционный эндокардит

Блок: Блок 16 | № 1534

1534. К ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМического ГИПОГОНАДИЗМА ОТНОСЯТ

☐ агонисты дофаминовых рецепторов

Блок: Блок 16 | № 1535

1535. ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА НЕ ПРОВОДИТСЯ

☐ людям с аллергией на куриные яйца

Блок: Блок 16 | № 1536

1536. К ПРИЗНАКАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА, ОТНОСЯТ

☐ повышение кожной температуры над суставами и припухлость суставов

Блок: Блок 16 | № 1537

1537. ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ НЕВОЗМОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ _____ ИЗУЧАЕМЫХ ОРГАНОВ И СТРУКТУР

☐ микроструктуру

Блок: Блок 16 | № 1538

1538. ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ СПОКОЙНОЙ ХОДЬБЕ НА РАССТОЯНИЕ 100–200 МЕТРОВ ИЛИ ПРИ ПОДЪЕМЕ ПО ЛЕСТНИЦЕ НА ОДИН ПРОЛЕТ, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ _____ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ

☐ III

Блок: Блок 16 | № 1539

1539. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

☐ Сальбутамол

Блок: Блок 16 | № 1540

1540. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОПАРАТИРЕОЗА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРЕПАРАТЫ

☐ кальция и витамина D

Блок: Блок 16 | № 1541

1541. В ПИТАНИИ БОЛЬНОГО С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ МОЖНО В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ огурцы

Блок: Блок 16 | № 1542

1542. ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ХАРАКТЕРНО ОСЛОЖНЕНИЕ, КОТОРЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ амилоидоз

Блок: Блок 16 | № 1543

1543. ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛИПОПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ (ММОЛЬ/Л)

☐ 1,4

Блок: Блок 16 | № 1544

1544. ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБНАРУЖИВАЕТСЯ

☐ полиартрит

Блок: Блок 16 | № 1545

1545. КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, ИСКЛЮЧАЮЩИМ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ синдром портальной гипертензии

Блок: Блок 16 | № 1546

1546. ЗАБОЛЕВАНИЕМ ГРУППЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ сахарный диабет

Блок: Блок 16 | № 1547

1547. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ утренней скованностью более часа

Блок: Блок 16 | № 1548

1548. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ

☐ тиреотропного гормона

Блок: Блок 16 | № 1549

1549. ПЕРВИЧНЫМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ

☐ дети и подростки

Блок: Блок 16 | № 1550

1550. У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ИМЕЮЩИХ ОЧЕНЬ ВЫСОКИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ РИСК, ОСНОВНЫМИ В ЛЕЧЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ изменение образа жизни и немедленное начало лекарственной терапии

Блок: Блок 16 | № 1551

1551. ДИУРЕТИКОМ, ИСПОЛЬЗУЕНЫМ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фуросемид

Блок: Блок 16 | № 1552

1552. НОРМАЛЬНЫЙ АОРТАЛЬНЫЙ КЛАПАН ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ ____ СТВОРОК

☐ трех

Блок: Блок 16 | № 1553

1553. К ДВИГАТЕЛЬНЫМ РЕЖИМАМ В САНАТОРИИ ОТНОСЯТ

☐ щадящий и щадяще-тренирующий

Блок: Блок 16 | № 1554

1554. ДЛЯ «FACIES MALARICA» ХАРАКТЕРНЫ

☐ бледно-желтая окраска кожных покровов и склер, одутловатость лица

Блок: Блок 16 | № 1555

1555. САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ III СТАДИИ, ХСН II А (2 Ф. КЛ.) ПОКАЗАНО

☐ в местных кардиологических санаториях вне курортов

Блок: Блок 16 | № 1556

1556. КЛАССИФИКАТОР ИЗДЕРЖЕК МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ

☐ материальные затраты

Блок: Блок 16 | № 1557

1557. ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

☐ Амоксициллина (или защищенного амоксициллина) или макролидов

Блок: Блок 16 | № 1558

1558. А1-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ СОЧЕТАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ С

☐ аденомой предстательной железы

Блок: Блок 16 | № 1559

1559. БОЛЬНЫМ С ХСН РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОГРАНИЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ

☐ поваренной соли

Блок: Блок 16 | № 1560

1560. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕМ

☐ стеноза митрального клапана

Блок: Блок 16 | № 1561

1561. СЕКРЕЦИЯ ГОРМОНА РОСТА УГНЕТАЕТСЯ ПРИ

☐ ожирении

Блок: Блок 16 | № 1562

1562. КОЛИЧЕСТВО ТРОМБОЦИТОВ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (В $\times 10^9/\text{л}$)

☐ 150-400

Блок: Блок 16 | № 1563

1563. АТЕРОГЕННЫЙ ЭФФЕКТ ОТСУТСТВУЕТ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

☐ α -адреноблокаторами

Блок: Блок 16 | № 1564

1564. К СЕКРЕТАГОГАМ ОТНОСЯТ САХАРОСНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ ГРУППЫ

☐ глинидов

Блок: Блок 16 | № 1565

1565. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гипотензия

Блок: Блок 16 | № 1566

1566. ОБРАЗОВАНИЕ АБСЦЕССОВ В ПЕЧЕНИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ амёбиаза

Блок: Блок 16 | № 1567

1567. ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИВОДИТ К ПОЯВЛЕНИЮ МИТРАЛЬНОЙ РЕГУРГИТАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ

☐ растяжения и отрыва хордальных сухожилий

Блок: Блок 16 | № 1568

1568. ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НАЗЫВАЮТ ПОВЫШЕНИЕ АД ВЫШЕ (ММ РТ.СТ.)

☐ 140/--90

Блок: Блок 16 | № 1569

1569. К ОСНОВНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СИЛИКОЗА НЕ ОТНОСЯТ

☐ ателектазы

Блок: Блок 16 | № 1570

1570. ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В КРОВИ УРОВНЯ

☐ аланинаминотрансферазы

Блок: Блок 16 | № 1571

1571. НЕОТЛОЖНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ НЕ ВКЛЮЧАЕТ

☐ введение препаратов калия

Блок: Блок 16 | № 1572

1572. ПРИ АНТИФОСФОЛИПИДНОМ СИНДРОМЕ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ

☐ плазмаферез и антикоагулянты

Блок: Блок 16 | № 1573

1573. КАРДИОСЕЛЕКТИВНЫЕ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ВЛИЯЮТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО НА ____-РЕЦЕПТОРЫ

☐ В1

Блок: Блок 16 | № 1574

1574. ЧЕТВЕРТОЙ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК (ХБП 4) СООТВЕТСТВУЕТ СКФ (МЛ/МИН/1.73 М²)

☐ 15-29

Блок: Блок 16 | № 1575

1575. СОЧЕТАНИЕ ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ гранулематоза с полиангиитом (гранулематоза Вегенера)

Блок: Блок 16 | № 1576

1576. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА У БОЛЬНЫХ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ БУДЕТ СЛУЖИТЬ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ____ К КОНЦУ ____ НЕДЕЛИ ТЕРАПИИ

☐ ретикулоцитов; 1

Блок: Блок 16 | № 1577

1577. К ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКАМ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ОТНОСЯТ

☐ снижение уровня эритроцитов в крови

Блок: Блок 16 | № 1578

1578. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ФИБРОЗИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛИТА СЛУЖИТ

☐ одышка

Блок: Блок 16 | № 1579

1579. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БОЛЕЗНИ РЕЙТЕРА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ хламидийная уrogenитальная инфекция

Блок: Блок 16 | № 1580

1580. ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ГИПОГЛИКЕМИИ НАЧИНАЮТ С ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ РАСТВОРА (В ПРОЦЕНТАХ)

☐ 40

Блок: Блок 16 | № 1581

1581. СРОК ДЕЙСТВИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ КАРТЫ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 2 месяца

Блок: Блок 16 | № 1582

1582. КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ В ПЕРВЫЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ПРИ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение уровня ретикулоцитов

Блок: Блок 16 | № 1583

1583. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КАЛЬПРОТЕКТИНА В КАЛЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ДИАГНОЗ

☐ болезнь Крона

Блок: Блок 16 | № 1584

1584. АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛИТ (БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА) ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТ

☐ молодых мужчин

Блок: Блок 16 | № 1585

1585. МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ колоноскопия с биопсией

Блок: Блок 16 | № 1586

1586. ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ отчет станции, отделения (больницы) скорой медицинской помощи (ф.40)

Блок: Блок 16 | № 1587

1587. ОДНИМ ИЗ ЛЕГОЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дистресс-синдром

Блок: Блок 16 | № 1588

1588. К ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ОТНОСЯТ

☐ сердечную недостаточность

Блок: Блок 16 | № 1589

1589. УСИЛЕННАЯ ПУЛЬСАЦИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ аортальной недостаточности

Блок: Блок 16 | № 1590

1590. К ВАЗОДИЛАТАТОРАМ СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТ

☐ нитропруссид натрия

Блок: Блок 16 | № 1591

1591. ПЕРВАЯ ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

☐ на 2 года

Блок: Блок 16 | № 1592

1592. ПОВЫШЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ВАНИЛИЛМИНДАЛЬНОЙ КИСЛОТЫ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ феохромоцитомы

Блок: Блок 16 | № 1593

1593. К ГОРМОНАМ ПЕРЕДНЕЙ ДОЛИ ГИПОФИЗА ОТНОСИТСЯ

☐ пролактин

Блок: Блок 16 | № 1594

1594. ИНДУКЦИЯ ГРУППОВОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКТОПИИ У ПАЦИЕНТА НА ПИКЕ НАГРУЗКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ диагностическим критерием ишемии миокарда

Блок: Блок 16 | № 1595

1595. ДЛЯ РЕВМАТИЧЕСКОГО ПОЛИАРТРИТА ХАРАКТЕРНО

☐ стойкое поражение суставов, поражение крупных и средних суставов

Блок: Блок 16 | № 1596

1596. СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ РАССЧИТЫВАЮТ С ПОМОЩЬЮ ФОРМУЛЫ

☐ СКД-ЕРІ

Блок: Блок 16 | № 1597

1597. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ФУРАЗИДИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ острый цистит

Блок: Блок 16 | № 1598

1598. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ИЗ-ЗА ТЕРАТОГЕННОГО ЭФФЕКТА АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКАЗАНЫ

☐ ингибиторы АПФ

Блок: Блок 16 | № 1599

1599. НАЛИЧИЕ МОНОНУКЛЕАРОВ В ГЕМОГРАММЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ инфекционного мононуклеоза

Блок: Блок 16 | № 1600

1600. ПРИ СОЧЕТАНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ блокаторов кальциевых каналов

Блок 17

Блок: Блок 17 | № 1601

1601. ЦЕЛЮ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ГЕПАТИТА С В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ полное устранение вируса из организма

Блок: Блок 17 | № 1602

1602. ПРИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗЕ СТУЛ ИМЕЕТ ВИД

☐ «болотной тины»

Блок: Блок 17 | № 1603

1603. ПОНЯТИЕ «РАННИЙ РАК» ПОДРАЗУМЕВАЕТ

☐ рак I-II стадий

Блок: Блок 17 | № 1604

1604. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ТИРЕОТОКСИКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ

☐ трийодтиронина и тироксина крови

Блок: Блок 17 | № 1605

1605. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ

☐ гломерулонефрита

Блок: Блок 17 | № 1606

1606. ПОКАЗАНИЯМИ К НАЗНАЧЕНИЮ ЦИТОСТАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЭРИТРЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ спленомегалия, лейкоцитоз, тромбоцитоз

Блок: Блок 17 | № 1607

1607. О НАЛИЧИИ СИНДРОМА ХОЛЕСТАЗА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

☐ повышение уровня щелочной фосфатазы

Блок: Блок 17 | № 1608

1608. ЖЕЛУДОЧКОВЫЙ РИТМ РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК «УСТОЙЧИВАЯ ЖЕЛУДОЧКОВАЯ ТАХИКАРДИЯ» ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ БОЛЕЕ (В СЕК.)

☐ 30

Блок: Блок 17 | № 1609

1609. ДЛЯ РАКА СРЕДНЕАМПУЛЯРНОГО ОТДЕЛА ПРЯМОЙ КИШКИ ХАРАКТЕРНЫ

☐ частые тенезмы с отхождением крови и слизи

Блок: Блок 17 | № 1610

1610. ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЁТ

☐ врач-терапевт участковый

Блок: Блок 17 | № 1611

1611. САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НА КЛИМАТИЧЕСКИХ КУОРТАХ ПРОТИВОПОКАЗАНО БОЛЬНЫМ С ДИАГНОЗОМ

☐ гипертоническая болезнь II ст, неконтролируемая артериальная гипертензия

Блок: Блок 17 | № 1612

1612. У ОСНОВАНИЯ МЕЧЕВИДНОГО ОТРОСТКА, А ТАКЖЕ СЛЕВА И СПРАВА ОТ НЕГО ЛУЧШЕ ВЫСЛУШИВАЮТСЯ ЗВУКОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА КЛАПАНЕ

☐ трехстворчатом

Блок: Блок 17 | № 1613

1613. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В

☐ год

Блок: Блок 17 | № 1614

1614. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ИНСУЛИНА ИЗОФАНА СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

☐ 12-16

Блок: Блок 17 | № 1615

1615. ДЛЯ ГЕМОМРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА ХАРАКТЕРНО

☐ выраженные общемозговые, очаговые и менингеальные симптомы

Блок: Блок 17 | № 1616

1616. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ЗАНЯТИЯМ ЛФК ДЛЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИИ НА СЕРДЦЕ: ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие резких колебаний АД

Блок: Блок 17 | № 1617

1617. КРИТЕРИЕМ III СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ СКФ (МЛ/МИН)

☐ 30-59

Блок: Блок 17 | № 1618

1618. ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ

☐ протеинурии

Блок: Блок 17 | № 1619

1619. ПРИ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ

☐ фибрилляция предсердий

Блок: Блок 17 | № 1620

1620. ПРИ ПЕРВИЧНОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В КРОВИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ низкий уровень натрия

Блок: Блок 17 | № 1621

1621. БОЛЬНАЯ, СТРАДАЮЩАЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ЖАЛУЕТСЯ НА ПОЯВЛЕНИЕ СУХОГО КАШЛЯ. ОНА ПРИНИМАЕТ БЕКЛОМЕТАЗОН, ЛИЗИНОПРИЛ ЕЖЕДНЕВНО И САЛЬБУТАМОЛ 1-2 РАЗА В НЕДЕЛЮ. ВЕРОЯТНО, ПОЯВЛЕНИЕ КАШЛЯ СВЯЗАНО С

☐ приемом лизиноприла

Блок: Блок 17 | № 1622

1622. НАРАСТАНИЕ ОДЫШКИ, БОЛИ В ГРУДИ, ОДНОСТОРОННЕГО ТИМПАНИТА ИЛИ КОРОБОЧНОГО ЗВУКА ПРИ ПЕРКУССИИ, ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ШУМОВ ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЮТ

☐ клапанный пневмоторакс

Блок: Блок 17 | № 1623

1623. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ

☐ базовую программу ОМС

Блок: Блок 17 | № 1624

1624. ПОДТВЕРЖДАТЬ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ КАТЕГОРИЮ НЕОБХОДИМО

☐ каждые пять лет

Блок: Блок 17 | № 1625

1625. ГРАНИЦЫ ЛЁГКИХ СМЕЩАЮТСЯ КНИЗУ ПРИ

☐ эмфиземе лёгких

Блок: Блок 17 | № 1626

1626. ОТЁК ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ ШЕИ, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙСЯ НИЖЕ КЛЮЧИЦ, ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ токсической дифтерии ротоглотки III степени

Блок: Блок 17 | № 1627

1627. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОГО ХОЛЕРОЙ III СТЕПЕНИ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ хлосоль

Блок: Блок 17 | № 1628

1628. СЦИНТИГРАФИЯ ЛЁГКИХ С ИЗОТОПАМИ ПОЗВОЛЯЕТ УТОЧНИТЬ СОСТОЯНИЕ

☐ капиллярного кровотока лёгких

Блок: Блок 17 | № 1629

1629. НА ЭКГ ИНТЕРВАЛ P-R СОСТАВЛЯЕТ 0,10 СЕК., КОМПЛЕКС QRS РАСШИРЕН ДО 0,12 СЕК. НА НАЧАЛЬНОЙ ЧАСТИ КОМПЛЕКСА QRS ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВОЛНА «ДЕЛЬТА», ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта

Блок: Блок 17 | № 1630

1630. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИИ РАБОТНИКА В ПЕРИОД ОЧЕРЕДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА ОФОРМЛЯЕТСЯ

☐ листок нетрудоспособности на весь период утраты трудоспособности

Блок: Блок 17 | № 1631

1631. ДЛЯ СИНДРОМА МАЛЬАБСОРБЦИИ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ диарея

Блок: Блок 17 | № 1632

1632. КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ полидипсия

Блок: Блок 17 | № 1633

1633. К ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ЛЁГОЧНОЙ ЭМБОЛИИ ОТНОСЯТ

☐ вены нижних конечностей

Блок: Блок 17 | № 1634

1634. ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В СОСТАВЛЯЕТ (В ДНЯХ)

☐ 60-180

Блок: Блок 17 | № 1635

1635. ПАССИВНЫМИ НАЗЫВАЮТ УПРАЖНЕНИЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ

☐ с помощью инструктора без волевого усилия больного

Блок: Блок 17 | № 1636

1636. ПРОТИВПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ЗНАМИВИРА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бронхоспазм

Блок: Блок 17 | № 1637

1637. ДЛЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ

☐ отёков, протеинурии, гипоальбуминемии

Блок: Блок 17 | № 1638

1638. ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ЭХОКГ ХАРАКТЕРЕН

☐ локальный гипо- и акинез

Блок: Блок 17 | № 1639

1639. К ПРОТИВОПОКАЗАНИЮ К САНАТОРНОМУ ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА, НЕ ОТНОСЯТ

☐ компенсированный сахарный диабет

Блок: Блок 17 | № 1640

1640. КАНДИДОЗ ОТНОСИТСЯ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

☐ грибковым

Блок: Блок 17 | № 1641

1641. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕКРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В МИОКАРДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

☐ сердечного тропонина Т или I

Блок: Блок 17 | № 1642

1642. ПРИ «ДИАРЕЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ» У БОЛЬНОГО С АЛЛЕРГИЕЙ К ФТОРХИНОЛОНАМ НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ

☐ рифаксимин

Блок: Блок 17 | № 1643

1643. К ПРЕПАРАТАМ, К КОТОРЫМ ВОЗНИКАЕТ ТОЛЕРАНТНОСТЬ, ЯВЛЯЮТСЯ

☐ нитраты

Блок: Блок 17 | № 1644

1644. КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дегидратация

Блок: Блок 17 | № 1645

1645. ВСЕ СЕЛЕКТИВНЫЕ НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (ИНГИБИТОРЫ ЦОГ-2) ПОВЫШАЮТ _____, ЧЕМ НЕСЕЛЕКТИВНЫЕ НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

☐ сердечно-сосудистый риск в большей степени

Блок: Блок 17 | № 1646

1646. АНТИБИОТИКИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ ШОКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВВЕДЕНЫ

☐ в течение первого часа от постановки диагноза

Блок: Блок 17 | № 1647

1647. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИМЕНЯЮТ

☐ гидрокортизон

Блок: Блок 17 | № 1648

1648. УРЧАНИЕ ПРИ ПАЛЬПАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ КИШЕЧНИКА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ, ЧТО

☐ в кишечнике имеется жидкое содержимое и скапливаются газы

Блок: Блок 17 | № 1649

1649. ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ СЛЕДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ

☐ трансфузиологическую помощь

Блок: Блок 17 | № 1650

1650. К МЕТОДАМ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ НАЛИЧИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ МОЖНО ОТНЕСТИ

☐ своевременную и адекватную терапию, своевременное проведение вакцинации от гриппа, прекращение контакта с аллергеном

Блок: Блок 17 | № 1651

1651. ПРИЗНАКОМ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стойкая гипотония

Блок: Блок 17 | № 1652

1652. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ НЕДОСТАТОЧНОСТИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пляска каротид

Блок: Блок 17 | № 1653

1653. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ВАЖНЕЙШИМ КРИТЕРИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ

☐ суточной протеинурии более 3,5 г

Блок: Блок 17 | № 1654

1654. У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ПРИ НАЛИЧИИ ВЫСОКИХ ЗАОСТРЕННЫХ ЗУБЦОВ Т, БРАДИКАРДИИ ВЕРОЯТНА

☐ гиперкалиемия

Блок: Блок 17 | № 1655

1655. ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (СКФ МЕНЕЕ 10 МЛ/МИН/1,73 М2) НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИЕМ

☐ дилтиазема

Блок: Блок 17 | № 1656

1656. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ АЛЬБУМИНУРИИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ ингибиторов АПФ

Блок: Блок 17 | № 1657

1657. ДЛЯ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ фторхинолоны

Блок: Блок 17 | № 1658

1658. ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОГО РЯДА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МОЧЕВОЙ ИНФЕКЦИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ полусинтетические пенициллины

Блок: Блок 17 | № 1659

1659. УСРЕДНЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И КРАТНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИДОВ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ВКЛЮЧЕНЫ В

☐ стандарты медицинской помощи

Блок: Блок 17 | № 1660

1660. ПРЕПАРАТОМ-АНТАГОНИСТОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ВАРФАРИНА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Витамин К

Блок: Блок 17 | № 1661

1661. ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST, СОПРОВОЖДАЮЩИМСЯ ПОВЫШЕНИЕМ МАРКЕРОВ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА, ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ В ТЕЧЕНИЕ (В ЧАСАХ)

☐ 24

Блок: Блок 17 | № 1662

1662. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ хроническое раздражение слизистой дыхательных путей поллютантами (аэрозоли промышленных выбросов, табачный дым и т.д.)

Блок: Блок 17 | № 1663

1663. ВОЗБУДИТЕЛЕМ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО СЫПНОГО ТИФА ЯВЛЯЕТСЯ РИККЕТСИЯ

☐ Провачека

Блок: Блок 17 | № 1664

1664. НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ КОМБИНАЦИЯ

☐ ингибиторы АПФ + дигидропиридиновые антагонисты кальция

Блок: Блок 17 | № 1665

1665. ПОЯВЛЕНИЕ КРОВОВАРКАРЬЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ бронхоэктатической болезни

Блок: Блок 17 | № 1666

1666. БОЛЬНЫМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ВЫСОКИМ И ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ РИСКОМ СЧИТАЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ СИНДРОМА

☐ метаболического

Блок: Блок 17 | № 1667

1667. ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЁТСЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

☐ эзофагогастродуоденоскопии с биопсией

Блок: Блок 17 | № 1668

1668. УЧЕТНАЯ ФОРМА N 039-1/У-06 «ДНЕВНИК УЧЕТА РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ УЧАСТКОВОЙ» ЗАПОЛНЯЕТСЯ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ УЧАСТКОВОЙ

☐ раз в квартал

Блок: Блок 17 | № 1669

1669. ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ОТ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЁЗОМ ПРИ БРАШ-БИОПСИИ, ПОДВЕРГАЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЮ

☐ цитологическому и гистологическому

Блок: Блок 17 | № 1670

1670. К ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИКСОДОВЫМИ КЛЕЩЕВЫМИ БОРРЕЛИОЗАМИ ОТНОСЯТСЯ

☐ тетрациклины

Блок: Блок 17 | № 1671

1671. ПРИЧИНОЙ СПОНТАННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА МОЖЕТ СТАТЬ

☐ коронарный тромбоз, спровоцированный разрывом бляшки

Блок: Блок 17 | № 1672

1672. КРОВООБЕСПЕЧЕНИЕ МИОКАРДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВО ВРЕМЯ

☐ диастолы

Блок: Блок 17 | № 1673

1673. ОСОБЕННОСТЬЮ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ преобладание отеочно-секреторного механизма обструкции

Блок: Блок 17 | № 1674

1674. СИНДРОМ «ПЕРЕКРЕСТА» («НОЖНИЦ») ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ снижением лейкоцитов и повышением СОЭ к концу первой недели

Блок: Блок 17 | № 1675

1675. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гемофильная палочка

Блок: Блок 17 | № 1676

1676. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ОДИНАКОВЫХ ДОЗАХ НАИБОЛЬШИЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТ ОТ ПРИЕМА

☐ розувастатина

Блок: Блок 17 | № 1677

1677. ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ПРЕДПОЛОЖИТЬ НАЛИЧИЕ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ величина протеинурии и уровень холестерина сыворотки

Блок: Блок 17 | № 1678

1678. НЕОБРАТИМЫМ КОМПОНЕНТОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ перибронхиальный фиброз

Блок: Блок 17 | № 1679

1679. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ ДИГИДРОПИРИДИНОВОГО РЯДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кардиогенный шок

Блок: Блок 17 | № 1680

1680. ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИНУСОВОГО РИТМА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ амиодарон

Блок: Блок 17 | № 1681

1681. ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ фибрилляцией предсердий

Блок: Блок 17 | № 1682

1682. ПОКАЗАНИЕМ К СРОЧНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ БОЛЬНОГО С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ГЕМОДИАЛИЗ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ высокая гиперкалиемия

Блок: Блок 17 | № 1683

1683. В ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТЕ С ЭКССУДАТИВНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ НА МИНДАЛИНАХ ВХОДИТ

☐ мазок из миндалин и носа на дифтерию

Блок: Блок 17 | № 1684

1684. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПАРОКСИЗМА УСТОЙЧИВОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ НА ФОНЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПОКАЗАНО

☐ незамедлительное проведение электроимпульсной терапии

Блок: Блок 17 | № 1685

1685. КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ БЕРОДУАЛ СОДЕРЖИТ

☐ фенотерола гидробромид и ипратропия бромид

Блок: Блок 17 | № 1686

1686. К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ОТНОСЯТ

☐ остронефритический синдром

Блок: Блок 17 | № 1687

1687. ДЛЯ ХОБЛ КРАЙНЕ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ (GOLD) ХАРАКТЕРНО ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 (%)

☐ < 30

Блок: Блок 17 | № 1688

1688. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ СИМПТОМОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА НАЛИЧИЕ ДУОДЕНОГАСТРАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие желчи в рвотных массах

Блок: Блок 17 | № 1689

1689. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КОЛИТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА ШИГЕЛЛЁЗА ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ НАЗНАЧАЮТ

☐ ципрофлоксацин

Блок: Блок 17 | № 1690

1690. ХАРАКТЕРНЫМ ЭКГ-ПРИЗНАКОМ ГИПЕРКАЛИЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ высокий остроконечный зубец Т

Блок: Блок 17 | № 1691

1691. ГРУППА ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ВКЛЮЧАЕТ БОЛЬНЫХ

☐ язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки

Блок: Блок 17 | № 1692

1692. К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ОТНОСЯТ

☐ курение

Блок: Блок 17 | № 1693

1693. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗОВ "ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ" И "ХРОНИЧЕСКИЙ ДУОДЕНИТ" РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ

☐ эндоскопии с биопсией

Блок: Блок 17 | № 1694

1694. ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ, ИГРАЮЩИМ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение тонуса нижнего пищеводного сфинктера

Блок: Блок 17 | № 1695

1695. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЭНДОГЕННЫЙ ГИПЕРКОРТИЦИЗМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ проведение ночного подавляющего теста с 1 мг дексаметазона

Блок: Блок 17 | № 1696

1696. ПРЕПАРАТОМ, ВХОДЯЩИМ В ТРЕХКОМПОНЕНТНУЮ СХЕМУ ЭРАДИКАЦИИ H. PYLORI, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кларитромицин

Блок: Блок 17 | № 1697

1697. ПЕРИОДОМ ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА (T_{1/2}) ЯВЛЯЕТСЯ ВРЕМЯ

☐ снижения концентрации в плазме крови на 50%

Блок: Блок 17 | № 1698

1698. К ПРИЗНАКАМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ СПЕЦИФИЧНОСТЬ ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ГРАНУЛЕМЫ, ОТНОСЯТ

☐ казеозный некроз

Блок: Блок 17 | № 1699

1699. УСРЕДНЁННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСТОТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И КРАТНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ИМПЛАНТИРУЕМЫХ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, ВКЛЮЧЕНЫ В

☐ стандарты медицинской помощи

Блок: Блок 17 | № 1700

1700. ДЛЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение титра антител к двуспиральной ДНК

Блок 18

Блок: Блок 18 | № 1701

1701. БОЛЬНОМУ С КЛИНИКОЙ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С ЖЕЛТУШНЫМ СИНДРОМОМ ПОКАЗАНА

☐ госпитализация в инфекционное отделение

Блок: Блок 18 | № 1702

1702. ГЕМОГЛОБИН, ГЕМАТОКРИТ И ОБЩАЯ МАССА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭРИТРОЦИТОВ УМЕНЬШАЮТСЯ ПРИ

☐ анемиях

Блок: Блок 18 | № 1703

1703. ПО РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТРАН ЕВРОПЫ «СИСТОЛО-ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ АГ» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО УРОВНЮ АД В ММ РТ. СТ.

☐ выше 140 и выше 90

Блок: Блок 18 | № 1704

1704. К МОДИФИЦИРУЕМЫМ (УПРАВЛЯЕМЫМ) ФАКТОРАМ РИСКА ОТНОСЯТ

☐ вредные для здоровья факторы поведенческого характера (курение, злоупотребление алкоголем, нерациональное питание)

Блок: Блок 18 | № 1705

1705. СУХОСТЬ КОЖИ, КОЖНЫЙ ЗУД, ЖАЖДА И ПОЛИУРИЯ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ

☐ сахарном диабете

Блок: Блок 18 | № 1706

1706. ОСТРО ВОЗНИКШАЯ БЛОКАДА ЛЕВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА ЧАЩЕ ВСЕГО СОПРОВОЖДАЕТ ИНФАРКТ ____ ЛОКАЛИЗАЦИИ

☐ передней

Блок: Блок 18 | № 1707

1707. КРИЗОВОЕ ТЕЧЕНИЕ АГ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ феохромоцитомы

Блок: Блок 18 | № 1708

1708. НАЛИЧИЕ КАЛЬЦИНАТОВ ВО ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ УКАЗЫВАЕТ НА

☐ ранее перенесенный туберкулёзный процесс

Блок: Блок 18 | № 1709

1709. ЦЕЛЮЮ ЛЕЧЕНИЯ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДАМИ БОЛЕЗНИ АДДИСОНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ контроль артериального давления

Блок: Блок 18 | № 1710

1710. ПРЕПАРАТОМ ТРЕХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ мальтофер

Блок: Блок 18 | № 1711

1711. ТОКСИЧНОСТЬ ФЕЛОДИПИНА ПОВЫШАЕТ

☐ эритромицин

Блок: Блок 18 | № 1712

1712. К ФИЗИКАЛЬНЫМ СИМПТОМАМ ХОБЛ ОТНОСЯТ

☐ сухие хрипы

Блок: Блок 18 | № 1713

1713. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТЕОАРТРОЗА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ остеофитозом

Блок: Блок 18 | № 1714

1714. ИСТОНЧЕНИЕ И ДЕФОРМАЦИЯ НОГТЕВЫХ ПЛАСТИН, СУХОСТЬ И ЛОМКОСТЬ ВОЛОС, СГЛАЖЕННОСТЬ СОСОЧКОВ ЯЗЫКА, НАРУШЕНИЕ ГЛОТАНИЯ СУХОЙ ПИЩИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

☐ сидеропенического синдрома

Блок: Блок 18 | № 1715

1715. ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНОГО ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СО СЛАБОСТЬЮ СИНУСОВОГО УЗЛА ИЛИ БРАДИСИСТОЛИЧЕСКОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ

☐ дигидропиридиновые антагонисты кальция

Блок: Блок 18 | № 1716

1716. УВЕЛИЧЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА F (ИЛИ A2) НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ талассемии

Блок: Блок 18 | № 1717

1717. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО СПОНДИЛИТА (БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА) ЯВЛЯЕТСЯ

☐ двусторонний сакроилеит

Блок: Блок 18 | № 1718

1718. БОЛЕЗНЬ ВИЛЛЕБРАНДА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ тромбоцитопатией

Блок: Блок 18 | № 1719

1719. ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРОИЗВОДНЫХ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гипогликемия

Блок: Блок 18 | № 1720

1720. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ КОННА ЧАЩЕ ВСЕГО ОБНАРУЖИВАЕТСЯ

☐ повышение концентрации альдостерона

Блок: Блок 18 | № 1721

1721. РЕЖЕ ДРУГИХ ВЫЗЫВАЕТ ЯЗВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

☐ нимесулид

Блок: Блок 18 | № 1722

1722. УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫСОТЫ И ШИРИНЫ ЗУБЦА R В ОТВЕДЕНИЯХ V1-V2 В СОЧЕТАНИИ С ДЕПРЕССИЕЙ СЕГМЕНТА ST И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ЗУБЦОМ T ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

☐ заднего инфаркта миокарда (задне-базального)

Блок: Блок 18 | № 1723

1723. НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ высокий уровень амилазы в крови

Блок: Блок 18 | № 1724

1724. ОТСУТСТВИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ФИБРИНОЗНОМ ПЛЕВРИТЕ СВЯЗАНО С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ В _____ ОБЛАСТИ

☐ междолевой

Блок: Блок 18 | № 1725

1725. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У БОЛЬНОГО СИНКОПАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ, БЛЕДНОСТИ, ГРУБОГО СИСТОЛИЧЕСКОГО ШУМА ВО 2 МЕЖРЕБЕРЬЕ СПРАВА СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ О НАЛИЧИИ

☐ аортального стеноза

Блок: Блок 18 | № 1726

1726. ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНА БОЛЬ

☐ длительная, не купирующаяся нитратами

Блок: Блок 18 | № 1727

1727. ДЕФИЦИТ ВИТАМИНА В12 В ОТЛИЧИЕ ОТ ДЕФИЦИТА ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ фуникулярным миелозом

Блок: Блок 18 | № 1728

1728. ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ листок нетрудоспособности

Блок: Блок 18 | № 1729

1729. К ДЫХАТЕЛЬНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ В ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЕ ОТНОСЯТСЯ

☐ звуковые

Блок: Блок 18 | № 1730

1730. К АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, ОТНОСЯТСЯ

☐ сухие хрипы на выдохе

Блок: Блок 18 | № 1731

1731. ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЫДАЁТСЯ

☐ медицинской организацией

Блок: Блок 18 | № 1732

1732. В ТЕРАПИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА С СЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ВКЛЮЧАЮТ

☐ ферменты (панкреатин)

Блок: Блок 18 | № 1733

1733. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БОЛИ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ, КАК ПРАВИЛО, СОСТАВЛЯЕТ

☐ от 2 до 5 минут

Блок: Блок 18 | № 1734

1734. ГРУППОЙ АНТИБИОТИКОВ, КОТОРАЯ ЧАЩЕ ДРУГИХ ВЫЗЫВАЕТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, ЯВЛЯЮТСЯ

☐ пенициллины

Блок: Блок 18 | № 1735

1735. ИНТЕНСИВНЫЕ СЖИМАЮЩИЕ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ, ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ НА ЭКГ И ПОВТОРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ АСТ, АЛТ И КФК-МВ НА 4 НЕДЕЛЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА КВАЛИФИЦИРУЮТ КАК

☐ рецидивирующий инфаркт миокарда

Блок: Блок 18 | № 1736

1736. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ КРИТЕРИЕМ В ДИЕТОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С НЕОСЛОЖНЕННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

☐ суточное потребление калорий

1737. ПРИ ВЫСОКОМ СОДЕРЖАНИИ ХОЛЕСТЕРИНА ЛПНП РИСК РАЗВИТИЯ ИБС

☐ **высокий**

1738. ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ

☐ **сатурации кислорода**

1739. В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ СИСТЕМНОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА ТИПИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ

☐ **лихорадки, кольцевидной эритемы, кардиальных, неврологических поражений, артрита**

1740. ПОЯВЛЕНИЕ У ЮНОШИ 18 ЛЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЖАЖДЫ, ПОЛИУРИИ, ОБЩЕЙ СЛАБОСТИ, ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ КРОВИ ДО 18 ММОЛЬ/Л, НАЛИЧИЯ АЦЕТОНА В МОЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

☐ **сахарном диабете 1 типа**

1741. ДЛЯ IVB СТАДИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ____ ЭТИОЛОГИЯ ПНЕВМОНИИ

☐ **пневмоцистная**

1742. ДЛЯ СИНДРОМА ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ХАРАКТЕРЕН _____ ТИП ОЖИРЕНИЯ

☐ **центральный**

1743. К ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ БАЗИСНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ОТНОСЯТ

☐ **метотрексат**

1744. МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ

☐ **фармакоинспекцией**

1745. МЕТФОРМИН ОТНОСИТСЯ К ПЕРОРАЛЬНЫМ САХАРОСНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ КЛАССА

☐ **бигуанидов**

1746. ОСНОВНОЙ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ НИТРОГЛИЦЕРИНА У БОЛЬНЫХ С ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ СВЯЗАН С

☐ **расширением периферической венозной системы**

Блок: Блок 18 | № 1747

1747. ПРИЧИНОЙ КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ язвенное поражение лимфоидных образований подвздошной кишки

Блок: Блок 18 | № 1748

1748. ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ заболевание желчного пузыря

Блок: Блок 18 | № 1749

1749. К ПОЗДНЕМУ ОСЛОЖНЕНИЮ ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСИТСЯ

☐ аневризма левого желудочка

Блок: Блок 18 | № 1750

1750. ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ВРАЧУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СТАЖ РАБОТЫ ПО

☐ соответствующей врачебной специальности не менее 7 лет

Блок: Блок 18 | № 1751

1751. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЭРИТРОЦИТОВ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ

☐ хронической обструктивной болезни легких

Блок: Блок 18 | № 1752

1752. ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ СТВОЛА ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ ПРИЕМ ДВОЙНОЙ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ (В МЕСЯЦАХ)

☐ 12

Блок: Блок 18 | № 1753

1753. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ДИЕТЫ БОЛЬНЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ С СИМПТОМАМИ НАРАСТАЮЩЕЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ПРЕЖДЕ ВСЕГО СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ

☐ белки

Блок: Блок 18 | № 1754

1754. ФАКТОРОМ, ОГРАНИЧИВАЮЩИМ ВСАСЫВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОМ ИЛИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ интенсивность периферического капиллярного кровотока

Блок: Блок 18 | № 1755

1755. ЛУЧИСТОСТЬ КОНТУРА ОКРУГЛОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ периферического рака

Блок: Блок 18 | № 1756

1756. ДЛЯ АУТОИММУННОГО ГАСТРИТА НЕ ХАРАКТЕРНО

☐ преимущественное поражение антрального отдела желудка

Блок: Блок 18 | № 1757

1757. К ГАСТРОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ

☐ ребамипид

Блок: Блок 18 | № 1758

1758. АНТИАГРЕГАНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ клопидогрел

Блок: Блок 18 | № 1759

1759. СКРИНИНГОВЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ БОЛЬНОГО С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПОДОЗРЕНИЕМ НА СИНДРОМ КУШИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тест с 1 мг дексаметазона и определение кортизола в крови

Блок: Блок 18 | № 1760

1760. ОСНОВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ регидратационная терапия

Блок: Блок 18 | № 1761

1761. ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ВИТАМИНА D В ОРГАНИЗМЕ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТОБЫ

☐ участвовать в регуляции кальциево-фосфорного обмена

Блок: Блок 18 | № 1762

1762. К ИНГАЛЯЦИОННЫМ КОРТИКОСТЕРОИДАМ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

☐ флютиказона пропионат

Блок: Блок 18 | № 1763

1763. ПРИ БОЛЕЗНИ АДДИСОНА ПРИЧИНОЙ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение уровня адренокортикотропного гормона

Блок: Блок 18 | № 1764

1764. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КУРСА ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ВЫЯВЛЯЮТСЯ

☐ anti-HBs

Блок: Блок 18 | № 1765

1765. ВВЕДЕНИЕ ЭПИНЕФРИНА ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПОКАЗАНО ПРИ

☐ сочетании с анафилаксией

Блок: Блок 18 | № 1766

1766. ФОРМА ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ НЕМНОГОЧИСЛЕННЫХ ОЧАГОВ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПРОДУКТИВНОГО ХАРАКТЕРА, ЛОКАЛИЗУЮЩИХСЯ В ОГРАНИЧЕННОМ УЧАСТКЕ ОДНОГО ИЛИ ОБОИХ ЛЕГКИХ И ЗАНИМАЮЩИХ 1-2 СЕГМЕНТА, И МАЛОСИМПТОМНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ТЕЧЕНИЕМ, МОЖЕТ БЫТЬ

☐ очаговой

Блок: Блок 18 | № 1767

1767. В ЛЕЧЕНИИ ГЕМОБЛАСТОЗОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ цитостатики и таргетные биологические препараты

Блок: Блок 18 | № 1768

1768. ПРИ ВНУТРИВЕННОМ ВВЕДЕНИИ ВЕРАПАМИЛА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ АСИСТОЛИЯ НА ФОНЕ ПРИЕМА ПАЦИЕНТОМ

☐ пропранолола

Блок: Блок 18 | № 1769

1769. В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ У БОЛЬНЫХ С ВРОЖДЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ А1- АНТИТРИПСИНА НАРАДУ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ПРИСУТСТВУЕТ

☐ хроническое рецидивирующее поражение легких с развитием дыхательной недостаточности

Блок: Блок 18 | № 1770

1770. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ АТИПИЧНЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ, ЯВЛЯЮТСЯ

☐ макролиды

Блок: Блок 18 | № 1771

1771. ПРИ ЕЖЕДНЕВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ УГНЕТЕНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (В ДНЯХ)

☐ 7 – 10

Блок: Блок 18 | № 1772

1772. «СПРАВКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ» (ФОРМА №070/У), ВЫДАВАЕМАЯ ЛИЦУ, ИМЕЮЩЕМУ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ЗАВЕРЯЕТСЯ ПОДПИСЬЮ

☐ председателя врачебной комиссии

Блок: Блок 18 | № 1773

1773. ДЛЯ РЕГИДРАТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ кристаллоиды

Блок: Блок 18 | № 1774

1774. УМЕНЬШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ

☐ увеличения концентрации эритроцитов в крови

Блок: Блок 18 | № 1775

1775. КОНТРОЛЬ АДЕКВАТНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТОВ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ

☐ МНО

Блок: Блок 18 | № 1776

1776. ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ УРОВЕНЬ АДРЕНОКОРТИКОТРОПНОГО ГОРМОНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ

☐ повышается

Блок: Блок 18 | № 1777

1777. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ введение гриппозных вакцин

Блок: Блок 18 | № 1778

1778. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СЛЕДУЕТ КЛИНИЧЕСКИ ОЦЕНИВАТЬ ЧЕРЕЗ

☐ 2-3 дня

Блок: Блок 18 | № 1779

1779. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭЛАСТАЗЫ КАЛА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СЛУЖИТ ДЛЯ

☐ оценки степени внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы

Блок: Блок 18 | № 1780

1780. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ У ЖЕНЩИНЫ 35 ЛЕТ, ПРИНИМАЮЩЕЙ ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ БОЛЕЕ ГОДА, С ЖАЛОБАМИ НА ОДЫШКУ, СУБФЕБРИЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ, МОКРОТУ ПРИ КАШЛЕ С ПРОЖИЛКАМИ КРОВИ И БОЛЬ В ЛЕВОЙ ПОЛОВИНЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тромбоэмболия легочной артерии

Блок: Блок 18 | № 1781

1781. ПРИЧИНОЙ МАССИВНОГО ОТЕЧНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНОЙ С АГ И СД, ГИПОАЛЬБУМИНЕМИЕЙ И ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ СКОРЕЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ

☐ нефротического синдрома

Блок: Блок 18 | № 1782

1782. К ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯТ

☐ общее сосудистое сопротивление

Блок: Блок 18 | № 1783

1783. ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингаляционные глюкокортикостероиды

Блок: Блок 18 | № 1784

1784. ОБОСНОВАННЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ОСТРОМ ПОСТСТРЕПТОКОККОВОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ

☐ сохранение значительной протеинурии (нефротический синдром) более 2 недель

Блок: Блок 18 | № 1785

1785. К РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ДИЕТЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТ

☐ ограничение потребления жидкости

Блок: Блок 18 | № 1786

1786. ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА МЕТФОРМИНОМ ЦЕЛЕСООБРАЗНО КОНТРОЛИРОВАТЬ В КРОВИ УРОВЕНЬ

☐ витамина B12

Блок: Блок 18 | № 1787

1787. ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ В ЛЕЙКОФОРМУЛЕ МОКРОТЫ ХАРАКТЕРНО ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

☐ эозинофилов

Блок: Блок 18 | № 1788

1788. ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СРОКИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ СЕРОПОЗИТИВНОМ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ С МЕДЛЕННО ПРОГРЕССИРУЮЩИМ ТЕЧЕНИЕМ I – II СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ СОСТАВЛЯЮТ (ДЕНЬ)

☐ 30 – 45

Блок: Блок 18 | № 1789

1789. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ трудовым договором (контрактом)

Блок: Блок 18 | № 1790

1790. CREST СИНДРОМ – ЭТО

☐ кальциноз, синдром Рейно, нарушение моторики пищевода, склеродактилия, телеангиэктазии

Блок: Блок 18 | № 1791

1791. ПАТОГНОМОНИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АДДИСОНОВОЙ БОЛЕЗНИ В ОТЛИЧИЕ ОТ ВТОРИЧНОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиперпигментация кожи

Блок: Блок 18 | № 1792

1792. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТ

☐ боль в животе, неустойчивый стул

Блок: Блок 18 | № 1793

1793. НАЛИЧИЕ ФИЛАДЕЛЬФИЙСКОЙ ХРОМОСОМЫ ПАТОГНОМОНИЧНО ДЛЯ

☐ хронического миелолейкоза

Блок: Блок 18 | № 1794

1794. ОТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ВСЕХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПО ПОВОДУ КОТОРЫХ НАСЕЛЕНИЕ ВПЕРВЫЕ ОБРАТИЛОСЬ В ДАННОМ ГОДУ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, К СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ВЫРАЖЕННОЕ В ПРОМИЛЛЕ, НАЗЫВАЮТ

☐ общей заболеваемостью

Блок: Блок 18 | № 1795

1795. К СЕЛЕКТИВНЫМ/СПЕЦИФИЧЕСКИМ ИНГИБИТОРАМ ЦОГ-2 НЕ ОТНОСИТСЯ

☐ Ацеклофенак

Блок: Блок 18 | № 1796

1796. ЧАСТЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ГАНЦИКЛОВИРА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нейтропения

Блок: Блок 18 | № 1797

1797. БОЛЬНОЙ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ II СТАДИИ СО СТАБИЛЬНЫМ АД 220/120 ММ РТ.СТ. ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ У

☐ врача-кардиолога

Блок: Блок 18 | № 1798

1798. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗВИТИЕ АБСЦЕССА ЛЁГКОГО ВЫЗЫВАЕТ

☐ золотистый стафилококк

Блок: Блок 18 | № 1799

1799. ОДНОСТОРОННЯЯ БОЛЬ В ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ острого пиелонефрита

Блок: Блок 18 | № 1800

1800. -Д-ДИМЕР ЯВЛЯЕТСЯ ПРОДУКТОМ ЛИЗИСА

☐ фибрина

Блок 19

Блок: Блок 19 | № 1801

1801. МИКРОАДЕНОМОЙ СЧИТАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ ГИПОФИЗА ДИАМЕТРОМ (В СМ)

☐ менее 1,0

Блок: Блок 19 | № 1802

1802. ТАКТИКОЙ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ ПО ДАННЫМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНО ХОРОШЕМ САМОЧУВСТВИИ БОЛЬНОГО ЯВЛЯЕТСЯ

☐ направление на консультацию гематолога

Блок: Блок 19 | № 1803

1803. ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ВАЗОДИЛАТАТОРОВ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ

☐ митральном стенозе

1804. УСЛОВИЕМ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инсулинорезистентность

1805. НА ЭКГ РИТМ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ НЕПРАВИЛЬНЫЙ (ИНТЕРВАЛ R-R РАЗНЫЙ), ЗУБЕЦ Р ОТСУТСТВУЕТ, КОМПЛЕКС QRST НЕ РАСШИРЕН, ЧСС ОКОЛО 130 В МИНУТУ, ЧТО УКАЗЫВАЕТ НА

☐ фибрилляцию предсердий

1806. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ И СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ геморрагический инсульт

1807. ТУБЕРКУЛЕЗ ВНУТРИГРУДНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПО РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ И МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ОСОБЕННОСТЯМ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА ФОРМЫ

☐ опухолевую, инфильтративную, малую

1808. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОГО ВЫБОРА У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эналаприл

1809. ГРУДНАЯ КЛЕТКА ВСЛЕДСТВИЕ ЛЕГОЧНЫХ БОЛЕЗНЕЙ МОЖЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ФОРМУ

☐ бочкообразную

1810. САМЫМ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ У 60-ТИ ЛЕТНЕГО БОЛЬНОГО С АТЕЛЕКТАЗОМ ВЕРХНЕЙ ДОЛИ ПРАВОГО ЛЕГКОГО, ОДЫШКОЙ И НЕПРОДУКТИВНЫМ КАШЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бронхоскопия

1811. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕ-ШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У МУЖЧИНЫ 65 ЛЕТ, КУРЯЩЕГО, НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ

☐ обследования трахеи и гортани

1812. КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ТИРЕОТОКСИКОЗА РАЗВИВАЮТСЯ

☐ при болезни Грейвса

1813. В ЛЕЧЕНИИ НПВП-ГАСТРОПАТИИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ

☐ ингибиторы протонной помпы

Блок: Блок 19 | № 1814

1814. НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ КОНТРОЛЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гликированный гемоглобин

Блок: Блок 19 | № 1815

1815. ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ОПУХОЛЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ синдроме Шегрена

Блок: Блок 19 | № 1816

1816. ПРИ ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ фенофибрата

Блок: Блок 19 | № 1817

1817. ПОКАЗАТЕЛЬ СВОЕВРЕМЕННОСТИ ВЗЯТИЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН РАССЧИТЫВАЕТСЯ, КАК ОТНОШЕНИЕ ЧИСЛА БЕРЕМЕННЫХ, ВЗЯТЫХ НА УЧЕТ БЕРЕМЕННОСТИ, К ЧИСЛУ БЕРЕМЕННЫХ, ПОСТУПИВШИХ ПОД НАБЛЮДЕНИЕ В ДАННОМ ГОДУ, УМНОЖЕННОЕ НА 100

☐ до 12 недель

Блок: Блок 19 | № 1818

1818. КАВЕРНОЗНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ клинической формой туберкулёза легких

Блок: Блок 19 | № 1819

1819. ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

☐ Апротинин

Блок: Блок 19 | № 1820

1820. ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РЕАКЦИИ НА МЕДИКАМЕНТЫ ВОЗМОЖНЫ ИЗ-ЗА

☐ наличия общих антигенных детерминант

Блок: Блок 19 | № 1821

1821. В ФОРМЕ N 025-1/У «ТАЛОН ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ» ПОДЛЕЖАТ УЧЕТУ

☐ посещения врачей любых специальностей, ведущих прием в амбулаторных условиях, в том числе консультативный прием

Блок: Блок 19 | № 1822

1822. О РАЗВИТИИ РАКА ПЕЧЕНИ НА ФОНЕ ЦИРРОЗА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЕ В КРОВИ

☐ альфа-фетопротеина

Блок: Блок 19 | № 1823

1823. ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ НАЗНАЧАЮТ ТОПИЧЕСКИЕ СОСУДОСУЖИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА (ДЕКОНГЕСТАНТЫ) В НОС ДЛЯ

☐ восстановления дренажной и вентиляционной функций слуховой трубы

Блок: Блок 19 | № 1824

1824. К ПЕРВИЧНЫМ КАРДИОМИОПАТИЯМ ОТНОСИТСЯ

☐ гипертрофическая

Блок: Блок 19 | № 1825

1825. ГИПЕРФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ДИФфуЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ ОБУСЛОВЛЕНА ГИПЕРПРОДУКЦИЕЙ

☐ тиреостимулирующих иммуноглобулинов

Блок: Блок 19 | № 1826

1826. ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЮТСЯ СУСТАВЫ

☐ проксимальные межфаланговые

Блок: Блок 19 | № 1827

1827. ЛЕВОТИРОКСИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ЛЕЧЕНИИ

☐ гипотиреоза

Блок: Блок 19 | № 1828

1828. ПРИ УГРОЗЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОМЫ У ПАЦИЕНТА С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ДИЕТИЧЕСКИЕ МЕРЫ КАСАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

☐ белков

Блок: Блок 19 | № 1829

1829. ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ СТРУКТУРУ, УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИЛИ ДОЛЮ ИЗУЧАЕМОГО ЯВЛЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

☐ экстенсивный

Блок: Блок 19 | № 1830

1830. ОСТРО РАЗВИВШАЯСЯ БЛОКАДА ЛЕВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА ЭКВИВАЛЕНТНА

☐ инфаркту миокарда с стойкими подъемами сегмента ST на ЭКГ

Блок: Блок 19 | № 1831

1831. ДЛЯ АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ систолического шума справа от грудины с проведением на шею

Блок: Блок 19 | № 1832

1832. У ПАЦИЕНТОВ С ОБСТРУКТИВНОЙ ФОРМОЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ нитратов, дигидропиридинов, ингибиторов АПФ

Блок: Блок 19 | № 1833

1833. СИНДРОМЫ ЛАЙЕЛЛА И СТИВЕНСА-ДЖОНСОНА ОТНОСЯТ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПОБОЧНЫМ РЕАКЦИЯМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ТИПА

☐ В (непредсказуемые)

Блок: Блок 19 | № 1834

1834. ГОСПИТАЛЬНАЯ ПНЕВМОНИЯ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ

☐ через 48 и более часов после поступления в стационар

Блок: Блок 19 | № 1835

1835. ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЮТСЯ ____ СУСТАВЫ

☐ межфаланговые

Блок: Блок 19 | № 1836

1836. ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВКЛЮЧЕНЫ В

☐ порядки оказания медицинской помощи

Блок: Блок 19 | № 1837

1837. ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ РАЗВИВАЮТСЯ УЗЕЛКИ БУШАРА НА

☐ проксимальных межфаланговых суставах кисти

Блок: Блок 19 | № 1838

1838. ЖАЛОБЫ БОЛЬНОГО 66 ЛЕТ НА ПОХОЛОДАНИЕ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, БОЛИ ПРИ ХОДЬБЕ, СТИХАЮЩИЕ ПРИ ОСТАНОВКЕ, СООТВЕТСТВУЮТ СИМПТОМАМ

☐ атеросклероза бедренных артерий

Блок: Блок 19 | № 1839

1839. ДЛЯ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ БЫСТРОГО ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ И

☐ головной боли распирающего характера, рвоты, не приносящей облегчения

Блок: Блок 19 | № 1840

1840. К РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСЯТ

☐ полифекалию

Блок: Блок 19 | № 1841

1841. МАКСИМАЛЬНЫЙ ПЕРИОД ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ ИМЕЕТ

☐ кордарон

Блок: Блок 19 | № 1842

1842. УЧАСТКОВЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ПМСП ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ФОРМИРОВАНИИ ГРУПП ОБСЛУЖИВАЕМОГО КОНТИНГЕНТА

☐ по признаку проживания (пребывания) на определенной территории

Блок: Блок 19 | № 1843

1843. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ КЛАПАННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ склеродегенеративный процесс

Блок: Блок 19 | № 1844

1844. ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ СИНДРОМ

☐ интоксикационный

Блок: Блок 19 | № 1845

1845. РИСК РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ПОВЫШЕН У

☐ женщин, родивших ребенка массой более 4,0 кг

Блок: Блок 19 | № 1846

1846. АНТИАГРЕГАНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Аспирин

Блок: Блок 19 | № 1847

1847. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ХОБЛ ЛЁГКОГО ТЕЧЕНИЯ С РЕДКИМИ ОБОСТРЕНИЯМИ И ВЫРАЖЕННЫМИ СИМПТОМАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ длительно действующие β2-агонисты или антихолинэргики

Блок: Блок 19 | № 1848

1848. ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ аспирина

Блок: Блок 19 | № 1849

1849. ХАРАКТЕРНОЙ ТРИАДОЙ СИМПТОМОВ МАЛЯРИЙНОГО ПРИСТУПА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ озноб, лихорадка, потоотделение

Блок: Блок 19 | № 1850

1850. ПАЦИЕНТАМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА ПЕРЕД КРАТКОВРЕМЕННОЙ (МЕНЕЕ 2 ЧАСОВ) ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГИПОГЛИКЕМИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

☐ дополнительный прием 1-2 ХЕ трудноусвояемых углеводов

Блок: Блок 19 | № 1851

1851. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ В БИОПТАТЕ ЛИМФАТИЧЕСКОГО УЗЛА

☐ клеток Березовского – Штернберга

Блок: Блок 19 | № 1852

1852. ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА СРЕДНЕТЕЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ ОФВ1 от 60% до 80% от должных величин

Блок: Блок 19 | № 1853

1853. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ КАК

☐ здоровье населения страны

Блок: Блок 19 | № 1854

1854. ДЛЯ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО ФИБРОЗА ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ТИПИЧНЫ

☐ изменения по типу «матового стекла»

Блок: Блок 19 | № 1855

1855. В ЛАВАЖНОЙ ЖИДКОСТИ, ПОЛУЧЕННОЙ ОТ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЁЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ, ПРЕОБЛАДАЮТ

☐ лимфоциты

Блок: Блок 19 | № 1856

1856. УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ III СТЕПЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ (В ММ РТ.СТ.)

☐ 170/115

Блок: Блок 19 | № 1857

1857. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ АНТИБИОТИКОВ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ПНЕВМОНИЕЙ КЛИНИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУДЕТ СЛУЖИТЬ

☐ общее улучшение самочувствия

Блок: Блок 19 | № 1858

1858. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ лихорадка и гнойная мокрота

Блок: Блок 19 | № 1859

1859. ПОКАЗАТЕЛЕМ, ОТРАЖАЮЩИМ СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ЭРИТРОЦИТА В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ MCV

Блок: Блок 19 | № 1860

1860. ЕСЛИ РУКОВОДИТЕЛЬ СОВЕТУЕТСЯ С ПОДЧИНЕННЫМИ, ИСПОЛЬЗУЯ ИХ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ЭТО ____ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА

☐ демократический

Блок: Блок 19 | № 1861

1861. ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ С ____ НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ ЕДИНОВРЕМЕННО

☐ 30

Блок: Блок 19 | № 1862

1862. ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ УРОВНЯ ЛПНП ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПО ШКАЛЕ SCORE СОСТАВЛЯЮТ МЕНЕЕ (В ММОЛЬ/Л)

☐ 1,8

Блок: Блок 19 | № 1863

1863. К ЭКГ-ПРИЗНАКАМ ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ ОТНОСЯТ

- ☐ комплекс QS в отведениях с V3 по V5

Блок: Блок 19 | № 1864

1864. РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- ☐ аутоантитела, как правило IgM, реагирующие с Fc-фрагментом IgG

Блок: Блок 19 | № 1865

1865. ДЛЯ БОЛЬНОГО С ГИПОТИРЕОЗОМ ХАРАКТЕРНЫ ЖАЛОБЫ НА

- ☐ сонливость

Блок: Блок 19 | № 1866

1866. КАКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ В ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ ВОЗМОЖНО ПРИ ТИРЕОТОКСИКОЗЕ?

- ☐ гипертрофическая остеоартропатия

Блок: Блок 19 | № 1867

1867. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ НПВС-ТЕРАПИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- ☐ Омепразол

Блок: Блок 19 | № 1868

1868. ЕДИНОЛИЧНО ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ МОЖЕТ ВЫДАТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ МАКСИМАЛЬНО НА ___ ДНЕЙ

- ☐ 15

Блок: Блок 19 | № 1869

1869. МЕХАНИЗМ ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- ☐ угнетении проводимости болевых стимулов в центральной нервной системе

Блок: Блок 19 | № 1870

1870. ПРИМЕНЕНИЕ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ

- ☐ стенозирующем атеросклерозе периферических артерий

Блок: Блок 19 | № 1871

1871. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ СИМПТОМОВ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ

- ☐ ингибиторов АПФ

Блок: Блок 19 | № 1872

1872. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К КОЛОНОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ декомпенсированная сердечная недостаточность

Блок: Блок 19 | № 1873

1873. ПРИ МАЛЯРИИ ИЗ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ ЧАЩЕ ПОРАЖАЮТСЯ

☐ эритроциты

Блок: Блок 19 | № 1874

1874. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ВОЗНИКАЮТ ПРИ

☐ деструкции критической массы β -клеток

Блок: Блок 19 | № 1875

1875. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ

☐ элиминационная диета

Блок: Блок 19 | № 1876

1876. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРОЙ ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ВНЕЗАПНОГО ПОЯВЛЕНИЯ ГРУБОГО СИСТОЛИЧЕСКОГО ШУМА У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ИНФАРКТМ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ разрыв межжелудочковой перегородки

Блок: Блок 19 | № 1877

1877. СТЕРИЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ПРИ

☐ остром лейкозе

Блок: Блок 19 | № 1878

1878. ТОЧНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ почечная ангиография

Блок: Блок 19 | № 1879

1879. В ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ИБС НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ДАННЫЕ

☐ жалоб и анамнеза

Блок: Блок 19 | № 1880

1880. ПРОЯВЛЕНИЕМ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА III СТАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гипоксическая кома

Блок: Блок 19 | № 1881

1881. КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ НА 2-3 ДЕНЬ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ частота дыхательных движений менее 20 в минуту

Блок: Блок 19 | № 1882

1882. АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ ВЫПОТА В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ резкое ослабление дыхания

Блок: Блок 19 | № 1883

1883. АССИМЕТРИЧНАЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- ☐ гипертрофией межжелудочковой перегородки

Блок: Блок 19 | № 1884

1884. ПРИ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЕ I СТЕПЕНИ

- ☐ регистрируется замедление предсердно-желудочковой проводимости, что на ЭКГ проявляется удлинением интервала P—Q(R)

Блок: Блок 19 | № 1885

1885. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ ЗИМНИЦКОГО НЕОБХОДИМО

- ☐ исключить избыточное потребление жидкости

Блок: Блок 19 | № 1886

1886. МАРКЕРОМ РЕПЛИКАЦИИ ВИРУСА ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ HBV ДНК

Блок: Блок 19 | № 1887

1887. НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ БОЛЬНИЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: ____ ОБОРОТА КОЙКИ И ____ ЛЕТАЛЬНОСТИ

- ☐ уменьшение; увеличение

Блок: Блок 19 | № 1888

1888. К ДЕПРЕССОРНОМУ НЕЙРОГУМОРАЛЬНОМУ МЕХАНИЗМУ ПРИ РАЗВИТИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТНОСИТСЯ АКТИВАЦИЯ

- ☐ мозгового и предсердного натрийуретических пептидов

Блок: Блок 19 | № 1889

1889. ДЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ наличие свистящих хрипов на выдохе, усиливающихся при форсированном дыхании

Блок: Блок 19 | № 1890

1890. ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ (БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА) ПОМИМО КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ В ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВОВЛЕКАЮТСЯ

- ☐ корневые (плечевые и тазобедренные)

Блок: Блок 19 | № 1891

1891. СОЧЕТАНИЕ ТАХИКАРДИИ, ЭКЗОФТАЛЬМА И ТРЕМОРА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- ☐ диффузного токсического зоба

Блок: Блок 19 | № 1892

1892. ЗАТЯЖНОЙ НАЗЫВАЮТ ПНЕВМОНИЮ, ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОЙ БОЛЕЕ

- ☐ шести недель

Блок: Блок 19 | № 1893

1893. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА, ВЫЗВАННОГО ВИРУСОМ ГРУППЫ А, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ римантадин

Блок: Блок 19 | № 1894

1894. КОНЪЮГИРОВАННЫЙ (СВЯЗАННЫЙ) БИЛИРУБИН ОБРАЗУЕТСЯ В КЛЕТКАХ ПЕЧЕНИ С ПОМОЩЬЮ ФЕРМЕНТА

☐ глюкуронилтрансферазы

Блок: Блок 19 | № 1895

1895. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ФЛУКОНАЗОЛА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кандидоз

Блок: Блок 19 | № 1896

1896. К ПОЗДНИМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ОТНОСЯТ

☐ синдром Дресслера

Блок: Блок 19 | № 1897

1897. ПОКАЗАТЕЛЕМ ХИРУРГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕНТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ЧИСЛА ____ К ЧИСЛУ БОЛЬНЫХ ____ ИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

☐ проведенных хирургических операций, выбывших

Блок: Блок 19 | № 1898

1898. ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ВЫЯВЛЯЮТСЯ

☐ лейкопения, лимфоцитоз, нормальная или замедленная СОЭ

Блок: Блок 19 | № 1899

1899. К ПРИЗНАКАМ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ

☐ приступы бронхоспазма на определенные аллергены

Блок: Блок 19 | № 1900

1900. БОЛЬНОГО С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НА ПРИЕМЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ СЛЕДУЕТ

☐ госпитализировать «по ОЗ» в БИТ

Блок 20

Блок: Блок 20 | № 1901

1901. РЕФЛЕКТОРНОЕ КУПИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА ВОЗМОЖНО ПРИ

☐ суправентрикулярной тахикардии

Блок: Блок 20 | № 1902

1902. ПАТОЛОГИЧЕСКИМ РОСТОМ И НАРУШЕНИЕМ СТРУКТУРЫ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТАХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ болезнь Педжета

Блок: Блок 20 | № 1903

1903. БАКТЕРИОСТАТИЧЕСКИМ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЯВЛЯЕТСЯ _____ КИСЛОТА

☐ фузидиевая

Блок: Блок 20 | № 1904

1904. ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ИНФОРМАТИВНО ИССЛЕДОВАНИЕ В СУТОЧНОЙ МОЧЕ

☐ свободных метанефрина и норметанефрина

Блок: Блок 20 | № 1905

1905. ГИПЕРПАРАТИРЕОЗ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ спонтанными переломами

Блок: Блок 20 | № 1906

1906. ПОКАЗАТЕЛЕМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ПОТРЕБНОСТЬ В ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ среднее число посещений на одного жителя в год

Блок: Блок 20 | № 1907

1907. ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «МАЛЯРИЯ» ИССЛЕДУЕТСЯ

☐ кровь

Блок: Блок 20 | № 1908

1908. ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ИНТЕРФЕРОНОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пегилированный интерферон

Блок: Блок 20 | № 1909

1909. ПРИ УГРОЖАЮЩЕМ ЖИЗНИ ВАРФАРИНОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ КРОМЕ СВЕЖЕЗАМОРОЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ

☐ Витамин К

Блок: Блок 20 | № 1910

1910. ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ ПРОДЛЕВАЕТ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ СРОКАХ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ БОЛЕЕ (В ДНЯХ)

☐ 15

Блок: Блок 20 | № 1911

1911. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЁГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ ОДНИМ РЕАНИМАТОРОМ СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛА КОМПРЕССИЙ К ЧАСТОТЕ ДЫХАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 30:2

Блок: Блок 20 | № 1912

1912. САМЫМ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОЧАГА НЕКРОЗА В МИОКАРДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ сцинтиграфия

Блок: Блок 20 | № 1913

1913. НЕРАЦИОНАЛЬНОЙ КОМБИНАЦИЕЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ БУДЕТ СОЧЕТАНИЕ

☐ ингибиторов АПФ и блокаторов ангиотензина II

Блок: Блок 20 | № 1914

1914. ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ ГРУППЫ РИСКА ПО ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ профилактический осмотр

Блок: Блок 20 | № 1915

1915. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАКА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фиброколоноскопия с биопсией

Блок: Блок 20 | № 1916

1916. ПРИ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИМЕЕТ МЕСТО

☐ ортопноэ

Блок: Блок 20 | № 1917

1917. ВРЕМЯ «ИНТЕРВАЛЬНОЙ» ТЕРАПИИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НИТРАТАМ СОСТАВЛЯЕТ (ЧАС)

☐ 8-12

Блок: Блок 20 | № 1918

1918. КРИТЕРИЕМ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНОГО С ПНЕВМОНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нестабильная гемодинамика

Блок: Блок 20 | № 1919

1919. УВЕЛИЧЕНИЕ ПРЯМОГО И НЕПРЯМОГО БИЛИРУБИНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

☐ хронического гепатита

Блок: Блок 20 | № 1920

1920. КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРАПИИ ВАРФАРИНОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

☐ международного нормализованного отношения(МНО)

Блок: Блок 20 | № 1921

1921. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ХРОНИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЕЗНЫЙ ХОЛЕЦИСТИТ С ЦЕЛЬЮ УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ

☐ УЗИ органов брюшной полости

Блок: Блок 20 | № 1922

1922. ФИБРОЗ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН ПРИ ПОМОЩИ

☐ эластометрии

Блок: Блок 20 | № 1923

1923. САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ПЕРВИЧНОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аутоиммунный адреналит

Блок: Блок 20 | № 1924

1924. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СВЯЗАНО С ПОВРЕЖДЕНИЕМ БОЛЕЕ ____ % МАССЫ МИОКАРДА

☐ 40

Блок: Блок 20 | № 1925

1925. К ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДАМ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ

☐ рентгенографическое исследование органов грудной клетки

Блок: Блок 20 | № 1926

1926. АНАЛИЗ «МИНИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ» ПРИМЕНЯЕТСЯ

☐ для подтверждения предпочтения более дешевого метода лечения

Блок: Блок 20 | № 1927

1927. БОЛЬНОМУ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ С АСЦИТОМ ЛЕЧЕБНЫЙ ПАРАЦЕНТЕЗ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ПРИ

☐ напряженном или рефрактерном к терапии асците

Блок: Блок 20 | № 1928

1928. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ГРАЖДАНИН ИМЕЕТ ПРАВО

☐ отказаться от проведения диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских вмешательств

Блок: Блок 20 | № 1929

1929. КРАЙНЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО НАЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЛАКТАЦИИ

☐ тетрациклина

Блок: Блок 20 | № 1930

1930. ДОКЛИНИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ микроальбуминурией

Блок: Блок 20 | № 1931

1931. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ТЮБАЖЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гипомоторная дискинезия желчевыводящих путей

Блок: Блок 20 | № 1932

1932. БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ЭТИОЛОГИЮ ГЕПАТИТА, ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ

☐ десахарированного трансферрина

Блок: Блок 20 | № 1933

1933. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ СОСТАВА ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ СТАЦИОНАРА, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПОКАЗАТЕЛЯМИ

☐ экстенсивности

Блок: Блок 20 | № 1934

1934. АБДОМИНАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ, АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ, БАГРОВЫЕ СТРИИ НА КОЖЕ ЖИВОТА У БОЛЬНОГО 40 ЛЕТ С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ АДРЕНКОРТИКОТРОПНОГО ГОРМОНА МОГУТ БЫТЬ ПРОЯВЛЕНИЕМ

☐ болезни Иценко-Кушинга

Блок: Блок 20 | № 1935

1935. КЛИНИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОКАРДИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ВЫШЕ (В ММ РТ.СТ.)

☐ 230

Блок: Блок 20 | № 1936

1936. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МОКРОТЫ БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ЧАСТО ВЫЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО

☐ нейтрофильных лейкоцитов

Блок: Блок 20 | № 1937

1937. ДЛЯ НИЖНЕГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНА ЭЛЕВАЦИЯ СЕГМЕНТА ST В ОТВЕДЕНИЯХ

☐ II, III, AVF

Блок: Блок 20 | № 1938

1938. ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ВТОРИЧНОГО, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ вовлечением лимфатической системы в патологический процесс

Блок: Блок 20 | № 1939

1939. К КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА, ОТНОСЯТСЯ

☐ тошнота, рвота, жидкий водянистый стул зеленоватого цвета, диффузные боли в животе, высокая температура тела

Блок: Блок 20 | № 1940

1940. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИГОКСИНА СНИЖАЕТ

☐ рифампицин

Блок: Блок 20 | № 1941

1941. ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ наличием и выраженностью осложнений

Блок: Блок 20 | № 1942

1942. ОСНОВНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ ИАПФ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С АГ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ профилактика ремоделирования сосудов

Блок: Блок 20 | № 1943

1943. ДЫХАНИЕ СО СТРИДОРОМ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ бронхиальной астме

Блок: Блок 20 | № 1944

1944. РИСК УСИЛЕНИЯ ГЕПАТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ПАРАЦЕТАМОЛА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ НА ФОНЕ

☐ приема алкоголя, антигистаминных препаратов

Блок: Блок 20 | № 1945

1945. ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ДЛЯ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА ХАРАКТЕРНО

☐ неоднородное снижение эхогенности

Блок: Блок 20 | № 1946

1946. ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ С ВЫРАЖЕННОЙ ПОТЛИВОСТЬЮ, ТАХИКАРДИЕЙ, ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ И ТРЕМОРОМ КОНЕЧНОСТЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ

☐ феохромоцитомой

Блок: Блок 20 | № 1947

1947. РАННИМ ПРИЗНАКОМ КЛИНИЧЕСКОГО ПРОЯВЛЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ полиаденопатия

Блок: Блок 20 | № 1948

1948. К ОНКОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОСЛОЖНЯЮЩИМ ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА С, ОТНОСЯТ

☐ гепатоцеллюлярную карциному

Блок: Блок 20 | № 1949

1949. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

☐ обзорной рентгенографии в прямой и боковой проекциях

Блок: Блок 20 | № 1950

1950. К ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМАМ ТИРЕОТОКСИКОЗА ОТНОСЯТ

☐ снижение массы тела, возбудимость

Блок: Блок 20 | № 1951

1951. ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПИЩЕВОДА ОТСУТСТВИЕ ПЕРИСТАЛЬТИКИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ДИСТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ склеродермии пищевода

Блок: Блок 20 | № 1952

1952. ТИПИЧНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ НА ЭКГ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИКАРДИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ элевация сегмента ST

Блок: Блок 20 | № 1953

1953. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ К НИТРАТАМ РЕКОМЕНДОВАНО

☐ делать перерыв в приеме нитратов 8-12 часов

Блок: Блок 20 | № 1954

1954. У ПАЦИЕНТКИ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ, НАЛИЧИЕМ В АНАМНЕЗЕ РЕЗЕКЦИИ ТОЩЕЙ И ЧАСТИ ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ БУДЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

☐ Феррум Лек внутримышечно

Блок: Блок 20 | № 1955

1955. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ПАЦИЕНТА 58 ЛЕТ ВЫЯВЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ОЕЛ 50% ОТ ДОЛЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ, ОФВ1 40% ОТ ДОЛЖНОЙ ВЕЛИЧИНЫ, ИНДЕКС ТИФФНО 50%) СООТВЕТСТВУЮТ

☐ смешанному нарушению вентиляции

Блок: Блок 20 | № 1956

1956. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стрептококк

Блок: Блок 20 | № 1957

1957. К ФАКТОРУ РИСКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСИТСЯ

☐ рак молочной железы у прямых родственников

Блок: Блок 20 | № 1958

1958. ПРИ ОТСУТСТВИИ НАРУШЕНИЙ ВСАСЫВАНИЯ ЖЕЛЕЗА, ПРИОРИТЕТНЫМ В ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

☐ таблетированных препаратов железа

Блок: Блок 20 | № 1959

1959. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ В ОНКОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ морфологический

Блок: Блок 20 | № 1960

1960. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА ГЛЮКОЗУРИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО

☐ определить уровень глюкозы в крови натощак

Блок: Блок 20 | № 1961

1961. ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭНДОГЕННОГО И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ГИПЕРКОРТИЦИЗМА ПРОВОДЯТ

☐ малую дексаметазоновую пробу

1962. ПРЕПАРАТЫ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ВЛИЯЮТ НА

☐ бета-клетки

1963. БОЛЬНОМУ С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ, ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И ПАРОКСИЗМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИСТУПОВ АРИТМИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ Амиодарон

1964. ПРИ НАЛИЧИИ У БОЛЬНОГО АНЕМИИ И ТРОМБОЦИТОПЕНИИ, БЛАСТОЗА В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ О

☐ острым лейкозе

1965. ДЛЯ ПЕРОРАЛЬНОЙ РЕГИДРАТАЦИИ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ НАЗНАЧАЮТ

☐ Регидрон

1966. ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ

☐ брадикардии, отеков

1967. ОБОРОТ КОЙКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕМ ЧИСЛА ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ К

☐ среднегодовому числу коек

1968. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАРТОВОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ ____ ЧАСА/ЧАСОВ С МОМЕНТА ОТ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ

☐ 48-72

1969. УЗЛОВАТАЯ ЭРИТЕМА НАБЛЮДАЕТСЯ КАК ВНЕКИШЕЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ

☐ болезни Крона

1970. ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ХАРАКТЕРНО

☐ повышение ТТГ и снижение св. Т4

1971. ДЛЯ УРЕЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТМ МИОКАРДА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ бета-блокаторы

1972. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ КОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ боль внизу живота, слизь и кровь в испражнениях, тенезмы

1973. МАРКЕРОМ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ антинуклеарный фактор

1974. ОДНИМ ИЗ ВИДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ профессиональная

1975. ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК V СТАДИИ ФИКСИРУЕТСЯ ПРИ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ (МЛ/МИН)

☐ менее 15

1976. РЕШАЮЩИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОПУХОЛИ ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фибробронхоскопия с биопсией

1977. ПРЕПАРАТОМ С ВОЗМОЖНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В ВИДЕ ПОРОШКОВОГО ИНГАЛЯТОРА, НО НЕ ИНГАЛЯЦИЙ ЧЕРЕЗ НЕБУЛАЙЗЕР ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Индакатерол

1978. ДЛЯ ВТОРИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ГОРМОНОВ В КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение тиреотропного гормона и снижение тироксина

1979. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЕ В АНАЛИЗЕ КРОВИ

☐ ретикулоцитоза

1980. В СЛУЧАЕ БЛАГОПРИЯТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО И ТРУДОВОГО ПРОГНОЗА ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА СРОК НЕ БОЛЕЕ _____, А ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА – НЕ БОЛЕЕ _____ (В МЕСЯЦАХ)

☐ 10; 12

1981. ПРИ НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ И ОТСУТСТВИИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННАЯ

☐ осматривается врачом-терапевтом при постановке на учет в женскую консультацию, в 32 и 36-37 недель

Блок: Блок 20 | № 1982

1982. АНТИТОКСИЧЕСКИЕ СЫВОРОТКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

☐ ботулизма

Блок: Блок 20 | № 1983

1983. ЛЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

☐ ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента

Блок: Блок 20 | № 1984

1984. К ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ВАЗОДИЛАТАТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

☐ антагонисты кальциевых каналов

Блок: Блок 20 | № 1985

1985. СПРОС НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН НА НИХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ низкой эластичностью

Блок: Блок 20 | № 1986

1986. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕРЫ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ТЕРАПИЯ

☐ регидратационная

Блок: Блок 20 | № 1987

1987. ПО СПИРОГРАФИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫДЕЛЯЮТ _____ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ

☐ 4 стадии

Блок: Блок 20 | № 1988

1988. ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ОСТЕОАРТРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ возникновение боли под влиянием дневной физической нагрузки

Блок: Блок 20 | № 1989

1989. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА РЕКОМЕНДУЕТСЯ

☐ использование йодированной поваренной соли

Блок: Блок 20 | № 1990

1990. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ МЕТОТРЕКСАТА КОНТРОЛИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРАПИИ ПОЗВОЛЯЕТ

☐ клинический анализ крови

Блок: Блок 20 | № 1991

1991. К ПРИЗНАКУ КАХЕКСИИ ОТНОСИТСЯ ПОТЕРЯ МАССЫ ТЕЛА БОЛЕЕ ____ ЗА ПОСЛЕДНИЕ (В МЕСЯЦАХ)

☐ 5%; 6

Блок: Блок 20 | № 1992

1992. КРИТЕРИЕМ ОКОНЧАНИЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МЕНИНГОКОККОВОМ МЕНИНГИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ санация ликвора

Блок: Блок 20 | № 1993

1993. ТИПИЧНЫМ МЕТОДОМ СКРИНИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ флюорография

Блок: Блок 20 | № 1994

1994. БОЛЬШИМ КРИТЕРИЕМ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ПО ДАННЫМ ЭХО-КГ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ вегетация на клапанах

Блок: Блок 20 | № 1995

1995. ЦИТОЛИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ

☐ активности патологического процесса

Блок: Блок 20 | № 1996

1996. ДЛЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ХАРАКТЕРНЫ

☐ гипопротеинемия и гиперлипидемия

Блок: Блок 20 | № 1997

1997. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПАРАЦЕНТЕЗ ПРОВОДЯТ ДЛЯ

☐ посева асцитической жидкости для выявления возбудителя

Блок: Блок 20 | № 1998

1998. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ДЕРМАТОМИОЗИТЕ ИМЕЕТ

☐ высокая активность креатинфосфокиназы

Блок: Блок 20 | № 1999

1999. ПРАВИЛЬНОСТЬ УСТАНОВКИ БОЛЬНОГО НА ОБЗОРНОЙ РЕНТГЕНОГРАММЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ

☐ по одинаковому расстоянию между медиальными контурами ключиц и остистыми отростками позвонков

Блок: Блок 20 | № 2000

2000. НА ЭКГ РИТМ ЖЕЛУДОЧКОВ 32 В 1 МИН, РЕГУЛЯРНЫЙ. ВМЕСТО ЗУБЦОВ P ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ВОЛНЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ синдрома Фредерика

Блок 21

Блок: Блок 21 | № 2001

2001. МАКСИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА ПАРАЦЕТАМОЛА, КОТОРУЮ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ПРЕВЫШАТЬ ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРОЛОБУЛЯРНОГО НЕКРОЗА ПЕЧЕНИ, СОСТАВЛЯЕТ (В ГРАММАХ)

☐ 4,0

Блок: Блок 21 | № 2002

2002. К ПРИЧИНАМ ВТОРИЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ОТНОСИТСЯ СИНДРОМ

☐ Кушинга

Блок: Блок 21 | № 2003

2003. ПРЯМЫМ ПРИЗНАКОМ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ СИМПТОМ «НИШИ»

Блок: Блок 21 | № 2004

2004. ЗАТЕМНЕНИЕ С БУГРИСТЫМИ КОНТУРАМИ И ПРОСВЕТЛЕНИЕМ В ЦЕНТРЕ, ОТСУТСТВИЕМ ОЧАГОВ ВОКРУГ ВЫЯВЛЯЕТСЯ В ЛЁГКИХ ПРИ

☐ опухоли с распадом

Блок: Блок 21 | № 2005

2005. ПРЕТЕСТОВЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ЭКГ, КОТОРОЕ ДЕЛАЕТ НЕВОЗМОЖНЫМ ПРОВЕДЕНИЕ НАГРУЗОЧНОГО ТРЕДМИЛ-ТЕСТА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ полная блокада левой ножки пучка Гиса

Блок: Блок 21 | № 2006

2006. ПОКАЗАНИЕМ К ЭКСТРЕННОЙ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ уровень жидкости в плевральной полости до 2 ребра

Блок: Блок 21 | № 2007

2007. ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИН ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКАЗАНЫ К НАЗНАЧЕНИЮ ПРИ

☐ двустороннем стенозе почечных артерий

Блок: Блок 21 | № 2008

2008. ДЛИТЕЛЬНОЕ КРОВОВАРКАНЬЕ ПРИ СУХОМ КАШЛЕ ЗАСТАВЛЯЕТ ДУМАТЬ О

☐ раке бронха

Блок: Блок 21 | № 2009

2009. ВЕДУЩИМ КРИТЕРИЕМ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ протеинурия > 3,5 г/л в сочетании с гипоальбуминемией

Блок: Блок 21 | № 2010

2010. ОТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ОТЧИСЛЯЮТ В ФОНД ОМС (В ПРОЦЕНТАХ)

☐ 5,1

Блок: Блок 21 | № 2011

2011. ТИПИЧНОЙ ФОРМОЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ангинозная

Блок: Блок 21 | № 2012

2012. К СПИД-АССОЦИИРОВАННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ОТНОСЯТ

☐ туберкулез

Блок: Блок 21 | № 2013

2013. ОСНОВНЫМ ОТЛИЧИЕМ СИМПТОМАТИЧЕСКИХ ЯЗВ ОТ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ отсутствие хронического рецидивирующего течения

Блок: Блок 21 | № 2014

2014. 40-ЛЕТНИЙ МУЖЧИНА ПОЛУЧИЛ ГЛУБОКУЮ РАНУ ПРИ ПАДЕНИИ С ТРАКТОРА. ЕМУ НЕ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ЭКСТРЕННУЮ ИММУНОПРОФИЛАКТИКУ СТОЛБНЯКА ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНОЙ СЫВОРОТКОЙ, ЕСЛИ

☐ он получил полный курс иммунизации и 2 года назад ревакцинацию

Блок: Блок 21 | № 2015

2015. НАЛИЧИЕ ТРИАДЫ СИМПТОМОВ - СТОЙКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ, ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ СТЕНОК ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА, ДИАРЕЯ - УКАЗЫВАЕТ НА

☐ синдром Золлингера-Эллисона

Блок: Блок 21 | № 2016

2016. ЭФФЕКТИВНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА АМИОДАРОНА (ПОСЛЕ ПЕРИОДА НАСЫЩЕНИЯ) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИГРАММАХ)

☐ 100-200

Блок: Блок 21 | № 2017

2017. КАНЦЕРОГЕНЕЗ ОТНОСЯТ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПОБОЧНЫМ РЕАКЦИЯМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ТИПА

☐ А (предсказуемые)

Блок: Блок 21 | № 2018

2018. БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОМ С ВАЗОДИЛАТИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Карведилол

Блок: Блок 21 | № 2019

2019. ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ДИФФУЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ развитием фибрилляции предсердий

Блок: Блок 21 | № 2020

2020. ЦЕЛЬЮ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ поддержание ремиссии заболевания

Блок: Блок 21 | № 2021

2021. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ ПЕРВОЙ СТАДИИ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ОТ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ рефрактерность к использованию ингаляционных β_2 -агонистов

Блок: Блок 21 | № 2022

2022. К ТИРЕОСТАТИКАМ ОТНОСИТСЯ

☐ пропилтиоурацил

Блок: Блок 21 | № 2023

2023. У МУЖЧИНЫ 78 ЛЕТ С АДЕНОМОЙ ПРОСТАТЫ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ АГ С НАЗНАЧЕНИЯ

☐ доксазозина

Блок: Блок 21 | № 2024

2024. ПРИЧИНОЙ УЗЛОВОГО ТОКСИЧЕСКОГО ЗОБА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ автономная функция клеток узлового образования

Блок: Блок 21 | № 2025

2025. У ПАЦИЕНТА С ЛИХОРАДКОЙ, ГИПЕРЕМИЕЙ РОТОГЛОТКИ, ЛИМФАДЕНОПАТИЕЙ, СПЛЕНОМЕГАЛИЕЙ, ЛИМФОЦИТОЗОМ С АТИПИЧНЫМИ МОНОНУКЛЕАРАМИ СЛЕДУЕТ ЗАПОДОЗРИТЬ

☐ инфекционный мононуклеоз

Блок: Блок 21 | № 2026

2026. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ В ПРОГРАММЕ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОЛЬНЫМИ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ спирография

Блок: Блок 21 | № 2027

2027. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ

☐ возможное нарушение всасывания лекарств

Блок: Блок 21 | № 2028

2028. ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИНУСОВОГО РИТМА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ

☐ амиодарон

Блок: Блок 21 | № 2029

2029. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ

☐ бактериурии

Блок: Блок 21 | № 2030

2030. ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВРОЖДЕННЫЙ ХАРАКТЕР ИМЕЕТ СТЕНОЗ

☐ лёгочной артерии

Блок: Блок 21 | № 2031

2031. НА СТАДИИ ЛАТЕНТНОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА МОЖЕТ ВЫЯВЛЯТЬСЯ

☐ снижение сывороточного железа

Блок: Блок 21 | № 2032

2032. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ иммунодиагностика

Блок: Блок 21 | № 2033

2033. ПРОТИВПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА, НА САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ недостаточность кровообращения IIБ стадии

Блок: Блок 21 | № 2034

2034. СРЕДСТВОМ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ месалазин

Блок: Блок 21 | № 2035

2035. ДЛЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ

☐ трофические расстройства кожи у медиальной лодыжки; отек стопы и тупые боли в ноге, появляющиеся к концу рабочего дня; судороги икроножных мышц голени в покое

Блок: Блок 21 | № 2036

2036. РАЗВИТИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА СПОСОБСТВУЕТ

☐ генетическая предрасположенность

Блок: Блок 21 | № 2037

2037. К ИНСУЛИНОНЕЗАВИСИМЫМ ТКАНЯМ В ОРГАНИЗМЕ ОТНОСЯТ

☐ мышечную, жировую

Блок: Блок 21 | № 2038

2038. РАННЕЙ ДИАГНОСТИКОЙ РАКА У ЖЕНЩИНЫ ЗАНИМАЮТСЯ В КАБИНЕТЕ

☐ смотровом

Блок: Блок 21 | № 2039

2039. СИНДРОМОМ КОННА НАЗЫВАЕТСЯ ОПУХОЛЬ ____ СЛОЯ НАДПОЧЕЧНИКОВ

☐ клубочкового

Блок: Блок 21 | № 2040

2040. У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПАРАСПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ СВЯЗАНЫ С

☐ первичным периодом туберкулезной инфекции

Блок: Блок 21 | № 2041

2041. ОДНИМ ИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ДИАГНОЗА «СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА» ЯВЛЯЕТСЯ

☐ серозит

Блок: Блок 21 | № 2042

2042. ПРИ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ ПРОГНОЗЕ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ МОЖЕТ ПРОДЛЕВАТЬСЯ ДО (В МЕСЯЦАХ)

☐ 4

Блок: Блок 21 | № 2043

2043. ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ К ФОРМЕ

☐ государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности

Блок: Блок 21 | № 2044

2044. МЕХАНИЗМОМ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТАТИНОВ ЯВЛЯЕТСЯ ИНГИБИРОВАНИЕ

☐ фермента ГМГ-КоА редуктазы

Блок: Блок 21 | № 2045

2045. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО НЕОТЛОЖНЫМ МЕРАМ САМОПОМОЩИ И ВЗАИМОПОМОЩИ ПРОВОДИТСЯ ЛИЦАМ С

☐ сердечно-сосудистыми заболеваниями

Блок: Блок 21 | № 2046

2046. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СИСТОЛИЧЕСКИЙ ЩЕЛЧОК, ВЫСЛУШИВАЕМЫЙ ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ СЕРДЦА, ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ

☐ пролапса створки митрального клапана

Блок: Блок 21 | № 2047

2047. НА ЭКГ КОМПЛЕКСЫ QRS НЕ ИЗМЕНЕНЫ, ИНТЕРВАЛЫ P-R ОДИНАКОВЫЕ И СОСТАВЛЯЮТ 0.38 СЕК., ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ АВ блокады I степени

Блок: Блок 21 | № 2048

2048. ПРИ ЭКССУДАТИВНОМ ПЛЕВРИТЕ НЕЯСНОЙ ЭТИОЛОГИИ, ДИАГНОСТИРОВАННОМ НА ДОМУ, ТАКТИКОЙ ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ немедленная госпитализация

Блок: Блок 21 | № 2049

2049. ДЛЯ ЛИМИТИРОВАННОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ ХАРАКТЕРНО

☐ формирование CREST-синдрома

Блок: Блок 21 | № 2050

2050. ДЛЯ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ХАРАКТЕРНО

☐ появление участков «немого легкого»

Блок: Блок 21 | № 2051

2051. АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ ПРИ

☐ выделении гнойной мокроты

Блок: Блок 21 | № 2052

2052. СРЕДНЕЕ ЧИСЛО ДНЕЙ РАБОТЫ КОЙКИ В ГОДУ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ОТНОШЕНИЕМ ЧИСЛА _____ К _____

☐ койко-дней, проведенных пациентами, среднегодовому числу коек

Блок: Блок 21 | № 2053

2053. ПАТОГНОМОНИЧНЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение фракции выброса левого желудочка

Блок: Блок 21 | № 2054

2054. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА ПРИМЕНЯЮТ

☐ ингибиторы тирозинкиназы и цитостатики

Блок: Блок 21 | № 2055

2055. ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ здоровый образ жизни

Блок: Блок 21 | № 2056

2056. ПРИ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ МИКОПЛАЗМОЙ, ПРИМЕНЯЮТ

☐ Азитромицин

Блок: Блок 21 | № 2057

2057. ПЕРЕДАЧА ВОЗБУДИТЕЛЯ ЧУМЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

☐ блохами

Блок: Блок 21 | № 2058

2058. ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН ПИЩЕВОДА И КАРДИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ циррозе печени

Блок: Блок 21 | № 2059

2059. ПОДБОР СУТОЧНОЙ ДОЗЫ ДАБИГАТРАНА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

☐ без контроля показателей коагулограммы

Блок: Блок 21 | № 2060

2060. ПОВЫШЕНИЕ КОНЪЮГИРОВАННОГО БИЛИРУБИНА, ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ, Г-ГЛУТАМИЛТРАНСПЕПТИДАЗЫ, ХОЛЕСТЕРИНА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ холестатического синдрома

Блок: Блок 21 | № 2061

2061. ПЕРВИЧНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ НАРУЖНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

☐ смотровые кабинеты

Блок: Блок 21 | № 2062

2062. ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ СПИРОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ОБОСТРЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение скорости форсированного выдоха за первую секунду

Блок: Блок 21 | № 2063

2063. ПРИ ФИЗИКАЛЬНОМ ОСМОТРЕ ПАЦИЕНТА С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕ

☐ громкого, хлопающего I тона сердца на верхушке

Блок: Блок 21 | № 2064

2064. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМИ ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ ПРИМЕНЕНИЯ СИБУТРАМИНА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ сердцебиение, сухость во рту

Блок: Блок 21 | № 2065

2065. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ РАК ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

☐ компьютерная томография органов грудной клетки

Блок: Блок 21 | № 2066

2066. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ панцитопения

Блок: Блок 21 | № 2067

2067. ПРИЗНАКИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЭКЗОКРИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЧАСТО РАЗВИВАЮТСЯ ПРИ

☐ муковисцидозе

Блок: Блок 21 | № 2068

2068. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ТИОТРОПИЯ БРОМИДА ОТНОСЯТСЯ

☐ сухость во рту, тахикардия, затрудненное мочеиспускание

Блок: Блок 21 | № 2069

2069. СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ PH-ЖЕЛУДКА ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ

☐ определения оптимальной дозы и времени назначения антисекреторного препарата

Блок: Блок 21 | № 2070

2070. КЕТОАЦИДОЗ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

☐ липолиза

Блок: Блок 21 | № 2071

2071. В ЛЕЧЕНИИ ПОСТПРАНДИАЛЬНОГО ДИСТРЕСС-СИНДРОМА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

☐ прокинетики

Блок: Блок 21 | № 2072

2072. ДЛЯ РАСЧЕТА ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕОБХОДИМЫ ДАННЫЕ О

☐ заболеваемости в данном году и в предыдущие годы

Блок: Блок 21 | № 2073

2073. ПРИ ВТОРИЧНОМ ТУБЕРКУЛЁЗЕ ЛЁГКИХ ЧАЩЕ ПОРАЖАЮТСЯ СЕГМЕНТЫ

☐ I, II, VI

Блок: Блок 21 | № 2074

2074. ДЕПРЕССИЯ СЕГМЕНТА ST НА ЭКГ ТИПИЧНА ДЛЯ

☐ приступа стенокардии напряжения

Блок: Блок 21 | № 2075

**2075. ДОСТОВЕРНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПЕРФОРАЦИИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

☐ свободный газ в брюшной полости

Блок: Блок 21 | № 2076

**2076. ДЛЯ СТРАТИФИКАЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ШКАЛА**

☐ SCORE

Блок: Блок 21 | № 2077

2077. ВОЗНИКНОВЕНИЕ БРОНХОСПАЗМА ВОЗМОЖНО НА ФОНЕ ПРИЁМА

☐ ацетилсалициловой кислоты

Блок: Блок 21 | № 2078

**2078. ЧРЕСПИЩЕВОДНУЮ ЭХОКГ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВНУТРИСЕРДЕЧНОГО
ТРОМБОЗА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПАРОКСИЗМА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ (В ЧАСАХ)**

☐ более 48

Блок: Блок 21 | № 2079

2079. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДА РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

☐ бюро медико-социальной экспертизы

Блок: Блок 21 | № 2080

**2080. ХОБЛ ТЯЖЁЛОГО И КРАЙНЕ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ С ВЫРАЖЕННЫМИ СИМПТОМАМИ,
ЧАСТЫМИ ОБОСТРЕНИЯМИ, С ГОСПИТАЛИЗАЦИЯМИ СООТВЕТСТВУЕТ ГРУППЕ**

☐ E

Блок: Блок 21 | № 2081

2081. К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА У БОЛЬНОГО ОСТРЫМ ТОНЗИЛЛИТОМ С АЛЛЕРГИЕЙ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА НА ПЕНИЦИЛЛИН В АНАМНЕЗЕ ОТНОСЯТСЯ

☐ макролиды

Блок: Блок 21 | № 2082

2082. ВОЗНИКНОВЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПОСЛЕ 55 ЛЕТ, ВЫСЛУШИВАНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОГО ШУМА В ОКОЛОПУПЧОНОЙ ОБЛАСТИ УКАЗЫВАЮТ НА ВОЗМОЖНОСТЬ

☐ реноваскулярной гипертензии

Блок: Блок 21 | № 2083

2083. ОСЛОЖНЕНИЕМ ХОБЛ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ абсцесс легкого

Блок: Блок 21 | № 2084

2084. УРОВНЕМ ТРИГЛИЦЕРИДОВ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ (ММОЛЬ/Л)

☐ 1,7

Блок: Блок 21 | № 2085

2085. К ОСЛОЖНЕНИЯМ ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ ДИФТЕРИИ ОТНОСИТСЯ

☐ миокардит

Блок: Блок 21 | № 2086

2086. В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСТЕОАРТРОЗА ВЕДУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

☐ нарушение структуры и функции гиалинового хряща

Блок: Блок 21 | № 2087

2087. К СИМПТОМАМ ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ ОТНОСЯТ

☐ экзофтальм и глазодвигательные нарушения

Блок: Блок 21 | № 2088

2088. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПАРАМЕТРОМ ОЧАГОВОЙ ТЕНИ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗМЕРЫ ДО (ММ)

☐ 10

Блок: Блок 21 | № 2089

2089. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ТУБЕРКУЛЁЗ ЛЁГКИХ У ВЗРОСЛЫХ ЛОКАЛИЗУЕТСЯ В СЕГМЕНТАХ

☐ 1, 2 и 6

Блок: Блок 21 | № 2090

2090. СОЧЕТАНИЕ АНЕМИИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ хронической болезни почек

Блок: Блок 21 | № 2091

2091. АСИСТОЛИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ ТРЕБУЕТ

☐ закрытого массажа сердца

Блок: Блок 21 | № 2092

2092. ПРИЗНАКОМ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОГО ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ недостаточность кровообращения по большому кругу

Блок: Блок 21 | № 2093

2093. НАЛИЧИЕ КИШЕЧНОЙ МЕТАПЛАЗИИ В ОБЛАСТИ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПИЩЕВОДА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ пищевода Баррета

Блок: Блок 21 | № 2094

2094. САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ ____ СТЕПЕНИ

☐ II

Блок: Блок 21 | № 2095

2095. У БОЛЬНОЙ 46 ЛЕТ НОЧЬЮ РАЗВИВАЮТСЯ ПРИСТУПЫ ЗАГРУДИННЫХ БОЛЕЙ, ВО ВРЕМЯ КОТОРЫХ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ПРЕХОДЯЩИЙ ПОДЪЁМ СЕГМЕНТА ST, ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ вариантной стенокардии

Блок: Блок 21 | № 2096

2096. ДЛЯ ПЕРЕДНЕ-БОКОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОСТРОГО ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНО ПОЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭКГ В ОТВЕДЕНИЯХ

☐ I, II, aVL

Блок: Блок 21 | № 2097

2097. НАУЧНОЙ ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЦЕПЦИЯ

☐ факторов риска

Блок: Блок 21 | № 2098

2098. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ШИГЕЛЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ колитический

Блок: Блок 21 | № 2099

2099. ПРИ ХОЛЕРЕ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДЯТ ЗАБОР

☐ испражнений, рвотных масс

Блок: Блок 21 | № 2100

2100. ПОД ПРОБОЙ НЕЧИПОРЕНКО ПОНИМАЮТ

☐ подсчет количества форменных элементов в единице объема мочи

Блок 22

Блок: Блок 22 | № 2101

2101. К ГРУППЕ ГЕМОГЛОБИНОПАТИЙ ОТНОСИТСЯ АНЕМИЯ

☐ серповидно-клеточная

Блок: Блок 22 | № 2102

2102. УХУДШЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИИ ВЫЗЫВАЕТ

☐ ячмень

Блок: Блок 22 | № 2103

2103. ОРАЛЬНЫЙ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ НА 24-28 НЕДЕЛЯХ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОВОДИТСЯ

☐ всем беременным при отсутствии ранее выявленных нарушений углеводного обмена и противопоказаний

Блок: Блок 22 | № 2104

2104. ДЛЯ БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ ХАРАКТЕРЕН _____ ТИП КРОВОТОЧИВОСТИ

☐ гематомный

Блок: Блок 22 | № 2105

2105. ПРИ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЗАСТОЙ КРОВИ РАЗВИВАЕТСЯ В

☐ малом круге кровообращения

Блок: Блок 22 | № 2106

2106. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОГО МЕТОДА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СВЕТОВОГО МИКРОСКОПА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ МИКОБАКТЕРИЙ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ (МИКРОБНЫХ ТЕЛ В 1 МЛ)

☐ 10 000

Блок: Блок 22 | № 2107

2107. СИБИРЕЯЗВЕННЫЙ КАРБУНКУЛ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ безболезненностью и выраженной отёчностью тканей по периферии

Блок: Блок 22 | № 2108

2108. К ПРЕПАРАТАМ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ОТНОСИТСЯ

☐ Гликлазид

Блок: Блок 22 | № 2109

2109. ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ПО ПАНЧЕНКОВУ РАВНОЕ 2 ММ В ЧАС ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нормальным для мужчин и женщин

Блок: Блок 22 | № 2110

2110. ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОДОЗРЕНИЕ НА

☐ инфекционный эндокардит

Блок: Блок 22 | № 2111

2111. ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА БОКОВОЙ СТЕНКИ ЛЖ ХАРАКТЕРЕН ПОДЪЕМ СЕГМЕНТА ST В ОТВЕДЕНИЯХ:

☐ I, aVL, V5-V6

Блок: Блок 22 | № 2112

2112. ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ БЛАНКА ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СТРОКЕ «ПРИЧИНА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ» ОТПУСК ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ В ПЕРВЫХ ДВУХ КЛЕТКАХ УКАЗЫВАЕТСЯ ДВУЗНАЧНЫЙ КОД

☐ 05

Блок: Блок 22 | № 2113

2113. ПРЕПАРАТОМ, МАСКИРУЮЩИМ СИМПТОМЫ ГИПОГЛИКЕМИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ биспролол

Блок: Блок 22 | № 2114

2114. ОБЪЕКТИВНЫМ СИМПТОМОМ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМ

☐ Менделя

Блок: Блок 22 | № 2115

2115. ПРЕПАРАТОМ ГРУППЫ ГЛЮКОНАТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тотема

Блок: Блок 22 | № 2116

2116. МЕТОДОМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ МАЛЯРИИ В МАТЕРИАЛЕ ОТ БОЛЬНОГО ЯВЛЯЕТСЯ

☐ микроскопический

Блок: Блок 22 | № 2117

2117. АБДОМИНАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ У ЖЕНЩИН БЕЛОЙ РАСЫ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИ ОКРУЖНОСТИ ТАЛИИ БОЛЕЕ (ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ В СМ)

☐ 92

Блок: Блок 22 | № 2118

2118. ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИУРЕТИКОВ У БОЛЬНЫХ С ОТЕЧНО-АСЦИТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ОЦЕНКА

☐ суточного диуреза

Блок: Блок 22 | № 2119

2119. ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ длительное применение антибиотиков

Блок: Блок 22 | № 2120

2120. ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ _____ ПОДХОД

☐ системный управленческий

Блок: Блок 22 | № 2121

2121. НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИУРЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение массы тела

Блок: Блок 22 | № 2122

2122. ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стимуляция секреции инсулина

Блок: Блок 22 | № 2123

2123. ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ НАЗНАЧАЮТ В СУТОЧНОЙ ДОЗЕ (МГ)

☐ 75-100

Блок: Блок 22 | № 2124

2124. К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ ГРАНУЛЕМАТОЗА С ПОЛИАНГИИТОМ ОТНОСЯТ

☐ ринит, фарингит

Блок: Блок 22 | № 2125

2125. ДЛЯ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ, МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ БЕЗ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ

☐ амоксициллин

Блок: Блок 22 | № 2126

2126. ТЕРАПИЯ ИНГИБИТОРОМ АЛЬФА-1-ПРОТЕИНАЗЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

☐ эмфиземе легких

Блок: Блок 22 | № 2127

2127. У ЗДОРОВЫХ ЛИЦ УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ (ММОЛЬ/Л)

☐ 5,0

Блок: Блок 22 | № 2128

2128. ЛИХОРАДКА, МИАЛГИИ, ГИПЕРЭОЗИНОФИЛИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ трихинеллеза

Блок: Блок 22 | № 2129

2129. ДЛЯ КАРДИОГЕННОГО ОТЕКА ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНЫ ХРИПЫ

☐ влажные мелкопузырчатые

Блок: Блок 22 | № 2130

2130. НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫМ ПРЕПАРАТОМ ПРИ ПНЕВМОЦИСТНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Ко-тримазол

Блок: Блок 22 | № 2131

2131. РАЦИОНАЛЬНОЙ ТАКТИКОЙ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА УЧАСТКОВОГО ПРИ ПРИСТУПЕ ЖЕЛЧНОЙ КОЛИКИ У БОЛЬНЫХ ЖББ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ госпитализация в хирургическое отделение по экстренным показаниям

Блок: Блок 22 | № 2132

2132. АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТАМ С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ НАЗНАЧАЕТСЯ В СЛУЧАЕ

☐ увеличения объема и степени гнойности мокроты

Блок: Блок 22 | № 2133

2133. К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ ИЕРСИНИОЗА, ОТНОСЯТ

☐ аминогликозиды

Блок: Блок 22 | № 2134

2134. ПРИ СОЧЕТАНИИ ТЕОФИЛЛИНА С ЦИПРОФЛОКСАЦИНОМ КОНЦЕНТРАЦИЯ ТЕОФИЛЛИНА В КРОВИ

☐ повышается кратно

Блок: Блок 22 | № 2135

2135. ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ИМЕЮТ ПАЦИЕНТЫ С

☐ орфанными заболеваниями

Блок: Блок 22 | № 2136

2136. «БОЛЬШИМИ» КРИТЕРИЯМИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ревмокардит, полиартрит, малая хорея, кольцевидная эритема

Блок: Блок 22 | № 2137

2137. IIБ ТИП ГИПЕРЛИПИДЕМИИ ПО КЛАССИФИКАЦИИ ВОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕМ В ПЛАЗМЕ КРОВИ

☐ липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП)

Блок: Блок 22 | № 2138

2138. У «ВНУТРИВЕННЫХ» НАРКОМАНОВ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ ЧАЩЕ ДРУГИХ ПОРАЖАЕТСЯ КЛАПАН

☐ трехстворчатый

Блок: Блок 22 | № 2139

2139. ПРОТИВОГРИБКОВЫМ СРЕДСТВОМ, ИНГИБИРУЮЩИМ ИЗОФЕРМЕНТ СУР2С9, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ флуконазол

Блок: Блок 22 | № 2140

2140. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ ПОКАЗАН

☐ Кордарон

Блок: Блок 22 | № 2141

2141. НАРУШЕНИЕ КАНАЛЬЦЕВОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ПРИ УДЕЛЬНОМ ВЕСЕ МОЧИ В ПРОБЕ ПО ЗИМНИЦКОМУ 1012-1010 СООТВЕТСТВУЕТ

☐ изостенурии

Блок: Блок 22 | № 2142

2142. ПОД ТЕРМИНОМ «ДЫХАТЕЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» ПРИНЯТО ПОНИМАТЬ НАРУШЕНИЕ

☐ вентиляции, транспорта и утилизации кислорода в легких

Блок: Блок 22 | № 2143

2143. УСИЛЕННАЯ ПУЛЬСАЦИЯ ВО II МЕЖРЕБЕРЬЕ СПРАВА ОТ ГРУДИНЫ ЧАЩЕ ВСЕГО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

☐ расширении восходящей части аорты

Блок: Блок 22 | № 2144

2144. ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ АНЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐

Блок: Блок 22 | № 2145

2145. БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ мозговой натрийуретический пептид

Блок: Блок 22 | № 2146

2146. ГЕМОЛИТИЧЕСКУЮ АНЕМИЮ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

☐ метилдопа

Блок: Блок 22 | № 2147

2147. ДЛЯ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМического ГИПОГОНАДИЗМА ХАРАКТЕРНА

☐ галакторея

Блок: Блок 22 | № 2148

2148. ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЯЗВЫ В ЛУКОВИЦЕ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ХАРАКТЕРНА БОЛЬ

☐ в эпигастрии, возникающая натощак и через 2-3 часа после еды

Блок: Блок 22 | № 2149

2149. ДИАГНОЗ «ГЛЮТЕНОВАЯ ЭНТЕРОПАТИЯ (ЦЕЛИАКИЯ)» ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕМ

☐ антител к тканевой трансглутаминазе в крови

Блок: Блок 22 | № 2150

2150. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ НАДЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ ПОКАЗАН

☐ верапамил

Блок: Блок 22 | № 2151

2151. АЛЬФА-БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ карведилол

Блок: Блок 22 | № 2152

2152. ДЛЯ НЕПРОЛИФЕРАТИВНОЙ СТАДИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ ХАРАКТЕРНО

☐ наличие микроаневризм

Блок: Блок 22 | № 2153

2153. ГЕНЕРАЛИЗОВАННУЮ ФОРМУ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ОТ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ОТЛИЧАЕТ НАЛИЧИЕ

☐ гепатоспленомегалии

Блок: Блок 22 | № 2154

2154. ИНГИБИТОРОМ ПРОТЕАЗЫ NS3/4A ВИРУСА ГЕПАТИТА С ЯВЛЯЕТСЯ

☐ асунапревир

Блок: Блок 22 | № 2155

2155. ВРАЧЕБНОЙ ТАКТИКОЙ ПРИ ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШЕЙ СТЕНОКАРДИИ III ФК ЯВЛЯЕТСЯ

☐ экстренная госпитализация

Блок: Блок 22 | № 2156

2156. ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ЖИЗНИ БЕРЕМЕННОЙ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ КАТЕГОРИИ D ПО КЛАССИФИКАЦИИ FDA

☐ амикацин

Блок: Блок 22 | № 2157

2157. ВОЗМОЖНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ В2-АГОНИСТОВ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ тахикардия, нарушения ритма

Блок: Блок 22 | № 2158

2158. К СИМПТОМАМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ КЛОНИДИНОМ (КЛОФЕЛИНОМ), ОТНОСЯТ

☐ гипотонию, брадикардию, миоз, угнетение сознания, гипотермию

Блок: Блок 22 | № 2159

2159. ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПОСТСТРЕПТОКОККОВОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА СЧИТАЮТ НАЛИЧИЕ

☐ бета-гемолитических стрептококков группы А

Блок: Блок 22 | № 2160

2160. АБСОЛЮТНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие признаков опухоли надпочечника и гиперпродукции катехоламинов

Блок: Блок 22 | № 2161

2161. НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛОЕ ТЕЧЕНИЕ СТЕНОКАРДИИ НАБЛЮДАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ С

☐ стенозом основного ствола левой коронарной артерии

Блок: Блок 22 | № 2162

2162. ДЛЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО

☐ повышение сердечного выброса

Блок: Блок 22 | № 2163

2163. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ПОЧЕЧНОЙ ТЕРАПИИ (ГЕМОДИАЛИЗ, ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ) У ПАЦИЕНТОВ С ТЕРМИНАЛЬНЫМ ПОЧЕЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ АНТИКОАГУЛЯНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гепарин

Блок: Блок 22 | № 2164

2164. К НАРУШЕНИЮ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЧАСТО ПРИВОДИТ ПРИЕМ

☐ амиодарона

Блок: Блок 22 | № 2165

2165. К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ АГРАНУЛОЦИТОЗА ОТНОСЯТ

☐ некротическую ангину

Блок: Блок 22 | № 2166

2166. К ПОКАЗАТЕЛЯМ СТАТИСТИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТНОСИТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

☐ нагрузки врача-терапевта на приеме в поликлинике

Блок: Блок 22 | № 2167

2167. ИНЦИДЕНТАЛОМОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ случайно выявленное образование

Блок: Блок 22 | № 2168

2168. ИЗМЕНЕНИЕМ В АНАЛИЗЕ МОЧИ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ II СТАДИИ ГИПЕРТЕНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ микроальбуминурия

Блок: Блок 22 | № 2169

2169. ВО ВРЕМЯ ФИБРОБРОНХОСКОПИИ МОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ

☐ центральный рак лёгкого

Блок: Блок 22 | № 2170

2170. ИНГИБИТОРЫ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В ЛЕЧЕНИИ

☐ болезни Крона

Блок: Блок 22 | № 2171

2171. У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ В ПОКОЕ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ (УД/МИН)

☐ 55-60

Блок: Блок 22 | № 2172

2172. ВАЖНЕЙШЕЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ КОМБИНАЦИЯ

☐ гипоальбуминемия и протеинурия более 3,5 г/сут

Блок: Блок 22 | № 2173

2173. ДИФFUЗНЫЕ, НЕСИММЕТРИЧНЫЕ, ДВУСТОРОННИЕ ЗАТЕМНЕНИЯ ЛЁГОЧНОЙ ТКАНИ (СИМПТОМ «СНЕЖНОЙ БУРИ») ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ респираторного дистресс-синдрома взрослых

Блок: Блок 22 | № 2174

2174. ДЛЯ ПИЕЛОНЕФРИТА, В ОТЛИЧИЕ ОТ ДРУГИХ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОЧЕК, ХАРАКТЕРНО

☐ наличие отёка и нейтрофильной инфильтрации почечной лоханки

Блок: Блок 22 | № 2175

2175. -ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИМИ МЕТОДИКАМИ- ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ИБС В ПРАКТИЧЕСКОЙ КАРДИОЛОГИИ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ

☐ стресс-эхокардиографию, мультиспиральную компьютерную томографию, перфузионную сцинтиграфию миокарда с нагрузкой

Блок: Блок 22 | № 2176

2176. ФЕОХРОМОЦИТОМА ЯВЛЯЕТСЯ ОПУХОЛЬЮ

☐ мозгового слоя надпочечников с гиперпродукцией катехоламинов

Блок: Блок 22 | № 2177

2177. МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕЙРООСТЕОАРТРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ разгрузка пораженной конечности

Блок: Блок 22 | № 2178

2178. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫМ И ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тест с 6-минутной ходьбой

Блок: Блок 22 | № 2179

2179. НАГРУЗОЧНАЯ ДОЗА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СОСТАВЛЯЕТ (В МГ)

☐ 250-300

Блок: Блок 22 | № 2180

2180. ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ АГРЕССИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ соляная кислота

Блок: Блок 22 | № 2181

2181. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ спирометрия

Блок: Блок 22 | № 2182

2182. ПОД АНТРОПОМЕТРИЕЙ ПОНИМАЮТ

☐ измерение роста и массы тела

Блок: Блок 22 | № 2183

2183. СИНДРОМ ОТМЕНЫ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

☐ глюкокортикостероидов

Блок: Блок 22 | № 2184

2184. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ БОЛЬНЫЕ С ЖАЛОБАМИ НА

☐ кашель с мокротой, потливость, потерю массы тела

Блок: Блок 22 | № 2185

2185. РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕЖДУ ИБС И ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ ИМЕЕТ

☐ коронарография

Блок: Блок 22 | № 2186

2186. ПРОКОЛ ПРИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

☐ по верхнему краю ребра

Блок: Блок 22 | № 2187

2187. ВТОРИЧНЫЙ ГИПОТИРЕОЗ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

☐ поражения гипофиза

Блок: Блок 22 | № 2188

2188. РИСК ПОВТОРНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И СМЕРТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СНИЖАЕТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

☐ ингибиторов АПФ и В-адреноблокаторов

Блок: Блок 22 | № 2189

2189. К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ ТЕРАПИИ СТАТИНАМИ ОТНОСЯТ

☐ миопатии

Блок: Блок 22 | № 2190

2190. ТУБЕРКУЛЕМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ клинической формой туберкулёза лёгких

Блок: Блок 22 | № 2191

2191. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ МИОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эндомиокардиальная биопсия

Блок: Блок 22 | № 2192

2192. ДЛЯ КРУПНООЧАГОВОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ подъем сегмента ST

Блок: Блок 22 | № 2193

2193. ПОКАЗАТЕЛЬ «ЧИСЛО ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК» ОТНОСИТСЯ К ТИПУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

☐ качественному

Блок: Блок 22 | № 2194

2194. ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ ОЗНАЧАЕТ

☐ подход, позволяющий облегчить страдания больного и улучшить качество жизни пациентов и их семей в терминальной стадии заболеваний

Блок: Блок 22 | № 2195

2195. ДЛЯ САЛЬМОНЕЛЛЁЗА ХАРАКТЕРЕН СТУЛ

☐ обильный, водянистый, зеленоватого цвета

Блок: Блок 22 | № 2196

2196. ХАРАКТЕРНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ В ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛАХ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ эпителиоидные клетки, лимфоциты, макрофаги, плазматические клетки, фибробласты

Блок: Блок 22 | № 2197

2197. МАТЕРИАЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ПРИ АСПИРАЦИОННОЙ КАТЕТЕРИЗАЦИОННОЙ БИОПСИИ, ПОДЛЕЖИТ ИССЛЕДОВАНИЮ

☐ цитологическому и бактериологическому

Блок: Блок 22 | № 2198

2198. В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО ФИБРОЗА ПРЕОБЛАДАЕТ

☐ прогрессирующая одышка

Блок: Блок 22 | № 2199

2199. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПУТЕЙ ПРОНИКНОВЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ В ОРГАНИЗМ ЧАЩЕ ПОРАЖАЮТСЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

☐ органы дыхания

Блок: Блок 22 | № 2200

2200. ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В ТЕРАПИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ПРИДАЕТСЯ

☐ ингибиторам протонной помпы

Блок 23

Блок: Блок 23 | № 2201

2201. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДИУРЕТИКОВ БОЛЬНОМУ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ХСН IIA-III стадии при наличии застойных явлений

Блок: Блок 23 | № 2202

2202. ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЦИРКУЛИРУЮЩЕГО СТОЛБНЯЧНОГО ЭКЗОТОКСИНА ПРОВОДЯТ

☐ специфическую детоксикацию

Блок: Блок 23 | № 2203

2203. ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ высокое АД

Блок: Блок 23 | № 2204

2204. АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ СПОСОБСТВУЕТ

☐ снижению частоты рецидивов

Блок: Блок 23 | № 2205

2205. ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ПОВРЕЖДАЮТСЯ

☐ капилляры клубочков

Блок: Блок 23 | № 2206

2206. БОЛЬНЫМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ БРАДИКАРДИИ ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ дигидропиридиновых антагонистов кальция

Блок: Блок 23 | № 2207

2207. У ЖЕНЩИНЫ 50 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, В ТЕЧЕНИЕ 3 МЕСЯЦЕВ ПОЯВИЛИСЬ ПЕРШЕНИЕ В ГОРЛЕ И СУХОЙ КАШЕЛЬ, НЕ ПОДДАЮЩИЕСЯ ТЕРАПИИ ОТХАРКИВАЮЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ И АНТИБИОТИКАМИ, (НЕ КУРИТ, АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЙ АНАМНЕЗ НЕ ОТЯГОЩЕН, НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ИЗМЕНЕНИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО). НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ КАШЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ

☐ ингибиторов АПФ

Блок: Блок 23 | № 2208

2208. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА, ОТДЕЛЯЮЩЕЕСЯ У ЧЕЛОВЕКА ПРИ ОБЫЧНОМ ПИЩЕВОМ РЕЖИМЕ, СОСТАВЛЯЕТ (В Л)

☐ 1,5-2

Блок: Блок 23 | № 2209

2209. ОДНИМ ИЗ КРИТЕРИЕВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ УРОВНЯ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ потребность в препарате для купирования симптомов

Блок: Блок 23 | № 2210

2210. САМЫМИ ЧАСТЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ИНФЕКЦИОННЫХ МИОКАРДИТОВ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ вирусы

Блок: Блок 23 | № 2211

2211. КЛИНИКА ЛАРИНГИТА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ парагриппа

Блок: Блок 23 | № 2212

2212. К ГОРМОНАМ ГИПОТАЛАМУСА ОТНОСЯТСЯ

☐ тиреолиберин, соматостатин

Блок: Блок 23 | № 2213

2213. УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСТНАГРУЗКИ НА ЗДОРОВЫЙ МИОКАРД ВЕДЕТ К

☐ компенсаторной гипертрофии миокарда

Блок: Блок 23 | № 2214

2214. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОСУМКОВАННЫЙ ПЛЕВРИТ ПЕРЕД ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПУНКЦИЕЙ НУЖНО ПРОВЕСТИ

☐ УЗИ

Блок: Блок 23 | № 2215

2215. ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ ВО ВТОРОМ МЕЖРЕБЕРЬЕ СПРАВА ОТ ГРУДИНЫ И В ТОЧКЕ БОТКИНА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КЛАПАНА

☐ аорты

Блок: Блок 23 | № 2216

2216. ПРИЧИНОЙ ТОТАЛЬНОГО ЗАТЕМНЕНИЯ ЛЕГОЧНОГО ПОЛЯ СО СМЕЩЕНИЕМ ОРГАНОВ СРЕДОСТЕНИЯ В СТОРОНУ ЗАТЕМНЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ

☐ ателектаз легкого

Блок: Блок 23 | № 2217

2217. БОЛЬНОЙ ВЫДЕЛЯЕТ МОКРОТУ ПО УТРАМ ПОЛНЫМ РТОМ ПРИ

☐ бронхоэктатической болезни

Блок: Блок 23 | № 2218

2218. ПРИ ПЕНЕТРАЦИИ ЯЗВЫ В ПОДЖЕЛУДОЧНУЮ ЖЕЛЕЗУ В КРОВИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ

☐ амилазы

Блок: Блок 23 | № 2219

2219. ЛЕЧЕНИЕ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С ПРИМЕНЕНИЯ МЕТРОНИДАЗОЛА

☐ перорально

Блок: Блок 23 | № 2220

2220. ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бронхоспазм

Блок: Блок 23 | № 2221

2221. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ УРСОДЕЗОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ С ЛИТОЛИТИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ ПОКАЗАНО ПРИ

☐ рентгенонегативных (холестериновых) камнях

Блок: Блок 23 | № 2222

2222. БОЛЬНЫЕ В РЕМИССИИ ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА ДОЛЖНЫ

☐ иметь нормальный режим труда и отдыха

Блок: Блок 23 | № 2223

2223. КРОВАРКАНЬЕ И ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ

☐ абсцессе легкого

Блок: Блок 23 | № 2224

2224. ПОКАЗАТЕЛЕМ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ОФВ1

Блок: Блок 23 | № 2225

2225. БОЛЬНОГО, ПЕРЕНЕСШЕГО ГРИПП, СЛЕДУЕТ ВЫПИСАТЬ К ТРУДУ

☐ через 3 дня после нормализации температуры и исчезновения клинических проявлений гриппа

Блок: Блок 23 | № 2226

2226. УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПОЧКИ, ДЕФОРМАЦИЯ ЛОХАНОЧНО-ЧАШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ, НЕРОВНЫЕ КОНТУРЫ МАЛЫХ ЧАШЕК, ОБЛИТЕРАЦИЯ МЕЛКИХ СОСУДОВ КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧКИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ сморщенной почки

Блок: Блок 23 | № 2227

2227. К ИНГИБИТОРАМ ДИПЕПТИДИЛПЕПТИДАЗЫ-4 ОТНОСИТСЯ

☐ алоглиптин

Блок: Блок 23 | № 2228

2228. СИСТЕМНЫЙ КАПИЛЛЯРИТ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АЛЬВЕОЛ ЛЕГКИХ И БАЗАЛЬНЫХ МЕМБРАН ГЛОМЕРУЛЯРНОГО АППАРАТА ПОЧЕК ИМЕЕТ МЕСТО ПРИ

☐ синдроме Гудпасчера

Блок: Блок 23 | № 2229

2229. К ВАЖНЕЙШЕМУ ИСТОЧНИКУ ИЗУЧЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ, СОСТАВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСЯТ

☐ перепись населения

Блок: Блок 23 | № 2230

2230. ЧАСТОТА ОСМОТРА БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ ПРИ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 2-4 раза в год и чаще в зависимости от тяжести заболевания

Блок: Блок 23 | № 2231

2231. У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ, ВОЗРАСТАЕТ ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПНЕВМОНИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ

☐ клебсиеллой

Блок: Блок 23 | № 2232

2232. ИЗ-ЗА РИСКА УВЕЛИЧЕНИЯ ГИПЕРУРИКЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОДАГРОЙ НЕ РЕКОМЕНДОВАНО ПРИМЕНЯТЬ

☐ ацетилсалициловую кислоту

Блок: Блок 23 | № 2233

2233. ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ГИНЕКОМАСТИЮ И ГИРСУТИЗМ СПОСОБЕН ВЫЗВАТЬ ДИУРЕТИК

☐ спиронолактон

Блок: Блок 23 | № 2234

2234. К ГИПОГЛИКЕМИИ НЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

☐ незапланированный дополнительный прием пищи

Блок: Блок 23 | № 2235

2235. ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ПОДПЕЧЁНОЧНОЙ (МЕХАНИЧЕСКОЙ) ЖЕЛТУХИ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

☐ магнитнорезонансная холангиография

Блок: Блок 23 | № 2236

2236. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ПОЛИАРТРИТА С ПОРАЖЕНИЕМ ДИСТАЛЬНЫХ МЕЖФАЛАНГОВЫХ СУСТАВОВ КИСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ псориатическая артропатия

Блок: Блок 23 | № 2237

2237. НЕФРОТИЧЕСКУЮ АЛЬБУМИНУРИЮ ОТРАЖАЕТ ГРАДАЦИЯ ____, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ СУТОЧНОЙ ПРОТЕИНУРИИ (В ГРАММАХ)

☐ A4; $\geq 3,5$

Блок: Блок 23 | № 2238

2238. НЕОБХОДИМО ЭКСТРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С

☐ расслаивающей аневризмой аорты

Блок: Блок 23 | № 2239

2239. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТАХИКАРДИИ С ШИРОКИМИ РИТМИЧНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ QRS И СТАБИЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Амиодарон

Блок: Блок 23 | № 2240

2240. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ГРИППЕ В АНАЛИЗЕ КРОВИ ИМЕЕТ МЕСТО

☐ лейкопения, относительный лимфоцитоз

Блок: Блок 23 | № 2241

2241. УВЕЛИЧЕНИЕ СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬФА-ФЕТОПРОТЕИНА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ гепатоцеллюлярного рака

Блок: Блок 23 | № 2242

2242. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СУБСТРАТ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ ПРЕДСТАВЛЕН

☐ плазмócитами

Блок: Блок 23 | № 2243

2243. ЦЕЛЬЮ ПЛАЗМАФЕРЕЗА ПРИ СКВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ удаление циркулирующих иммунных комплексов

Блок: Блок 23 | № 2244

2244. ЭРАДИКАЦИЯ H. PYLORI КАК МЕРА ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ НПВП-ГАСТРОПАТИИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНА И БЕЗОПАСНА

☐ в пределах полугода от начала терапии НПВП

Блок: Блок 23 | № 2245

2245. БАЗОВАЯ ПРОГРАММА ОМС

☐ является частью программы государственных гарантий

Блок: Блок 23 | № 2246

2246. ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ СТЕНТА БЕЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПОКРЫТИЯ ДВОЙНАЯ АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ ТЕРАПИЯ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ КАК МИНИМУМ В ТЕЧЕНИЕ (МЕС.)

☐ 12

Блок: Блок 23 | № 2247

2247. НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА КРОВИ У БОЛЬНЫХ БЕЗ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЬШЕ (ММОЛЬ/Л)

☐ 5

Блок: Блок 23 | № 2248

2248. ПРИ ОПУХОЛЕВЫХ МЕТАСТАТИЧЕСКИХ ВЫПОТАХ ПЛЕВРАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ ЧАЩЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

☐ экссудат

Блок: Блок 23 | № 2249

2249. ОБЪЕМ ВЫБОРОЧНОЙ СОВОКУПНОСТИ ЗАВИСИТ ОТ

- ☐ величины предельной ошибки и степени однородности изучаемого явления

Блок: Блок 23 | № 2250

2250. НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ УСИЛИВАЮТ ДЕЙСТВИЕ

- ☐ варфарина

Блок: Блок 23 | № 2251

2251. РЕАКЦИИ НА ТУБЕРКУЛИН РАЗВИВАЮТСЯ ЧЕРЕЗ (ЧАС)

- ☐ 48-72

Блок: Блок 23 | № 2252

2252. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ АНАЛИЗ

- ☐ суточной мочи на метанефрин и норметанефрин

Блок: Блок 23 | № 2253

2253. ФАКТОРОМ, КОТОРЫЙ МЕШАЕТ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАГРУЗОЧНЫХ ПРОБ, ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ полная блокада левой ножки

Блок: Блок 23 | № 2254

2254. МОКРОТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ КАТАРАЛЬНОМ БРОНХИТЕ БЫВАЕТ

- ☐ слизистой

Блок: Блок 23 | № 2255

2255. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА В ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ

- ☐ кровохарканье и легочное кровотечение

Блок: Блок 23 | № 2256

2256. К ЗАБОЛЕВАНИЯМ ЖЕЛУДКА СО СНИЖЕННОЙ КИСЛОТООБРАЗУЮЩЕЙ ФУНКЦИЕЙ ОТНОСЯТ

- ☐ аутоиммунный гастрит

Блок: Блок 23 | № 2257

2257. ДЛЯ КОНТРОЛЯ СИНТЕЗА МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ПОДАГРЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

- ☐ Аллопуринол

Блок: Блок 23 | № 2258

2258. ДЛЯ ПЛЕНЧАТОЙ ФОРМЫ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ХАРАКТЕРНЫ НАЛЕТЫ

- ☐ не выходящие за пределы небных миндалин

Блок: Блок 23 | № 2259

2259. ДЛЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ГРИППА НАЗНАЧАЮТ

- ☐ осельтамивир

Блок: Блок 23 | № 2260

2260. ПАТОГНОМОНИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРИ ДЕРМАТОМИОЗИТЕ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

☐ параорбитальный отек

Блок: Блок 23 | № 2261

2261. РАК ЛЁГКОГО ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ С

☐ хроническим неспецифическим заболеванием лёгких

Блок: Блок 23 | № 2262

2262. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гипохромия

Блок: Блок 23 | № 2263

2263. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ДЕРМАТОМИОЗИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ резкая мышечная слабость

Блок: Блок 23 | № 2264

2264. К ОСНОВНЫМ СИНДРОМАМ ПРИ ГРИППЕ ОТНОСЯТ

☐ респираторный и интоксикационный

Блок: Блок 23 | № 2265

2265. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ С ПРОТЕИНУРИЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫ

☐ ингибиторы АПФ или сартаны

Блок: Блок 23 | № 2266

2266. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА, СЧИТАЮТСЯ

☐ бета-адреноблокаторы

Блок: Блок 23 | № 2267

2267. НАИБОЛЬШУЮ РОЛЬ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ И КЛИНИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЧЕЛОВЕКА ИГРАЮТ

☐ микобактерии человеческого типа

Блок: Блок 23 | № 2268

2268. К ПОКАЗАТЕЛЯМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ, ОТНОСЯТ

☐ прибыль

Блок: Блок 23 | № 2269

2269. РИСК РАЗВИТИЯ ГИПОГЛИКЕМИИ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИЕМЕ ГЛИБЕНКЛАМИДА С

☐ флуконазолом

Блок: Блок 23 | № 2270

2270. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ *Streptococcus pneumoniae*

Блок: Блок 23 | № 2271

2271. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ПРОВОДИТСЯ

☐ анализ мочи по Зимницкому

Блок: Блок 23 | № 2272

2272. ХАРАКТЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ I ПОКОЛЕНИЯ (ПРОМЕТАЗИН, ХЛОРОПИРАМИН) ЯВЛЯЕТСЯ

☐ обратимое связывание с H1-гистаминовыми рецепторами; местноанестезирующее, седативное, атропиноподобное и проаритмическое действие

Блок: Блок 23 | № 2273

2273. РАННИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПИЩЕВОГО БОТУЛИЗМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ двоение в глазах

Блок: Блок 23 | № 2274

2274. КАРДИОВЕРСИЮ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ МОЖНО ПРОВОДИТЬ ПРИ ПАРОКСИЗМЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ (ЧАС)

☐ 48

Блок: Блок 23 | № 2275

2275. ЗАСТРАХОВАННОМУ В СИСТЕМЕ ОМС ВЫДАЕТСЯ

☐ страховой медицинский полис

Блок: Блок 23 | № 2276

2276. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ВЫЯВИТЬ МИКРОБНОГО ВОЗБУДИТЕЛЯ В ФЕКАЛИЯХ БОЛЬНОГО, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бактериологический

Блок: Блок 23 | № 2277

2277. ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА КРОВИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА РАНЬШЕ ВСЕГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ

☐ количества ретикулоцитов

Блок: Блок 23 | № 2278

2278. ЗАГРУДИННАЯ БОЛЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ БЫСТРОЙ ХОДЬБЕ ИЛИ ПОДЪЕМЕ ПО ЛЕСТНИЦЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА ОДИН ПРОЛЕТ, ХАРАКТЕРНА ДЛЯ _____ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ

☐ II

Блок: Блок 23 | № 2279

2279. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕФИЦИТА ЙОДА В РЕГИОНЕ ИССЛЕДУЮТ

☐ экскрецию йода с мочой в группе риска

Блок: Блок 23 | № 2280

2280. УЧЕТНЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТА, СОСТОЯЩЕГО ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ контрольная карта диспансерного наблюдения

Блок: Блок 23 | № 2281

2281. ФИБРОЗНО-СКЛЕРОТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ (ЛЕГКИХ, СЕРДЦА, ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА, ПОЧЕК), ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ МЕЛКИХ СОСУДОВ В ФОРМЕ СИНДРОМА РЕЙНО ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЯМИ

☐ системной склеродермии

Блок: Блок 23 | № 2282

2282. ДИАГНОЗ «ИНЦИДЕНТАЛОМА» ЯВЛЯЕТСЯ

☐ предварительным

Блок: Блок 23 | № 2283

2283. ЗАСТРАХОВАННОМУ В СИСТЕМЕ ОМС ВЫДАЕТСЯ

☐ страховой медицинский полис

Блок: Блок 23 | № 2284

2284. К ПЕРВИЧНЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФОРМАЦИИ О ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСЯТ

☐ перепись населения

Блок: Блок 23 | № 2285

2285. ПРИ ГИПЕРАЦИДНОМ ГАСТРИТЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ВОДАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ гидрокарбонатные

Блок: Блок 23 | № 2286

2286. К СИМПТОМАМ ИНТОКСИКАЦИИ СЕРДЕЧНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ НЕ ОТНОСИТСЯ

☐ полиурия

Блок: Блок 23 | № 2287

2287. ЭКССУДАТ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ЛИМФОЦИТОВ И НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ МЕЗОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛУЧЕН ИЗ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ

☐ туберкулезном плеврите

Блок: Блок 23 | № 2288

2288. К БИГУАНИДАМ ОТНОСИТСЯ

☐ метформин

Блок: Блок 23 | № 2289

2289. ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ НЕ ПОРАЖАЕТСЯ ПРИ

☐ псевдомембранозном колите

Блок: Блок 23 | № 2290

2290. К ВЕНОЗНЫМ ВАЗОДИЛАТАТОРАМ ОТНОСЯТСЯ

☐ моно- и динитраты

Блок: Блок 23 | № 2291

2291. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ОСТРОМ БРОНХИТЕ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 10

Блок: Блок 23 | № 2292

2292. ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПОМОЩИ

☐ специализированной

Блок: Блок 23 | № 2293

2293. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ БЕРОТЕК ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

☐ бета-2 агонистов короткого действия

Блок: Блок 23 | № 2294

2294. ОСЛАБЛЕНИЕ ГОЛОСОВОГО ДРОЖАНИЯ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ эмфиземе легких

Блок: Блок 23 | № 2295

2295. СИМПТОМ ИЗЖОГИ ВЫРАЖЕН ПРИ

☐ гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Блок: Блок 23 | № 2296

2296. ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кашель

Блок: Блок 23 | № 2297

2297. ПРИЗНАКОМ ЭКССУДАТА ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ отношение ЛДГ плевральной жидкости к ЛДГ крови более 0,6

Блок: Блок 23 | № 2298

2298. У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ОДЫШКА НОСИТ ХАРАКТЕР

☐ экспираторный

Блок: Блок 23 | № 2299

2299. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ

☐ альбуминурия/протеинурия

Блок: Блок 23 | № 2300

2300. ИСТОЧНИКОМ ХОРОШО УСВАИВАЕМОГО КАЛЬЦИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ молоко и молочные продукты

Блок 24

Блок: Блок 24 | № 2301

2301. УВЕЛИЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭОЗИНОФИЛОВ В КРОВИ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИ

☐ бронхиальной астме

Блок: Блок 24 | № 2302

2302. ОТБОР БОЛЬНЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ В СТАЦИОНАРЕ НА ДОМУ ПРОВОДИТСЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ

☐ врачей-терапевтов участковых и специалистов поликлиники

Блок: Блок 24 | № 2303

2303. БЕТА-ИНТЕРФЕРОНЫ ПОКАЗАНЫ ПРИ

☐ рассеянном склерозе

Блок: Блок 24 | № 2304

2304. ХАРАКТЕРНЫМИ СИМПТОМАМИ СТОЛБНЯКА ЯВЛЯЮТСЯ ТРИЗМ И

☐ тонические судороги конечностей, туловища, дисфагия

Блок: Блок 24 | № 2305

2305. ПОД ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОНИМАЮТ ГРУППУ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ИЛИ СИМПТОМОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПОДОЗРЕВАТЬ

☐ инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию

Блок: Блок 24 | № 2306

2306. ОСОБЕННОСТЬЮ ФАРМАКОКИНЕТИКИ У ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ уменьшение всасывания лекарственных средств (ЛС) в пищеварительном тракте

Блок: Блок 24 | № 2307

2307. ДВУСТОРОННЯЯ ПРИПУХЛОСТЬ В ОКОЛОУШНЫХ ОБЛАСТЯХ НА ФОНЕ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ УКАЗЫВАЕТ НА

☐ паротитную инфекцию

Блок: Блок 24 | № 2308

2308. К ГРУППЕ МИОРЕЛАКСАНТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

☐ тизанидин

Блок: Блок 24 | № 2309

2309. ПРИ ТРИХИНЕЛЛЕЗЕ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ИМЕЕТ МЕСТО

☐ эозинофилия

Блок: Блок 24 | № 2310

2310. ВТОРИЧНЫЙ ГИПОКОРТИЦИЗМ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ снижением адренокортикотропного гормона

Блок: Блок 24 | № 2311

2311. МОСТОВИДНЫЕ НЕКРОЗЫ ПЕЧЕНИ ВСТРЕЧАЮТСЯ ПРИ

☐ хроническом гепатите высокой активности

Блок: Блок 24 | № 2312

2312. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ОСТРОГО ПРИСТУПА ПОДАГРЫ НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ

☐ нестероидные противовоспалительные средства, колхицин, глюкокортикоиды

Блок: Блок 24 | № 2313

2313. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕГИОНЕЛЛЕЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ макролиды

Блок: Блок 24 | № 2314

2314. ТОКСИЧНОСТЬ КЛАРИТРОМИЦИНА ПОВЫШАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

☐ ритонавира

Блок: Блок 24 | № 2315

2315. ПРАВАЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ТУПОСТИ СЕРДЦА ОБРАЗОВАНА

☐ правым предсердием

Блок: Блок 24 | № 2316

2316. ГИСТОПЛАЗМОЗ ОТНОСИТСЯ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

☐ грибковым

Блок: Блок 24 | № 2317

2317. ОБСЛЕДОВАНИЕ НА ПРЕДМЕТ ПОЗДНИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПАЦИЕНТУ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ ____ ПОСЛЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ДИАГНОЗА

☐ сразу

Блок: Блок 24 | № 2318

2318. В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТУ, ПРИЕХАВШЕМУ ИЗ РОСТОВА В МОСКВУ И ОБРАТИВШЕМУ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ

☐ формируется (выдаётся) листок нетрудоспособности

Блок: Блок 24 | № 2319

2319. К НАСЛЕДСТВЕННЫМ ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ДИАТЕЗАМ ОТНОСИТСЯ

☐ Болезнь Виллебранда

Блок: Блок 24 | № 2320

2320. В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ЧАСТО ТРЕБУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГНОСТИКУ МЕЖДУ СТЕНОКАРДИЕЙ И

☐ хроническим колитом

Блок: Блок 24 | № 2321

2321. ИЗОЛИРОВАННАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ПОЖИЛЫХ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ ПРИ ПОКАЗАТЕЛЯХ САД ВЫШЕ (ММ РТ.СТ.)

☐ 140 и диастолическом АД менее 90

Блок: Блок 24 | № 2322

2322. ДЛЯ РАСЧЕТА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОРАЖЕННОСТИ НЕОБХОДИМЫ ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ СЛУЧАЕВ

☐ заболеваний, выявленных при медосмотре, и числе лиц, прошедших медосмотр

Блок: Блок 24 | № 2323

2323. СОГЛАСНО СПИРОМЕТРИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНО ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА _____ ОТ ДОЛЖНОГО

☐ $50 \% \leq \text{ОФВ1} < 80\%$

Блок: Блок 24 | № 2324

2324. НАЗНАЧЕНИЕ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ АГ ПОКАЗАНО

☐ при выявлении ИБС

Блок: Блок 24 | № 2325

2325. ЭКГ-ПРИЗНАКОМ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В МИОКАРДЕ ПРИ КРУПНООЧАГОВОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ желудочковый комплекс типа QS

Блок: Блок 24 | № 2326

2326. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР СПЕЦИФИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ микроскопия мокроты по методу Циля – Нельсена

Блок: Блок 24 | № 2327

2327. СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стимулирующей

Блок: Блок 24 | № 2328

2328. АНТИМИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ первичного билиарного холангита

Блок: Блок 24 | № 2329

2329. ВЛИЯНИЕ СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНА НА ТКАНИ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЧЕРЕЗ

☐ инсулиноподобный фактор роста-1

Блок: Блок 24 | № 2330

2330. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ЛЕЧЕНИЯ АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ БЕЗ ЗНАЧИМЫХ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ РЕДКИМИ ПЕНИЦИЛЛИНОРЕЗИСТЕНТНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ Амоксициллин, Кларитромицин

Блок: Блок 24 | № 2331

2331. ПРИ МЕНИНГОКОККОВОМ МЕНИНГИТЕ В ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ

☐ нейтрофильный плеоцитоз

Блок: Блок 24 | № 2332

2332. СТЕПЕНЬ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ ОБСЛЕДОВАНИИ МОЖНО ОЦЕНИТЬ НА ОСНОВАНИИ

☐ гликолизированного гемоглобина

Блок: Блок 24 | № 2333

2333. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ СТЕНОЗА ПРИВРАТНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ шум плеска через 3-4 часа после приема пищи

Блок: Блок 24 | № 2334

2334. АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В АНАМНЕЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ В1-адреноблокаторы

Блок: Блок 24 | № 2335

2335. К ПРИЗНАКАМ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА ЭКГ ОТНОСЯТ

☐ глубокие зубцы SI, QIII

Блок: Блок 24 | № 2336

2336. 40-ЛЕТНЕМУ БОЛЬНОМУ АБСЦЕССОМ ЛЕГКИХ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ИЗ МОКРОТЫ И КРОВИ ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА, РЕЗИСТЕНТНОГО К МЕТИЦИЛЛИНУ, СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

☐ Ванкомицин

Блок: Блок 24 | № 2337

2337. ПРИ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ СКЛОННОСТЬ К

☐ панцитопении

Блок: Блок 24 | № 2338

2338. БИОХИМИЧЕСКИМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЦИТОЛИЗА ГЕПАТОЦИТОВ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

☐ уровня АЛТ

Блок: Блок 24 | № 2339

2339. ВЫДЕЛЕНИЕ БОЛЕЕ 3 ЛИТРОВ МОЧИ В СУТКИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ несахарном диабете

Блок: Блок 24 | № 2340

2340. К СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ОТНОСЯТ

☐ сухой кашель

Блок: Блок 24 | № 2341

2341. ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА – КОНОВАЛОВА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПОРАЖАЮТСЯ ОРГАНЫ-МИШЕНИ: ПЕЧЕНЬ И

☐ головной мозг

Блок: Блок 24 | № 2342

2342. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» ДИАГНОСТИКИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД

☐ гистологический

Блок: Блок 24 | № 2343

2343. РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ I СТАДИИ С КРИЗОМ I ТИПА СОСТАВЛЯЕТ

☐ не более 7

Блок: Блок 24 | № 2344

2344. УСИЛЕННОЕ ВЕЗИКУЛЯРНОЕ ДЫХАНИЕ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ

☐ неизменной легочной ткани в условиях гипервентиляции

Блок: Блок 24 | № 2345

2345. ДИАГНОЗ «СКРЫТОЙ» АГ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ УРОВНЯМИ (В ММ РТ. СТ.)

☐ среднесуточного АД > 135/85 и «офисного АД» < 140/90

Блок: Блок 24 | № 2346

2346. НАЗНАЧЕНИЕ ЭРИТРОПОЭТИНА МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ

☐ артериальную гипертензию

Блок: Блок 24 | № 2347

2347. СИНТЕЗ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В ЖЕЛЕЗАХ ЖЕЛУДКА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

☐ париетальные клетки

Блок: Блок 24 | № 2348

2348. В МОЧЕ МОГУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ КЛЕТКИ ШТЕРНГЕЙМЕРА–МАЛЬБИНА ПРИ

☐ пиелонефрите

Блок: Блок 24 | № 2349

2349. ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОНКРЕТНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ НЕОБХОДИМЫ ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ СЛУЧАЕВ КОНКРЕТНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ И

☐ среднегодовой численности населения

Блок: Блок 24 | № 2350

2350. ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ СЧИТАЕТСЯ ОСЛОЖНЕННЫМ ПРИ НАЛИЧИИ

☐ острого нарушения мозгового кровообращения

Блок: Блок 24 | № 2351

2351. НАИБОЛЕЕ БЫСТРЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ШТАММОВ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА С ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ молекулярно-генетический метод

Блок: Блок 24 | № 2352

2352. ФЕНОМЕН УСКОРЕНИЯ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ ОБУСЛОВЛЕН

☐ снижением заряда мембраны эритроцитов из-за окружения ее патологическими белками

Блок: Блок 24 | № 2353

2353. О НАЛИЧИИ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ СУДЯТ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ

☐ соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ

Блок: Блок 24 | № 2354

2354. ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ ГЕМОДИАЛИЗОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ сердечно-сосудистое заболевание

Блок: Блок 24 | № 2355

2355. СИНДРОМ ПЕРЕКРЕСТА (OVERLAP), ВКЛЮЧАЕТ СОЧЕТАНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И

☐ хронической обструктивной болезни легких

Блок: Блок 24 | № 2356

2356. ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ТИАЗИДНЫХ ДИУРЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ подагра

Блок: Блок 24 | № 2357

2357. ПРЕПАРАТЫ ОМЕГА-ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ СНИЖАЮТ УРОВЕНЬ

☐ триглицеридов

Блок: Блок 24 | № 2358

2358. К МЕТОДАМ ВЕРИФИКАЦИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОТНОСЯТ

☐ бактериологический и цито-гистологический

Блок: Блок 24 | № 2359

2359. АВТОНОМНАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ НЕЙРОПАТИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ нарушением сердечного ритма

Блок: Блок 24 | № 2360

2360. РЕГРЕСС ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ образованием остаточных изменений

Блок: Блок 24 | № 2361

2361. В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ОРНИТОЗА ТИПИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ ЛИХОРАДКИ, ПНЕВМОНИИ И

☐ гепатоспленомегалии

Блок: Блок 24 | № 2362

2362. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО ПАЦИЕНТАМ С ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК КРОВОТЕЧЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ варфарин

Блок: Блок 24 | № 2363

2363. ПРИ ЛЕЧЕНИИ МИКРОСФЕРОЦИТАРНОЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ (БОЛЕЗНИ МИНКОВСКОГО-ШОФФАРА) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ спленэктомия

Блок: Блок 24 | № 2364

2364. В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ РАЦИОНАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ БЕЛКОВ, УГЛЕВОДОВ И ЖИРОВ СОСТАВЛЯЕТ (%)

☐ 16, 60, 24

Блок: Блок 24 | № 2365

2365. ОСТРЫЙ ПЕРИОД ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО

☐ 7 суток

Блок: Блок 24 | № 2366

2366. ПОКАЗАТЕЛЬ ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ интенсивным показателем

Блок: Блок 24 | № 2367

2367. ЛИМФАДЕНИТ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ туляремии

Блок: Блок 24 | № 2368

2368. ПРОТИВОЦИТОМЕГАЛОВИРУСНЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ганцикловир

Блок: Блок 24 | № 2369

2369. БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ, РАЗВИВШИЕСЯ НА ФОНЕ ВНЕЗАПНО ПОЯВИВШЕЙСЯ ОДЫШКИ, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ тромбоэмболии легочной артерии

Блок: Блок 24 | № 2370

2370. ДОМИНИРУЮЩИМ СИМПТОМОМ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ боль в животе

Блок: Блок 24 | № 2371

2371. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ исследование функции внешнего дыхания

Блок: Блок 24 | № 2372

2372. К ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ МИНДАЛИН ПРИ ДИФТЕРИИ ОТНОСЯТ

☐ налеты серого цвета, трудно удаляемые шпателем

Блок: Блок 24 | № 2373

2373. ОМЕПРАЗОЛ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ингибитором протонной помпы

Блок: Блок 24 | № 2374

2374. К ИЗМЕНЕНИЯМ ЭКГ, ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ТЭЛА, ОТНОСЯТ

☐ подъем сегмента ST и глубокий зубец Q в I отведении

Блок: Блок 24 | № 2375

2375. ВЫРАЖЕННОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ____ ТУБЕРКУЛЕЗ

☐ милиарный

Блок: Блок 24 | № 2376

2376. ДЛЯ КОЖНОЙ ФОРМЫ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ХАРАКТЕРЕН СИМПТОМ

☐ Бенъе-Мещерского

Блок: Блок 24 | № 2377

2377. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

☐ antiHAV IgM

Блок: Блок 24 | № 2378

2378. РЕШАЮЩАЯ РОЛЬ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ АБСЦЕССА ЛЕГКОГО ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА И ПОЛОСТНОЙ ФОРМЫ РАКА ЛЕГКОГО ПРИНАДЛЕЖИТ

☐ биопсии

Блок: Блок 24 | № 2379

2379. КЛЕТКИ БЕРЕЗОВСКОГО-ШТЕРНБЕРГА ПОЯВЛЯЮТСЯ ПРИ

☐ лимфогранулематозе

Блок: Блок 24 | № 2380

2380. СРЕДИ В2-АГОНИСТОВ ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

☐ сальметерол

Блок: Блок 24 | № 2381

2381. ПРИ ФИБРОЗНОМ СМОРЩИВАНИИ ЛЕГКОГО РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ

☐ уменьшение объема легочного поля, смещение средостения в пораженную сторону

Блок: Блок 24 | № 2382

2382. ПРИ МЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ АКРОМЕГАЛИИ ПРИМЕНЯЮТ

☐ аналоги соматостатина

Блок: Блок 24 | № 2383

2383. ДЛЯ АСПИРИНОВОЙ ТРИАДЫ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ АСПИРИНА И

☐ бронхиальной астмы, полипов носа

Блок: Блок 24 | № 2384

2384. ПРИЧИНОЙ ГИПЕРЭОЗИНОФИЛИИ КРОВИ И ЭОЗИНОФИЛЬНЫХ ИНФИЛЬТРАТОВ В ЛЕГКИХ МОГУТ БЫТЬ

☐ аллергический бронхолегочный аспергиллез

Блок: Блок 24 | № 2385

2385. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ НАЧАЛА ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ОЖИРЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ метформин

Блок: Блок 24 | № 2386

2386. ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО СУБАОТАЛЬНОГО СТЕНОЗА У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ ПОКАЗАНО ПРОВЕДЕНИЕ

☐ трансторакальной эхокардиографии

Блок: Блок 24 | № 2387

2387. К ГРУППЕ ИНГИБИТОРОВ АПФ ОТНОСИТСЯ

☐ Периндоприл

Блок: Блок 24 | № 2388

2388. К РАЗВИТИЮ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ

☐ постельный режим

Блок: Блок 24 | № 2389

2389. УЗЕЛКИ ГЕБЕРДЕНА И БУШАРА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ остеоартроза

Блок: Блок 24 | № 2390

2390. ШИРОКИМ СЧИТАЕТСЯ КОМПЛЕКС QRS БОЛЕЕ (В СЕКУНДАХ)

☐ 0,12

Блок: Блок 24 | № 2391

2391. РАЗМЕР СТРАХОВОГО ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ 8 ЛЕТ И СТАРШЕ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ СВЫШЕ 10 ДНЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ____ % СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА

☐ 50

2392. ОДЫШКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- ☐ имеет инспираторный или смешанный характер

2393. ЧАСТО ПРИМЕНЯЕМОЙ КОМБИНАЦИЕЙ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЮТСЯ АНТАЦИДЫ, АНТИСЕКРЕТОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ И

- ☐ прокинетики

2394. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ ОТ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ наличие в крови антител к антигену Scl-70

2395. ЛЕЙКОЦИТОЗ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ВЫЯВЛЯЕТСЯ ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ

- ☐ через несколько часов

2396. ПЕРВИЧНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ ПРИ ПСОРИАЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ папула

2397. ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- ☐ двухсторонней диссеминацией

2398. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ ОТНОСЯТ

- ☐ тромбоз в полости левого предсердия

2399. МИНИМАЛЬНАЯ ВЕЛИЧИНА КОЭФФИЦИЕНТА СТЬЮДЕНТА, ПРИ КОТОРОЙ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ СРАВНИВАЕМЫМИ ВЕЛИЧИНАМИ СЧИТАЕТСЯ ДОСТОВЕРНЫМ, СОСТАВЛЯЕТ

- ☐ 2,0

2400. ПОЯВЛЕНИЕ ШУМА ТРЕНИЯ ПЕРИКАРДА НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ Q ИНФАРКТА МИОКАРДА СВЯЗАНО С

- ☐ развитием раннего постинфарктного (т.н. эпистенокардитического) перикардита

Блок 25

2401. ПРИСТУП УДУШЬЯ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ КУПИРУЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕМ

- ☐ сальбутамола

Блок: Блок 25 | № 2402

2402. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ВОЗ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КАШЛЯ НЕ МЕНЕЕ ____ МЕСЯЦЕВ В ГОДУ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЛЕТ ПОДРЯД

☐ 3; 2

Блок: Блок 25 | № 2403

2403. ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ВСКОРЕ ПОСЛЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ СИМПТОМОВ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЧАСТО ОБНАРУЖИВАЮТ

☐ увеличение остаточного объема легких

Блок: Блок 25 | № 2404

2404. ОСТЕОПОРОЗ ПРИ СИНДРОМЕ ИЦЕНКО-КУШИНГА ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ

☐ катаболических процессов в костной ткани

Блок: Блок 25 | № 2405

2405. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ СИМПТОМОМ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ФИБРОЗИРУЮЩЕГО АЛЬВЕОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ одышка

Блок: Блок 25 | № 2406

2406. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНОГО РАКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гепатомегалия

Блок: Блок 25 | № 2407

2407. ПРИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА-КОНОВАЛОВА В КРОВИ СНИЖЕНО СОДЕРЖАНИЕ

☐ церулоплазмينا

Блок: Блок 25 | № 2408

2408. ЖЕЛЕЗО, В ОСНОВНОМ, ДЕПОНИРУЕТСЯ В ФОРМЕ

☐ ферритина

Блок: Блок 25 | № 2409

2409. ОКАЗЫВАЕТ ПРЯМОЕ ВАЗОПРЕССОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ

☐ ангиотензин II

Блок: Блок 25 | № 2410

2410. ПРИ ОБЕЗВОЖИВАНИИ II СТЕПЕНИ ПРОЦЕНТ ПОТЕРИ МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ

☐ 7-9

Блок: Блок 25 | № 2411

2411. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В СОМНИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ ВЫСТУПАЕТ

☐ нагрузочный тест

Блок: Блок 25 | № 2412

2412. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ НЕИНВАЗИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛИ ВИЛЬМСА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ компьютерная томография

Блок: Блок 25 | № 2413

2413. САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У МУЖЧИН ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ хроническая кровопотеря из желудочно-кишечного тракта

Блок: Блок 25 | № 2414

2414. ОСНОВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- ☐ ановуляция, поликистоз по результатам сонографии, гиперандрогения

Блок: Блок 25 | № 2415

2415. ПРИ НАЛИЧИИ У ПАЦИЕНТА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПРИ МИНИМАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ИЛИ В ПОКОЕ ДАВЯЩЕЙ БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ, КУПИРУЮЩЕЙСЯ ПРИЕМОМ НИТРОГЛИЦЕРИНА, СЛЕДУЕТ ДУМАТЬ О

- ☐ стабильной стенокардии III функционального класса

Блок: Блок 25 | № 2416

2416. К ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ОТНОСИТСЯ

- ☐ синдром неязвенной диспепсии

Блок: Блок 25 | № 2417

2417. «БОЛЬШИМИ» ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ КРИТЕРИЯМИ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ЯВЛЯЮТСЯ

- ☐ вегетации на клапанах сердца и положительная гемокультура

Блок: Блок 25 | № 2418

2418. СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПОЖИЛЫХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- ☐ уменьшением вариабельности АД

Блок: Блок 25 | № 2419

2419. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ЛЕЧЕНИЯ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЮТСЯ

- ☐ глюкокортикостероиды, цитостатики, антикоагулянты

Блок: Блок 25 | № 2420

2420. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ СЕРДЦА ВЛЕВО И ВНИЗ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

- ☐ дилатации левого желудочка

Блок: Блок 25 | № 2421

2421. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ТРОМБОЛИЗИСУ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ предполагаемое расслоение аорты

Блок: Блок 25 | № 2422

2422. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ β-адреноблокаторы

Блок: Блок 25 | № 2423

2423. МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ В СХЕМАХ АРТ ПРИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 3

Блок: Блок 25 | № 2424

2424. ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ ТЕРАПИЯ

☐ заместительная

Блок: Блок 25 | № 2425

2425. ПОКАЗАТЕЛЕМ ПЕЧЕНОЧНОГО ЦИТОЛИТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение АЛТ

Блок: Блок 25 | № 2426

2426. ВЫЯВЛЕНИЕ БОЛЕЗНЕННОСТИ В ОБЛАСТИ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СУСТАВОВ У БОЛЬНОГО С ДЛИТЕЛЬНО ТЕКУЩИМ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ МОНОАРТРИТОМ КРУПНОГО СУСТАВА ОСЕВОГО СКЕЛЕТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О

☐ анкилозирующем спондилите

Блок: Блок 25 | № 2427

2427. ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ ДАННЫЕ ПО

☐ обращаемости за медицинской помощью

Блок: Блок 25 | № 2428

2428. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ расслаивающая аневризма аорты

Блок: Блок 25 | № 2429

2429. РАННИМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ АМИЛОИДОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ протеинурия

Блок: Блок 25 | № 2430

2430. УСИЛЕНИЕ БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА И ЕЕ ОСЛАБЛЕНИЕ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ТЕЛА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ грыжи пищеводного отверстия диафрагмы

Блок: Блок 25 | № 2431

2431. ПРИ СИДЕРОАХРЕСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ПРОТИВОПОКАЗАН

☐ железа (III) гидроксид полимальтозат

Блок: Блок 25 | № 2432

2432. ИМПЕДАНСОМЕТРИЯ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ

☐ регистрации жидких и газовых рефлюксов, основанном на измерении сопротивления, которое оказывает переменному электрическому току содержимое, попадающее в просвет пищевода

Блок: Блок 25 | № 2433

2433. КУПИРОВАНИЕ АНГИНОЗНОГО ПРИСТУПА НАЧИНАЕТСЯ С НАЗНАЧЕНИЯ

☐ нитроглицерина сублингвально

Блок: Блок 25 | № 2434

2434. ЭФФЕКТИВНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА СОТАЛОЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ)

☐ 160-320

Блок: Блок 25 | № 2435

2435. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ артериальная гипертензия

Блок: Блок 25 | № 2436

2436. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА У ПАЦИЕНТА 30 ЛЕТ БЕЗ ТЯЖЕЛЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА И РИСКА ТЯЖЕЛЫХ ГИПОГЛИКЕМИЙ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ (В %)

☐ 6,5

Блок: Блок 25 | № 2437

2437. «ШТАМПОВАННЫЕ» КАВЕРНЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

☐ подострого диссеминированного

Блок: Блок 25 | № 2438

2438. АУТОИММУННАЯ ДЕСТРУКЦИЯ В-КЛЕТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

☐ сахарного диабета 1 типа

Блок: Блок 25 | № 2439

2439. ВЫСОКАЯ ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ хронической болезни почек 5 стадии

Блок: Блок 25 | № 2440

2440. ПОВЫШЕНИЕ СЫВОРОТОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНОСПЕЦИФИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ

☐ увеличения проницаемости клеточных мембран и разрушения клеток

Блок: Блок 25 | № 2441

2441. НАИБОЛЕЕ ВСЕГО К РАЗВИТИЮ ОСТЕОАРТРОЗА ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ

☐ ожирение

Блок: Блок 25 | № 2442

2442. ПРЕПАРАТАМИ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингаляционные глюкокортикостероиды

Блок: Блок 25 | № 2443

2443. ПАЦИЕНТУ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

☐ фиброколоноскопии с биопсией

Блок: Блок 25 | № 2444

2444. ДИАБЕТИЧЕСКАЯ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКАЯ КОМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЫХАНИЕМ

☐ Куссмауля

Блок: Блок 25 | № 2445

2445. У ВЗРОСЛЫХ САМОЙ ЧАСТОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инфильтративная

Блок: Блок 25 | № 2446

2446. СТАРТОВАЯ ДОЗА БИСОПРОЛОЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ/СУТ)

☐ 1,25

Блок: Блок 25 | № 2447

2447. ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

☐ некоммерческой

Блок: Блок 25 | № 2448

2448. ГРУБЫЙ СИСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ НАД ПРАВОЙ СОННОЙ АРТЕРИЕЙ, ОТСУТСТВИЕ ПУЛЬСА НА ПРАВОЙ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ И АД 180/120 ММ РТ.СТ. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ неспецифического аортоартериита

Блок: Блок 25 | № 2449

2449. ДОКАЗАТЕЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие снижения уровня сывороточного железа

Блок: Блок 25 | № 2450

2450. ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиперхолестеринемия

Блок: Блок 25 | № 2451

2451. ВИДАМИ ОТВЕТНЫХ МЕСТНЫХ РЕАКЦИЙ НА ПРОБУ МАНТУ С 2 ТЕ PPD-L ЯВЛЯЮТСЯ

☐ отрицательная, сомнительная, положительная, гиперергическая

Блок: Блок 25 | № 2452

2452. НОЗОКОМИАЛЬНОЙ ПРИНЯТО НАЗЫВАТЬ ПНЕВМОНИЮ, ВОЗНИКШУЮ

☐ позднее 48 часов после госпитализации человека

Блок: Блок 25 | № 2453

2453. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БАКТЕРИАЛЬНЫМ ПИЩЕВЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ И II-ОЙ СТЕПЕНЬЮ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НАЗНАЧАЮТ

☐ цитроглюкосолан

Блок: Блок 25 | № 2454

2454. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ДИАГНОЗА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ С СИНДРОМОМ ИЦЕНКО-КУШИНГА НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ МЕТОДОМ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

☐ 17-оксикортикостероида

Блок: Блок 25 | № 2455

2455. ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ ТЕРАПИЮ ДВС-СИНДРОМА СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

☐ проведения плазмафереза в объеме 1 л эксфузии

Блок: Блок 25 | № 2456

2456. К МЕРОПРИЯТИЯМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСИТСЯ

☐ устранение причин развития заболевания

Блок: Блок 25 | № 2457

2457. СОЧЕТАНИЕ АНЕМИИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ хронической почечной недостаточности

Блок: Блок 25 | № 2458

2458. В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ПРИ ОСТРОМ БРУЦЕЛЛЁЗЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ

☐ лейкопения, нейтропения, лимфоцитоз

Блок: Блок 25 | № 2459

2459. ГИГАНТСКИМИ СЧИТАЮТСЯ ЯЗВЫ РАЗМЕРОМ БОЛЕЕ (СМ)

☐ 3

Блок: Блок 25 | № 2460

2460. НЕ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ МАКРОЛИДОВ

☐ Гентамицин

Блок: Блок 25 | № 2461

2461. ФАКТОРОМ, УМЕНЬШАЮЩИМ РИСК РАЗВИТИЯ ИБС, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение уровня липопротеидов высокой плотности

Блок: Блок 25 | № 2462

2462. ПРИЧИНОЙ ЭКСПИРАТОРНОЙ ОДЫШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бронхиальная обструкция

Блок: Блок 25 | № 2463

2463. ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

☐ нитроглицерина

Блок: Блок 25 | № 2464

2464. КОЛИЧЕСТВО ЕЖЕГОДНЫХ ОСМОТРОВ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК СЗБ ПРИ ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 4

Блок: Блок 25 | № 2465

2465. ЖИДКОСТЬ В ПОЛОСТИ ПЕРИКАРДА МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕРАПИИ

☐ цитостатиками

Блок: Блок 25 | № 2466

2466. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ ОТНОСИТСЯ К ____ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СУСТАВОВ

☐ воспалительным

Блок: Блок 25 | № 2467

2467. СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ СТЕНОЗА ПОЧЕЧНОЙ АРТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дуплексная доплерультрасонография почек и почечных артерий

Блок: Блок 25 | № 2468

2468. ДЫХАНИЕ ЧЕЙН—СТОКСА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ апноэ, сменяющимся гиперпноэ

Блок: Блок 25 | № 2469

2469. ОСНОВНЫМ ПУТЕМ ИНФИЦИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА МИКОБАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аэрогенный

Блок: Блок 25 | № 2470

2470. ОДНОСТОРОННИЕ ОТЕКИ НОГ У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

☐ могут быть при сопутствующей патологии вен

Блок: Блок 25 | № 2471

2471. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОТНОСЯТ

☐ медицинские противопоказания к труду

Блок: Блок 25 | № 2472

2472. ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ ПОВЫШАЕТСЯ ВЫРАБОТКА

☐ альдостерона

Блок: Блок 25 | № 2473

2473. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОФОСМОТРОВ КРИТЕРИЯМИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ____ ММ РТ.СТ. И ВЫШЕ И/ИЛИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ ____ ММ РТ.СТ. И ВЫШЕ

☐ 140 / 90

Блок: Блок 25 | № 2474

2474. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «С» ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингибиторы протеазы и полимеразы вируса

Блок: Блок 25 | № 2475

2475. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эхокардиография

Блок: Блок 25 | № 2476

2476. ВЫЯВЛЕНИЕ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ОДНОСТОРОННЕГО РАСШИРЕНИЯ ТЕНИ КОРНЯ ЛЕГКОГО, НАРУШЕНИЯ ЕГО ФОРМЫ И СТРУКТУРЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов

Блок: Блок 25 | № 2477

2477. ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ В ВИДЕ КАШЛЯ ПРИ ПРИЁМЕ ИНГИБИТОРОВ АПФ СВЯЗАН С

☐ блокадой деградации брадикинина

Блок: Блок 25 | № 2478

2478. ПРИ ФИЗИКАЛЬНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНОГО НАЛИЧИЕ ПЛЕВРАЛЬНОГО ВЫПОТА МОЖЕТ ПРОЯВЛЯТЬСЯ

☐ ослаблением голосового дрожания

Блок: Блок 25 | № 2479

2479. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ЭТАМБУТОЛА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ туберкулез

Блок: Блок 25 | № 2480

2480. ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ «СТЕРОИДНОГО ДИАБЕТА» ПРИ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ активация глюконеогенеза в печени

Блок: Блок 25 | № 2481

2481. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ

☐ мероприятия, предупреждающие развитие осложнений и рецидивов заболеваний

Блок: Блок 25 | № 2482

2482. СИНТЕЗ ЭРГОСТЕРОЛА НАРУШАЕТ

☐ клотримазол

Блок: Блок 25 | № 2483

2483. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ НОЗОКОМИАЛЬНОЙ (ГОСПИТАЛЬНОЙ) ПНЕВМОНИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ клебсиелла

Блок: Блок 25 | № 2484

2484. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ БОЛЕЗНИ АДДИСОНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аутоиммунная деструкция

Блок: Блок 25 | № 2485

2485. ОСНОВНЫМ ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нефротический синдром

Блок: Блок 25 | № 2486

2486. НАЛИЧИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТРАЖАЕТ

☐ инвентаризационная (сличительная) ведомость

Блок: Блок 25 | № 2487

2487. К АТИПИЧНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЯМ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ

☐ микоплазму

Блок: Блок 25 | № 2488

2488. ОБРАТИМАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ ОБСТРУКЦИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ бронхиальной астмы

Блок: Блок 25 | № 2489

2489. У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, У ПАЦИЕНТОВ, ДЛИТЕЛЬНО ПРИНИМАЮЩИХ ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ, НАБЛЮДАЕТСЯ ВЫСОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ АНЕМИИ

☐ фолиеводефицитной

Блок: Блок 25 | № 2490

2490. ПОВЫШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТРОМБОЦИТОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ эссенциальной тромбоцитемии

Блок: Блок 25 | № 2491

2491. БОЛЬНОЙ 48 ЛЕТ С УСТОЙЧИВЫМ ПОВЫШЕНИЕМ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЛЕТ АД ДО 160/100 ММ РТ.СТ. БЕЗ КАКИХ-ЛИБО КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ

☐ изменение образа жизни и постоянную антигипертензивную терапию

Блок: Блок 25 | № 2492

2492. ДЛЯ ЭНТЕРОБИОЗА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ зуда и жжения в области ануса

Блок: Блок 25 | № 2493

2493. УСТАНОВЛИВАТЬ ДИАГНОЗ АЛКОГОЛИЗМА ИМЕЕТ ПРАВО ВРАЧ

☐ психиатр-нарколог

Блок: Блок 25 | № 2494

2494. ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТА С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ, ЕСЛИ ПО ШКАЛЕ CRB65 ПРИ ОСМОТРЕ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПАЦИЕНТ НАБРАЛ 4 БАЛЛА, СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ В

☐ отделении реанимации и интенсивной терапии

Блок: Блок 25 | № 2495

2495. ПРИ НЕСАХАРНОМ ДИАБЕТЕ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЧИ КОЛЕБЛЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ

☐ 1001-1005 (при количестве мочи 5 - 20 литров)

Блок: Блок 25 | № 2496

2496. МОКРОТА У БОЛЬНЫХ С БРОНХОЭКТАЗАМИ

☐ имеет гнойный характер и при стоянии расслаивается

Блок: Блок 25 | № 2497

2497. МАКСИМАЛЬНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НАБЛЮДАЕТ ПРИ

☐ стенозе устья аорты

Блок: Блок 25 | № 2498

2498. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОБУСЛОВЛЕННЫ

☐ фармакологическими свойствами лекарственного средства

Блок: Блок 25 | № 2499

2499. К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ ОТНОСЯТ

☐ панцитопению

Блок: Блок 25 | № 2500

2500. «НАПРАВЛЕНИЕ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ, ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ОБСЛЕДОВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИЮ» (УЧЕТНАЯ ФОРМА N 057/У-04) ПОДПИСЫВАЕТСЯ

☐ заведующим отделением

Блок 26

Блок: Блок 26 | № 2501

2501. ПРИЧИНОЙ СНИЖЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ БОЛИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение порога болевой чувствительности

Блок: Блок 26 | № 2502

2502. ЛИМФОЦИТАРНАЯ РЕАКЦИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ вирусной инфекции

2503. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ КАШЛЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ БРОНХИТЕ СОСТАВЛЯЕТ

- ☐ 3 месяца в течение 2 лет подряд

2504. ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРИЕМУ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ БОЛЬНЫМ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ И СИНУСОВЫМ РИТМОМ С ЧСС > 80 МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕН

- ☐ Ивабрадина гидрохлорид

2505. ВО ВРЕМЯ ГЕМОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИ АУТОИММУННОЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО

- ☐ назначение стероидов

2506. ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДАМИ (ГИДРОКОРТИЗОНОМ, КОРТИЗОНОМ) ПРОВОДЯТ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДОЗАХ

- ☐ физиологических, 2/3 дозы утром и 1/3 дозы вечером

2507. ДИАГНОЗ «ЛИХОРАДКА НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА» ФОРМУЛИРУЕТСЯ ПРИ ЕЕ НЕВЫЯСНЕННОЙ ПРИЧИНЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РУТИННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 3 НЕДЕЛЬ И ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА БОЛЕЕ (В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ)

- ☐ 38,3

2508. ХАРАКТЕРНЫМИ МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ ВЫСТУПАЮТ

- ☐ лимфоидные, эпителиоидные, гигантские клетки Пирогова-Лангханса, казеозный некроз

2509. ПРИ ОБРАЩЕНИИ К ВРАЧУ-ТЕРАПЕВТУ УЧАСТКОВОМУ В ПУНКТЕ 19 УЧЕТНОЙ ФОРМЫ N 025-1/У «ТАЛОН ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ» НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ ПУНКТ

- ☐ первичная врачебная медико-санитарная помощь

2510. НЕ СЧИТАЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ РЕЖИМА

- ☐ отказ от госпитализации

2511. СОЧЕТАНИЕ ПРОТЕИНУРИИ, ЭРИТРОЦИТУРИИ, ГИПОПРОТЕИНЕМИИ, ОТЕКОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

- ☐ острого гломерулонефрита

Блок: Блок 26 | № 2512

2512. ВАРИАНТ ИНФАРКТА МИОКАРДА С НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

☐ цереброваскулярным

Блок: Блок 26 | № 2513

2513. ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ кальцинатов в головке поджелудочной железы

Блок: Блок 26 | № 2514

2514. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН ПРИ ЛЕЧЕНИИ РИККЕТСИОЗОВ

☐ Тетрациклин

Блок: Блок 26 | № 2515

2515. БЛОКАТОРОМ ЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ монтелукаст

Блок: Блок 26 | № 2516

2516. НА КАКОЙ ИЗ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ ВЛИЯЮТ БАЗИСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ?

☐ хроническое иммунное воспаление

Блок: Блок 26 | № 2517

2517. АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ

☐ является частой причиной невынашивания беременности

Блок: Блок 26 | № 2518

2518. САМЫМ РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ мононуклеозоподобный синдром

Блок: Блок 26 | № 2519

2519. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СТИМУЛЯТОРОМ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ

☐ Атропин

Блок: Блок 26 | № 2520

2520. ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ отсутствием зубцов Р

Блок: Блок 26 | № 2521

2521. АНТИАТЕРОГЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЮТ

☐ липопротеиды высокой плотности

Блок: Блок 26 | № 2522

2522. НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА УГЛЕВОДНЫЙ И ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ ОКАЗЫВАЮТ

☐ неселективные В-адреноблокаторы

Блок: Блок 26 | № 2523

2523. ПОД БИОДОСТУПНОСТЬЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ПОНИМАЮТ ТУ ЧАСТЬ ЕГО ДОЗЫ, КОТОРАЯ ПОСЛЕ ВНЕСОСУДИСТОГО ВВЕДЕНИЯ

☐ достигла системного кровотока

Блок: Блок 26 | № 2524

2524. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ ОБУСЛОВЛЕНА

☐ повышением секреции катехоламинов

Блок: Блок 26 | № 2525

2525. С ЦЕЛЬЮ КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕРАПИИ СТАТИНАМИ СЛЕДУЕТ ОЦЕНИВАТЬ УРОВЕНЬ

☐ креатинфосфокиназы

Блок: Блок 26 | № 2526

2526. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО ЗОБА ЦЕЛЕСООБРАЗНО ЙОДИРОВАТЬ

☐ поваренную соль

Блок: Блок 26 | № 2527

2527. АНЕМИЯ, ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ, БЛАСТОЗ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ острого лейкоза

Блок: Блок 26 | № 2528

2528. ВЕРНЫМ СПОСОБОМ ВВЕДЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ В НЕОТЛОЖНОЙ ПРАКТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ внутривенный

Блок: Блок 26 | № 2529

2529. ТИПИЧНЫМИ СИМПТОМАМИ АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ синкопальные состояния

Блок: Блок 26 | № 2530

2530. КОЛЬЦЕВИДНАЯ ТЕНЬ В ЛЕГКИХ С ДОРОЖКОЙ К КОРНЮ И ПОЛИМОРФНЫМИ ОЧАГАМИ ВОКРУГ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ туберкулёзной каверны

Блок: Блок 26 | № 2531

2531. ВНЕОЧЕРЕДНЫМ МЕДИЦИНСКИМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ОСМОТРАМ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПОДЛЕЖАТ

☐ лица, снятые с диспансерного учета в противотуберкулезных учреждениях в связи с выздоровлением, в течение первых 3 лет после снятия с учета

Блок: Блок 26 | № 2532

2532. ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ХОЛЕСТАЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кожный зуд

2533. ФАМОТИДИН БЛОКИРУЕТ

☐ H₂-рецепторы

2534. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКУЮ ТЕРАПИЮ БОТУЛИЗМА НАЧИНАЮТ С

☐ дезинтоксикационной терапии

2535. К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ КОЖНО-БУБОННОЙ ФОРМЫ ЧУМЫ ОТНОСЯТ

☐ резкую болезненность первичного аффекта, регионарный лимфаденит

2536. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ПОБОЧНОЙ РЕАКЦИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ОТНОСЯТ

☐ нефротоксичность

2537. РИСК ТОКСИЧНОСТИ ФЕЛОДИПИНА ВОЗРАСТАЕТ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ

☐ азитромицина

2538. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ИМПУЛЬС ПОДВЕРГАЕТСЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАДЕРЖКЕ В

☐ АВ-соединении

2539. ОСЛАБЛЕНИЕ ВЕРХУШЕЧНОГО ТОЛЧКА МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ПРИ

☐ эмфиземе лёгких

2540. ПОКАЗАТЕЛЕМ, НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНО ОТРАЖАЮЩИМ СТЕПЕНЬ КОМПЕНСАЦИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАБЛЮДЕНИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гликозилированный гемоглобин

2541. ДЕБЮТ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ВОЗНИКАЕТ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ СТРЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ЧЕРЕЗ

☐ 2-4 недели

2542. КУПИРОВАНИЕ АНГИНОЗНОГО ПРИСТУПА В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРИМЕНЕНИИ

☐ нитроглицерина сублингвально

Блок: Блок 26 | № 2543

2543. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ КРОВИ НЕОБХОДИМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ

☐ цитостатиками

Блок: Блок 26 | № 2544

2544. 41-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЕ С ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ И ПОВЫШЕННЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ, ПОЛУЧАЮЩЕЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНУЮ ТЕРАПИЮ, НЕОБХОДИМО РЕКОМЕНДОВАТЬ

☐ СНИЗИТЬ ВЕС

Блок: Блок 26 | № 2545

2545. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ФЕНОМЕНА РЕЙНО ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ дигидропиридиновые антагонисты кальция

Блок: Блок 26 | № 2546

2546. ЭКОНОМИКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К БЛОКУ НАУК

☐ отраслевых экономических

Блок: Блок 26 | № 2547

2547. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дисфония

Блок: Блок 26 | № 2548

2548. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТИАМАЗОЛА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ агранулоцитоз

Блок: Блок 26 | № 2549

2549. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ СИМПТОМ КЕРА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

☐ хронического холецистита

Блок: Блок 26 | № 2550

2550. ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ АНГИНЫ У ПАЦИЕНТА 20 ЛЕТ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Амоксиклав

Блок: Блок 26 | № 2551

2551. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ АТИПИЧНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ азитромицин

Блок: Блок 26 | № 2552

2552. ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИ ПРИ ЛЕГОЧНОМ СЕРДЦЕ ОБНАРУЖИВАЮТ

☐ гипертрофию и дилатацию правых отделов сердца

2553. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ БУБОНА ПРИ ТУЛЯРЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ незначительная болезненность, чёткие контуры

2554. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ И ЗНАЧИМЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ОТ ДРУГИХ ГЛОМЕРУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПОРАЖЕНИЙ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ биопсия почек

2555. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ИНФЕКЦИОННОГО ЭЗОФАГИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ одинофагия (боль при глотании)

2556. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ вирусная инфекция

2557. МАРКЕРОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ anti-HAV IgM

2558. ВНУТРИКЛУБЧКОВУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ СНИЖАЮТ

☐ ингибиторы АПФ

2559. ВЫСОКИЙ РОСТ, ВЫСОКАЯ ТАЛИЯ И ПРИЗНАКИ ГИНЕКОМАСТИИ, ГИПОГОНАДИЗМА У МУЖЧИН ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ СИНДРОМА____ С НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ КАРИОТИПОМ____

☐ Клайнфельтера; 47 ХХУ

2560. ПОКАЗАНИЕМ К ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТЕНОКАРДИЯ

☐ нестабильная

2561. ДЛЯ БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКИМ НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ В ФАЗЕ РЕМИССИИ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ плохой переносимости жирной пищи

2562. ПРИ ДИФFUЗНОМ ПРОЦЕССЕ В ЛЕГКИХ НЕЯСНОЙ ПРИРОДЫ СЛЕДУЕТ ВЫПОЛНИТЬ БРОНХОСКОПИЮ И СДЕЛАТЬ

☐ щипцовую биопсию

Блок: Блок 26 | № 2563

2563. НАЛИЧИЕ ФИЛАДЕЛЬФИЙСКОЙ ХРОМОСОМЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ хронического миелолейкоза

Блок: Блок 26 | № 2564

2564. ДЛЯ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНЫ УМЕРЕННЫЕ

☐ лейкопения и тромбоцитопения

Блок: Блок 26 | № 2565

2565. ГРУППА ИНВАЛИДНОСТИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ БЕЗ СРОКА ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

☐ инвалидам с необратимыми анатомическими дефектами

Блок: Блок 26 | № 2566

2566. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение тонуса артериол

Блок: Блок 26 | № 2567

2567. КОМБИНИРОВАННЫМ ИНГАЛЯЦИОННЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРОГО ВОЗМОЖНО ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ) ПРИ СТУПЕНЧАТОЙ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ, НАЧИНАЯ С ПЕРВОЙ СТУПЕНИ ТЕРАПИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ формотерол/будесонид

Блок: Блок 26 | № 2568

2568. АНТИБИОТИКОМ ВЫБОРА ПРИ MRSA (МЕТИЦИЛЛИН РЕЗИСТЕНТНЫЙ СТАФИЛОКОКК ЗОЛОТИСТЫЙ) ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Ванкомицин

Блок: Блок 26 | № 2569

2569. МОЩНОСТЬ СТАЦИОНАРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ количеством коек

Блок: Блок 26 | № 2570

2570. У ЛИЦ СТАРШЕ 40 ЛЕТ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКИХ БРОНХИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ курение

Блок: Блок 26 | № 2571

2571. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ НЕТЯЖЕЛОГО ОБОСТРЕНИЯ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гемофильная палочка

Блок: Блок 26 | № 2572

2572. АНТАГОНИСТОМ ВИТАМИНА К ЯВЛЯЕТСЯ

☐ варфарин

Блок: Блок 26 | № 2573

2573. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА БЕЗ ПРИЗНАКОВ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, РЕКОМЕНДУЮТСЯ

☐ бета-адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

Блок: Блок 26 | № 2574

2574. СУБСТРАТОМ ОПУХОЛИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

☐ гранулоциты

Блок: Блок 26 | № 2575

2575. СУТОЧНЫЙ РИТМ АД ТИПА NON-DIPPER ДИАГНОСТИРУЮТ, КОГДА АД В НОЧНЫЕ ЧАСЫ

☐ по сравнению с дневными часами, снижается менее чем на 10%

Блок: Блок 26 | № 2576

2576. ДЛЯ ГРИППА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ трахеита

Блок: Блок 26 | № 2577

2577. ПРАВИЛЬНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВНЕЗАПНУЮ ОСТАНОВКУ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ ОЦЕНКА

☐ врачом собственной безопасности; оценка сознания; оценка дыхания

Блок: Блок 26 | № 2578

2578. ЛАБОРАТОРНЫМ ТЕСТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ НАЛИЧИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ иммуноблоттинг

Блок: Блок 26 | № 2579

2579. ДЛЯ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ багровых стрий

Блок: Блок 26 | № 2580

2580. ДЛЯ СИБИРЕЯЗВЕННОГО КАРБУНКУЛА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ черного струпа в центре поражения

Блок: Блок 26 | № 2581

2581. ПРИ ПЕРВИЧНОМ ОСМОТРЕ ПАЦИЕНТА С СУСТАВНЫМ СИНДРОМОМ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ УЧАСТКОВЫМ ОБНАРУЖЕНЫ УЗЛЫ ГЕБЕРДЕНА И БУШАРА, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАСТАВЛЯЕТ ДУМАТЬ О/ОБ

☐ остеоартрозе суставов кистей

Блок: Блок 26 | № 2582

2582. ЖИЗНЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ ЛЕГКИХ НАЗЫВАЮТ

☐ максимальный объем воздуха, который попадает в легкие при вдохе и выходит при выдохе

Блок: Блок 26 | № 2583

2583. ПРЕПАРАТЫ ЛАКТУЛОЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ ИЗ-ЗА ИХ СПОСОБНОСТИ

☐ подавлять образование аммиака в кишечнике

Блок: Блок 26 | № 2584

2584. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АСПЕРГИЛЛЕЗА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ вориконазол

Блок: Блок 26 | № 2585

2585. САМЫМ ПОЗДНИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОЙ СТАРТОВОЙ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ ПНЕВМОНИИ СЛУЖИТ

☐ исчезновение легочного инфильтрата

Блок: Блок 26 | № 2586

2586. К ВЕДУЩЕМУ МЕТОДУ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ПОДРОСТКОВ ОТНОСЯТ

☐ флюорографию органов грудной клетки

Блок: Блок 26 | № 2587

2587. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНЫЙ КОЛИТ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНО ИССЛЕДОВАНИЕ

☐ кала на токсины А и В *Cl. difficile*

Блок: Блок 26 | № 2588

2588. ПРИ ФЕОХРОМОЦИТОМЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ПОВЫШАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ ГИПЕРПРОДУКЦИИ

☐ катехоламинов

Блок: Блок 26 | № 2589

2589. НИТРАТЫ НЕЛЬЗЯ СОЧЕТАТЬ С

☐ Силденафилом

Блок: Блок 26 | № 2590

2590. У ВЗРОСЛЫХ САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СТЕНОЗА ПРИВРАТНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ язвенная болезнь

Блок: Блок 26 | № 2591

2591. ДЛЯ ХОБЛ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ (GOLD) ХАРАКТЕРНО ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 (%)

☐ > 80

Блок: Блок 26 | № 2592

2592. ДЛЯ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ХАРАКТЕРЕН КЛИНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ

☐ дегидратационный

Блок: Блок 26 | № 2593

2593. ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ УНИВЕРСАЛЬНЫМ АМЕБОЦИДНЫМ ДЕЙСТВИЕМ (ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВСЕХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ АМЕБИАЗА И НОСИТЕЛЬСТВА), ЯВЛЯЕТСЯ

☐ метронидазол

Блок: Блок 26 | № 2594

2594. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ У ЖЕНЩИНЫ 55 ЛЕТ С ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА 38,0 КГ/М² ГЛИКЕМИИ НАТОЩАК 11,5 ММОЛЬ/Л НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ БУДЕТ

☐ сахарный диабет 2 типа

Блок: Блок 26 | № 2595

2595. ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 7 ЛЕТ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ

☐ выдается листок нетрудоспособности на весь срок лечения

Блок: Блок 26 | № 2596

2596. КАРДИОТОКСИЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ВПЛОТЬ ДО РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНОЙ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ОБЛАДАЕТ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫЙ ПРЕПАРАТ

☐ доксорубицин

Блок: Блок 26 | № 2597

2597. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ишемическая болезнь сердца

Блок: Блок 26 | № 2598

2598. ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ ЧАЩЕ ПОРАЖАЕТСЯ

☐ пищевод

Блок: Блок 26 | № 2599

2599. РАЦИОНАЛЬНОЙ СЧИТАЕТСЯ КОМБИНАЦИЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ

☐ бета-адреноблокаторов и дигидропиридиновых блокаторов медленных кальциевых каналов

Блок: Блок 26 | № 2600

2600. ИЗОЛИРОВАННАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ САД > ____ ММ РТ. СТ., ДАД < (В ММ РТ. СТ.)

☐ 140; 90

Блок: Блок 26 | №

. РЕКОМЕНДУЮТ

☐ снизить вес

Блок 27

Блок: Блок 27 | № 2601

2601. ПРИ БОЛЕЗНИ ШЕНЛЕЙНА-ГЕНОХА ЧАЩЕ ВСЕГО И ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

☐ поражаются мелкие сосуды - капилляры и артериолы

Блок: Блок 27 | № 2602

2602. К ОСНОВНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ СИМПТОМАМ ПРИ ХОБЛ ОТНОСЯТ

☐ сухие свистящие хрипы

Блок: Блок 27 | № 2603

2603. ХРОНИЧЕСКИЙ МИЕЛОЛЕЙКОЗ

☐ относится к миелопролиферативным заболеваниям

Блок: Блок 27 | № 2604

2604. В ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ ОМС ВХОДЯТ

☐ медицинские услуги, оплачиваемые из средств ОМС

Блок: Блок 27 | № 2605

2605. МЕРОЙ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ введение противогриппозной вакцины

Блок: Блок 27 | № 2606

2606. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА СЛЕДУЕТ ЗАВЕРШИТЬ ДО НАЧАЛА ТЕРАПИИ

☐ доксорубицином

Блок: Блок 27 | № 2607

2607. ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА ДРЕССЛЕРА НАЧИНАЮТ С

☐ нестероидных противовоспалительных препаратов

Блок: Блок 27 | № 2608

2608. К ТИПИЧНЫМ ЖАЛОБАМ ПАЦИЕНТА ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ОТНОСЯТ

☐ давящие боли за грудиной, возникающие при физической нагрузке

Блок: Блок 27 | № 2609

2609. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ СО СТАБИЛЬНОЙ ИБС РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ В ДОЗЕ (В МГ В СУТКИ)

☐ 75-100

Блок: Блок 27 | № 2610

2610. К ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ, СНИЖАЮЩИХ ВНУТРИЛУБОЧКОВУЮ ГИПЕРТЕНЗИЮ, ОТНОСЯТ

☐ ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

Блок: Блок 27 | № 2611

2611. ОСНОВНЫМ МЕСТОМ ВСАСЫВАНИЯ ВИТАМИНА В12 ЯВЛЯЕТСЯ ____ ОТДЕЛ ____ КИШКИ

☐ дистальный; подвздошной

Блок: Блок 27 | № 2612

2612. ПОКАЗАНИЕМ К РАННЕМУ ОПЕРАТИВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ осложнение эмболического характера

Блок: Блок 27 | № 2613

2613. ПРИЗНАКОМ АВ-БЛОКАДЫ I СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ увеличение PQ более 0,20 с

Блок: Блок 27 | № 2614

2614. УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ НАТОЩАК, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ДИАГНОСТИРОВАТЬ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, СОСТАВЛЯЕТ (ММОЛЬ/Л)

☐ 7,0

Блок: Блок 27 | № 2615

2615. АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ ВОЗМОЖНО

☐ у молодых больных при нетяжелом течении заболевания

Блок: Блок 27 | № 2616

2616. В12-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ гиперхромией, макроцитозом, цитопенией

Блок: Блок 27 | № 2617

2617. СПАЗМОЛИТИКОМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ НА МУСКУЛАТУРУ: СФИНКТЕРА ОДДИ, КИШЕЧНИКА И МОЧЕТОЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дротаверин

Блок: Блок 27 | № 2618

2618. ТИПИЧНЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пневмоциста

Блок: Блок 27 | № 2619

2619. САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХСН ВОЗМОЖНО ПРИ

☐ ХСН ФК I и II

Блок: Блок 27 | № 2620

2620. ПРИ ИСХОДНОМ ЗНАЧЕНИИ УРОВНЯ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА 6,5-7,5% НАЧИНАТЬ ЛЕЧЕНИЕ РЕКОМЕНДОВАНО С

☐ монотерапии (метформин, ингибиторы ДПП-4 или аналог ГПП-1)

Блок: Блок 27 | № 2621

2621. ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ИНГИБИТОРАМИ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ

☐ двустороннем стенозе почечных артерий

Блок: Блок 27 | № 2622

2622. ЭКГ-ПРИЗНАКОМ ЗАДНЕ-БАЗАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА В ОТВЕДЕНИЯХ V1-V2 ЯВЛЯЕТСЯ

☐ увеличение высоты и ширины зубцов R

Блок: Блок 27 | № 2623

2623. У ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПОСТАНОВКЕ ПРОБЫ МАНТУ С 2ТЕ ППД-Л ВОЗНИКАЕТ РЕАКЦИЯ

☐ только местная

Блок: Блок 27 | № 2624

2624. ПОД ПОТРЕБНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ В ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПОНИМАЕТСЯ

☐ доля населения, нуждающегося в госпитализации

Блок: Блок 27 | № 2625

2625. РАК ЛЕГКОГО ЧАЩЕ МЕТАСТАЗИРУЕТ В ЛИМФОУЗЛЫ

☐ надключичные

Блок: Блок 27 | № 2626

2626. МЕТОДОМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ соотношение альбумин/креатинин в разовой порции мочи

Блок: Блок 27 | № 2627

2627. ОГРАНИЧЕНИЕМ СПОСОБНОСТИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПЕРЕДВИЖЕНИЮ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ НАЗЫВАЮТ ____ К САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ПЕРЕДВИЖЕНИЮ

☐ способность; при более длительной затрате времени и сокращения расстояния

Блок: Блок 27 | № 2628

2628. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ИНГИБИТОРОВ АПФ У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ сопутствующая хроническая сердечная недостаточность

Блок: Блок 27 | № 2629

2629. НАИБОЛЕЕ РАННИМИ ЭКГ-ПРИЗНАКАМИ МИТРАЛЬНОГО СТЕНОЗА ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКИ ГИПЕРТРОФИИ

☐ левого предсердия

Блок: Блок 27 | № 2630

2630. ЭРИТЕМА ПРИ КЛЕЩЕВОМ БОРРЕЛИОЗЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ГИПЕРЕМИЮ КОЖИ

☐ безболезненную с воспалительным валиком по периферии и бледно-цианотичным центром

Блок: Блок 27 | № 2631

2631. ПРИ УГРОЗЕ РАЗВИТИЯ ПЕЧЁНОЧНОЙ КОМЫ ПАЦИЕНТУ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ В ДИЕТЕ

☐ белки

Блок: Блок 27 | № 2632

2632. ПОБОЧНЫМ ЯВЛЕНИЕМ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ИНГАЛЯЦИОННЫМИ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ В ОБЫЧНЫХ ДОЗАХ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кандидоз ротоглотки и дисфония

Блок: Блок 27 | № 2633

2633. ТРЕТИЙ ПЛАНОВЫЙ ВИЗИТ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА К БОЛЬНОМУ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ____ ОТ ПЕРВОГО ВИЗИТА

☐ на 7-10 сутки

Блок: Блок 27 | № 2634

2634. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МЕТОТРЕКСАТОМ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ

☐ трансаминазы, клиренс креатинина, клинический анализ крови, состояние легких по данным рентгенографии

Блок: Блок 27 | № 2635

2635. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ ПАЦИЕНТА, ПОЛУЧАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (ФОРМА №025/У), ОФОРМЛЯЕТСЯ ПЕРВИЧНО

☐ в регистратуре

Блок: Блок 27 | № 2636

2636. ДЛЯ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ ЛЮБОЙ ЭТИОЛОГИИ ХАРАКТЕРНО ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

☐ трансаминаз

Блок: Блок 27 | № 2637

2637. ПРИ КОМБИНАЦИИ ВАРФАРИНА И ФТОРХИНОЛОНОВ НАБЛЮДАЕТСЯ

☐ повышение международного нормализованного отношения

Блок: Блок 27 | № 2638

2638. ПРИ ПНЕВМОНИИ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ____ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ

☐ внутривенный

Блок: Блок 27 | № 2639

2639. ПРИ ЭМФИЗЕМЕ ЛЁГКИХ ДЫХАНИЕ

☐ везикулярное ослабленное

Блок: Блок 27 | № 2640

2640. ОСНОВОЙ ЛЕЧЕНИЯ СКАРЛАТИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ антибактериальная терапия

Блок: Блок 27 | № 2641

2641. ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ, ВЫЗВАННОЙ ЛЕГИОНЕЛЛОЙ, ПРОВОДИТСЯ

☐ Азитромицином

Блок: Блок 27 | № 2642

2642. ДЕЙСТВИЕ ИНСУЛИНА СВЯЗАНО С

☐ анаболическим эффектом

Блок: Блок 27 | № 2643

2643. УЛУЧШИТЬ ОТДАЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ КРУПНООЧАГОВЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ПОЗВОЛЯЮТ

☐ β-блокаторы

Блок: Блок 27 | № 2644

2644. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПНЕВМОНИЮ, ВЫЗВАННУЮ ПНЕВМОКОККОМ, СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

☐ пенициллины

Блок: Блок 27 | № 2645

2645. ОСНОВОЙ ПАТОГЕНЕЗА ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЮТСЯ _____ ПРОЦЕССЫ

☐ аутоиммунные

Блок: Блок 27 | № 2646

2646. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЛЕЧЕБНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ПРИ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ постуральный дренаж

Блок: Блок 27 | № 2647

2647. ОТЛИЧИЕ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ОТ ДРУГИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

☐ интерстициальном расположении очагов в легких

Блок: Блок 27 | № 2648

2648. ДЛЯ НАРУШЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК ХАРАКТЕРНА

☐ гипоизостенурия

Блок: Блок 27 | № 2649

2649. ИЗМЕНЕНИЕМ В КРОВИ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОСТРОЙ СТАДИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ увеличение уровня тропонина

Блок: Блок 27 | № 2650

2650. РИСК ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ УВЕЛИЧИВАЕТ

☐ неблагоприятный семейный анамнез ССЗ

Блок: Блок 27 | № 2651

2651. ДЛЯ МЕНИНГОКОКЦЕМИИ ХАРАКТЕРНА СЫПЬ

☐ геморрагическая с некрозом в центре

Блок: Блок 27 | № 2652

2652. ПРИ ГЕПАТОКАРЦИНОМЕ В КРОВИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ

☐ альфафетопротеина

Блок: Блок 27 | № 2653

2653. ГИПЕРСПЛЕНИЗМ ДИАГНОСТИРУЮТ ПРИ СОЧЕТАНИИ СПЛЕНОМЕГАЛИИ И

☐ лейкопении, анемии, тромбоцитопении

Блок: Блок 27 | № 2654

2654. В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДЕКОМПЕНСИРОВАННЫМ ЛЕГОЧНЫМ СЕРДЦЕМ НЕ ОПРАВДАНО ПРИМЕНЕНИЕ

☐ сердечных гликозидов

Блок: Блок 27 | № 2655

2655. ДЛЯ БОЛЬНОГО С ДИАГНОЗОМ «ДИФфуЗНЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ» ХАРАКТЕРНЫ

☐ раздражительность, возбудимость

Блок: Блок 27 | № 2656

2656. ЗАБОЛЕВАНИЕМ НАДПОЧЕЧНИКОВ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ ПРИ ОПУХОЛЕВОМ ПОРАЖЕНИИ КОРКОВОГО ВЕЩЕСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кортикостерома

Блок: Блок 27 | № 2657

2657. ВЫСОКИЙ РИСК ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫХ СУДОРОГ СУЩЕСТВУЕТ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГАНЦИКЛОВИРА С

☐ имипенемом

Блок: Блок 27 | № 2658

2658. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОМУ ПРИЗНАКУ ЭКГ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОТНОСЯТ

☐ гипертрофию левого желудочка

Блок: Блок 27 | № 2659

2659. В ПОНЯТИЕ «РЕЗОРБЦИОННО-НЕКРОТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ» НЕ ВХОДИТ

☐ увеличение уровня щелочной фосфатазы

Блок: Блок 27 | № 2660

2660. ПОКАЗАТЕЛЬ СООТНОШЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТ

☐ соотношение двух разнородных совокупностей

Блок: Блок 27 | № 2661

2661. СОЧЕТАНИЕ ЛИХОРАДКИ, ГОЛОВНОЙ БОЛИ, БОЛЕЗНЕННОСТИ В ИЛЕОЦЕКАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, СКУДНОЙ РОЗЕОЛЕЗНОЙ СЫПИ И ГЕПАТОМЕГАЛИИ УКАЗЫВАЕТ НА

☐ брюшной тиф

Блок: Блок 27 | № 2662

2662. БОЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ РЕКОМЕНДОВАНО ПРИНИМАТЬ ПИЩУ _____ В СУТКИ

☐ 4-5 раз

Блок: Блок 27 | № 2663

2663. ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН

☐ акроцианоз

Блок: Блок 27 | № 2664

2664. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ИСПОЛЬЗУЮТ ПОКАЗАТЕЛЬ

☐ отношение ОФВ1/ФЖЕЛ

Блок: Блок 27 | № 2665

2665. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ АКАРБОЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ хроническое заболевание кишечника с заметными нарушениями пищеварения и всасывания

Блок: Блок 27 | № 2666

2666. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ПОТЕРИ СОЗНАНИЯ 52-ЛЕТНЕГО МУЖЧИНЫ (ЛИЦО СИММЕТРИЧНО, ПАТОЛОГИЧЕСКИХ РЕФЛЕКСОВ НЕТ, ПУЛЬС 40 В МИНУТУ, АД 160/60 ММ РТ.СТ.) ЯВЛЯЕТСЯ

☐ полная А-V блокада

Блок: Блок 27 | № 2667

2667. ГИПОХРОМИЯ ЭРИТРОЦИТОВ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ

☐ талассемии

Блок: Блок 27 | № 2668

2668. ИЗМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ЛЕКАРСТВ У ПОЖИЛЫХ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СВЯЗАНО

☐ со снижением активности печеночных ферментов

Блок: Блок 27 | № 2669

2669. КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ АНГИНОЗНО-БУБОННОЙ ФОРМЫ ТУЛЯРЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ односторонний тонзиллит с серовато-белым налетом, малоблезненный бубон в углочелюстной области

Блок: Блок 27 | № 2670

2670. ОРГАНИЧЕСКИЕ НИТРАТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ДОНОРАМИ

☐ NO

Блок: Блок 27 | № 2671

2671. ЭОЗИНОФИЛИЯ В МОКРОТЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ бронхиальной астмы

Блок: Блок 27 | № 2672

2672. КОРРИГИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дислипидемия

Блок: Блок 27 | № 2673

2673. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ метотрексат

Блок: Блок 27 | № 2674

2674. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ

☐ тиреотропного гормона

Блок: Блок 27 | № 2675

2675. ПАЛЬПАЦИЯ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ МОЖЕТ ОБНАРУЖИТЬ

☐ усиление голосового дрожания

Блок: Блок 27 | № 2676

2676. ПРИМЕРОМ МЕСТНОГО ОТЕКА МОЖЕТ БЫТЬ

☐ отёк при воспалении сустава

Блок: Блок 27 | № 2677

2677. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ

☐ Гидрокортизон

Блок: Блок 27 | № 2678

2678. ОБЪЕКТОМ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ риск наступления страхового случая

Блок: Блок 27 | № 2679

2679. К РАННИМ ПРИЗНАКАМ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ОТНОСИТСЯ

☐ артрит

Блок: Блок 27 | № 2680

2680. СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРЕДПОЛАГАЕТ

☐ лицензирование и аккредитацию ресурсной базы учреждений здравоохранения

Блок: Блок 27 | № 2681

2681. ВЕДУЩИМ (ГЛАВНЫМ) МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ СТЕНОКАРДИИ ПРИНЦМЕТАЛА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ коронарный спазм

Блок: Блок 27 | № 2682

2682. МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВРАЧОМ ПОЛИКЛИНИКИ, ЕСЛИ

☐ пациент регулярно наблюдался в данной поликлинике и умер дома

Блок: Блок 27 | № 2683

2683. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бензилпенициллин

Блок: Блок 27 | № 2684

2684. К ОБЩИМ ПРАВИЛАМ ВЗЯТИЯ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ ДЛЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТНОСЯТ

☐ взятие крови натощак

Блок: Блок 27 | № 2685

2685. ПОД ПЕРВИЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ПОНИМАЕТСЯ ЧАСТОТА

☐ новых, нигде ранее не учтенных и впервые в данном календарном году выявленных среди населения заболеваний

Блок: Блок 27 | № 2686

2686. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ В КРОВИ

☐ тропонина

Блок: Блок 27 | № 2687

2687. СУТОЧНЫЙ РИТМ АД ТИПА NIGHT-PICKER ДИАГНОСТИРУЕТСЯ В СЛУЧАЕ, КОГДА

☐ ночные значения АД выше, чем дневные

Блок: Блок 27 | № 2688

2688. НАИБОЛЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ИНФОРМАТИВНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА БОЛЬНЫМИ В СТАДИИ РЕМИССИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ суточная протеинурия

Блок: Блок 27 | № 2689

2689. ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ГЕПАРИНА СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

☐ Протамина сульфат

Блок: Блок 27 | № 2690

2690. КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ ПРИ КАРДИОГЕННОМ ШОКЕ

☐ бледные, холодные

Блок: Блок 27 | № 2691

2691. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ МЕТОДОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ лазерная фотокоагуляция

Блок: Блок 27 | № 2692

2692. ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА НИЖНЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ХАРАКТЕРНА

☐ элевация сегмента ST в отведениях II, III, aVF

Блок: Блок 27 | № 2693

2693. ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ВТОРОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ ВРАЧУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ СТАЖ РАБОТЫ ПО

☐ соответствующей врачебной специальности не менее 3 лет

Блок: Блок 27 | № 2694

2694. РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ НАИБОЛЕЕ ВЫСОК ПРИ НАЛИЧИИ КОНТАКТОВ

☐ внутрисемейных

Блок: Блок 27 | № 2695

2695. РЕПЕРFUЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТАМ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ЦЕЛЕСООБРАЗНА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ СИМПТОМОВ МЕНЕЕ ____ ЧАСОВ

☐ 12

Блок: Блок 27 | № 2696

2696. К СИМПТОМАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА, ОТНОСЯТ

☐ латеральную девиацию суставов кистей

Блок: Блок 27 | № 2697

2697. ИНВАЛИДНОСТЬ I ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА

☐ 2 года

Блок: Блок 27 | № 2698

2698. ПРИ ПНЕВМОНИИ ЛЁГКОГО ТЕЧЕНИЯ ПРЕДПОЧТИТЕЛЕН ____ ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ

☐ пероральный

Блок: Блок 27 | № 2699

2699. НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЙ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ВВЕДЕНИЕ ОПИОИДНЫХ АНАЛЬГЕТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ угнетение дыхания

Блок: Блок 27 | № 2700

2700. ОБСТРУКТИВНЫЙ ТИП ГИПОВЕНТИЛЯЦИИ ЛЁГКИХ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

☐ нарушении проходимости воздухоносных путей

Блок: Блок 27 | №

. АД в ночные часы по сравнению с дневными часами ниже чем на 10%

☐ ночные значения АД выше, чем дневные

Блок 28

Блок: Блок 28 | № 2701

2701. СТАНДАРТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УТВЕРЖДАЮТСЯ

☐ Министерством здравоохранения РФ

Блок: Блок 28 | № 2702

2702. ТЯЖЕСТЬ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ

☐ исследования функции внешнего дыхания

Блок: Блок 28 | № 2703

2703. СТУДЕНТАМ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЫДАЁТСЯ

☐ справка

Блок: Блок 28 | № 2704

2704. ДАПАГЛИФЛОЗИН ОТНОСИТСЯ К КЛАССУ

☐ ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа

Блок: Блок 28 | № 2705

2705. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ИАПФ МОЖЕТ СНИЖАТЬСЯ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРИЕМЕ

☐ нестероидных противовоспалительных средств

Блок: Блок 28 | № 2706

2706. ПОЯВЛЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА БЛАСТОВ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ острых лейкозов

Блок: Блок 28 | № 2707

2707. ДЛИТЕЛЬНОЕ КРОВОХАРКАНИЕ ПРИ СУХОМ КАШЛЕ ЗАСТАВЛЯЕТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ПОДОЗРЕВАТЬ

☐ рак бронхов

Блок: Блок 28 | № 2708

2708. ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ АНТИБИОТИКОМ, ОБЛАДАЮЩИМ НЕФРО-, ОТО- И ВЕСТИБУЛОТОКСИЧНОСТЬЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стрептомицин

Блок: Блок 28 | № 2709

2709. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПНЕВМОСКЛЕРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ компьютерная томография

Блок: Блок 28 | № 2710

2710. ОСОБЕННОСТЬЮ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение ударного объема и сердечного выброса

Блок: Блок 28 | № 2711

2711. К ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТ

☐ больного туберкулезом легких, выделяющего МБТ

Блок: Блок 28 | № 2712

2712. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ массивное затемнение легочной ткани, состоящее из очагов, сливающихся между собой, неоднородная структура тени за счет участков распада

2713. ПИЩЕВОД БАРРЕТТА ЯВЛЯЕТСЯ ОСЛОЖНЕНИЕМ

- ☐ гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

2714. ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАРУШЕННЫЕ ФУНКЦИИ ОРГАНИЗМА, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ТРУДУ

- ☐ носят временный, обратимый характер

2715. ЛАБОРАТОРНЫЙ СИМПТОМ «КРЕАТОРЕЯ» ХАРАКТЕРИЗУЕТ

- ☐ повышенное содержание в кале мышечных волокон

2716. УСИЛЕНИЕ I ТОНА СЕРДЦА МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ

- ☐ тиреотоксикозе

2717. «МИТРАЛИЗАЦИЕЙ» АОРТАЛЬНОГО ПОРОКА НАЗЫВАЮТ

- ☐ повышение давления в левом предсердии и малом круге кровообращения

2718. ПРАВО НА ЛЬГОТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ИМЕЮТ

- ☐ ветераны боевых действий

2719. ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ

- ☐ непрерывно

2720. К ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИИ ОТНОСЯТ

- ☐ вздутие живота и диарею при употреблении злаков

2721. ДАЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ О ВРЕМЕННОМ ПЕРЕВОДЕ РАБОТНИКА ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

- ☐ врачебная комиссия медицинской организации

2722. ДЛЯ БОЛЕЗНИ ТАКАЯСУ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ

- ☐ ослабленного пульса на одной из рук

Блок: Блок 28 | № 2723

2723. ПРИ КОЭФФИЦИЕНТЕ ДОСТОВЕРНОСТИ, РАВНОМ 2, ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ (%)

☐ 95,5

Блок: Блок 28 | № 2724

2724. В КЛИНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТРИХИНЕЛЛЕЗА РЕЖЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

☐ кашель

Блок: Блок 28 | № 2725

2725. НАИБОЛЬШЕЙ НЕФРОТОКСИЧНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

☐ аминогликозиды

Блок: Блок 28 | № 2726

2726. ПОЯВЛЕНИЮ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ СПОСОБСТВУЕТ ПРИЁМ

☐ изосорбида моонитрата

Блок: Блок 28 | № 2727

2727. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА (В %)

☐ $\geq 6,5$

Блок: Блок 28 | № 2728

2728. ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПОДЛЕЖАТ БЕРЕМЕННЫЕ С УРОВНЕМ ГЕМОГЛОБИНА

☐ 70 г/л и ниже

Блок: Блок 28 | № 2729

2729. К СИМПТОМАМ, ОТЛИЧАЮЩИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННУЮ ФОРМУ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ОТ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ, ОТНОСЯТ

☐ гепатоспленомегалию

Блок: Блок 28 | № 2730

2730. ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПЕРВИЧНОГО ГЕНЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ туберкулез, развившийся вследствие первичного инфицирования

Блок: Блок 28 | № 2731

2731. ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕ

☐ синтеза антидиуретического гормона в ядрах гипоталамуса

Блок: Блок 28 | № 2732

2732. ФУНИКУЛЯРНЫЙ МИЕЛОЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ АНЕМИИ

☐ В12-дефицитной

Блок: Блок 28 | № 2733

2733. ДОБРОКАЧЕСТВЕННАЯ ОПУХОЛЬ СЕРДЦА - МИКСОМА - НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ В

☐ левом предсердии

Блок: Блок 28 | № 2734

2734. ДЛЯ ОСТЕОАРТРОЗА НЕ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ скованности в движениях утром в течение 120 минут

Блок: Блок 28 | № 2735

2735. ДЛЯ НАЧАЛА МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО СОЧЕТАНИЕ ЛИХОРАДКИ, ГОЛОВНОЙ БОЛИ И

☐ нарушения сознания

Блок: Блок 28 | № 2736

2736. ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫМ ИНГИБИТОРОМ ЦОГ-2 ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Целекоксиб

Блок: Блок 28 | № 2737

2737. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Двусторонний стеноз почечных артерий

Блок: Блок 28 | № 2738

2738. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВОГО ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ У ВЗРОСЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ флюорография органов грудной клетки

Блок: Блок 28 | № 2739

2739. ДЕСТРУКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЁГКИХ ПРИ ОСТРОМ МИЛИАРНОМ ТУБЕРКУЛЁЗЕ

☐ встречаются редко

Блок: Блок 28 | № 2740

2740. ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ С ПОРАЖЕНИЕМ ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА ВСТРЕЧАЕТСЯ ТРОМБОЭМБОЛИЯ В АРТЕРИЮ

☐ легочную

Блок: Блок 28 | № 2741

2741. АНТИАНГИНАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ СТЕНОКАРДИИ ОБЛАДАЕТ

☐ Изосорбида динитрат

Блок: Блок 28 | № 2742

2742. ГЕМОРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ гиперемией лица, шеи, верхней части груди

Блок: Блок 28 | № 2743

2743. БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С

☐ ИБС (ИБС (стенокардией напряжения и постинфарктным кардиосклерозом)

2744. В КНИГЕ ЗАПИСИ ВЫЗОВОВ ВРАЧЕЙ НА ДОМ ОТМЕЧАЮТСЯ

☐ все вызовы, поступившие в течение дня, и активные посещения

2745. ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ С АГ, ПОЛУЧАЮЩИМ ЛЕЧЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА И СТЕПЕНИ РИСКА, РЕКОМЕНДУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ СНИЖАТЬ АД ДО ЗНАЧЕНИЙ МЕНЕЕ ____ ММ.РТ.СТ.

☐ 140/90

2746. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАГРУЗОЧНОГО ТРЕДМИЛ-ТЕСТА НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ТАХИКАРДИЯ С ШИРОКИМИ КОМПЛЕКСАМИ, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ИССЛЕДОВАНИЕ

☐ при любом генезе изменений, которые не ясны

2747. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фибрилляция желудочков

2748. К ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ РАКА ПИЩЕВОДА СИМПТОМАМ ОТНОСЯТ

☐ боли за грудиной

2749. У БОЛЬНОГО 50 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕГО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ III ФК, С НАЛИЧИЕМ НА ЭКГ СИНУСОВОГО РИТМА, ПОСТЕПЕННОГО УДЛИНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА RQ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫПАДЕНИЕМ КОМПЛЕКСА QRS В КАЧЕСТВЕ АНТИАНГИНАЛЬНОГО СРЕДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН

☐ нитросорбид

2750. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ сахарный диабет 2 типа

2751. ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ДИАГНОЗА «ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТ» С НАЛЁТОМ НА МИНДАЛИНАХ ОБЯЗАН НАЗНАЧИТЬ

☐ мазок из миндалин на дифтерию

2752. ПРИ ДИФУЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ УРОВЕНЬ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА

☐ понижен

2753. ПРИЗНАКОМ ПЕРФОРАЦИИ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ригидность передней брюшной стенки

Блок: Блок 28 | № 2754

2754. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АТИПИЧНУЮ ЭТИОЛОГИЮ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ макролиды

Блок: Блок 28 | № 2755

2755. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИМЕНЯЮТСЯ

☐ препараты десмопрессина

Блок: Блок 28 | № 2756

2756. У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ЛЕЧЕНИЕ ПНЕВМОНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

☐ амоксициллина

Блок: Блок 28 | № 2757

2757. АКАРБОЗА ОТНОСИТСЯ К ПЕРОРАЛЬНЫМ САХАРОСНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ КЛАССА

☐ ингибиторов альфа-глюкозидаз

Блок: Блок 28 | № 2758

2758. УСИЛЕНИЕ II ТОНА НА АОРТЕ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ

☐ эссенциальной гипертензии

Блок: Блок 28 | № 2759

2759. ПРИ ДИЕТОТЕРАПИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ВКЛЮЧЕНИЕ БЕЛКОВЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ ДРОБНОМ ПИТАНИИ ПРИВЕДЕТ К

☐ снижению агрессивности желудочного содержимого

Блок: Блок 28 | № 2760

2760. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ

☐ катаракта

Блок: Блок 28 | № 2761

2761. ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ митральном стенозе

Блок: Блок 28 | № 2762

2762. ЦЕЛЬЮ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гарантирование медицинской помощи при страховом случае

Блок: Блок 28 | № 2763

2763. ПАЦИЕНТАМ С АГ И ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ

☐ спиронолактон

Блок: Блок 28 | № 2764

2764. В ПЕРВУЮ НЕДЕЛЮ БРЮШНОГО ТИФА ВОЗБУДИТЕЛЬ ЧАЩЕ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ В СУБСТРАТЕ

☐ крови

Блок: Блок 28 | № 2765

2765. К НЕРАЦИОНАЛЬНЫМ КОМБИНАЦИЯМ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТ СОЧЕТАНИЕ

☐ бета-адреноблокатора и недигидропиридинового блокатора медленных кальциевых каналов

Блок: Блок 28 | № 2766

2766. ОБНАРУЖЕНИЕ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ С ИНФИЛЬТРАТОМ В ЛЕГКОМ И НАЛИЧИЕМ МИКОБАКТЕРИЙ В МОКРОТЕ СООТВЕТСТВУЕТ

☐ несвоевременному выявлению туберкулеза

Блок: Блок 28 | № 2767

2767. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА, ВЫЗВАННОГО СТРЕПТОКОККАМИ, ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ пенициллины и аминогликозиды

Блок: Блок 28 | № 2768

2768. ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ, ОСЛОЖНЕННОМ ОТЕКОМ ЛЁГКИХ, ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ В/В ВВЕДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Нитроглицерин

Блок: Блок 28 | № 2769

2769. СТАДИЯ ОСТРОЙ ЛЕВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ IV СТЕПЕНИ ПО KILLIP СООТВЕТСТВУЕТ

☐ кардиогенному шоку

Блок: Блок 28 | № 2770

2770. РОСЗДРАВНАДЗОР ПРОВОДИТ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

☐ государственный

Блок: Блок 28 | № 2771

2771. ХАРАКТЕР ЭКСТРЕННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ТРОМБОЛИЗИС) ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ положением сегмента ST относительно изоэлектрической линии на электрокардиограмме

Блок: Блок 28 | № 2772

2772. СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВО ВРЕМЯ АМБУЛАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БЕСКАМЕННОГО ХОЛЕЦИСТИТА СОСТАВЛЯЕТ (ДЕНЬ)

☐ 14-20

Блок: Блок 28 | № 2773

2773. ПРИ КАПИЛЛЯРНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ этамзилат натрия

Блок: Блок 28 | № 2774

2774. ОСЛОЖНЕНИЕМ ТРОПИЧЕСКОЙ МАЛЯРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кома

Блок: Блок 28 | № 2775

2775. ДЛЯ ОЦЕНКИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НАИБОЛЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫ ДАННЫЕ

☐ эхокардиографии

Блок: Блок 28 | № 2776

2776. КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ АСЦИТА У ПАЦИЕНТА С ДИАГНОЗОМ «ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ» ИГРАЕТ

☐ портальная гипертензия

Блок: Блок 28 | № 2777

2777. САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ атеросклероз коронарных артерий

Блок: Блок 28 | № 2778

2778. ДИАГНОЗ «МАЛЯРИЯ» ПОДТВЕРЖДАЕТ

☐ исследование толстой капли крови и мазка крови на наличие паразита

Блок: Блок 28 | № 2779

2779. ОСНОВНЫМ ЦИТОХИМИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ ОСТРОГО МИЕЛОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА

☐ миелопероксидазу

Блок: Блок 28 | № 2780

2780. УВЕЛИЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ХОЛЕСТЕРИНА МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНО ПРИМЕНЕНИЕМ

☐ тиазидных диуретиков

Блок: Блок 28 | № 2781

2781. ПРЕПАРАТОМ, СПОСОБНЫМ ВЫЗВАТЬ АПЛАСТИЧЕСКУЮ АНЕМИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ хлорамфеникол

Блок: Блок 28 | № 2782

2782. К СНИЖЕНИЮ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ НАЗНАЧЕНИЕ

☐ Индометацина

Блок: Блок 28 | № 2783

2783. НАЛИЧИЕ ЭРОЗИЙ В АНТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ хеликобактерной инфекции

Блок: Блок 28 | № 2784

2784. ЭКССУДАЦИЯ ЖИДКОСТИ В ПЛЕВРАЛЬНУЮ ПОЛОСТЬ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗНОМ ПЛЕВРИТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЛЕВРОЙ

☐ висцеральной

Блок: Блок 28 | № 2785

2785. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ДОКСОРУБИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ рак пищевода

Блок: Блок 28 | № 2786

2786. ДИАРЕЯ НЕ ПОДДАЕТСЯ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ

☐ эозинофильном энтерите

Блок: Блок 28 | № 2787

2787. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аденома гипофиза, секретирующая адренотропный гормон

Блок: Блок 28 | № 2788

2788. АНАЛЬНЫЙ ЗУД ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ энтеробиозе

Блок: Блок 28 | № 2789

2789. У МАЛЬЧИКА 5 ЛЕТ С АГ И ЖАЛОБАМИ НА БОЛИ В ГОЛЕНЯХ ПРИ ХОДЬБЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ

☐ коарктацию аорты

Блок: Блок 28 | № 2790

2790. ПРИЁМ СТАТИНОВ СЛЕДУЕТ ОТМЕНИТЬ В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ НА ФОНЕ МИАЛГИЙ ПОВЫШЕНИЯ В КРОВИ АКТИВНОСТИ КФК В ____ РАЗ

☐ 10

Блок: Блок 28 | № 2791

2791. ВАЖНЕЙШИМ КРИТЕРИЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кашель с мокротой не менее 3 мес в году на протяжении последних двух лет

Блок: Блок 28 | № 2792

2792. ПОД БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ ПОНИМАЮТ

☐ нарушение прохождения воздушного потока по мелким и средним бронхам

Блок: Блок 28 | № 2793

2793. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ИСТИННОГО КАРДИОГЕННОГО ШОКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ артериальная гипотония

Блок: Блок 28 | № 2794

2794. МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ИМЕЮЩИМ РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МИОКАРДИТА И ИБС, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ коронарография

Блок: Блок 28 | № 2795

2795. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ С ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ХАРАКТЕР СТУЛА

☐ обильный, кашицеобразный, блестящий

Блок: Блок 28 | № 2796

2796. ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ ГРИППА ВОЗРАСТАЕТ ЧАСТОТА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПНЕВМОНИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ

☐ гемофильной палочкой

Блок: Блок 28 | № 2797

2797. ФАКТОРОМ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИМ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОСТИНФЕКЦИОННОГО СИНДРОМА РАЗДРАЖЁННОЙ КИШКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ перенесённая кишечная инфекция

Блок: Блок 28 | № 2798

2798. ПРИЗНАКОМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кровоизлияния и/или отек соска зрительного нерва

Блок: Блок 28 | № 2799

2799. ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ

☐ плоских костей

Блок: Блок 28 | № 2800

2800. РЕГИСТРАЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗУБЦА Q И ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST В ОТВЕДЕНИЯХ V1-V3 ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ ____ ИНФАРКТА МИОКАРДА

☐ передне-перегородочного

Блок: Блок 28 | №

. ХОЛЕЦИСТИТА СОСТАВЛЯЕТ (ДЕНЬ)

☐ 14-20

Блок: Блок 28 | №

. ДЛЯ ОЦЕНКИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НАИБОЛЕЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫ ДАННЫЕ

☐ эхокардиографии

Блок 29

Блок: Блок 29 | № 2801

2801. БЕРЕМЕННОЙ, СТРАДАЮЩЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, МОЖНО НАЗНАЧИТЬ

☐ метилдопу

Блок: Блок 29 | № 2802

2802. ХАРАКТЕРНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ СИМПТОМОМ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ систолический шум на верхушке

Блок: Блок 29 | № 2803

2803. ДЛЯ РАСЧЁТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НЕОБХОДИМЫ ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ДАННОМ ГОДУ, И

☐ среднегодовой численности населения

Блок: Блок 29 | № 2804

2804. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К МАССАЖУ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ хронический остеомиелит

Блок: Блок 29 | № 2805

2805. У АМБУЛАТОРНОГО ПАЦИЕНТА С ХОБЛ УРОВЕНЬ ПОСТБРОНХОДИЛАТАЦИОННОГО ОФВ1 В 46% СООТВЕТСТВУЕТ ____ СТЕПЕНИ ОБСТРУКЦИИ

☐ тяжелой

Блок: Блок 29 | № 2806

2806. ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКИЙ ГЕПАТИТ С» УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

☐ выявления РНК HCV

Блок: Блок 29 | № 2807

2807. ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ» УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

☐ кашля с мокротой на протяжении, по крайней мере, 3 месяцев в году в течение 2 лет и более

Блок: Блок 29 | № 2808

2808. ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИИ ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

☐ эритропоэтина

Блок: Блок 29 | № 2809

2809. ЗАБОЛЕВАНИЕМ, СВЯЗАННЫМ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПЕРПРОДУКЦИЕЙ СОМАТОТРОПНОГО ГОРМОНА У ВЗРОСЛЫХ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ акромегалия

Блок: Блок 29 | № 2810

2810. ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

☐ ограничение хлорида натрия до 1,5 г/сут

Блок: Блок 29 | № 2811

2811. ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПРЕПАРАТАМИ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ

☐ гипогликемического состояния

Блок: Блок 29 | № 2812

2812. ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ПОЧТИ ВСЕГДА ЗАТРАГИВАЕТ СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ____ КИШКИ

☐ прямой

Блок: Блок 29 | № 2813

2813. ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ ПРИ ХОЛЕРЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиповолемический шок

Блок: Блок 29 | № 2814

2814. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ легочная артериальная гипертензия

Блок: Блок 29 | № 2815

2815. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ рефрактерная к комбинированной терапии АГ

Блок: Блок 29 | № 2816

2816. НА РАННИХ СТАДИЯХ АМИЛОИДОЗА НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ БИОПСИЯ

☐ слизистой прямой кишки

Блок: Блок 29 | № 2817

2817. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ ГИПОТОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ передозировка антигипертензивных препаратов

Блок: Блок 29 | № 2818

2818. ПРИ ДОСТИЖЕНИИ РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА 17 ЛЕТ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) И ПЕРЕДАЧЕ ЕГО НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДАННЫЕ ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА (УЧЕТНАЯ ФОРМА N 112/У) ПЕРЕНОСЯТСЯ В ФОРМУ N

☐ 052-1/у «Вкладной лист на подростка к медицинской карте амбулаторного больного»

Блок: Блок 29 | № 2819

2819. ОСМОЛЯРНОСТЬ КРОВИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАВИСИТ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ В ПЛАЗМЕ

☐ глюкозы

Блок: Блок 29 | № 2820

2820. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭРИТРОЦИТАРНОЙ ШИЗОГОНИИ ПРИ ТРЕХДНЕВНОЙ МАЛЯРИИ СОСТАВЛЯЕТ (ЧАС)

☐ 48

Блок: Блок 29 | № 2821

2821. СИНДРОМ РЕЙНО ЧАЩЕ ВСЕГО АССОЦИИРУЕТСЯ С

☐ системной склеродермией

Блок: Блок 29 | № 2822

2822. ВНУТРИВЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ ДИЛТИАЗЕМА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

☐ купирования приступа атриовентрикулярной узловой тахикардии

Блок: Блок 29 | № 2823

2823. 2823 К ОСНОВНЫМ СИМПТОМАМ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА НЕ ОТНОСИТСЯ

☐ понижение АД

Блок: Блок 29 | № 2824

2824. 2824 ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА «САЛЬМОНЕЛЛЕЗ» ПРОВОДЯТ

☐ бактериологическое исследование кала

Блок: Блок 29 | № 2825

2825. 2825 ОЖИРЕНИЕ 2 СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВУЕТ ИНДЕКСУ МАССЫ ТЕЛА (В КГ/М²)

☐ 35,0-39,9

Блок: Блок 29 | № 2826

2826. 2826 ПРОЛИФЕРАТИВНАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ наличием новообразованных сосудов на сетчатке

Блок: Блок 29 | № 2827

2827. 2827 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПРИКРЕПЛЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ В ГОРОДЕ СОСТАВЛЯЕТ ____ ЧЕЛОВЕК ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ

☐ 1700

Блок: Блок 29 | № 2828

2828. 2828 БОЛИ В СУСТАВАХ ПРИ НАГРУЗКЕ, ПРОХОДЯЩИЕ В ПОКОЕ, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ остеоартрита

Блок: Блок 29 | № 2829

2829. 2829 ИЗ ПОРАЖЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ крупноочаговый кардиосклероз

Блок: Блок 29 | № 2830

2830. 2830 ПРИЧИНОЙ АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА У ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

☐ атеросклероз

Блок: Блок 29 | № 2831

2831. 2831 ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ осложненный пиелонефрит

Блок: Блок 29 | № 2832

2832. 2832 В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА С ПНЕВМОНИЕЙ ДВА АНТИБИОТИКА НЕОБХОДИМЫ В СЛУЧАЕ

☐ тяжелого течения пневмонии

Блок: Блок 29 | № 2833

2833. 2833 ИНГИБИТОРЫ АПФ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ БОЛЬНЫМ С

☐ двусторонним стенозом почечных артерий

Блок: Блок 29 | № 2834

2834. 2834 НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВЫСТУПАЕТ

☐ внутриспеченочный блок при циррозе печени

Блок: Блок 29 | № 2835

2835. 2835 К МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, КОТОРЫЙ ОБЪЕКТИВНО ВЫЯВЛЯЕТ ПРИЗНАКИ ДИСФУНКЦИИ СЕРДЦА НА ЕЁ РАННИХ СТАДИЯХ, ОТНОСЯТ

☐ определение уровня мозгового натрий-уретического пептида

Блок: Блок 29 | № 2836

2836. 2836 В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕТИ К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОТНОСЯТ

☐ диагностику туберкулеза у больных

Блок: Блок 29 | № 2837

2837. 2837 ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА «ПНЕВМОНИЯ» ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие очагово-инфильтративных изменений по результатам рентгенологического исследования

Блок: Блок 29 | № 2838

2838. 2838 ПАЦИЕНТ С ВЫРАЖЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ И ОГРАНИЧЕНИЕМ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2-3 СТЕПЕНИ ПРИЗНАЕТСЯ

☐ инвалидом 2 группы

Блок: Блок 29 | № 2839

2839. 2839 ХОЛЕСТАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ

☐ первичного билиарного цирроза

Блок: Блок 29 | № 2840

2840. 2840 ПРЕПАРАТОМ ГРУППЫ ФУМАРАТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ферретаб

Блок: Блок 29 | № 2841

2841. 2841 ОСНОВНЫМ АНТИБИОТИКОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА, ВЫЗВАННОГО МЕТИЦИЛЛИН-РЕЗИСТЕНТНЫМИ КОККАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ванкомицин

Блок: Блок 29 | № 2842

2842. 2842 ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ АНЕМИИ ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ ХБП ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

☐ эритропоэтина

Блок: Блок 29 | № 2843

2843. 2843 ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ОБОЗНАЧАЮТ

☐ HbA1c

Блок: Блок 29 | № 2844

2844. 2844 ПРИЗНАКОМ СИНДРОМА ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ОСТРОЙ ДИЗЕНТЕРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ лихорадка

Блок: Блок 29 | № 2845

2845. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИ ПРИЕМЕ

☐ нитратов

Блок: Блок 29 | № 2846

2846. АНГИПЕРТЕНЗИВНЫМ ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Метилдопа

Блок: Блок 29 | № 2847

2847. У ПАЦИЕНТКИ, ЖЕНЩИНЫ 60 ЛЕТ, С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 1 СТЕПЕНИ, ВЫРАЖЕННОЙ ПРОТЕИНУРИЕЙ (ДО 18-20 Г/СУТ), ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ БЕЛКА В ПЛАЗМЕ КРОВИ (95 Г/Л), МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ ДИАГНОЗ

☐ миеломная болезнь

Блок: Блок 29 | № 2848

2848. КЛАПАННЫМ ПОРОКОМ, ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЮТСЯ ОБМОРОКИ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аортальный стеноз

Блок: Блок 29 | № 2849

2849. ОКРУГЛОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛЕГКИХ С ЧЕТКИМИ КОНТУРАМИ И НАЛИЧИЕМ ОЧАГОВ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ

☐ туберкулёме

Блок: Блок 29 | № 2850

2850. НАМЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЕТ МЕДИЦИНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С

☐ решением врачебной комиссии

Блок: Блок 29 | № 2851

2851. К ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ АГ ОТНОСЯТ

☐ блокаторы рецепторов ангиотензина II

Блок: Блок 29 | № 2852

2852. ОТЕК ПОДКОЖНОЙ КЛЕТЧАТКИ ШЕИ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ АНГИНЫ ПРИ

☐ дифтерии

Блок: Блок 29 | № 2853

2853. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЕЁ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ВКЛЮЧЕНЫ В

☐ порядки оказания медицинской помощи

Блок: Блок 29 | № 2854

2854. ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ «АПЛАСТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ», ЯВЛЯЕТСЯ

☐ жировой метаморфоз кроветворного костного мозга в трепанобиоптате подвздошной кости

Блок: Блок 29 | № 2855

2855. ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ НАБЛЮДАЕТСЯ ЖЕЛТУХА

☐ паренхиматозная

Блок: Блок 29 | № 2856

2856. ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ С ЛЕГКИМ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ НЕОБХОДИМО

☐ напоить пациента сладким чаем

Блок: Блок 29 | № 2857

2857. ЛЕЧЕНИЕ КОЛИТИЧЕСКОГО ВАРИАНТА ШИГЕЛЛЕЗА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

☐ ципрофлоксацина

Блок: Блок 29 | № 2858

2858. ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ И СЛИЗИСТЫХ, ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИЯ, СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ полицитемии

Блок: Блок 29 | № 2859

2859. ГЕПАРИН

☐ инактивирует тромбин (фактор II свертывания крови)

Блок: Блок 29 | № 2860

2860. СТАНДАРТНОЙ СХЕМОЙ ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ХЕЛИКОБАКТЕРОМ ПИЛОРИ, ЯВЛЯЕТСЯ ____ В СУТКИ

☐ ингибитор протонной помпы + амоксициллин 1000 мг 2 раза + кларитромицин 500 мг 2 раза + висмута трикалия дицитрат 240 мг 2 раза

Блок: Блок 29 | № 2861

2861. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ ГРИБКОВОЙ ЭТИОЛОГИИ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Амфотерицин В

Блок: Блок 29 | № 2862

2862. БОЛЬНЫМ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ

☐ бета-адреноблокаторы

Блок: Блок 29 | № 2863

2863. ОСНОВНЫМ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ В РАЗВИТИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инфицирование хеликобактер пилори

Блок: Блок 29 | № 2864

2864. ПРИ РАЗВИТИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА УРОВЕНЬ ТРОПОНИНОВ В КРОВИ ПОВЫШАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ____ ЧАСА/ЧАСОВ ОТ НАЧАЛА ПРИСТУПА

☐ 3-4

Блок: Блок 29 | № 2865

2865. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПНЕВМОНИИ, КОТОРЫЙ ПРИВОДИТ К ДЕСТРУКЦИИ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стафилококк

Блок: Блок 29 | № 2866

2866. ПРИ ОБОСТРЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ диспепсический

Блок: Блок 29 | № 2867

2867. НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННЫЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУТ ПРИ ПРИЕМЕ

☐ Розувастатина

Блок: Блок 29 | № 2868

2868. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ПРИ ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ ____ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

☐ 140

Блок: Блок 29 | № 2869

2869. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЛЕГКИХ НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ С

☐ рентгенографии органов грудной клетки

Блок: Блок 29 | № 2870

2870. ЭТИОЛОГИЮ ФОКУСНОЙ ТЕНИ В ЛЁГКОМ ПОЗВОЛИТ УТОЧНИТЬ

☐ гистологическое и бактериологическое исследование патологического материала

Блок: Блок 29 | № 2871

2871. ОСНОВНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ легочный инфильтрат

Блок: Блок 29 | № 2872

2872. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТЕРНАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ СЛЕДУЕТ

☐ наклеить стерильную повязку на место прокола

Блок: Блок 29 | № 2873

2873. САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ЛЁГОЧНОГО СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ хроническая обструктивная болезнь легких

Блок: Блок 29 | № 2874

2874. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ В КРОВИ ТРОПОНИНА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА СОСТАВЛЯЕТ

☐ до 14 дней

Блок: Блок 29 | № 2875

2875. К АНТИХОЛИНЕРГИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

☐ ипратропия бромид

Блок: Блок 29 | № 2876

2876. АНТИТЕЛА К РЕЦЕПТОРУ ТТГ ЯВЛЯЮТСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИМ МАРКЕРОМ

☐ диффузного токсического зоба

Блок: Блок 29 | № 2877

2877. ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ контроль уровня гликемии

Блок: Блок 29 | № 2878

2878. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОБЫ С В2-АГОНИСТАМИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ____ ОФВ1 БОЛЕЕ ____ %

☐ приростом; 12

Блок: Блок 29 | № 2879

2879. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ «ЗАКЛИНИВАНИЕ» СУСТАВА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ остеоартроза

Блок: Блок 29 | № 2880

2880. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ

☐ дискинезии желчного пузыря

Блок: Блок 29 | № 2881

2881. ПОРОГОВЫЙ УРОВЕНЬ ОФИСНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ СОСТАВЛЯЕТ (ММ РТ.СТ.)

☐ 140/90

Блок: Блок 29 | № 2882

2882. К ГИПЕРТРОФИИ И ДИЛАТАЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ПРИВОДИТ

☐ перегрузка левого желудочка объёмом

Блок: Блок 29 | № 2883

2883. К ОГРАНИЧЕНИЮ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ВТОРОЙ СТЕПЕНИ ОТНОСЯТ ____ САМООБСЛУЖИВАНИЮ

☐ способность; с использованием вспомогательных средств и (или) с помощью других лиц

Блок: Блок 29 | № 2884

2884. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ С ОБСТРУКЦИЕЙ ВЫНОСЯЩЕГО ТРАКТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ В-адреноблокаторы

Блок: Блок 29 | № 2885

2885. К САМОЙ РАСПРОСТРАНЕННОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РОССИИ ОТНОСЯТ

☐ артериальную гипертензию

Блок: Блок 29 | № 2886

2886. У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИИ ПОЧЕК РЕКОМЕНДОВАНО ПРИМЕНЯТЬ ПО ПОВОДУ СОПУТСТВУЮЩИХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

☐ лоратадин, хифенадин

Блок: Блок 29 | № 2887

2887. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТЯЖЕЛЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И СМЕРТИ У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ

☐ статины и дезагреганты

Блок: Блок 29 | № 2888

2888. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ЭКСПЕРТИЗУ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИМЕЮТ ПРАВО

☐ медицинские организации независимо от организационно-правовой формы (индивидуальные предприниматели), имеющие лицензию на осуществление экспертизы временной нетрудоспособности

Блок: Блок 29 | № 2889

2889. ДИАГНОСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО НЕОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кашель

Блок: Блок 29 | № 2890

2890. МАКСИМАЛЬНАЯ МИНЕРАЛКОРТИКОИДНАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ СИСТЕМНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА У

☐ кортизона

Блок: Блок 29 | № 2891

2891. ИЗОЛИРОВАННАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фактором риска развития мозгового инсульта

Блок: Блок 29 | № 2892

2892. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У БОЛЬНОГО СО СНИЖЕННОЙ ПУЛЬСАЦИЕЙ АРТЕРИЙ СТОП И ИЗМЕНЕНИЯМИ НИЖНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ РЕБЕР НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ коарктация аорты

Блок: Блок 29 | № 2893

2893. ДЛЯ ЭТИОТРОПНОГО ЛЕЧЕНИЯ БРЮШНОГО ТИФА ПРИМЕНЯЮТ

☐ Ципрофлоксацин

Блок: Блок 29 | № 2894

2894. ОПТИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ТРИГЛИЦЕРИДОВ ПЛАЗМЫ ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ (ММОЛЬ/Л)

☐ 1,7

Блок: Блок 29 | № 2895

2895. ГЕМОСТАЗ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ высокой адгезией и агрегацией тромбоцитов

Блок: Блок 29 | № 2896

2896. К ТРЕТЬЕЙ ДИСПАНСЕРНОЙ ГРУППЕ ОНКОБОЛЬНЫХ ОТНОСЯТ ПАЦИЕНТОВ С

☐ раком, подвергшимся радикальному лечению

Блок: Блок 29 | № 2897

2897. К АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКАМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ

☐ свистящие хрипы на выдохе

Блок: Блок 29 | № 2898

2898. В ЭТИОЛОГИИ ПЕРВИЧНОГО ОСТЕОАРТРОЗА ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ

☐ генетический фактор

Блок: Блок 29 | № 2899

2899. МЕЛЕНА ПРИ НАЛИЧИИ ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНА НА

☐ кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода

Блок: Блок 29 | № 2900

2900. ВОЗБУДИТЕЛИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОТНОСЯТСЯ К ВИДУ

☐ бактерий

Блок 30

Блок: Блок 30 | № 2901

2901. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ЦИРРОЗА ЛЕГКОГО ЯВЛЯЮТСЯ

☐ деформация легочного рисунка, уменьшение объема пораженного участка, смещение средостения к зоне цирроза, деформация плевры

Блок: Блок 30 | № 2902

2902. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ СТАНДАРТОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТА С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ЯЗВЕННЫЙ КОЛИТ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ колоноскопия с биопсией

Блок: Блок 30 | № 2903

2903. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СПОНТАННОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО АСЦИТА-ПЕРИТОНИТА ОПТИМАЛЬНА КОМБИНАЦИЯ

☐ цефалоспоринов и альбумина

Блок: Блок 30 | № 2904

2904. РАЗВИТИЕ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ АССОЦИИРУЕТСЯ С

☐ β -гемолитическим стрептококком группы А

Блок: Блок 30 | № 2905

2905. ДЛЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ЯЗВЫ В ТЕЛЕ ЖЕЛУДКА ХАРАКТЕРНЫ ____ БОЛИ

☐ «ранние»

Блок: Блок 30 | № 2906

2906. АБСОЛЮТНЫЙ ЛИМФОЦИТОЗ НАБЛЮДАЮТ ПРИ

☐ лимфопролиферативных заболеваниях

Блок: Блок 30 | № 2907

2907. В РАЦИОНЕ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В НЕОГРАНИЧЕННОМ КОЛИЧЕСТВЕ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ

☐ помидоры, огурцы, листья салата

Блок: Блок 30 | № 2908

2908. НАИБОЛЕЕ РАННИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ОФВ1/ФЖЕЛ менее 70%

Блок: Блок 30 | № 2909

2909. СРЕДНЯЯ СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ИНСУЛИНЕ В ПУБЕРТАТНОМ ВОЗРАСТЕ СОСТАВЛЯЕТ (В ЕД/КГ МАССЫ ТЕЛА)

☐ 1.0-2.0

Блок: Блок 30 | № 2910

2910. К КЛИНИЧЕСКОМУ ПРОЯВЛЕНИЮ ЗАСТОЯ ПО МАЛОМУ КРУГУ КРОВООБРАЩЕНИЯ ОТНОСЯТ

☐ отек легких

Блок: Блок 30 | № 2911

2911. К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСЯТ

☐ паллиативную

Блок: Блок 30 | № 2912

2912. БОЛЬ В ОБЛАСТИ ВЕРХУШКИ СЕРДЦА, ВОЗНИКАЮЩАЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ И ПРОХОДЯЩАЯ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ПОСЛЕ ЕЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

☐ атипичной стенокардией

Блок: Блок 30 | № 2913

2913. ОБ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

☐ повышение уровня диастазы мочи

Блок: Блок 30 | № 2914

2914. К ПРИЧИНАМ РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНОГО ДЕФОРМИРУЮЩЕГО АРТРОЗА ОТНОСЯТ

☐ функциональную перегрузку с микротравматизацией

Блок: Блок 30 | № 2915

2915. ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ СИМПТОМЫ СУХОСТИ, ОТСУТСТВИЯ СЛЮНЫ ВО РТУ, РЕЗЕЙ В ГЛАЗАХ, ОТСУТСТВИЯ СЛЕЗЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ СИНДРОМА

☐ Шегрена

Блок: Блок 30 | № 2916

2916. НАИБОЛЬШЕЙ КАЛОРИЙНОСТЬЮ В РАСЧЕТЕ НА 1 Г ОБЛАДАЮТ

☐ спирты

Блок: Блок 30 | № 2917

2917. ОСНОВНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СЕЛЬСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ этапность

Блок: Блок 30 | № 2918

2918. В СХЕМУ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ЭРАДИКАЦИИ H. PYLORI ВХОДИТ

☐ Амоксициллин

Блок: Блок 30 | № 2919

2919. ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ ПОСЛЕ НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

☐ 48-72

Блок: Блок 30 | № 2920

2920. АНГИОСПАСТИЧЕСКАЯ СТЕНОКАРДИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ подъемом ST в период боли

Блок: Блок 30 | № 2921

2921. ГЕПАТО- И СПЛЕНОМЕГАЛИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ МИЕЛОЛЕЙКОЗЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ СИНДРОМА

☐ гиперпластического

Блок: Блок 30 | № 2922

2922. КАРДИОСПЕЦИФИЧНЫМ ИЗОФЕРМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ креатинфосфокиназа MB

Блок: Блок 30 | № 2923

2923. КРИТЕРИЕМ, ОТРАЖАЮЩИМ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ферритин

Блок: Блок 30 | № 2924

2924. К ПРИОРИТЕТНЫМ ПРЕПАРАТАМ ПЕРВОГО РЯДА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ОТНОСИТСЯ

☐ метформин

Блок: Блок 30 | № 2925

2925. ДЛЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ПРИМЕНЯЮТ

☐ ацикловир

Блок: Блок 30 | № 2926

2926. ПРИ КОЛИТИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ДИЗЕНТЕРИИ ХАРАКТЕР СТУЛА ОБЫЧНО

☐ скудный, со слизью и прожилками крови

Блок: Блок 30 | № 2927

2927. НАЗНАЧЕНИЕ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ОБЫЧНО НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ

☐ предсердной экстрасистолии

Блок: Блок 30 | № 2928

2928. ПОЗДНИЕ, «ГОЛОДНЫЕ» НОЧНЫЕ БОЛИ, ЛОКАЛИЗУЮЩИЕСЯ В ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ язвенной болезни 12-перстной кишки

Блок: Блок 30 | № 2929

2929. РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В ДОКЛИНИЧЕСКОЙ СТАДИИ ПОСРЕДСТВОМ МАССОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ПАЦИЕНТОВ НАЗЫВАЕТСЯ

☐ скрининг

Блок: Блок 30 | № 2930

2930. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА В ЛЕЧЕНИИ ДЕРМАТОМИОЗИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ преднизолон

Блок: Блок 30 | № 2931

2931. ДЛЯ ДОСТОВЕРНОГО ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА УВЕЛИЧЕНИЕ БЛАСТОВ В КОСТНОМ МОЗГЕ СОСТАВЛЯЕТ (%)

☐ 20

Блок: Блок 30 | № 2932

2932. ТИПИЧНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ФАРИНГИТОВ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ вирусы

Блок: Блок 30 | № 2933

2933. ПРИЗНАКОМ ОПТИМАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ РЕНТГЕНОГРАММЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ видимость тел 3-4 верхних грудных позвонков

Блок: Блок 30 | № 2934

2934. АКЦЕНТ 2 ТОНА НАД АОРТОЙ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ

☐ артериальной гипертонии

Блок: Блок 30 | № 2935

2935. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНОГО С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

☐ пропранолола

Блок: Блок 30 | № 2936

2936. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭЗОФАГИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эзофагоскопия

Блок: Блок 30 | № 2937

2937. ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕДНИЗОЛОНА И НПВС ПОВЫШАЕТСЯ РИСК РАЗВИТИЯ

☐ гастродуоденальных кровотечений

Блок: Блок 30 | № 2938

2938. ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ ГРИППА ПРОВОДИТСЯ

☐ ингибиторами нейраминидазы

Блок: Блок 30 | № 2939

2939. ПОЯВЛЕНИЕ В МОЧЕ БЕЛКА БЕНС-ДЖОНСА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ миеломной нефропатии

Блок: Блок 30 | № 2940

2940. ОСНОВНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ рентгенография

Блок: Блок 30 | № 2941

2941. ЛИХОРАДКА И БОЛИ В ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦАХ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ НАЧАЛА

☐ лептоспироза

Блок: Блок 30 | № 2942

2942. К ИНГИБИТОРАМ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ ОТНОСИТСЯ

☐ рабепразол

Блок: Блок 30 | № 2943

2943. ПРИ ПРИЁМЕ НИТРОГЛИЦЕРИНА КОНЕЧНОЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЛЕВОМ ЖЕЛУДОЧКЕ

☐ понижается

Блок: Блок 30 | № 2944

2944. ОМЕПРАЗОЛ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

☐ блокаторов протонного насоса

Блок: Блок 30 | № 2945

2945. ОСЕЛЬТАМИВИР ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЗНАМИВИРА ТЕМ, ЧТО

☐ применяется внутрь, действует за счёт активного метаболита

Блок: Блок 30 | № 2946

2946. РЕПЛИКАЦИЮ ГЕРПЕСВИРУСА ЧЕЛОВЕКА ИНГИБИРУЕТ

☐ ацикловир

Блок: Блок 30 | № 2947

2947. ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИНУСОВОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ БЕЗ ФАКТОРОВ РИСКА КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА АНТИКОАГУЛЯНТНАЯ ТЕРАПИЯ ДОЛЖНА ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ (НЕДЕЛЯ)

☐ 4

Блок: Блок 30 | № 2948

2948. ГИПОКАЛИЕМИЮ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ И УСИЛИВАТЬ

☐ гидрохлортиазид

Блок: Блок 30 | № 2949

2949. ПО ШКАЛЕ SCORE РАССЧИТЫВАЮТ РИСК РАЗВИТИЯ _____ В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ

☐ фатальных осложнений

Блок: Блок 30 | № 2950

2950. ДОСТОВЕРНЫМ АУСКУЛЬТАТИВНЫМ ПРИЗНАКОМ ФИБРИНОЗНОГО ПЛЕВРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ шум трения плевры

Блок: Блок 30 | № 2951

2951. НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ определение уровня ферритина

Блок: Блок 30 | № 2952

2952. ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА А ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ВЫЯВЛЕНИИ В КРОВИ

☐ anti- HAV IgM

Блок: Блок 30 | № 2953

2953. МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эластометрия

Блок: Блок 30 | № 2954

2954. ПЕРВИЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ КОМПЛЕКС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

☐ фокуса специфического воспаления в легком, лимфангита, внутригрудного лимфаденита

Блок: Блок 30 | № 2955

2955. ПРИ ОСМОТРЕ ПАЦИЕНТА С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ПНЕВМОНИЮ НА ДОМУ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ШКАЛЫ CRB65 НЕ ОЦЕНИВАЮТ

☐ индекс массы тела

Блок: Блок 30 | № 2956

2956. ПРИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ С СИНДРОМОМ ЭПИГАСТРАЛЬНОЙ БОЛИ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ

☐ антисекреторные препараты

Блок: Блок 30 | № 2957

2957. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОБЫ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ преходящее горизонтальное смещение сегмента ST на 1 мм и более

Блок: Блок 30 | № 2958

2958. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ СИМПТОМОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пароксизмальный непродуктивный кашель

Блок: Блок 30 | № 2959

2959. РЕПАГЛИНИД ОТНОСИТСЯ К ПЕРОРАЛЬНЫМ САХАРОСНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ КЛАССА

☐ производных бензойной кислоты

Блок: Блок 30 | № 2960

2960. ПЕРЕНОСЧИКОМ ВОЗБУДИТЕЛЯ СЫПНОГО ТИФА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЯВЛЯЕТСЯ

☐ платяная вошь

Блок: Блок 30 | № 2961

2961. ГОЛОСОВОЕ ДРОЖАНИЕ НЕ БУДЕТ ОСЛАБЛЕНО НА СТОРОНЕ ПОРАЖЕНИЯ ПРИ

☐ компрессионном ателектазе

Блок: Блок 30 | № 2962

2962. К КАТЕГОРИИ ОТДЕЛЬНЫХ «СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ БОЛЕЗНЕЙ», ПОДЛЕЖАЩИХ СПЕЦИАЛЬНОМУ УЧЕТУ, ОТНОСИТСЯ

☐ наркомания

Блок: Блок 30 | № 2963

2963. К КАЛИЙСБЕРЕГАЮЩИМ ДИУРЕТИКАМ ОТНОСИТСЯ

☐ триамтерен

Блок: Блок 30 | № 2964

2964. ОСТРЫЙ КАТАРАЛЬНЫЙ ЭЗОФАГИТ МОЖЕТ ОСЛОЖНИТЬСЯ

☐ микрокровотечением (диапедезным)

Блок: Блок 30 | № 2965

2965. ПРИ ОПРОСЕ БОЛЬНОГО С В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ МОЖНО ВЫЯВИТЬ

☐ жжение на языке, парестезии

Блок: Блок 30 | № 2966

2966. О ПЕНЕТРАЦИИ ЯЗВЫ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

☐ мелена

Блок: Блок 30 | № 2967

2967. СКАРЛАТИНОПОДОБНАЯ СЫПЬ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ краснухе

Блок: Блок 30 | № 2968

2968. ВЫСОКАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ МОЧИ (1030 И ВЫШЕ) ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ сахарного диабета

Блок: Блок 30 | № 2969

2969. МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ выраженный казеозно-некротический компонент воспаления

Блок: Блок 30 | № 2970

2970. КАЛ ПРИ ХОЛЕРЕ ИМЕЕТ ВИД

☐ «рисового отвара»

Блок: Блок 30 | № 2971

2971. ПОД ПЛЕЙОТРОПНЫМИ ЭФФЕКТАМИ СТАТИНОВ ПОНИМАЮТ

☐ их положительные свойства, не связанные с гиполипидемическим действием

Блок: Блок 30 | № 2972

2972. ЦЕЛЬЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ оценка состояния здоровья, включая определение группы здоровья и группы диспансерного наблюдения

Блок: Блок 30 | № 2973

2973. В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У БЕРЕМЕННЫХ АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ ингибиторов АПФ

Блок: Блок 30 | № 2974

2974. ОТЛИЧИЕ ПЕРВИЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ОТ ВТОРИЧНОГО ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ поражением лимфатических узлов

Блок: Блок 30 | № 2975

2975. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ атриовентрикулярная блокада 2-3 степени у пациентов без электрокардиостимулятора

Блок: Блок 30 | № 2976

2976. «ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ» БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ метотрексат

Блок: Блок 30 | № 2977

2977. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА КОННА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ антагонист альдостерона

Блок: Блок 30 | № 2978

2978. ТИПОМ ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ регрессивный

Блок: Блок 30 | № 2979

2979. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОСТРОГО БРОНХИТА НЕ ИМЕЕТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

☐ нарушение режима питания

Блок: Блок 30 | № 2980

2980. ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ СОКРАЩАЕТСЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ

☐ холецистокинина

Блок: Блок 30 | № 2981

2981. ОСЛОЖНЕНИЕМ, НЕ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ полипоз пищевода

Блок: Блок 30 | № 2982

2982. ВЕДУЩИМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КРУПНЫХ БРОНХОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кашель с мокротой

Блок: Блок 30 | № 2983

2983. ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ГИПОВОЛЕМИЮ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТом МИОКАРДА МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

☐ инфаркт миокарда правого желудочка

Блок: Блок 30 | № 2984

2984. ОЧЕНЬ БЫСТРОЕ ПОВТОРНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ В ПОЛОСТИ ПЛЕВРЫ ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ

☐ мезотелиомы (рака) плевры

Блок: Блок 30 | № 2985

2985. ПРИ ГЕМОФИЛИИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

☐ АЧТВ

Блок: Блок 30 | № 2986

2986. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ САЛЬБУТАМОЛА СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

☐ 4-6

Блок: Блок 30 | № 2987

2987. К ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ ПО СТЕПЕНИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ОТНОСЯТСЯ

☐ активные и пассивные

Блок: Блок 30 | № 2988

2988. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ КАШЛЯ НА ФОНЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНАЛАПРИЛА У БОЛЬНОГО ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ БУДЕТ ЕГО ЗАМЕНА НА

☐ кандесартан

Блок: Блок 30 | № 2989

2989. ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пневмония

Блок: Блок 30 | № 2990

2990. РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ

☐ по индивидуальной программе с учетом функционального состояния миокарда

Блок: Блок 30 | № 2991

2991. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ИНТЕРМИТТИРУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ

☐ ингаляционные глюкокортикостероиды + β 2-агонисты короткого действия по потребности

Блок: Блок 30 | № 2992

2992. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЦЕЛЕСООБРАЗНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ ципрофлоксацин

Блок: Блок 30 | № 2993

2993. АТЕРОГЕННЫМ КЛАССОМ ЛИПОПРОТЕИНОВ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ липопротеины низкой плотности

Блок: Блок 30 | № 2994

2994. К АНАЛОГАМ НУКЛЕОЗИДОВ ОТНОСИТСЯ

☐ Рибавирин

Блок: Блок 30 | № 2995

2995. ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ БОЛЕЗНИ АДДИСОНА ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ гидрокортизон

Блок: Блок 30 | № 2996

2996. ТУБЕРКУЛЁЗНАЯ ЭТИОЛОГИЯ МЕНИНГИТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

☐ обнаружением ДНК МБТ методом ПЦР при исследовании ликвора

Блок: Блок 30 | № 2997

2997. СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДРОЖАНИЕ В ПЕРИКАРДИАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПРИ

☐ стенозе устья аорты

Блок: Блок 30 | № 2998

2998. К ОСНОВНОМУ КЛИНИЧЕСКОМУ СИМПТОМУ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ОТНОСЯТ

☐ частый жидкий стул с примесью крови

Блок: Блок 30 | № 2999

2999. К БАЗИСНЫМ (ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ) СРЕДСТВАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСИТСЯ

☐ Беклометазон

Блок: Блок 30 | № 3000

3000. ОБЪЕМ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

☐ до 18 мл у женщин, до 25 мл у мужчин

Блок 31

Блок: Блок 31 | № 3001

3001. БОЛЬНОМУ В СОСТОЯНИИ АСТМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧИТЬ

☐ глюкокортикостероиды

Блок: Блок 31 | № 3002

3002. НАИБОЛЕЕ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЗАПАСЫ ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ

☐ уровень сывороточного ферритина

Блок: Блок 31 | № 3003

3003. К ГРУППЕ ГИПОХРОМНЫХ АНЕМИЙ ОТНОСИТСЯ АНЕМИЯ

☐ сидероахрестическая

Блок: Блок 31 | № 3004

3004. ДОЗА МЕТИЛПРЕДНИЗОЛОНА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ У ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ/КГ)

☐ 1-2

Блок: Блок 31 | № 3005

3005. ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ РАЗВИВАЕТСЯ

☐ относительная коронарная недостаточность

Блок: Блок 31 | № 3006

3006. ВЕЛИЧИНА БИОДОСТУПНОСТИ ВАЖНА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

☐ пути введения лекарственных средств

Блок: Блок 31 | № 3007

3007. НОЗОКОМИАЛЬНЫЕ (ГОСПИТАЛЬНЫЕ) ПНЕВМОНИИ ЧАЩЕ ВЫЗЫВАЮТСЯ

☐ грамотрицательной флорой

Блок: Блок 31 | № 3008

3008. ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ альбуминурия

Блок: Блок 31 | № 3009

3009. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ ТАКАЯСУ ХАРАКТЕРНО

☐ отсутствие пульса на одной руке

Блок: Блок 31 | № 3010

3010. У БОЛЬНОЙ 36 ЛЕТ, ДЛИТЕЛЬНО БОЛЬНОЙ РЕВМАТОИДНЫМ ПОЛИАРТРИТОМ, В МОЧЕ ОБНАРУЖЕНА ПРОТЕИНУРИЯ ДО 3,5 Г/Л. МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ РАЗВИТИЕ

☐ амилоидоза почек

Блок: Блок 31 | № 3011

3011. НЕДОСТАТОК ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ ОБУСЛАВЛИВАЕТ

☐ сонливость

Блок: Блок 31 | № 3012

3012. ПАЦИЕНТУ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ПОКАЗАНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЬБУМИНУРИИ

☐ сразу при постановке диагноза

Блок: Блок 31 | № 3013

3013. К ХАРАКТЕРНОМУ ОСЛОЖНЕНИЮ СКАРЛАТИНЫ ОТНОСЯТ

☐ гломерулонефрит

Блок: Блок 31 | № 3014

3014. ДОЗА СУХОЙ ГЛЮКОЗЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ СОСТАВЛЯЕТ

- ☐ 1,75 г/кг массы тела, но не более 75 г

Блок: Блок 31 | № 3015

3015. К ОСЛОЖНЕНИЯМ ИБС ОТНОСИТСЯ

- ☐ сердечная недостаточность левожелудочковая

Блок: Блок 31 | № 3016

3016. В МОЗГОВОМ СЛОЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ СИНТЕЗИРУЮТСЯ

- ☐ катехоламины

Блок: Блок 31 | № 3017

3017. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС ОПЛАЧИВАЕТСЯ ___ ПОМОЩЬ

- ☐ скорая медицинская

Блок: Блок 31 | № 3018

3018. ДЕФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

- ☐ фибрилляции желудочков

Блок: Блок 31 | № 3019

3019. ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ НАЗЫВАЮТ

- ☐ синдром, обусловленный системным действием опухоли на макроорганизм

Блок: Блок 31 | № 3020

3020. ОСНОВНОЙ ГРУППОЙ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ

- ☐ ингаляционные пролонгированные М-холинолитики

Блок: Блок 31 | № 3021

3021. В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К РАЗВИТИЮ ПОРОКОВ У РЕБЕНКА НАЗНАЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВИТАМИНА

- ☐ А

Блок: Блок 31 | № 3022

3022. ГЕМОГЛОБИН, ГЕМАТОКРИТ И МАССА ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ЭРИТРОЦИТОВ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ПРИ

- ☐ истинной полицитемии

Блок: Блок 31 | № 3023

3023. НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ВКЛЮЧАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- ☐ иммуностимулирующих и противовирусных препаратов

3024. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ ОТНОСИТСЯ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ

☐ воспалительным

3025. УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНОГО САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ОБЫЧНО ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ

☐ жирового гепатоза

3026. РАННИМ СИМПТОМОМ РАКА ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ немотивированная потеря аппетита

3027. ОСНОВОЙ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ показатели здоровья населения и потребность в медицинской помощи

3028. ТОНЗИЛЛИТ В СОЧЕТАНИИ С ПОЛИАДЕНОПАТИЕЙ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ инфекционного мононуклеоза

3029. ПРОТИВПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ В САНАТОРИЙ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ЯВЛЯЕТСЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ

☐ выше второго функционального класса, а при аневризме сердца – первого функционального класса

3030. АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ ТЕРАПИЮ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ ПРИ

☐ увеличении степени гнойности мокроты

3031. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПАРОКСИЗМА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ НА ФОНЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ амиодарон

3032. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ рентгенологически подтвержденного легочного инфильтрата

3033. ГОЛОДНЫЕ И/ИЛИ «НОЧНЫЕ БОЛИ», ВОЗНИКАЮЩИЕ ЧЕРЕЗ 2,5-4 ЧАСА ПОСЛЕ ЕДЫ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЕМА ПИЩИ, ЗАСТАВЛЯЮТ ДУМАТЬ О ЯЗВЕ

☐ 12-перстной кишки

Блок: Блок 31 | № 3034

3034. ОРГАНОМ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ, В КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ СОЗРЕВАНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИРОВКА Т-ЛИМФОЦИТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ вилочковая железа

Блок: Блок 31 | № 3035

3035. РАЗВИТИЮ ТУБЕРКУЛЕМЫ ЧАЩЕ ПРЕДШЕСТВУЕТ ТУБЕРКУЛЕЗ

☐ инфильтративный

Блок: Блок 31 | № 3036

3036. АНТИКОАГУЛЯНТОМ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ, НЕ ТРЕБУЮЩИМ МОНИТОРИРОВАНИЯ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ, НАЗНАЧАЕМЫМ ВНУТРЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ривароксабан

Блок: Блок 31 | № 3037

3037. ОСТРЫЙ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ А ВЕРИФИЦИРУЕТСЯ

☐ обнаружением антител к вирусу гепатита А класса Ig M

Блок: Блок 31 | № 3038

3038. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ НАЛИЧИИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ бета-адреноблокаторов

Блок: Блок 31 | № 3039

3039. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

☐ инсулинорезистентности и дисфункции бета-клеток поджелудочной железы

Блок: Блок 31 | № 3040

3040. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ДОМАШНЕЙ ПНЕВМОНИИ У ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пневмококк

Блок: Блок 31 | № 3041

3041. СКРИНИНГ НА АЛЬБУМИНУРИЮ У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ

☐ при установлении диагноза «сахарный диабет»

Блок: Блок 31 | № 3042

3042. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ ЛЕЧЕНИЕМ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

☐ глюкокортикостероидов

Блок: Блок 31 | № 3043

3043. ДЛЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ СКВ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ

☐ гломерулонефрита

Блок: Блок 31 | № 3044

3044. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЙ АРТРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ

☐ появление механических болей

Блок: Блок 31 | № 3045

3045. КРИТЕРИЕМ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ____ В КРОВИ

☐ трансаминаз

Блок: Блок 31 | № 3046

3046. ПАЦИЕНТ ВО ВРЕМЯ ТЕСТА 6-МИНУТНОЙ ХОДЬБЫ ПРОХОДИТ РАССТОЯНИЕ, РАВНОЕ 350 М, ЭТО СООТВЕТСТВУЕТ ____ ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ КЛАССУ NYHA

☐ II

Блок: Блок 31 | № 3047

3047. ПРИ ВЫБОРЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ

☐ возраст пациента

Блок: Блок 31 | № 3048

3048. ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ МОНОНУКЛЕОЗЕ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОТМЕЧАЮТ

☐ лейкоцитоз, лимфоцитоз, моноцитоз, появление атипичных мононуклеаров

Блок: Блок 31 | № 3049

3049. ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ЭКСКУДАТИВНЫЙ ПЛЕВРИТ ПО ПАТОГЕНЕЗУ БЫВАЕТ

☐ первичный, вторичный, гематогенно-диссеминированный

Блок: Блок 31 | № 3050

3050. ГЕСТАЦИОННОЙ НАЗЫВАЮТ АГ, КОТОРАЯ

☐ развилась после 20 недели беременности и исчезает в течение 6 недель после родов

Блок: Блок 31 | № 3051

3051. ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ТКАНЕВОГО ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ломкость ногтей

Блок: Блок 31 | № 3052

3052. К ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ЛЕЧЕНИЯ ОТЕКОВ ПРИ НЕФРОТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ ОТНОСЯТ

☐ инфузии альбумина, мочегонные препараты

Блок: Блок 31 | № 3053

3053. САХАРОСНИЖАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ МЕТФОРМИНА ОБУСЛОВЛЕНО ВЛИЯНИЕМ НА

☐ чувствительность тканей к инсулину

Блок: Блок 31 | № 3054

3054. НАИБОЛЕЕ УБЕДИТЕЛЬНО ХАРАКТЕРИЗУЕТ БРОНХИАЛЬНУЮ ОБСТРУКЦИЮ

☐ объем форсированного выдоха за 1 секунду

Блок: Блок 31 | № 3055

3055. ОСНОВНЫМ МЕДИКАМЕНТОЗНЫМ МЕТОДОМ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST У БОЛЬНЫХ, ПОСТУПАЮЩИХ НЕ ПОЗДНЕЕ 6 ЧАСОВ ОТ НАЧАЛА ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тромболитическая терапия

Блок: Блок 31 | № 3056

3056. СЕЛЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ЗАВИСИТ ОТ

☐ дозы

Блок: Блок 31 | № 3057

3057. ОСНОВНЫМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНОГО ПРИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ флюорография

Блок: Блок 31 | № 3058

3058. КИШЕЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ тахикардией, падением артериального давления

Блок: Блок 31 | № 3059

3059. ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ АД У БОЛЬНЫХ МОЛОЖЕ 65 ЛЕТ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ (ММ РТ.СТ.)

☐ 130/80

Блок: Блок 31 | № 3060

3060. ПОНЯТИЕ «ХЛЕБНАЯ ЕДИНИЦА» ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВОМ УГЛЕВОДОВ (Г)

☐ 10-12

Блок: Блок 31 | № 3061

3061. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОГО КЕТОАЦИДОЗА СЛЕДУЮЩАЯ ДОЗА ИНСУЛИНА КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ УМЕНЬШАЕТСЯ ВДВОЕ ПРИ ГЛИКЕМИИ (ММОЛЬ/Л)

☐ 14,0

Блок: Блок 31 | № 3062

3062. ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ОСТРОЙ АНЕВРИЗМЫ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тромбоз полости левого желудочка

Блок: Блок 31 | № 3063

3063. ПРЕПАРАТОМ ГРУППЫ СУЛЬФАТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ сорбифер

Блок: Блок 31 | № 3064

3064. СТУЛ ПРИ КОЛИТИЧЕСКОМ ВАРИАНТЕ ДИЗЕНТЕРИИ

☐ скудный, со слизью и прожилками крови

Блок: Блок 31 | № 3065

3065. К СИНКОПАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ОТНОСЯТ

☐ обмороки

Блок: Блок 31 | № 3066

3066. ВЗИМАНИЕ ПЛАТЫ С ПАЦИЕНТА ПРИ ОКАЗАНИИ ЕМУ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

☐ не допускается ни при каких обстоятельствах

Блок: Блок 31 | № 3067

3067. ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЭНТЕРИТА ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ

☐ железодефицитной анемии

Блок: Блок 31 | № 3068

3068. ПНЕВМОНИЯ СЧИТАЕТСЯ МЕДЛЕННО РАЗРЕШАЮЩЕЙСЯ, ЕСЛИ КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА СОХРАНЯЕТСЯ БОЛЕЕ (В НЕДЕЛЯХ)

☐ 4

Блок: Блок 31 | № 3069

3069. ВИД ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЁЗА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

☐ культурального исследования

Блок: Блок 31 | № 3070

3070. ПРИ СОЧЕТАНИИ ТЯЖЕЛОГО ГИПОТИРЕОЗА СО СТЕНОКАРДИЕЙ II ФК СЛЕДУЕТ

☐ начать лечение с малых доз тироксина

Блок: Блок 31 | № 3071

3071. НАЛИЧИЕ В ЛЕГКИХ ТОНКОСТЕННОЙ ПОЛОСТИ С ЧЕТКИМИ КОНТУРАМИ БЕЗ ОЧАГОВЫХ ТЕНЕЙ В ОКРУЖАЮЩЕЙ ТКАНИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ кисты легкого

Блок: Блок 31 | № 3072

3072. ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ

☐ аторвастатин

Блок: Блок 31 | № 3073

3073. НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧАТЬ ПРИ НЕВРИТЕ СЛУХОВОГО НЕРВА

☐ стрептомицин

Блок: Блок 31 | № 3074

3074. ДЛЯ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ АКТИВНОСТЬ

☐ эластазы кала

Блок: Блок 31 | № 3075

3075. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ ВВОДИТЬ

☐ внутрь перорально

Блок: Блок 31 | № 3076

3076. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ДОКСОРУБИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нейробластома

Блок: Блок 31 | № 3077

3077. НЕОБРАТИМЫМ КОМПОНЕНТОМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ склероз стенки бронхов

Блок: Блок 31 | № 3078

3078. НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА УГЛЕВОДНЫЙ И ЛИПИДНЫЙ ПРОФИЛЬ ОКАЗЫВАЮТ

☐ тиазидные диуретики

Блок: Блок 31 | № 3079

3079. ОМЕПРАЗОЛ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

☐ блокаторов протонового насоса

Блок: Блок 31 | № 3080

3080. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ

☐ соответствующий вид медицинской помощи

Блок: Блок 31 | № 3081

3081. К ПЕРВИЧНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ

☐ злоупотребление алкоголем

Блок: Блок 31 | № 3082

3082. В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМ И ДОСТУПНЫМ СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТОМ НА ВЫЯВЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ И СУБКЛИНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ определение уровня тиреотропного гормона

Блок: Блок 31 | № 3083

3083. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ

☐ подушевой норматив финансирования здравоохранения

Блок: Блок 31 | № 3084

3084. ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ВАРФАРИНОМ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛЯТЬ

☐ международное нормализованное отношение (МНО)

Блок: Блок 31 | № 3085

3085. ДЛЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ сибутрамин

Блок: Блок 31 | № 3086

3086. ОДНИМ ИЗ ВИДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ психологическая

Блок: Блок 31 | № 3087

3087. К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ

☐ скорая

Блок: Блок 31 | № 3088

3088. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ДЕРМАТОМИОЗИТЕ ИМЕЕТ

☐ высокая активность креатинфосфокиназы

Блок: Блок 31 | № 3089

3089. ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эрадикация *Helicobacter pylori*

Блок: Блок 31 | № 3090

3090. ОДНИМ ИЗ ВИДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ медицинская

Блок: Блок 31 | № 3091

3091. ДОСТОИНСТВО НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В МЕДИЦИНЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНИ ПРИМЕНЯЮТСЯ

☐ при небольшом числе наблюдений

Блок: Блок 31 | № 3092

3092. ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКОМ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение общей железосвязывающей способности

Блок: Блок 31 | № 3093

3093. ВЫРАЖЕННАЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ ДО 10-30 X 10⁹/Л ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ тромбоцитопенической пурпуры

Блок: Блок 31 | № 3094

3094. ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ

☐ В-адреноблокаторы

Блок: Блок 31 | № 3095

3095. К ОСНОВНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ОТНОСЯТ

☐ глюкокортикоиды

Блок: Блок 31 | № 3096

3096. ОДНИМ ИЗ ВИДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ социальная

Блок: Блок 31 | № 3097

3097. СТЕРНАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ПРИ

☐ В12-дефицитной анемии

Блок: Блок 31 | № 3098

3098. ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ

☐ доверительные интервалы

Блок: Блок 31 | № 3099

3099. К ПЕРВИЧНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ

☐ гиподинамию

Блок: Блок 31 | № 3100

3100. СИДЕРОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ извращением вкуса

Блок 32

Блок: Блок 32 | № 3101

3101. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ

☐ Базовую программу ОМС

Блок: Блок 32 | № 3102

3102. ЧАСТЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ГАНЦИКЛОВИРА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тромбоцитопения

Блок: Блок 32 | № 3103

3103. НА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПАЦИЕНТА НАПРАВЛЯЕТ

☐ врачебная комиссия медицинской организации

Блок: Блок 32 | № 3104

3104. ЛЕЙКОЦИТОЗ МОЖЕТ БЫТЬ ОТРАЖЕНИЕМ

☐ острого инфаркта миокарда

Блок: Блок 32 | № 3105

3105. РАЗДЕЛОМ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕМОГРАФИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ статистика

Блок: Блок 32 | № 3106

3106. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ синдром мальдигестии

Блок: Блок 32 | № 3107

3107. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ С ПРОТЕИНУРИЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ ингибиторов АПФ

Блок: Блок 32 | № 3108

3108. ЛЕЙКОПЕНИЯ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ СЛЕДСТВИЕМ

☐ гиперспленизма

Блок: Блок 32 | № 3109

3109. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ КРИТЕРИЕМ ГИПЕРТРОФИИ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ S-тип ЭКГ

Блок: Блок 32 | № 3110

3110. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ ПРИМЕНЯЮТ

☐ леналидомид

Блок: Блок 32 | № 3111

3111. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ДОКСОРУБИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ саркома

Блок: Блок 32 | № 3112

3112. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кандидоз полости рта и глотки

Блок: Блок 32 | № 3113

3113. БЕРОДУАЛ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ комбинацией адреномиметика и холинолитика

Блок: Блок 32 | № 3114

3114. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ПЕРСОНАЛОМ НА 10000 НАСЕЛЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО

☐ числу среднего медицинского персонала (физических лиц)

Блок: Блок 32 | № 3115

3115. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВРАЧЕБНЫМИ КАДРАМИ НА 10000 НАСЕЛЕНИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО

☐ занятым должностям

Блок: Блок 32 | № 3116

3116. ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЮТСЯ СУСТАВЫ

☐ проксимальные межфаланговые

Блок: Блок 32 | № 3117

3117. ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ

☐ значение Хи-квадрат

Блок: Блок 32 | № 3118

3118. БОЛЬНОГО С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НА ПРИЕМЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ СЛЕДУЕТ

☐ госпитализировать в приём в блок интенсивной терапии

Блок: Блок 32 | № 3119

3119. ПРОГНОСТИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ желудочковая тахикардия

Блок: Блок 32 | № 3120

3120. ВИДОМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СОВОКУПНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ выборочная

Блок: Блок 32 | № 3121

3121. К АТЕРОГЕННЫМ ЛИПОПРОТЕИДАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ

☐ ЛПВП

Блок: Блок 32 | № 3122

3122. ОСЕЛЬТАМИВИР ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

☐ гриппа

Блок: Блок 32 | № 3123

3123. ПОКАЗАТЕЛЕМ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ СТЕПЕНЬ НАРУШЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ОФВ1

Блок: Блок 32 | № 3124

3124. КРИСТАЛЛЫ ХОЛЕСТЕРИНА В МОКРОТЕ ОБНАРУЖИВАЮТ ПРИ

☐ кавернозном туберкулезе

Блок: Блок 32 | № 3125

3125. ПРОДЛЕНИЕ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВЫДАННОГО ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИЕЙ ЧЕРЕЗ ____ ДНЕЙ

☐ 15

Блок: Блок 32 | № 3126

3126. ТРЕТИЙ ТОН СЕРДЦА МОЖЕТ ВЫСЛУШИВАТЬСЯ

☐ в норме у детей и подростков

Блок: Блок 32 | № 3127

3127. РАК КОЖИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ У

☐ белого населения

Блок: Блок 32 | № 3128

3128. ПРИ ПОВЫШЕННОМ СОДЕРЖАНИИ РЕНИНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ

☐ ангиотензина II

Блок: Блок 32 | № 3129

3129. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кровохарканье

Блок: Блок 32 | № 3130

3130. ОСНОВНОЙ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ РАКА ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аденокарцинома

Блок: Блок 32 | № 3131

3131. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ арбидол (умифеновир)

Блок: Блок 32 | № 3132

3132. БИОМИШЕНЬЮ ДЛЯ АРБИДОЛА (УМИФЕНОВИРА) ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гемагглютинин

Блок: Блок 32 | № 3133

3133. ЭОЗИНОФИЛИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ аллергии

Блок: Блок 32 | № 3134

3134. ПРЕПАРАТ УМИФЕНОВИР (АРБИДОЛ) ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

☐ лечения и профилактики гриппа А и В

Блок: Блок 32 | № 3135

3135. УВЕЛИЧЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ билиарном циррозе

Блок: Блок 32 | № 3136

3136. СРЕДНИЕ ДОЗЫ ИНГАЛЯЦИОННЫХ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ПО БУДЕСОНИДУ СОСТАВЛЯЮТ (В МКГ)

☐ 400-800

Блок: Блок 32 | № 3137

3137. О ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОМ ХОЛЕСТАЗЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОВЫШЕНИЕ В КРОВИ УРОВНЯ

☐ ГГТП, ЩФ

Блок: Блок 32 | № 3138

3138. НОРМАЛЬНЫЕ СРОКИ РУБЦЕВАНИЯ ЯЗВЫ ДПК СОСТАВЛЯЮТ

☐ 1,5 месяца

Блок: Блок 32 | № 3139

3139. ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АКТИВНОГО Н.Р.-АССОЦИИРОВАННОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиперемия слизистой с точечными кровоизлияниями

Блок: Блок 32 | № 3140

3140. ВЫЯВЛЕННАЯ ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ ПЛОСКАЯ НИША В АНТРАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ЖЕЛУДКА ДИАМЕТРОМ 2,5 СМ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ С ОБШИРНОЙ АПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОЙ ЗОНОЙ ВОКРУГ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ язвы-рака

Блок: Блок 32 | № 3141

3141. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ хроническое кровотечение

Блок: Блок 32 | № 3142

3142. В ПОКОЕ ЧАСТОТА СИНУСОВОГО РИТМА В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (В УД. В МИН)

☐ 60-80

Блок: Блок 32 | № 3143

3143. ПАНЦИТОПЕНИЯ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ аплазии костного мозга

Блок: Блок 32 | № 3145

3145. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА P-Q В НОРМЕ ОТ (В СЕКУНДАХ)

☐ 0,12 до 0,20

Блок: Блок 32 | № 3146

3146. ДЛЯ ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ

☐ вальпроевой кислоты

Блок: Блок 32 | № 3147

3147. ОСТРОЕ ТЯЖЕЛОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ОПИАТАМИ (СИНТЕТИЧЕСКИМИ ОПИОИДАМИ) ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ острой дыхательной недостаточностью

3148. К СИМПТОМАМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПИАТАМИ ОТНОСЯТ

☐ угнетение дыхания

3149. У БОЛЬНЫХ С КЛИРЕНСОМ КРЕАТИНИНА 60 МЛ/МИН И МЕНЕЕ, КОТОРЫЕ ПРИНИМАЮТ НОВЫЕ ПЕРОРАЛЬНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ, ФУНКЦИЮ ПОЧЕК СЛЕДУЕТ ОЦЕНИВАТЬ 1 РАЗ В

☐ 6 месяцев

3150. ПРИ РАКЕ ФАЛЛОПИЕВОЙ ТРУБЫ ПРОВОДЯТ

☐ экстирпацию матки с придатками, резекцию большого сальника

3151. ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОГО ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СУДОРОЖНОГО СИНДРОМА У БЕРЕМЕННЫХ С ВЫСОКИМ АД ЯВЛЯЕТСЯ

☐ магния сульфат внутривенно

3152. НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ брадикардия

3153. БРОНХОРАСШИРЯЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ ПУРИНОВОГО РЯДА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ОБЫЧНО ВЫЗЫВАЮТ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

☐ связанные с кумуляцией препарата

3154. СНИЖЕНИЕ ОСМОТИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ ИМЕЕТ МЕСТО ПРИ _____ АНЕМИИ

☐ гемолитической

3155. КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА СНИЖАЕТ

☐ соматостатин

3156. ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЩЕГО АНАЛИЗА МОЧИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ первую утреннюю порцию мочи

3157. ПОСЛЕ ИНГАЛЯЦИИ БРОНХОСПАЗМОЛИТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ИЗ БАЛЛОНЧИКА-ИНГАЛЯТОРА СЛЕДУЕТ

☐ задержать дыхание на 10 с

Блок: Блок 32 | № 3158

3158. К КЛАССУ БЛОКАТОРОВ ЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ОТНОСЯТСЯ ПРЕПАРАТЫ

☐ монтелукаст и зафирлукаст

Блок: Блок 32 | № 3159

3159. ИБУПРОФЕН ОБЛАДАЕТ ЭФФЕКТОМ

☐ жаропонижающим

Блок: Блок 32 | № 3160

3160. ПРЕИМУЩЕСТВО НЕИНГАЛЯЦИОННОГО НАРКОЗА ПЕРЕД ИНГАЛЯЦИОННЫМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

☐ отсутствии стадии возбуждения

Блок: Блок 32 | № 3161

3161. БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ

☐ синдром отмены

Блок: Блок 32 | № 3162

3162. ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕСТА ШЕСТИМИНУТНОЙ ХОДЬБЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 1 ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА СОСТАВЛЯЕТ (В МЕТРАХ)

☐ 426-550

Блок: Блок 32 | № 3163

3163. ПРИ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ОТМЕЧАЕТСЯ

☐ диффузное снижение сократительной способности миокарда

Блок: Блок 32 | № 3164

3164. ЛАБОРАТОРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ТРАНССУДАТА В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА _____ ПРОБА РИВАЛЬТА

☐ менее 20 г/л, отрицательная

Блок: Блок 32 | № 3165

3165. В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕЖДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ И РАКОМ ЖЕЛУДКА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гистологическое исследование

Блок: Блок 32 | № 3166

3166. ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ПОВЫШАЮЩИМИ КОНЦЕНТРАЦИЮ КАЛИЯ В КРОВИ, ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингибиторы АПФ

Блок: Блок 32 | № 3167

3167. БОЛЬНОМУ С УМЕРЕННЫМ ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАН ПРИЕМ

☐ НПВС

Блок: Блок 32 | № 3168

3168. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРОВЕДЕНИЕ БРОНХОСКОПИЧЕСКОГО ЛАВАЖА С ЛЕЧЕБНОЙ ЦЕЛЬЮ ПРИ

☐ хроническом гнойном бронхите с бронхоэктазами

Блок: Блок 32 | № 3169

3169. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 4 СТАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ билатеральный стенозирующий атеросклероз почечной артерии

Блок: Блок 32 | № 3170

3170. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 4 СТАДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиперкалиемия

Блок: Блок 32 | № 3171

3171. ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ зеленающий стрептококк

Блок: Блок 32 | № 3172

3172. ДЛЯ ОТБОРА ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА, ВРАЧ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ПРОВЕСТИ

☐ пробу Манту

Блок: Блок 32 | № 3173

3173. ПРИ ОСТРОМ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ АОРТАЛЬНЫЙ ПОРОК СЕРДЦА ЧАЩЕ ФОРМИРУЕТСЯ ____ ЗАБОЛЕВАНИЯ

☐ на 2 неделе

Блок: Блок 32 | № 3174

3174. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРЕПАРАТА, РАЗВИВАЮЩИЕСЯ НЕЗАВИСИМО ОТ ДОЗЫ ИЛИ ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕКАРСТВА, НАЗЫВАЮТСЯ

☐ аллергические

Блок: Блок 32 | № 3175

3175. БОЛЬ ПРИ ОСТРОМ ФИБРИНОЗНОМ ПЕРИКАРДИТЕ ОСЛАБЛЯЕТСЯ В ПОЛОЖЕНИИ

☐ сидя, наклон туловища вперед, коленно-локтевое положение

Блок: Блок 32 | № 3176

3176. ТИПИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ЭКГ ПЕРИКАРДИТА МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ ПРИ ____ ФОРМЕ ОСТРОГО ПЕРИКАРДИТА

☐ уремический

Блок: Блок 32 | № 3177

3177. ШАРООБРАЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ЛЕГКИХ С ЧЕТКИМ ВНУТРЕННИМ КОНТУРОМ, РАЗМЕРОМ 15 СМ, С УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ абсцесса легкого

Блок: Блок 32 | № 3178

3178. ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ПЕРОРАЛЬНЫМ В2-АГОНИСТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ сальтос

Блок: Блок 32 | № 3179

3179. АМОКСИЦИЛЛИН/КЛАВУЛАНАТ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ПРИ

☐ обострении ХОБЛ, остром риносинусите, внебольничной пневмонии

Блок: Блок 32 | № 3180

3180. СИНДРОМ ЦИТОЛИЗА ВЫРАЖЕН В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПРИ

☐ активном гепатите

Блок: Блок 32 | № 3181

3181. ПРИ БОЛЯХ В СУСТАВАХ РЕКОМЕНДОВАН

☐ ибупрофен

Блок: Блок 32 | № 3182

3182. ПРИМЕНЕНИЕ КЛАВУЛАНОВОЙ КИСЛОТЫ В СОЧЕТАНИИ С АМОКСИЦИЛЛИНОМ ПОЗВОЛЯЕТ

☐ расширить спектр действия амоксициллина на штаммы бактерий, производящих бета-лактамазу

Блок: Блок 32 | № 3183

3183. КАКОЕ НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ВОЛЬФА – ПАРКИНСОНА – УАЙТА?

☐ пароксизмальная атриовентрикулярная тахикардия

Блок: Блок 32 | № 3184

3184. У БОЛЬНЫХ ИБС С СИНДРОМОМ СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

☐ верапамила

Блок: Блок 32 | № 3185

3185. СИНДРОМ «РИКОШЕТА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

☐ ухудшение течения заболевания после отмены препарата

Блок: Блок 32 | № 3186

3186. СИНДРОМ ОТМЕНЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ____ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРИЕМА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИ ДОСТИЖЕНИИ НЕОБХОДИМОГО ЭФФЕКТА

☐ ухудшение клинического течения болезни

Блок: Блок 32 | № 3187

3187. НАИБОЛЕЕ УДОБНЫМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТОДОМ ВВЕДЕНИЯ БРОНХОСПАЗМОЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ПОДОБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ДОЗИРОВКУ ПРЕПАРАТА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ингаляционный

Блок: Блок 32 | № 3188

3188. К НОРМОХРОМНЫМ АНЕМИЯМ ОТНОСИТСЯ

☐ апластическая

Блок: Блок 32 | № 3189

3189. В ПАТОГЕНЕЗЕ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ВЕДУЩИМ МЕХАНИЗМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ иммунный

Блок: Блок 32 | № 3190

3190. АНЕМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОХРОМНОЙ, ЕСЛИ МСН _____ ПГ

☐ 29,0

Блок: Блок 32 | № 3191

3191. СЕЛЕКТИВНО ИНГИБИРУЕТ ЦОГ-1 В НИЗКОЙ ДОЗЕ (75-150 МГ)

☐ ацетилсалициловая кислота

Блок: Блок 32 | № 3192

3192. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПАРАЦЕТАМОЛА СВЯЗАН _____ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ

☐ с блокированием ЦОГ

Блок: Блок 32 | № 3193

3193. НПВС УМЕНЬШАЮТ ГИПОТЕНЗИВНЫЙ ЭФФЕКТ

☐ ингибиторов АПФ

Блок: Блок 32 | № 3194

3194. В КАЧЕСТВЕ БАЗИСНОГО ПРЕПАРАТА ДЛЯ БОЛЬНОГО СО СРЕДНЕ-ТЯЖЁЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ ХОБЛ НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ

☐ тиотропиум бромид

Блок: Блок 32 | № 3195

3195. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ «АСПИРИНОВОЙ» АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ глюкокортикостероиды

Блок: Блок 32 | № 3196

3196. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА ПОРАЖЕНИЕ

☐ голеностопных суставов

Блок: Блок 32 | № 3197

3197. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИНТЕРМИТТИРУЮЩЕЙ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

☐ нерегулярные ингаляции b2-агонистов короткого действия

Блок: Блок 32 | № 3198

3198. ВОЗНИКНОВЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА СПОСОБСТВУЕТ

☐ курение

Блок: Блок 32 | № 3199

3199. ПОСЛЕ ИНГАЛЯЦИИ БРОНХОСПАЗМОЛИТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ИЗ БАЛЛОНЧИКА-ИНГАЛЯТОРА СЛЕДУЕТ

☐ задержать дыхание на 10 секунд

Блок: Блок 32 | № 3200

3200. У МУЖЧИН СТАРШЕ 40 ЛЕТ С БЕССИМПТОМНЫМ ФОКУСНЫМ ЗАТЕМНЕНИЕМ В ЛЕГКИХ, ИМЕЮЩИМ ЧЕТКИЕ ИЛИ НЕЧЕТКИЕ КОНТУРЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ

☐ периферический рак

Блок 33

Блок: Блок 33 | № 3201

3201. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пневмококк

Блок: Блок 33 | № 3202

3202. У МУЖЧИН СТАРШЕ 40 ЛЕТ С БЕССИМПТОМНО ПРОТЕКАЮЩИМ ЗАТЕМНЕНИЕМ В ЛЕГКИХ ВРАЧ ОБЯЗАН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИСКЛЮЧИТЬ

☐ периферический рак легкого

Блок: Блок 33 | № 3203

3203. ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПРИСТУПА ПОДАГРЫ НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ С НАЗНАЧЕНИЯ

☐ диклофенака

Блок: Блок 33 | № 3204

3204. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРСИРОВАННОГО ДИУРЕЗА У РЕБЕНКА, КОТОРЫЙ ПО ОШИБКЕ ВЫПИЛ 150 МЛ ВОДКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фуросемид

Блок: Блок 33 | № 3205

3205. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ НАРУШЕНИЕМ РИТМА СЕРДЦА ПРИ МИТРАЛЬНОМ СТЕНОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фибрилляция предсердий

Блок: Блок 33 | № 3206

3206. ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛЕЙ ПРИ ЭЗОФАГИТЕ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВЕН

☐ рабепразол

Блок: Блок 33 | № 3207

3207. ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭФФЕКТА НИТРОГЛИЦЕРИНА ПРИ ПРИЕМЕ СУБЛИНГВАЛЬНО СОСТАВЛЯЕТ (В МИНУТАХ)

☐ 0,5

Блок: Блок 33 | № 3208

3208. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ АНТИСИНЕГНОЙНЫМ АНТИБИОТИКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ цефоперазон

Блок: Блок 33 | № 3209

3209. К ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ 1 ЛИНИИ У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ОТНОСЯТ

☐ метформин

Блок: Блок 33 | № 3210

3210. АНЕМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГИПЕРХРОМНОЙ ПРИ ЗНАЧЕНИИ MCH ____ пг

☐ 36,8

Блок: Блок 33 | № 3211

3211. АНЕМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ГИПОХРОМНОЙ ПРИ ЗНАЧЕНИИ MCH ____ пг

☐ 24,2

Блок: Блок 33 | № 3212

3212. ТЕРАПИЯ ГИДРООКИСЬЮ АЛЮМИНИЯ НЕРЕДКО ВЫЗЫВАЕТ

☐ гипофосфатемию

Блок: Блок 33 | № 3213

3213. Постпрандиальный дистресс-синдром при синдроме раздраженного кишечника проявляется:

☐ Запоры

Блок: Блок 33 | № 3214

3214. ЗУБЕЦ Q НА ЭКГ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА ОТРАЖАЕТ

☐ возбуждение межжелудочковой перегородки

Блок: Блок 33 | № 3215

3215. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА, НАЗНАЧАЮТ

☐ селективные бета-адреноблокаторы

Блок: Блок 33 | № 3216

3216. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ С УЗКИМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ варфарин

Блок: Блок 33 | № 3217

3217. ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПЕРЕДНЕПЕРЕГОРОДОЧНОЙ ОБЛАСТИ ХАРАКТЕРНЫ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ИЗМЕНЕНИЯ В ОТВЕДЕНИЯХ

☐ V1 - V2, (V3)

Блок: Блок 33 | № 3218

3218. ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРЕДНЕВЕРХУШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ ХАРАКТЕРНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТВЕДЕНИЯХ

☐ V2, V3, V4

Блок: Блок 33 | № 3219

3219. ДЛЯ МИЕЛОМНОЙ БОЛЕЗНИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ В МИЕЛОГРАММЕ

☐ плазматических клеток

Блок: Блок 33 | № 3220

3220. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ АНТИАРИТМИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ ПРИ КУПИРОВАНИИ ПАРОКСИЗМА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ амиодарон

Блок: Блок 33 | № 3221

3221. К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ БЕТА-БЛОКАТОРОВ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТ

☐ сердечную астму и отек легких

Блок: Блок 33 | № 3222

3222. ПЕРЕД НАЧАЛОМ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ БОЛЬНОМУ ПРИДАЮТ ПОЛОЖЕНИЕ

☐ на спине, горизонтально, на твердой поверхности

Блок: Блок 33 | № 3223

3223. ПРИ РАЗВИТИИ У ПАЦИЕНТА ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ В РЕЖИМЕ МАЛЫХ ДОЗ ИНСУЛИНА

☐ растворимого человеческого генно-инженерного

Блок: Блок 33 | № 3224

3224. ВИДАМИ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ПРИ СИСТЕМНОМ НАЗНАЧЕНИИ КОРТИКОСТЕРОИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гипергликемия, гипокалиемия

Блок: Блок 33 | № 3225

3225. ПОКАЗАНИЕМ К ВВЕДЕНИЮ БИКАРБОНАТА НАТРИЯ ПРИ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЯВЛЯЕТСЯ PH <

☐ 7,0

Блок: Блок 33 | № 3226

3226. ПРЕПАРАТОМ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПАРАЦЕТАМОЛОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ацетилцистеин

Блок: Блок 33 | № 3227

3227. УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНО НИЗКИМ УРОВНЕМ

☐ гемоглобина

Блок: Блок 33 | № 3228

3228. КАКОЙ РАСТВОР ГЛЮКОЗЫ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОЙ ЛИНИИ У ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ИНСУЛИНА (В ПРОЦЕНТАХ)?

☐ 40

Блок: Блок 33 | № 3229

3229. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эпинефрин

Блок: Блок 33 | № 3230

3230. СПЕЦИФИЧЕСКИМ АНТИДОТОМ В «ТОКСИЧЕСКОЙ» ФАЗЕ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ атропина сульфат

Блок: Блок 33 | № 3231

3231. ВАЛАЦИКЛОВИР В ОТЛИЧИЕ ОТ АЦИКЛОВИРА

☐ имеет более высокую биодоступность при приёме внутрь

Блок: Блок 33 | № 3232

3232. ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИ РАЗВИТИИ ГИПОТИРЕОИДНОЙ КОМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ раствор глюкозы

Блок: Блок 33 | № 3233

3233. ПРИ ТИРЕОТОКСИЧЕСКОМ КРИЗЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ

☐ глюкокортикоидов

Блок: Блок 33 | № 3234

3234. ПРИ НЕОСЛОЖНЁННОМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМ ПУТЁМ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ сублингвальный

Блок: Блок 33 | № 3235

3235. ПРИ ОСЛОЖНЁННОМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ВВОДЯТ ВНУТРИВЕННО

☐ урапидил

Блок: Блок 33 | № 3236

3236. ВВЕДЕНИЕ КАКОГО ИНФУЗИОННОГО РАСТВОРА ПОКАЗАНО ПРИ НАЛИЧИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ?

☐ изотонического натрия хлорида

Блок: Блок 33 | № 3237

3237. ЧАСТОЕ РАЗВИТИЕ СПОНТАННОЙ РЕМИССИИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ____ ФОРМЫ ПЕРИКАРДИТА

☐ вирусной

Блок: Блок 33 | № 3238

3238. ДЛЯ МЕГАЛОБЛАСТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ лейкопении

Блок: Блок 33 | № 3239

3239. К ТРИАДЕ ПРИЗНАКОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ВЫРАЖЕННОГО АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА, ОТНОСЯТ

☐ одышку, обмороки, стенокардию

Блок: Блок 33 | № 3240

3240. ПРЕПАРАТОМ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ОБСТРУКТИВНОМ БРОНХИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тиотропиум бромид

Блок: Блок 33 | № 3241

3241. ПРИ ГИПЕРТРОФИИ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ КРИТЕРИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ смещение переходной зоны вправо

Блок: Блок 33 | № 3242

3242. ПРЕПАРАТ ЗНАМИВИР

☐ активен в отношении вирусов гриппа А и В, назначается ингаляционно только для лечения гриппа

Блок: Блок 33 | № 3243

3243. ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ГИПЕРОСМОЛЯРНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОМЫ СЛУЖИТ

☐ тяжелая дегидратация с очень высоким уровнем гликемии (более 35 ммоль/л)

Блок: Блок 33 | № 3244

3244. В КАЧЕСТВЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПЕРВОГО ВЫБОРА У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ

☐ ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента

Блок: Блок 33 | № 3245

3245. ПРИ СИНДРОМЕ ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА, ВЫЗВАННОМ КЛЕБСИЕЛЛОЙ, СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

☐ амикацин

Блок: Блок 33 | № 3246

3246. ПРЕСИСТОЛИЧЕСКОЕ УСИЛЕНИЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО ШУМА У БОЛЬНОГО С НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ КЛАПАНА АОРТЫ ОТНОСЯТ К

☐ шуму Флинта

Блок: Блок 33 | № 3247

3247. ПРИ АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОМ ОТЕКЕ В ОБЛАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕИ ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ

☐ эпинефрина

Блок: Блок 33 | № 3248

3248. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИСТОЛИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ПОПУЛЯЦИИ СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО В ПРОЦЕНТАХ

☐ 2

Блок: Блок 33 | № 3249

3249. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИСТОЛИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СРЕДИ ЛИЦ 65 ЛЕТ И СТАРШЕ СОСТАВЛЯЕТ ПРИМЕРНО В ПРОЦЕНТАХ

☐ 6-10

Блок: Блок 33 | № 3250

3250. ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ИНГИБИРУЕТ ЦОГ-2

☐ нимесулид

Блок: Блок 33 | № 3251

3251. ПРИ УМЕРЕННОЙ ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИИ БЕЗ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАЗНАЧАЮТ

☐ диету

Блок: Блок 33 | № 3252

3252. ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ТЕРАПИИ ГЛИКОЗИДНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ унитиол

Блок: Блок 33 | № 3253

3253. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ САНАЦИИ ИНФЕКЦИИ ПРИ РЕАКТИВНОМ АРТРИТЕ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ макролиды

Блок: Блок 33 | № 3254

3254. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАБЛЮДЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гликозилированный гемоглобин

Блок: Блок 33 | № 3255

3255. ДИФFUЗНЫЙ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЙ ФИБРОЗ МИОКАРДА, ПРИЗНАКИ ГИПЕРТРОФИИ КАРДИОМИОЦИТОВ ПРИ НОРМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЕ И ПРАВИЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ САМИХ ВОЛОКОН ЯВЛЯЮТСЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ ПРИ _____ КАРДИОМИОПАТИИ

☐ рестриктивной

Блок: Блок 33 | № 3256

3256. ФИБРОЗ В ВИДЕ БЕСПОРЯДОЧНО ПЕРЕПЛЕТАЮЩИХСЯ ПУЧКОВ КОЛЛАГЕНА, ВЫРАЖЕННАЯ ГИПЕРТРОФИЯ КАРДИОМИОЦИТОВ И ДЕЗОРГАНИЗАЦИЯ МИОКАРДИАЛЬНЫХ ВОЛОКОН ЯВЛЯЮТСЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ _____ КАРДИОМИОПАТИИ

☐ гипертрофической

Блок: Блок 33 | № 3257

3257. ШИРОКОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ МИОКАРДА ЖИРОВОЙ ТКАНЬЮ С РАССЕЯННЫМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ ОСТАТКОВ КЛЕТОК МИОКАРДА И ФИБРОЗНОЙ ТКАНИ ЯВЛЯЕТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТИНОЙ ПРИ _____ КАРДИОМИОПАТИИ

☐ аритмогенной правожелудочковой

Блок: Блок 33 | № 3258

3258. ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ПОКАЗАНИЙ К ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ _____ КАРДИОМИОПАТИЯ

☐ дилатационная

Блок: Блок 33 | № 3259

3259. ОСНОВНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ФОРМОЙ ПИЩЕВЫХ ЛИПИДОВ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ хиломикроны

Блок: Блок 33 | № 3260

3260. РАННИМ ПРИЗНАКОМ ПЕРВИЧНОГО БИЛИАРНОГО ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кожный зуд

Блок: Блок 33 | № 3261

3261. УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ МОЖЕТ БЫТЬ ОБУСЛОВЛЕНО

☐ эритроцитозом

Блок: Блок 33 | № 3262

3262. ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ положительный латекс-тест

Блок: Блок 33 | № 3263

3263. ДЛЯ КОРМЯЩЕЙ МАТЕРИ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ метронидазола

Блок: Блок 33 | № 3264

3264. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ДОЗА ПРЕДНИЗОЛОНА ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ СОСТАВЛЯЕТ (В МИЛЛИГРАММАХ)

☐ 90-120

Блок: Блок 33 | № 3265

3265. ПОД ГИПОГОНАДИЗМОМ У ДЕВОЧЕК ПОНИМАЮТ ОТСУТСТВИЕ ВТОРИЧНЫХ ПОЛОВЫХ ПРИЗНАКОВ ПОСЛЕ (В ГОДАХ)

☐ 13

Блок: Блок 33 | № 3266

3266. ГОРМОНАЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ прогестерон

Блок: Блок 33 | № 3267

3267. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, УМЕНЬШАЮЩИМ ЧСС И ВЫЗЫВАЮЩИМ ЗАМЕДЛЕНИЕ АВ-ПРОВЕДЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ верапамил

Блок: Блок 33 | № 3268

3268. ЛЕЙКОЦИТОЗ СО СДВИГОМ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ ВЛЕВО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ долевого пневмонии

Блок: Блок 33 | № 3269

3269. К САМОМУ ХАРАКТЕРНОМУ СИМПТОМУ ТЭЛА ОТНОСЯТ

☐ внезапную одышку без ортопноэ

Блок: Блок 33 | № 3270

3270. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО СТРЕПТОКОККОВОГО ТОНЗИЛЛИТА МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ

☐ амоксициллин, кларитромицин, цефалексин

Блок: Блок 33 | № 3271

3271. ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ острая боль в горле

Блок: Блок 33 | № 3272

3272. СРЕДНЯЯ МАКСИМАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕИЗМЕНЕННОГО КЛОПИДОГРЕЛА В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПОСЛЕ ПРИЕМА РАЗОВОЙ ДОЗЫ 75 МГ ДОСТИГАЕТСЯ ЧЕРЕЗ

☐ 15 минут

Блок: Блок 33 | № 3273

3273. ПОКАЗАНИЯМИ К НАЗНАЧЕНИЮ МАКРОЛИДОВ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ острый тонзиллит, инфекции кожи и мягких тканей, внебольничная пневмония

Блок: Блок 33 | № 3274

3274. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ В КАЧЕСТВЕ ТЕРАПИИ ПЕРВОГО ВЫБОРА ПРИМЕНЯЮТ

☐ пенициллины

Блок: Блок 33 | № 3275

3275. СИСТОЛО-ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ВО 2-3 МЕЖРЕБЕРЬЕ СЛЕВА ОТ ГРУДИНЫ ПРИ

☐ открытом артериальном протоке

Блок: Блок 33 | № 3276

3276. КАТЕТЕРНАЯ РАДИОЧАСТОТНАЯ АБЛАЦИЯ ПО ПОВОДУ ТИПИЧНОГО ТРЕПЕТАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ ПРОВОДИТСЯ В

☐ правом предсердии

Блок: Блок 33 | № 3277

3277. СУТОЧНАЯ ДОЗА ПЕНИЦИЛЛИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ (ВЕС БОЛЬНОГО 80 КГ) СОСТАВЛЯЕТ ____ МЛН ЕД.

☐ 24

Блок: Блок 33 | № 3278

3278. ПРИ НАЛИЧИИ НА ЭКГ ПРИЗНАКОВ СОЧЕТАННОЙ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ И ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ВОЗМОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ

☐ митральный стеноз

Блок: Блок 33 | № 3279

3279. ПРИ АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОМ ОТЕКЕ НЕОТЛОЖНУЮ ТЕРАПИЮ НАЧИНАЮТ

☐ с H1-гистаминоблокаторов

Блок: Блок 33 | № 3280

3280. К МОРФИНОПОДОБНЫМ ПРОТИВОКАШЛЕВЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТ

☐ кодеин

Блок: Блок 33 | № 3281

3281. ПЕРИОД ПОЛУВЫВЕДЕНИЯ РОЗУВАТАТИНА СОСТАВЛЯЕТ (В ЧАСАХ)

☐ 19

Блок: Блок 33 | № 3282

3282. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЕЙСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ, ____ ПЕРЕСМОТРА

☐ 10

Блок: Блок 33 | № 3283

3283. В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЛЕЖИТ

☐ ремоделирование миокарда

Блок: Блок 33 | № 3284

3284. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ГИСТОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ХРОНИЧЕСКОГО АКТИВНОГО ГЕПАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие очагов некроза

Блок: Блок 33 | № 3285

3285. ПОКАЗАНИЯМИ К НАЗНАЧЕНИЮ ЦЕФОТАКСИМА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ внебольничная пневмония, менингит, сепсис

Блок: Блок 33 | № 3286

3286. ПРИ ОДНОКРАТНОМ РАЗВИТИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ В ПЕРВЫЕ СУТКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПАЦИЕНТУ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОКАЗАН ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ

☐ В-адреноблокаторов

Блок: Блок 33 | № 3287

3287. ПОД ЭНДОКАРДИТОМ ЛИБМАНА – САКСА ПОНИМАЮТ

☐ эндокардит при системной красной волчанке

Блок: Блок 33 | № 3288

3288. ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ ФАЗА ЗУБЦА Р В ОТВЕДЕНИИ V1 ОБУСЛОВЛЕНА

☐ возбуждением левого предсердия

Блок: Блок 33 | № 3289

3289. К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ОТНОСЯТ

☐ симметричность поражения суставов

Блок: Блок 33 | № 3290

3290. СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ КАЛЬКУЛЕЗНОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ УЗИ органов брюшной полости

Блок: Блок 33 | № 3291

3291. ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ панкреатин

Блок: Блок 33 | № 3292

3292. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ЖЕЛУДОЧКОВУЮ ТАХИКАРДИЮ ТИПА «TORSADE DE POINTES», ЯВЛЯЕТСЯ

☐ прокаинамид

Блок: Блок 33 | № 3293

3293. ПРИ ОСТРОМ НЕОСЛОЖНЁННОМ ЦИСТИТЕ В КАЧЕСТВЕ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ

☐ фуразидин, фосфомицина трометамол, цефиксим

Блок: Блок 33 | № 3294

3294. ПОСТПРАНДИАЛЬНЫЙ ДИСТРЕСС-СИНДРОМ ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ запоры

Блок: Блок 33 | № 3295

3295. МОЛНИЕНОСНОЕ ТЕЧЕНИЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ____ ФОРМЫ ПЕРИКАРДИТА

☐ бактериальной

Блок: Блок 33 | № 3296

3296. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ АНТИМИКРОБНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, НЕОБХОДИМО

☐ выяснение данных аллергологического анамнеза

Блок: Блок 33 | № 3297

3297. ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПОКОЙ БОЛЬНОГО С ИНФАРКТМ МИОКАРДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

☐ тромбоэмболическим осложнениям

Блок: Блок 33 | № 3298

3298. ПРИ НЕОСЛОЖНЁННОМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ПРИЁМ ВВЕДЕНИЯ

☐ сублингвальный

Блок: Блок 33 | № 3299

3299. СРЕДИ ХОЛИНОЛИТИКОВ ЭФФЕКТИВНЕЕ ВСЕГО УСТРАНЯЕТ БРОНХОСПАЗМ, ВОЗДЕЙСТВУЯ НА РЕЦЕПТОРЫ БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА, И ВЫЗЫВАЕТ НАИМЕНЬШЕЕ ЧИСЛО ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ

☐ тиотропиум бромид

Блок: Блок 33 | № 3300

3300. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ТАХИКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ верапамил

Блок 34

Блок: Блок 34 | № 3301

3301. СПИРОНОЛАКТОН ЧАЩЕ ПОКАЗАН ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИСТОЛИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ФК

☐ 3-4

Блок: Блок 34 | № 3302

3302. ДЛЯ НЕОСЛОЖНЕННОГО ОСТЕОАРТРОЗА В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ

☐ изменений нет

Блок: Блок 34 | № 3303

3303. К ВСАСЫВАЮЩИМ АНТАЦИДАМ ОТНОСЯТ

☐ натрия гидрокарбонат

Блок: Блок 34 | № 3304

3304. ПРИ КАКОМ ЗАБОЛЕВАНИИ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ 4 ТОН

☐ аортальный стеноз

Блок: Блок 34 | № 3305

3305. ПРОВЕДЕНИЕ БРОНХОСКОПИЧЕСКОГО ЛАВАЖА С ЛЕЧЕБНОЙ ЦЕЛЬЮ НЕЭФФЕКТИВНО ПРИ

☐ бронхиальной астме

Блок: Блок 34 | № 3306

3306. К ГРУППЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПУРИНА (МЕТИЛКСАНТИНЫ) ПРОЛОНГИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТСЯ

☐ теопек

Блок: Блок 34 | № 3307

3307. СОСТОЯНИЕМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ОТНОСИТЕЛЬНОМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДНИЗОЛОНА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ язвенная болезнь желудка

Блок: Блок 34 | № 3308

3308. К АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ I КЛАССА ОТНОСЯТСЯ БЛОКАТОРЫ

☐ натриевых каналов

Блок: Блок 34 | № 3309

3309. К АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ II КЛАССА ОТНОСЯТСЯ БЛОКАТОРЫ

☐ бета-адренорецепторов

Блок: Блок 34 | № 3310

3310. К АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ III КЛАССА ОТНОСЯТСЯ БЛОКАТОРЫ

☐ калиевых каналов

Блок: Блок 34 | № 3311

3311. К АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ IV КЛАССА ОТНОСЯТСЯ БЛОКАТОРЫ

☐ кальциевых каналов

Блок: Блок 34 | № 3312

3312. САМЫМ РАННИМ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ подъем сегмента ST

Блок: Блок 34 | № 3313

3313. НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ИБУПРОФЕНА В ПОСЛЕДНЕМ ТРИМЕСТРЕ БЕРЕМЕННОСТИ СВЯЗАНО С

☐ замедлением родовой деятельности

Блок: Блок 34 | № 3314

3314. МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНО ПРИ

☐ проктите

Блок: Блок 34 | № 3315

3315. СИМПТОМОМ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИМ В ПОЛЬЗУ ПЕРЕДОЗИРОВКИ ОПИАТАМИ, У ПАЦИЕНТА С ПОТЕРЕЙ СОЗНАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ миоз

Блок: Блок 34 | № 3316

3316. ЭНДОГЕННЫЙ СИНТЕЗ ХОЛЕСТЕРИНА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В

☐ печени

Блок: Блок 34 | № 3317

3317. КОМБИНАЦИЯ ПРОПРАНОЛОЛА И ВЕРАПАМИЛА СЧИТАЕТСЯ

☐ нерациональной из-за риска развития AV-блокады

Блок: Блок 34 | № 3318

3318. АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, БЛОКИРУЮЩИЕ МЕДЛЕННЫЕ КАЛЬЦИЕВЫЕ КАНАЛЫ, ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ

☐ IV

Блок: Блок 34 | № 3319

3319. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ ЖЕЛЕЗА ВКЛЮЧАЮТ

☐ тошноту, рвоту, боли в эпигастрии, понос, запоры

Блок: Блок 34 | № 3320

3320. В КАЧЕСТВЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ КАТЕТЕРОАССОЦИИРОВАННОГО СЕПСИСА В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВ 1 РЯДА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ ванкомицин

Блок: Блок 34 | № 3321

3321. РАЗВИТИЮ АТЕРОСКЛЕРОЗА И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА СПОСОБСТВУЕТ

☐ сахарный диабет

Блок: Блок 34 | № 3322

3322. БЛОКАТОРЫ H₁-РЕЦЕПТОРОВ ГИСТАМИНА СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ___ ЕДЫ

☐ до

Блок: Блок 34 | № 3323

3323. АСТМАТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ БЕСКОНТРОЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

☐ β-адреномиметиков

Блок: Блок 34 | № 3324

3324. К ОТХАРКИВАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТ

☐ амброксол

Блок: Блок 34 | № 3325

3325. ПОЯВЛЕНИЕ УЗЕЛКОВ И ОГРАНИЧЕНИЕ ПОДВИЖНОСТИ В ДИСТАЛЬНЫХ МЕЖФАЛАНГОВЫХ СУСТАВАХ КИСТЕЙ РУК ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ деформирующего остеоартроза

Блок: Блок 34 | № 3326

3326. НОРМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА СИНУСОВОГО РИТМА СОСТАВЛЯЕТ ____ УДАРОВ В МИНУТУ

☐ 60-80

Блок: Блок 34 | № 3327

3327. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЭРИТРЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ плеторический синдром

Блок: Блок 34 | № 3328

3328. ЦЕФАЛЕКСИН В ОТЛИЧИЕ ОТ ЦЕФАЗОЛИНА

☐ назначается только внутрь

Блок: Блок 34 | № 3329

3329. К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОТНОСЯТ

☐ ulcerогенное действие

Блок: Блок 34 | № 3330

3330. ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ АД ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГ В ОБЩЕЙ ПОПУЛЯЦИИ < (В ММ РТ.СТ.)

☐ 140/90

Блок: Блок 34 | № 3331

3331. У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ РИСК РАЗВИТИЯ

☐ разрыв миокарда

Блок: Блок 34 | № 3332

3332. ЕСЛИ У 60-ЛЕТНЕГО БОЛЬНОГО ОДЫШКА, НЕПРОДУКТИВНЫЙ КАШЕЛЬ, ВЫЯВЛЕН АТЕЛЕКТАЗ ВЕРХНЕЙ ДОЛИ ЛЕГКОГО СПРАВА, ТО НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДАННОМ СЛУЧАЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бронхоскопия

Блок: Блок 34 | № 3333

3333. КАКОЙ ИЗ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НИТРАТОВ?

☐ анемия

Блок: Блок 34 | № 3334

3334. ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ симптоматических гипертензиях

Блок: Блок 34 | № 3335

3335. ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА АНТИБИОТИКОТЕРАПИЯ ПОКАЗАНА

☐ при инфекционных осложнениях

3336. К ПРИЧИНАМ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ

- ☐ внутриклеточные микроорганизмы

3337. ИПРАТРОПИЯ БРОМИД ОКАЗЫВАЕТ БРОНХОДИЛАТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПУТЕМ

- ☐ блокады М-холинорецепторов

3338. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ОЧАГОВ ПРИ МИЛИАРНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ

- ☐ однотипные мелкие, симметрично расположенные в обоих легких

3339. «ЭКСТРЕННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ» ОБ ИНФЕКЦИОННОМ БОЛЬНОМ ЗАПОЛНЯЕТСЯ

- ☐ при подозрении на инфекционную болезнь и постановке первоначального диагноза

3340. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНОГО С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

- ☐ Пропранолол

3341. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАКА ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ бронхоскопия

3342. ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРИЁМ АЛКОГОЛЯ И ПАРАЦЕТАМОЛА СОПРОВОЖДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- ☐ гепатотоксичности

3343. ДЛЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА ИСПОЛЬЗУЮТ

- ☐ интерферон

3344. ЕСЛИ НА ОБЗОРНОЙ РЕНТГЕНОГРАММЕ ЛЕГКИХ СПРАВА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ГОМОГЕННОЕ ЗАТЕМНЕНИЕ С КОСОВОСХОДЯЩЕЙ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЕЙ (ЛИНИЯ ДАМУАЗО), СИНУС СПРАВА ЗАТЕМНЕН, ЛЕВОЕ ЛЕГКОЕ БЕЗ ПАТОЛОГИИ, А СРЕДОСТЕНИЕ СМЕЩЕНО В ЗДОРОВУЮ СТОРОНУ, ТО НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ правосторонний экссудативный плеврит

3345. ТРАНСПОРТНОЙ ФОРМОЙ ЭКЗОГЕННЫХ ТРИГЛИЦЕРИДОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- ☐ хиломикроны

Блок: Блок 34 | № 3346

3346. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ КЛОПИДОГРЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ острое кровотечение

Блок: Блок 34 | № 3347

3347. ПРЕПАРАТОМ С САМЫМ ВЫРАЖЕННЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ индометацин

Блок: Блок 34 | № 3348

3348. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНТЕРВАЛА PQ В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ (СЕК)

☐ от 0,18 до 0,22

Блок: Блок 34 | № 3349

3349. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СУДОРОЖНОГО ПРИСТУПА ПРИ ЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ магния сульфат

Блок: Блок 34 | № 3350

3350. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ СТАТИНОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

☐ ингибировании фермента 3-гидрокси-3-метил-глутарил-коэнзим А редуктазы

Блок: Блок 34 | № 3351

3351. Сидеропенический синдром характерен для анемии:

☐ железодефицитной

Блок: Блок 34 | № 3352

3352. К СРЕДСТВАМ, ПОДАВЛЯЮЩИМ КАШЕЛЬ, ОТНОСИТСЯ

☐ кодеина фосфат

Блок: Блок 34 | № 3353

3353. ПРЕПАРАТОМ ГРУППЫ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дексаметазон

Блок: Блок 34 | № 3354

3354. ВЫЯВЛЕННЫЙ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА СИСТОЛО-ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ («МАШИННЫЙ» ШУМ) ВО II-III МЕЖРЕБЕРЬИ СЛЕВА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ открытого артериального (Боталлова) протока

Блок: Блок 34 | № 3355

3355. ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ИБС ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРИ СТЕНОЗЕ_____ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ

☐ ствола левой

Блок: Блок 34 | № 3356

3356. КАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ СЛЕДУЕТ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЕСЛИ НА ВЕРХУШКЕ СЕРДЦА ВЫСЛУШИВАЕТСЯ НЕПОСТОЯННЫЙ ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ, ЗАВИСЯЩИЙ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ БОЛЬНОГО

☐ миксому левого предсердия

Блок: Блок 34 | № 3357

3357. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ МОЖНО ОЦЕНИТЬ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

☐ агрегации тромбоцитов

Блок: Блок 34 | № 3358

3358. ВЫРАЖЕННОСТЬ СИМПТОМОВ ТАМПОНАДЫ СЕРДЦА ЗАВИСИТ ОТ

☐ быстроты появления выпота

Блок: Блок 34 | № 3359

3359. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЭТИОЛОГИИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ

☐ бактериологическое

Блок: Блок 34 | № 3360

3360. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ ГИПОТЕНЗИВНОГО ДЕЙСТВИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ КОТОРОГО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО У БОЛЬНОГО БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ амлодипин

Блок: Блок 34 | № 3361

3361. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОМИЕЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ линкомицин

Блок: Блок 34 | № 3362

3362. ГИПОКАЛИЕМИЯ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

☐ фуросемида

Блок: Блок 34 | № 3363

3363. ПЛОХО ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ

☐ рак большого сосочка двенадцатиперстной кишки (фатерова соска)

Блок: Блок 34 | № 3364

3364. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖЕНИЕ ЭНДОКАРДА ВЫЗЫВАЕТ

☐ зеленающий стрептококк Тотти

Блок: Блок 34 | № 3365

3365. К ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СИНУСОВОЙ БРАДИКАРДИИ ОТНОСЯТ

☐ сохранение правильного синусового ритма с частотой 40-59 в минуту

Блок: Блок 34 | № 3366

3366. ПРИ ВЫПИСЫВАНИИ ВРАЧОМ ОДНОМУ ПАЦИЕНТУ 5 И БОЛЕЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМО

☐ решение врачебной комиссии

Блок: Блок 34 | № 3367

3367. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ выбухание второй дуги по левому контуру в прямой проекции

Блок: Блок 34 | № 3368

3368. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТИАЗИДНЫХ ДИУРЕТИКОВ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ

☐ гиперурикемия

Блок: Блок 34 | № 3369

3369. НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ВЛИЯЮТ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ПЕТЛЕВЫХ» ДИУРЕТИКОВ

☐ ослабляя их действие

Блок: Блок 34 | № 3370

3370. ЗУБЕЦ Р В НОРМЕ ВСЕГДА _____ В AVR ОТВЕДЕНИЯХ

☐ положительный в I, II, aVF, и отрицательный

Блок: Блок 34 | № 3371

3371. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ АНТИМИКРОБНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ сбор анамнеза

Блок: Блок 34 | № 3372

3372. АНТИТРОМБОТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ (ИНГИБИТОРОМ ЦИКЛООКСИГЕНАЗЫ 1) ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ацетилсалициловая кислота

Блок: Блок 34 | № 3373

3373. НАИБОЛЕЕ АТЕРОГЕННЫМИ СЧИТАЮТСЯ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ ТИПА

☐ II, III

Блок: Блок 34 | № 3374

3374. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕМОЙ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ АРИТМИИ ОТНОСЯТ

☐ фибрилляцию предсердий

Блок: Блок 34 | № 3375

3375. ДИСКИНЕТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОЙ КИШКИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ запорами

Блок: Блок 34 | № 3376

3376. ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Диазепам

Блок: Блок 34 | № 3377

3377. САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ЛЕГОЧНОГО СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тромбоэмболия легочной артерии

Блок: Блок 34 | № 3378

3378. К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ СИСТОЛИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОТНОСЯТ

☐ ишемическую болезнь сердца

Блок: Блок 34 | № 3379

3379. ОДНОВРЕМЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ С ФУРОСЕМИДОМ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ОСЛОЖНЕНИЕ В ВИДЕ

☐ нефрита

Блок: Блок 34 | № 3380

3380. К ОСОБЕННОСТЯМ АЦИКЛОВИРА ОТНОСЯТ

☐ активность в отношении вирусов Herpes simplex и Varicella zoster

Блок: Блок 34 | № 3381

3381. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОГО ЧКВ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА НАЗНАЧАЕТСЯ В НАГРУЗОЧНОЙ ДОЗЕ (В МГ)

☐ 150-300

Блок: Блок 34 | № 3382

3382. ЕСЛИ У ПАЦИЕНТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 1 СТЕПЕНИ ИНДЕКС МАССЫ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 150 Г/М, ТО СТЕПЕНЬ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА

☐ высокая

Блок: Блок 34 | № 3383

3383. ШАРООБРАЗНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ ЛЕГКИХ РАЗМЕРОМ 8 СМ, С ЭКСЦЕНТРИЧНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПОЛОСТЬЮ И БУГРИСТЫМИ НАРУЖНЫМИ КОНТУРАМИ, ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ периферического рака

Блок: Блок 34 | № 3384

3384. ГЕПАТОМЕГАЛИЯ, ГИПЕРГЛИКЕМИЯ, ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ КОЖИ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖЕЛЕЗА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ гемохроматоза

Блок: Блок 34 | № 3385

3385. ЛАБОРАТОРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА ПЛЕВРАЛЬНОГО ВЫПОТА ЯВЛЯЮТСЯ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА БОЛЕЕ _____ ПРОБА

☐ 30 г/л, положительная

3386. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА ЧАЩЕ ВСЕГО ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ _____ ТИПЕ ГИПЕРЛИПОПРОТЕИДЕМИИ

☐ II

3387. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКГ ПРИ ОСТРОМ ПЕРИКАРДИТЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

☐ конкордантным подъемом сегмента ST в стандартных и грудных отведениях

3388. ВЫРАЖЕННАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ ПУЛЬСАЦИЯ ПЕЧЕНИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ недостаточности трехстворчатого клапана

3389. САМЫМ ЧАСТЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ АГЕНТОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ОБОСТРЕНИЕ I СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пневмококк

3390. ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ НА ФОНЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНОТРОПНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА И УВЕЛИЧЕНИЯ МИНУТНОГО ОБЪЕМА ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ

☐ добутамина

3391. НАЗНАЧЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ У ДЕТЕЙ ПОВЫШАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ

☐ гипернатриемии и гипокалиемии

3392. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ АНТИДОТОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОТРАВЛЕНИЙ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ этиловый спирт

3393. ДЛИТЕЛЬНОЕ ОБЕЗДВИЖИВАНИЕ БОЛЬНОГО С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

☐ тромбоэмболическим осложнениям

3394. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ И ЛАКТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инсулин

3395. К МЕРАМ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ, ВЫЗЫВАЕМЫХ АМИНОГЛИКОЗИДАМИ, ОТНОСЯТ

☐ расчёт дозы на массу тела у детей и у взрослых, аудиометрию, мониторинг функции почек

Блок: Блок 34 | № 3396

3396. НПВС снижают антигипертензивное действие

☐ **ИАПФ**

Блок: Блок 34 | № 3397

3397. К МАРКЕРАМ НАРУШЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ОТНОСИТСЯ

☐ **холинэстераза**

Блок: Блок 34 | № 3398

3398. СТРУКТУРЫ, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ПЛОТНОЙ СЛИЗИ В ВИДЕ ОСЕВОГО ЦИЛИНДРА, ОКРУЖЕННОГО РЫХЛОЙ СЛИЗЬЮ, ПОЯВЛЯЮЩИЕСЯ В МОКРОТЕ ПРИ ПАТОЛОГИЯХ, НАЗЫВАЮТ

☐ **спиралями Куршмана**

Блок: Блок 34 | № 3399

3399. ПАТОЛОГИЮ, ПРИ КОТОРОЙ СПЕРМАТОЗОИДЫ ПОЛНОСТЬЮ УТРАЧИВАЮТ ДВИГАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ, НАЗЫВАЮТ

☐ **акинозооспермией**

Блок: Блок 34 | № 3400

3400. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ КАЛА ОБНАРУЖЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕРЕВАРИВАЕМОЙ КЛЕТЧАТКИ, ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО КРАХМАЛА, НОРМАЛЬНОЙ ЙОДОФИЛЬНОЙ ФЛОРЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ **бродильного дисбиоза**

Блок: Блок 34 | №

. хронического гепатита вирусной этиологии

☐ **гемохроматоза**

Блок 35

Блок: Блок 35 | № 3401

3401. МИКРООРГАНИЗМЫ, ДЕЛЯЩИЕСЯ БЕСПОРЯДОЧНО В РАЗЛИЧНЫХ ПЛОСКОСТЯХ С ОБРАЗОВАНИЕМ СКОПЛЕНИЙ, НАПОМИНАЮЩИХ ГРОЗДЬЯ ВИНОГРАДА, ЯВЛЯЮТСЯ

☐ **стафилококки**

Блок: Блок 35 | № 3402

3402. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ КОНСТРИКТИВНОГО (СДАВЛИВАЮЩЕГО) ПЕРИКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ **туберкулез**

Блок: Блок 35 | № 3403

3403. ЭНДОСКОПИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АКТИВНОГО Н.Р.-АССОЦИИРОВАННОГО ГАСТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ **гиперемия слизистой с точечными кровоизлияниями**

Блок: Блок 35 | № 3404

3404. БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИМ НЕСТЕРОИДНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ диклофенак

Блок: Блок 35 | № 3405

3405. БЕРОТЕК (ФЕНОТЕРОЛ) ОКАЗЫВАЕТ БРОНХОДИЛАТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПУТЕМ

☐ возбуждения В2-адренорецепторов

Блок: Блок 35 | № 3406

3406. БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО СОЧЕТАТЬ С

☐ верапамилом

Блок: Блок 35 | № 3407

3407. ОТСУТСТВИЕ ЗУБЦА Р, УЗКИЙ QRS, ПРАВИЛЬНЫЙ РИТМ С ЧАСТОТОЙ В Н.

☐ атриовентрикулярный ритм

Блок: Блок 35 | № 3408

3408. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВИРУСНУЮ ЭТИОЛОГИЮ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ ИССЛЕДОВАНИЕ

☐ маркеров вирусов гепатита

Блок: Блок 35 | № 3409

3409. К ФАКТОРАМ АГРЕССИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ОТНОСЯТ

☐ соляную кислоту и пепсин

Блок: Блок 35 | № 3410

3410. НА ПЕРЕХОД ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ УКАЗЫВАЕТ

☐ асцит

Блок: Блок 35 | № 3411

3411. ПРИ МИКРОСКОПИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ МОКРОТЫ ДЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ эозинофилы, кристаллы Шарко-Лейдена

Блок: Блок 35 | № 3412

3412. У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ КОННА В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ЛЕЖИТ

☐ увеличение реабсорбции натрия

Блок: Блок 35 | № 3413

3413. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ АЛКОГОЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ АДЕКВАТНЫМ ЛЕЧЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ

☐ эссенциале

Блок: Блок 35 | № 3414

3414. ПОД РЕФЛЕКСОМ КИТАЕВА ПОНИМАЮТ ПОВЫШЕНИЕ

- ☐ тонуса артериол малого круга в ответ на повышение давления в венах малого круга

Блок: Блок 35 | № 3415

3415. МЕТОДОМ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ КОНТРОЛИРОВАТЬ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ ЭКГ

Блок: Блок 35 | № 3416

3416. ПОТЕНЦИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА И УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКА ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ СИМВАСТАТИНА ВОЗРАСТАЕТ ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ УПОТРЕБЛЕНИИ В ПИЩУ

- ☐ грейпфрутового сока

Блок: Блок 35 | № 3417

3417. ВВЕДЕНИЕ КАКОГО ИНФУЗИОННОГО РАСТВОРА ПОКАЗАНО ПРИ НАЛИЧИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ ПРИ АНАФИЛАКТИЧЕСКОМ ШОКЕ?

- ☐ изотонического натрия хлорида

Блок: Блок 35 | № 3418

3418. БАЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНЫМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВКЛЮЧАЕТ ПРЕПАРАТЫ

- ☐ которые пациент принимает постоянно для достижения и поддержания контроля бронхиальной астмы

Блок: Блок 35 | № 3419

3419. НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ АНТИАРИТМИКОМ 1С ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ пропафенон

Блок: Блок 35 | № 3420

3420. ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ ИНСУЛИНА ЛЕЧЕНИЕ ТЯЖЁЛОЙ ГИПОГЛИКЕМИИ НАЧИНАЕТСЯ С ВВЕДЕНИЯ

- ☐ 40-100 мл 40% глюкозы в/в струйно

Блок: Блок 35 | № 3421

3421. ПРИ РАЗВИТИИ У ПАЦИЕНТА ТЯЖЁЛОЙ ГИПОГЛИКЕМИИ С ПОТЕРЕЙ СОЗНАНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕМЕДЛЕННОЕ ВВЕДЕНИЕ

- ☐ глюкагона

Блок: Блок 35 | № 3422

3422. Рак желчного пузыря встречается

- ☐ чаще у женщин

Блок: Блок 35 | № 3423

3423. ДЛЯ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНА

- ☐ норма

Блок: Блок 35 | № 3424

3424. ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ СТАРТОВОГО РЕЖИМА ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ В-ЛАКТАМАМИ И МАКРОЛИДАМИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ респираторные фторхинолоны

Блок: Блок 35 | № 3425

3425. МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ

☐ ревматизма

Блок: Блок 35 | № 3426

3426. ПЛЕЙОТРОПНЫМ СВОЙСТВОМ СТАТИНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ антипролиферативное действие

Блок: Блок 35 | № 3427

3427. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, СПОСОБНЫМ ВЫЗВАТЬ У БОЛЬНОГО С ЯЗВЕННЫМ ДЕФЕКТОМ В ЛУКОВИЦЕ 12-ТИ-ПЕРСТНОЙ КИШКИ КРОВОТЕЧЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ диклофенак

Блок: Блок 35 | № 3428

3428. РАННЕЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕСС ПЛЮСНЕФАЛАНГОВОГО СУСТАВА БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА СТОПЫ, В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ РЕЗКОЕ ПОКРАСНЕНИЕ, ДЕФИГУРАЦИЯ СУСТАВОВ, ПОДЪЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ, НЕФРОПАТИЯ, ПРИСТУПЫ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКИ, ПОДКОЖНЫЕ УЗЕЛКИ НА УШНЫХ РАКОВИНАХ И ЛОКТЯХ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ подагры

Блок: Блок 35 | № 3429

3429. В ОСНОВЕ СПОНТАННОЙ СТЕНОКАРДИИ ЛЕЖИТ

☐ спазм коронарных артерий

Блок: Блок 35 | № 3430

3430. ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНО ПРИ

☐ сопутствующей ИБС

Блок: Блок 35 | № 3431

3431. ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НЕФРОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ ____ В КРОВИ

☐ креатинина

Блок: Блок 35 | № 3432

3432. ГИПЕРРЕНИНОВЫЕ ФОРМЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ПРИ

☐ гипертонической болезни

Блок: Блок 35 | № 3433

3433. ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ БРАДИКАРДИИ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 60 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ИБС, осложненная нарушением функции проводимости

Блок: Блок 35 | № 3434

3434. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНИЦИЛЛИНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ крапивница

Блок: Блок 35 | № 3435

3435. ПРИ КРУПНООЧАГОВОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЗУБЕЦ Q ВЫЯВЛЯЕТСЯ

☐ обычно в течение первых нескольких часов

Блок: Блок 35 | № 3436

3436. ПРИ ПРАВИЛЬНОЙ ОТОСКОПИИ ПРАВОГО УХА У ВЗРОСЛОГО ВРАЧ СОБЛЮДАЕТ АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ МАНИПУЛЯЦИИ

☐ левой рукой оттягивает ушную раковину вверх и кзади, а правой вводит ушную воронку в наружный слуховой проход

Блок: Блок 35 | № 3437

3437. ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ МОКРОТЫ ВОЗБУДИТЕЛЯ _____ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О КОНТАМИНАЦИИ МАТЕРИАЛА

☐ staphylococcus epidermidis

Блок: Блок 35 | № 3438

3438. ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ПОРАЖЕНИЯ МИОКАРДА ВКЛЮЧАЮТ

☐ гипертрофическую кардиомиопатию

Блок: Блок 35 | № 3439

3439. ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЯЗВЫ В ОБЛАСТИ МАЛОЙ КРИВИЗНЫ ЖЕЛУДКА ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ БОЛЕЙ ЧЕРЕЗ _____ ПОСЛЕ ЕДЫ

☐ 1-1,5 часа

Блок: Блок 35 | № 3440

3440. ДЛЯ АБСЦЕССА ЛЕГКОГО, СОЕДИНЕННОГО С БРОНХОМ, ХАРАКТЕРНО

☐ амфорическое дыхание

Блок: Блок 35 | № 3441

3441. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ _____ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ

☐ спазм

Блок: Блок 35 | № 3442

3442. У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАРУШАЕТСЯ

☐ диастолическая функция левого желудочка

Блок: Блок 35 | № 3443

3443. ПОЯВЛЕНИЕ НА ЭКГ ПЕРВОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ФАЗЫ ЗУБЦА R В ОТВЕДЕНИИ V1 СВЯЗЫВАЮТ С

☐ возбуждением правого предсердия

Блок: Блок 35 | № 3444

3444. АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ АДРЕНЕРГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СЕРДЦЕ, ОТНОСЯТСЯ К КЛАССУ

☐ II

Блок: Блок 35 | № 3445

3445. ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ДЛЯ ПОЛНОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ ПРОКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ нормальный по ширине комплекс QRS, равные интервалы R-R, отсутствие связи зубца Р и комплекса QRS

Блок: Блок 35 | № 3446

3446. СИНТЕТИЧЕСКИМ ГОРМОНАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В КАЧЕСТВЕ СНОТВОРНОГО СРЕДСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ мелатонин

Блок: Блок 35 | № 3447

3447. Сердечная астма представляет собой

☐ приступ ночной одышки при левожелудочковой недостаточности

Блок: Блок 35 | № 3448

3448. ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ БИЛИРУБИНА В МОЧЕ НАЧИНАЕТСЯ НА

☐ клетках эпителия

Блок: Блок 35 | № 3449

3449. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ преждевременное появление широкого экстрасистолического комплекса без предшествующего зубца Р, компенсаторная пауза полная

Блок: Блок 35 | № 3450

3450. ПАТОГНОМОНИЧНЫМ ЭКГ- ПРИЗНАКОМ ДЛЯ МИОПЕРИКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ элевация ST

Блок: Блок 35 | № 3451

3451. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРОТИВОПОКАЗАННЫМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ карведилол

Блок: Блок 35 | № 3452

3452. ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТИАЗИДНЫХ ДИУРЕТИКОВ ПРОИСХОДИТ СНИЖЕНИЕ

☐ общего периферического сосудистого сопротивления

Блок: Блок 35 | № 3453

3453. СРЕДСТВОМ ПЕРВОГО ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ амиодорон

Блок: Блок 35 | № 3454

3454. ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫМИ МЕДИКАМЕНТАМИ ПРИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ БЕЗ ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ статины

Блок: Блок 35 | № 3455

3455. ВЫСОКАЯ ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА «В» ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ узелкового полиартериита

Блок: Блок 35 | № 3456

3456. ПРЕПАРАТОМ, ОТНОсяЩИМСЯ К ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ИНГАЛЯЦИОННЫМ В2-АГОНИСТАМ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ формотерол

Блок: Блок 35 | № 3457

3457. Преходящие эпизоды ишемии миокарда

☐ могут не сопровождаться симптомами

Блок: Блок 35 | № 3458

3458. ДЛЯ СИНДРОМА ЦИТОЛИЗА, РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ПРИ ОСТРЫХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ ПЕЧЕНИ, ХАРАКТЕРНО ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

☐ АСТ, АЛТ, ЛДГ,

Блок: Блок 35 | № 3459

3459. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ СНОТВОРНЫХ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВОГО РЯДА И БАРБИТУРАТОВ ОТНОСЯТ РАЗВИТИЕ

☐ лекарственной зависимости

Блок: Блок 35 | № 3460

3460. ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК В ____ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ

☐ общем стволе левой

Блок: Блок 35 | № 3461

3461. ЭКГ-ПРИЗНАКОМ ПОЛНОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ независимость появления предсердных и желудочковых комплексов при правильном ритме желудочковых комплексов

Блок: Блок 35 | № 3462

3462. ОПТИМАЛЬНЫМ БРОНХОЛИТИКОМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРИСТУПОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ салметерол

Блок: Блок 35 | № 3463

3463. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ амиодарон

Блок: Блок 35 | № 3464

3464. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ-ИНГИБИТОРОМ ЦОГ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ И ОБЛАДАЮЩИМ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ парацетамол

Блок: Блок 35 | № 3465

3465. НЕЙТРОФИЛЕЗ СО СДВИГОМ ВЛЕВО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ бактериальном воспалении

Блок: Блок 35 | № 3466

3466. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА, ОСЛОЖНЁННОГО ТЯЖЁЛОЙ ПЕЧЁНОЧНОЙ И ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инсулин

Блок: Блок 35 | № 3467

3467. МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ СТАТИНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ингибирование фермента ГМГ-коА-редуктазы

Блок: Блок 35 | № 3468

3468. ДЛЯ БОЛЬНЫХ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНЫМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ НАРАДУ С ХИМИОТЕРАПИЕЙ БОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВЕН МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ

☐ хирургический

Блок: Блок 35 | № 3469

3469. МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОЗНАЧАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЁЗА К

☐ Изониазиду и Рифампицину

Блок: Блок 35 | № 3470

3470. СТАНДАРТНЫМ РЕЖИМОМ ХИМИОТЕРАПИИ, НАЗНАЧАЕМЫМ БОЛЬНОМУ ТУБЕРКУЛЁЗОМ С ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЁЗА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ IV

Блок: Блок 35 | № 3471

3471. К АНТИБИОТИКАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ, КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ ВЫРАЖЕННОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНОЙ АКТИВНОСТЬЮ И ОТНОСЯТСЯ К ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫМ ПРЕПАРАТАМ, ОТНОСЯТ

☐ фторхинолоны

Блок: Блок 35 | № 3472

3472. К ПРЕПАРАТАМ ГРУППЫ ГИДРАЗИДА ИЗОНИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ (ГИНК) ОТНОСИТСЯ

☐ Изониазид

Блок: Блок 35 | № 3473

3473. ГЛАВНЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ В ЛЕЧЕНИИ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ плевральная пункция, активный дренаж и аспирация

Блок: Блок 35 | № 3474

3474. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ химиотерапия

Блок: Блок 35 | № 3475

3475. ШИРОКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОБОЗНАЧАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЁЗА К

☐ изониазиду, рифампицину, фторхинолону, бедаквилину или линезолиду

Блок: Блок 35 | № 3476

3476. НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ТЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЁЗА НАБЛЮДАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ, ВЫДЕЛЯЮЩИХ МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЁЗА

☐ лекарственно устойчивые к сочетанию основных и резервных противотуберкулезных препаратов

Блок: Блок 35 | № 3477

3477. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА СОСТАВЛЯЕТ (В МЕСЯЦАХ)

☐ 3-6

Блок: Блок 35 | № 3478

3478. СОХРАНЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ВОЗМОЖНО ПРИ

☐ ограниченном туберкулезе без деструкции и бактериовыделения

Блок: Блок 35 | № 3479

3479. ПОБОЧНЫМ ДЕЙСТВИЕМ КАНАМИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нефротоксичность

Блок: Блок 35 | № 3480

3480. ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ НЕЗАВИСИМО ОТ ЕЁ СРОКОВ У БОЛЬНОЙ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ПОКАЗАНО ПРИ

☐ распространенном деструктивном туберкулезе

3481. В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ПРЕОБЛАДАЕТ

- ☐ множественная лекарственная устойчивость

3482. ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ФЕНОТИПА ХОБЛ И БА (ПЕРЕКРЕСТ ХОБЛ-БА) ОДНИМ ИЗ БОЛЬШИХ КРИТЕРИЕВ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ эозинофилия мокроты (>3%)

3483. ЛЕЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫМ ПНЕВМОТОРАКСОМ ПРОВОДИТСЯ ПРИ

- ☐ кавернозном туберкулезе легких

3484. ОСНОВНЫМ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЁЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ Изониазид

3485. ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИМПТОМАМИ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА ЯВЛЯЮТСЯ

- ☐ боли в груди, усиливающиеся при вдохе, с иррадиацией в шею, иногда в эпигастральную или поясничную область и одышка

3486. ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЁЗОМ ПРИНАДЛЕЖИТ

- ☐ химиотерапии

3487. К КОМПЛЕКСУ ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ИЗЛЕЧЕНИЮ ФИБРОЗНО-КАВЕРНОЗНОГО ТУБЕРКУЛЁЗА ОТНОСЯТ

- ☐ специфическую химиотерапию, хирургическое лечение, патогенетическую терапию

3488. 3488 ОСНОВНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ РИФАМПИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ нарушение функции печени

3489. 3489 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЙ НА ХИМИОТЕРАПИЮ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- ☐ степенью выраженности побочного свойства

3490. 3490 МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ОЧАГОВЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЧАЩЕ ОБНАРУЖИВАЮТ В

- ☐ бронхоальвеолярной лаважной жидкости

3491. 3491 ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА ПРИМЕНЯЮТ

- ☐ дренирование плевральной полости по Бюлау во II-III межреберье

3492. 3492 ВТОРИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

- ☐ лечению одним препаратом

3493. 3493 МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ К

- ☐ Изониазиду и Рифампицину

3494. 3494 К КОМПЛЕКСУ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТ

- ☐ Изониазид и Рифампицин

3495. 3495 ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ НА ТУБЕРКУЛИН У БОЛЬНЫХ КАЗЕОЗНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ проявлением вторичного иммунодефицита

3496. 3496 КОМБИНАЦИЯ НЕСКОЛЬКИХ ХИМИОПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- ☐ для воздействия на разные стороны обмена веществ и жизнедеятельности МБТ и более выраженного бактериостатического эффекта

3497. 3497 НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ДЛЯ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ

- ☐ клапанного спонтанного пневмоторакса

3498. 3498 В УСЛОВИЯХ ЗАТУХАЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ ПРОДУКТИВНОЙ ФАЗЫ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ВОСПАЛЕНИЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- ☐ СВЧ-терапию

3499. 3499 СОВРЕМЕННАЯ ГРУППИРОВКА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ИХ РАЗДЕЛЕНИЕ НА

- ☐ препараты I, II и III рядов

Блок: Блок 35 | № 3500

3500. 3500 ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ НАЗНАЧЕННОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ лекарственной устойчивости к препаратам

Блок 36

Блок: Блок 36 | № 3501

3501. ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, С ОСТОРОЖНОСТЬЮ НУЖНО ПРИМЕНЯТЬ

☐ Канамицин, Амикацин

Блок: Блок 36 | № 3502

3502. ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ химиотерапия

Блок: Блок 36 | № 3503

3503. БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ДЕТЯМ ДО 13 ЛЕТ НЕ ПОКАЗАН

☐ этамбутол

Блок: Блок 36 | № 3504

3504. НЕОБХОДИМОСТЬ ОДНОВРЕМЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НЕСКОЛЬКИХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ ПРЕПАРАТОВ БОЛЬНОМУ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОБУСЛОВЛЕНА

☐ возможностью быстрого развития лекарственной устойчивости МБТ

Блок: Блок 36 | № 3505

3505. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМАХ ТУБЕРКУЛЕЗА ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ (В МЕСЯЦАХ)

☐ 6

Блок: Блок 36 | № 3506

3506. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ длительная полихимиотерапия

Блок: Блок 36 | № 3507

3507. ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТАКОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ОСНОВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, КАК

☐ легочное кровотечение

Блок: Блок 36 | № 3508

3508. МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА НАЗЫВАЮТ

☐ устойчивость *M. tuberculosis* к Изониазиду и Рифампицину одновременно вне зависимости устойчивости к другим препаратам

Блок: Блок 36 | № 3509

3509. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ВЕСТИБУЛЯРНЫЕ РАССТРОЙСТВА И ГЛУХОТУ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

☐ Стрептомицин

Блок: Блок 36 | № 3510

3510. ОСНОВНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОБУСЛОВЛЕННЫ

☐ гепатотоксичностью противотуберкулезных препаратов

Блок: Блок 36 | № 3511

3511. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПОБОЧНЫМ ЯВЛЕНИЕМ ПРИ ПРИЕМЕ РИФАМПИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ преходящее повышение трансаминаз

Блок: Блок 36 | № 3512

3512. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА НЕ ПОКАЗАН

☐ левофлоксацин

Блок: Блок 36 | № 3513

3513. ПАЦИЕНТАМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ МИКОБАКТЕРИЙ НАЗНАЧАЮТ _____ РЕЖИМ ХИМИОТЕРАПИИ

☐ IV

Блок: Блок 36 | № 3514

3514. НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ НА ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВКЛЮЧАЕТ

☐ введение ганглиоблокаторов при постоянном контроле артериального давления

Блок: Блок 36 | № 3515

3515. КАКИМ ДЕЙСТВИЕМ НА МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОБЛАДАЮТ ПРЕПАРАТЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГРУППЕ АМИНОГЛИКОЗИДОВ?

☐ бактерицидным, ингибиторы синтеза белка в рибосомах

Блок: Блок 36 | № 3516

3516. В КОМПЛЕКС МЕР ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВХОДИТ

☐ предупреждение профессионально обусловленных заболеваний и травм, несчастных случаев

Блок: Блок 36 | № 3517

3517. ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ В ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОВЛЕКАЕТСЯ _____ КИШКА

☐ прямая

Блок: Блок 36 | № 3518

3518. НЕФРОГЕННАЯ АНЕМИЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ОБУСЛОВЛЕНА

☐ снижением синтеза эритропоэтина

Блок: Блок 36 | № 3519

3519. ОДНИМ ИЗ ДОКАЗАННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ (ШКАЛА РИСКА, АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ) ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие обструкции выходного тракта левого желудочка

Блок: Блок 36 | № 3520

3520. ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ СЧИТАЮТ ПНЕВМОНИЮ, РАЗВИВШУЮСЯ ВНЕ СТАЦИОНАРА, ЛИБО ДИАГНОСТИРОВАННУЮ В ПЕРВЫЕ _____ С МОМЕНТА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

☐ 48 часов

Блок: Блок 36 | № 3521

3521. НАГРУЗОЧНАЯ ДОЗА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОВ, В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ РЕГУЛЯРНО НЕ ПРИНИМАВШИХ ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ СОСТАВЛЯЕТ (МГ)

☐ 150-325

Блок: Блок 36 | № 3522

3522. МЕТАБОЛИЧЕСКИ НЕГАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЮТ

☐ В-адреноблокаторы

Блок: Блок 36 | № 3523

3523. НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ БРОНХОДИЛАТИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЮТ

☐ β 2-агонисты адренорецепторов

Блок: Блок 36 | № 3524

3524. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ПАЦИЕНТОВ БЕЗ ЗНАЧИМЫХ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ РИСКА СЧИТАЮТ

☐ амоксициллин

Блок: Блок 36 | № 3525

3525. ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСТУПА СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧИТЬ

☐ нитроглицерин

Блок: Блок 36 | № 3526

3526. СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДОМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ОЦЕНКИ ВЫРАЖЕННОСТИ ГИПОКСЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пульсоксиметрия

Блок: Блок 36 | № 3527

3527. СИМПТОМОКОМПЛЕКС ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ВКЛЮЧАЕТ

☐ лихорадку, кашель сухой или со скудной мокротой, одышку

Блок: Блок 36 | № 3528

3528. СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ХОЛЕРЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ВЫРАЖЕННОСТЬЮ _____ СИНДРОМА

☐ дегидратационного

Блок: Блок 36 | № 3529

3529. ДЛЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ОДНИМ ИЗ ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ контактно-бытовой

Блок: Блок 36 | № 3530

3530. РАСПРОСТРАНЁННУЮ (ТОКСИЧЕСКУЮ) ФОРМУ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С

☐ ожогом слизистой ротоглотки

Блок: Блок 36 | № 3531

3531. ТИПИЧНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ЯВЛЯЕТСЯ

☐ острый респираторный дистресс-синдром

Блок: Блок 36 | № 3532

3532. ДЛЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ТИПИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАЧИ

☐ воздушно-капельный

Блок: Блок 36 | № 3533

3533. МАРКЕРОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ДОЖЕЛТУШНОГО ПЕРИОДА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ

☐ HCV РНК

Блок: Блок 36 | № 3534

3534. ТИПИЧНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ВКЛЮЧАЮТ

☐ одышку, непродуктивный кашель, заложенность в грудной клетке

Блок: Блок 36 | № 3535

3535. ДЛЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ дисгевзии, аносмии

Блок: Блок 36 | № 3536

3536. ВОЗБУДИТЕЛЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ЯВЛЯЕТСЯ

☐ SARS-CoV-2

Блок: Блок 36 | № 3537

3537. ДЛЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ПРИМЕНЯЮТ МЕТОД

☐ иммунохимический

Блок: Блок 36 | № 3538

3538. ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ХАРАКТЕРНЫ КТ-ПРИЗНАКИ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ

☐ двустороннего полисегментарного по типу "матового стекла"

3539. КАШЕЛЬ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

☐ сухой или с небольшим количеством мокроты

3540. ПРИ СЫПНОМ ТИФЕ ЭКЗАНТЕМА ПОЯВЛЯЕТСЯ НА _____ СУТКИ

☐ 4-6

3541. К ХАРАКТЕРНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 ОТНОСИТСЯ

☐ лимфопения

3542. К ОСНОВНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ОТНОСЯТ

☐ мазок из носоглотки

3543. СОЧЕТАНИЕ ПЕРЕМЕЖАЮЩЕЙСЯ ЛИХОРАДКИ, МИАЛГИЙ, АРТРАЛГИЙ, ГЕПАТОСПЛЕНОМЕГАЛИИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ бруцеллеза

3544. ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА ХАРАКТЕРНО

☐ быстрое повышение температуры тела, головная боль

3545. В ТИПИЧНЫХ СЛУЧАЯХ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 СОСТАВЛЯЕТ (В СУТКАХ)

☐ 2-7

3546. ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ХОЛЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ обильный водянистый стул без запаха, отсутствие болей в животе

3547. ДЛЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕТОД

☐ серологический

3548. ЭТИОЛОГИЯ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ВЫЯВЛЕНИЕМ ВОЗБУДИТЕЛЯ В

☐ ликворе

3549. ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Болезнь Лайма

3550. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ХОЛЕРЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиповолемический шок

3551. ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ФУЛЬМИНАНТНОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БЕРЕМЕННЫХ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ПРИ ВИРУСНОМ ГЕПАТИТЕ

☐ Е

3552. РАННИМ БИОХИМИЧЕСКИМ МАРКЁРОМ ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ падение протромбинового индекса крови

3553. ДЛЯ ТЕЧЕНИЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С ХАРАКТЕРНО

☐ наличие безжелтушных форм в 95% случаев в острой фазе инфекции

3554. ПОРАЖЕНИЕ ТЕРМИНАЛЬНЫХ БРОНХИОЛ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ респираторно-синцитиальной инфекции

3555. ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ респираторный дистресс-синдром

3556. ЦИТОЛИТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕМ

☐ АЛТ и АСТ

3557. ЛИКВОР ПРИ МЕНИНГОКОККОВОМ МЕНИНГИТЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ нейтрофилёзом (до 80-90%)

3558. МЕТОДОМ ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ЯВЛЯЕТСЯ

☐ КТ органов грудной клетки без внутривенного контрастирования

Блок: Блок 36 | № 3559

3559. ДЛЯ СРЕДНЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ХАРАКТЕРНА САТУРАЦИЯ КИСЛОРОДА (SpO₂) (В ПРОЦЕНТАХ)

☐ < 95

Блок: Блок 36 | № 3560

3560. ВЕДУЩИМ ПУТЕМ ПЕРЕДАЧИ SARS-CoV-2 ЯВЛЯЕТСЯ

☐ воздушно-капельный

Блок: Блок 36 | № 3561

3561. ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ЯВЛЯЕТСЯ

☐ больной человек

Блок: Блок 36 | № 3562

3562. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКЗАНТЕМЫ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ВКЛЮЧАЮТ

☐ папуло-везикулезные высыпания по типу милиарии

Блок: Блок 36 | № 3563

3563. ВИРУСНАЯ ПНЕВМОНИЯ ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ЧАЩЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ нарастающей одышкой

Блок: Блок 36 | № 3564

3564. ФАКТОРЫ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К ТЯЖЕЛОМУ ТЕЧЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19, ВКЛЮЧАЮТ ВОЗРАСТ

☐ старше 60 лет, сахарный диабет, онкологические заболевания

Блок: Блок 36 | № 3565

3565. МЕТОДОМ ВЫБОРА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ЯВЛЯЕТСЯ

☐ компьютерная томография органов грудной клетки

Блок: Блок 36 | № 3566

3566. МАКСИМАЛЬНЫЙ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 СОСТАВЛЯЕТ

☐ 14 дней

Блок: Блок 36 | № 3567

3567. МИНИМАЛЬНЫЙ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД ПРИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 СОСТАВЛЯЕТ

☐ 2 дня

Блок: Блок 36 | № 3568

3568. В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 НАБЛЮДАЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ лимфопении и тромбоцитопении

Блок: Блок 36 | № 3569

3569. ОСНОВНЫМИ МИШЕНЯМИ ДЛЯ ВОЗБУДИТЕЛЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ЯВЛЯЮТСЯ КЛЕТКИ

☐ дыхательного тракта

Блок: Блок 36 | № 3570

3570. КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПРИСОЕДИНЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ COVID-19 ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гнойная мокрота

Блок: Блок 36 | № 3571

3571. В РЕКОМЕНДОВАННЫХ СХЕМАХ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19 В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ УМИФЕНОВИР НАЗНАЧАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ

☐ 5-7 дней

Блок: Блок 36 | № 3572

3572. В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ В РЕКОМЕНДОВАННЫХ СХЕМАХ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ фавипиравир

Блок: Блок 36 | № 3573

3573. ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СТОЛБНЯКА НАЗНАЧАЮТ

☐ АС (столбнячный анатоксин)

Блок: Блок 36 | № 3574

3574. ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ регидратация

Блок: Блок 36 | № 3575

3575. В РЕКОМЕНДОВАННЫХ СХЕМАХ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 К ПРЕПАРАТАМ С ПРЯМЫМ ПРОТИВОВИРУСНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОТНОСИТСЯ

☐ ремдесивир

Блок: Блок 36 | № 3576

3576. В РЕКОМЕНДОВАННЫХ СХЕМАХ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19 В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРОРАЛЬНЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ НАЗНАЧАЮТСЯ ВПЛОТЬ ДО (В ДНЯХ)

☐ 30

Блок: Блок 36 | № 3577

3577. В РЕКОМЕНДОВАННЫХ СХЕМАХ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19 В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ФАВИПИРАВИР НАЗНАЧАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В ДНЯХ)

☐ 10

3578. ПРОТИВПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТОВ ПРИ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ЯВЛЯЕТСЯ

☐ уровень тромбоцитов в крови ниже $25 \times 10^9/\text{л}$

3579. С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ОТХОЖДЕНИЯ МОКРОТЫ ПРИ ПРОДУКТИВНОМ КАШЛЕ У БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ ацетилцистеина

3580. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ШИГЕЛЛЁЗА НАЗНАЧАЮТ

☐ фторхинолоны

3581. С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ОТХОЖДЕНИЯ МОКРОТЫ ПРИ ПРОДУКТИВНОМ КАШЛЕ У БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 НАЗНАЧАЮТ

☐ амброксол, карбоцистеин

3582. В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ В РЕКОМЕНДОВАННЫХ СХЕМАХ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 ЛЕГКОГО ТЕЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ умифеновир

3583. С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ОТХОЖДЕНИЯ МОКРОТЫ ПРИ ПРОДУКТИВНОМ КАШЛЕ У БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 НАЗНАЧАЮТ

☐ мукоактивные препараты

3584. ПРИ РАЗВИТИИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ, НЕ ПРИМЕНЯВШИХ АНТИБИОТИКИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3-Х МЕСЯЦЕВ, ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ амоксициллин

3585. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ ИЕРСИНИОЗА НАЗНАЧАЮТ

☐ фторхинолоны

3586. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С «ВОДЯНИСТОЙ» ДИАРЕЕЙ И НОРМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ, ПРИБЫВШИХ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ

☐ холеру

Блок: Блок 36 | № 3587

3587. К ПЕРОРАЛЬНЫМ АНТИКОАГУЛЯНТАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19, ОТНОСЯТ

☐ дабигатрана этексилат

Блок: Блок 36 | № 3588

3588. ОДНИМ ИЗ ПРЕПАРАТОВ С ПРЯМЫМ ПРОТИВОВИРУСНЫМ ДЕЙСТВИЕМ РЕКОМЕНДОВАННЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фавипиравир

Блок: Блок 36 | № 3589

3589. ПРИ РАЗВИТИИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ COVID-19 СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ, С СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ПРИМЕНЯВШИХ АНТИБИОТИКИ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ 3-Х МЕСЯЦЕВ, АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ПРЕПАРАТОМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ левофлоксацин

Блок: Блок 36 | № 3590

3590. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЗОВ И ТРОМБОЭМБОЛИЙ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НЕТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ У КОМОРБИДНЫХ БОЛЬНЫХ РЕКОМЕНДУЮТ

☐ ривароксабан

Блок: Блок 36 | № 3591

3591. ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ ЕДИНОЛИЧНО МОЖЕТ СФОРМИРОВАТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА (В ДНЯХ)

☐ 15

Блок: Блок 36 | № 3592

3592. ВАРИАНТА, ИМЕЮЩАЯ НАИБОЛЬШУЮ ЧАСТОТУ В ВАРИАЦИОННОМ РЯДУ, НАЗЫВАЕТСЯ

☐ модой

Блок: Блок 36 | № 3593

3593. ПРИ БЛАГОПРИЯТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ И ТРУДОВОМ ПРОГНОЗЕ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ СФОРМИРОВАН И ПРОДЛЕН ДО ДНЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ, НО НА СРОК НЕ БОЛЕЕ ____ МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ НАЧАЛА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, А ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА - НЕ БОЛЕЕ ____ МЕСЯЦЕВ

☐ 10; 12

Блок: Блок 36 | № 3594

3594. ФОРМИРОВАНИЕ (ВЫДАЧА) ЛИСТКОВ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НЕЗАВИСИМО ОТ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ФОРМЫ (ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ), ИМЕЮЩИМИ ЛИЦЕНЗИЮ НА МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ РАБОТЫ (УСЛУГИ) ПО

☐ экспертизе временной нетрудоспособности

Блок: Блок 36 | № 3595

3595. ПРИ НАЛИЧИИ ОШИБОК В ЗАПОЛНЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ЛИБО В СВЯЗИ С ЕГО ПОРЧЕЙ ИЛИ УТЕРЕЙ ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ВЗАМЕН РАНЕЕ ВЫДАННОГО ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

☐ оформляется дубликат листка нетрудоспособности

Блок: Блок 36 | № 3596

3596. ВАРИАНТА, ДЕЛЯЩАЯ ВАРИАЦИОННЫЙ РЯД ПОПОЛАМ ПО ЧИСЛУ НАБЛЮДЕНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

☐ медианой

Блок: Блок 36 | № 3597

3597. ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО УХОДУ ЗА ВЗРОСЛЫМ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ФОРМИРУЕТСЯ НА

☐ 7 календарных дней

Блок: Блок 36 | № 3598

3598. ВРАЧИ ПОЛИКЛИНИКИ ВЫПОЛНЯЮТ ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ, САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНУЮ РАБОТУ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКУЮ РАБОТУ И ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

☐ ведение медицинской документации

Блок: Блок 36 | № 3599

3599. СТЕПЕНЬ ВАРЬИРОВАНИЯ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

☐ среднего квадратического отклонения

Блок: Блок 36 | № 3600

3600. ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 15 ЛЕТ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ПО КАЖДОМУ СЛУЧАЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА

☐ весь период лечения

Блок 37

Блок: Блок 37 | № 3601

3601. ОДНИМИ ИЗ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРИЧИН ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ В РФ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ болезни системы кровообращения и онкологические заболевания

Блок: Блок 37 | № 3602

3602. В СОСТАВ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ВХОДИТ

☐ лечащий врач, заведующий отделением и заместитель главного врача, в должностные обязанности которого входит решение вопросов, отнесенных к компетенции комиссии

Блок: Блок 37 | № 3603

3603. ПОДХОД К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

☐ процессный

Блок: Блок 37 | № 3604

3604. ФЕЛЬДШЕР ИЛИ ЗУБНОЙ ВРАЧ ЕДИНОЛИЧНО ВЫДАЕТ (ФОРМИРУЕТ) ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДО (В ДНЯХ)

☐ 10

Блок: Блок 37 | № 3605

3605. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОБРАТИМОСТИ ОБСТРУКЦИИ БРОНХОДИЛАТАЦИОННЫЙ ТЕСТ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

☐ β2-адреномиметика

Блок: Блок 37 | № 3606

3606. СИНДРОМ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПАТОГНОМОНИЧЕН ДЛЯ

☐ цирроза печени

Блок: Блок 37 | № 3607

3607. МОНОТЕРАПИЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ РЕКОМЕНДОВАНА ПАЦИЕНТАМ

☐ очень пожилого возраста (>80 лет)

Блок: Блок 37 | № 3608

3608. В КАЧЕСТВЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 1-Й ЛИНИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛЫМИ ОБОСТРЕНИЯМИ ХОБЛ И С ФАКТОРАМИ РИСКА, А ТАКЖЕ С АЛЛЕРГИЕЙ НА ПЕНИЦИЛЛИН, РЕКОМЕНДУЕТСЯ

☐ Левофлоксацин

Блок: Блок 37 | № 3609

3609. РЕПЕРFUЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА СМЕРТИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ С ОКС И ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ СИМПТОМОВ МЕНЕЕ ____ ЧАСОВ

☐ 12

Блок: Блок 37 | № 3610

3610. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ глюкокортикоиды

Блок: Блок 37 | № 3611

3611. ПАЦИЕНТАМ С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ, СО ЗНАЧИМЫМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И/ИЛИ ДРУГИМИ ФАКТОРАМИ РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ РЕДКИМИ И/ИЛИ ПОЛИРЕЗИСТЕНТНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕПАРАТА ВЫБОРА ПРИ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ПЕНИЦИЛЛИНА НАЗНАЧИТЬ

☐ левофлоксацин

Блок: Блок 37 | № 3612

3612. ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ БОЛИ, С ЦЕЛЬЮ СЕДАЦИИ И СНИЖЕНИЯ СИМПАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПРИВОДЯЩЕЙ К ТАХИКАРДИИ И ПОВЫШЕНИЮ АД, ПАЦИЕНТАМ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВОДИТЬ

☐ морфин внутривенно

Блок: Блок 37 | № 3613

3613. ПРИ МИЛИАРНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАЗМЕРЫ ОЧАГОВ (В ММ)

☐ 1-2

Блок: Блок 37 | № 3614

3614. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ НА НАЛИЧИЕ КИСЛОТОУСТОЙЧИВЫХ МИКОБАКТЕРИЙ ПРОВОДИТСЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ЛАБОРАТОРИЯМИ

☐ общей лечебной сети

Блок: Блок 37 | № 3615

3615. ПРИ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ МАНТУ ИЛИ ДИАСКИНТЕСТА ВОЗМОЖНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ альтернативных методов иммунодиагностики туберкулеза

Блок: Блок 37 | № 3616

3616. К ОСНОВНОЙ ПРИЧИНЕ РАЗВИТИЯ ГИПЕРОСМОЛЯРНОЙ КОМЫ ОТНОСЯТ

☐ дегидратацию организма

Блок: Блок 37 | № 3617

3617. ДОСТОВЕРНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ИНТРАСЕЛЛЯРНОЙ АДЕНОМЫ ГИПОФИЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ увеличение размеров турецкого седла

Блок: Блок 37 | № 3618

3618. ДИАГНОЗ САХАРНОГО ДИАБЕТА МОЖНО ПОСТАВИТЬ ПРИ УРОВНЕ ГЛЮКОЗЫ В ХОДЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА (ММОЛЬ/Л)

☐ 11,1

Блок: Блок 37 | № 3619

3619. КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА ОТРАЖАЕТ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ГЛИКЕМИИ ЗА

☐ 3 месяца

Блок: Блок 37 | № 3620

3620. ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА ТРЕБУЕТ ПРИЕМА

☐ 75 мл раствора глюкозы 20%

Блок: Блок 37 | № 3621

3621. ПИК ДЕЙСТВИЯ ИНСУЛИНА УЛЬТРАКОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ НАСТУПАЕТ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

☐ 1,5-2

Блок: Блок 37 | № 3622

3622. ЙОД ЯВЛЯЕТСЯ СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ГОРМОНОВ

☐ щитовидной железы

Блок: Блок 37 | № 3623

3623. ОДНИМ ИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гликированный гемоглобин

Блок: Блок 37 | № 3624

3624. НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ И ДОСТУПНЫМ МЕТОДОМ ОЦЕНКИ РАЗМЕРОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ультразвуковое исследование

Блок: Блок 37 | № 3625

3625. ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ

☐ альбуминурии

Блок: Блок 37 | № 3626

3626. НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛИКЕМИИ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ ЕДЫ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ (ММОЛЬ/Л)

☐ 7,8

Блок: Блок 37 | № 3627

3627. НЕОБХОДИМЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЕМ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ определение уровней ТТГ, св. Т3, св. Т4

Блок: Блок 37 | № 3628

3628. ПЕРОРАЛЬНОМУ ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОМУ ТЕСТУ ДОЛЖНО ПРЕДШЕСТВОВАТЬ НОЧНОЕ ГОЛОДАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЧАСОВ

☐ 8-14

Блок: Блок 37 | № 3629

3629. СИНДРОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ОСЛОЖНЯЕТСЯ

☐ стопой Шарко

Блок: Блок 37 | № 3630

3630. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПОДСЧЕТ ХЛЕБНЫХ ЕДИНИЦ РЕКОМЕНДОВАН ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

☐ интенсифицированной инсулинотерапии

Блок: Блок 37 | № 3631

3631. ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ агонист рецепторов ГПП-1

Блок: Блок 37 | № 3632

3632. ЦЕЛЕВЫМ УРОВНЕМ ГЛИКЕМИИ НАТОЩАК У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ISPAD ОТ 2018 Г. ЯВЛЯЕТСЯ (В ММОЛЬ/Л)

☐ 4,0-7,0

3633. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГИПОКАЛЬЦИЕМИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ РАСТВОР

☐ хлорида кальция 10%

3634. ПАРИЕТАЛЬНЫЕ (ОБКЛАДОЧНЫЕ) КЛЕТКИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА, ПОМИМО СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ, ВЫРАБАТЫВАЮТ

☐ внутренний фактор Касла

3635. ИСХОДНАЯ МАММОГРАФИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА ЖЕНЩИНАМ В ВОЗРАСТЕ ____ ЛЕТ

☐ 35-40

3636. ЛЕЙКОЦИТОЗ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ

☐ пневмонии

3637. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЗАДНЕДИАФРАГМАЛЬНОГО (НИЖНЕГО) ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗУБЦА Q ИЛИ КОМПЛЕКСА QS В ОТВЕДЕНИЯХ

☐ III, aVF, II

3638. В ЛЕЧЕНИИ АУТОИММУННОГО ГЕПАТИТА ОДНИМ ИЗ РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ преднизолон

3639. ПРОФИЛАКТИКА ФОЛИЕВОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ВЗРОСЛЫХ ИЗ "ГРУПП РИСКА" ПРОВОДИТСЯ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТОЙ В ДОЗЕ (МКГ/СУТ)

☐ 150-200, длительность определяется индивидуально

3640. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПРЕПАРАТОВ В12 ПАЦИЕНТУ С В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ БУДЕТ СЛУЖИТЬ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГЕМОГЛОБИНА ЧЕРЕЗ ____ ОТ НАЧАЛА ТЕРАПИИ

☐ 7-10 дней

3641. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ЦИАНОКОБАЛАМИНА ПАЦИЕНТУ С В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ БУДЕТ СЛУЖИТЬ РЕЗКОЕ ВОЗРАСТАНИЕ КОЛИЧЕСТВА РЕТИКУЛОЦИТОВ ____ ОТ НАЧАЛА ТЕРАПИИ

☐ на 5-7 день

Блок: Блок 37 | № 3642

3642. ИПРАТРОПИЯ БРОМИД СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ У ПАЦИЕНТОВ С

☐ закрытоугольной глаукомой

Блок: Блок 37 | № 3643

3643. НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ БРОНХОЛИТИКОМ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ипратропия бромид

Блок: Блок 37 | № 3644

3644. ПРИ НЕТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИИ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

☐ амоксициллин

Блок: Блок 37 | № 3645

3645. ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И С ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НЕ СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ

☐ ипратропия бромид

Блок: Блок 37 | № 3646

3646. ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ВИТАМИНОМ В12 ПАЦИЕНТУ С В12 ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ СЛЕДУЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ С УЧЕТОМ РЕТИКУЛОЦИТОВ 1 РАЗ В

☐ 3-4 месяца

Блок: Блок 37 | № 3647

3647. ВОЗБУДИТЕЛЕМ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кишечная палочка

Блок: Блок 37 | № 3648

3648. РЕСТРИКТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО ДАННЫМ СПИРОМЕТРИИ, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ БОЛЬНЫХ

☐ идиопатическим легочным фиброзом

Блок: Блок 37 | № 3649

3649. ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИХ К ОБРАЗОВАНИЮ ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ (В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ХОЛЕСТЕРИНОВЫХ), ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ожирение

Блок: Блок 37 | № 3650

3650. САМЫМ РАННИМ ПРИЗНАКОМ РАЗВИТИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ клубочковая гиперфилътрация

Блок: Блок 37 | № 3651

3651. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ДИЕТОТЕРАПИИ ПРИ ОЖИРЕНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ

☐ нутриметаболического анализа

Блок: Блок 37 | № 3652

3652. РЕМИССИЕЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1-ГО ТИПА СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ КОНЦЕНТРАЦИЯ HbA1c < 7%, А СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЭКЗОГЕННОМ ИНСУЛИНЕ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ _____ ЕД/КГ МАССЫ ТЕЛА (Пороговое значение)

☐ 0,5

Блок: Блок 37 | № 3653

3653. Для определения стадии фиброза печени рекомендуется использовать

☐ эластометрия

Блок: Блок 37 | № 3654

3654. Тромбоцитопения часто проявляется

☐ носовыми, десневыми, тяжелыми кровотечениями после травм

Блок: Блок 37 | № 3655

3655. При митральной недостаточности наиболее характерным изменением, выявляемым при перкуссии сердца, является

☐ смещение границ относительной сердечной тупости вверх и влево

Блок: Блок 37 | № 3656

3656. Профилактика тромбоза глубоких вен нижних конечностей у пациентов со среднетяжелой формой COVID-19 с высоким риском тромбоэмболических осложнений в амбулаторных условиях проводится профилактическими дозами

☐ низкомолекулярного гепарина

Блок: Блок 37 | № 3657

3657. Противовирусным средством, разрешенным с 3-х летнего возраста, является

☐ ацикловир

Блок: Блок 37 | № 3658

3658. Наименее характерным для дебюта ревматоидного артрита является поражение

☐ дистальных межфаланговых суставов кистей

Блок: Блок 37 | № 3659

3659. Абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE определяют у граждан в возрасте до (в годах)

☐ 65

Блок: Блок 37 | № 3660

3660. Противопоказанием к назначению изониазида является

☐ заболевание центральной и периферической нервной систем

Блок: Блок 37 | № 3661

3661. Относительным противопоказанием к проведению нагрузочного теста является

☐ стеноз ствола левой коронарной артерии

Блок: Блок 37 | № 3662

3662. НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ТИПА Е (ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ) ПРОЯВЛЯЮТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

☐ индивидуальной нечувствительности и устойчивости

Блок: Блок 37 | № 3663

3663. В СОСТАВЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ГРАНУЛЕМЫ ОТСУТСТВУЮТ

☐ эозинофилы

Блок: Блок 37 | № 3664

3664. ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ остеоденситометрия

Блок: Блок 37 | № 3665

3665. ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В И С ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ СВЯЗАНА С

☐ массивной трансфузионной нагрузкой препаратами крови

Блок: Блок 37 | № 3666

3666. НОСИТЕЛЬСТВО В27-АНТИГЕНОВ HLA СВОЙСТВЕННО

☐ болезни Бехтерева

Блок: Блок 37 | № 3667

3667. ЛЕЙКОЦИТОЗ МОЖЕТ БЫТЬ ОТРАЖЕНИЕМ

☐ пневмонии

Блок: Блок 37 | № 3668

3668. АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ НАПРАВЛЕНА НА

☐ снижение частоты рецидивов язвенной болезни

Блок: Блок 37 | № 3669

3669. КРИТЕРИЕМ ДИАГНОЗА «УЗЕЛКОВЫЙ ПОЛИАРТЕРИИТ» ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие вируса гепатита В

Блок: Блок 37 | № 3670

3670. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ВОЗБУДИТЕЛЕМ ГОСПИТАЛЬНОЙ (ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ) ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ клебсиелла

Блок: Блок 37 | № 3671

3671. ГИПЕРОСМОЛЯРНАЯ КОМА РАЗВИВАЕТСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ

☐ дегидратация организма

Блок: Блок 37 | № 3672

3672. У ПАЦИЕНТА С ЗАБОЛЕВАНИЕМ ЦНС, ПРИНИМАВШЕГО МЕТИЛДОПА, РАЗВИЛАСЬ ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ АНЕМИЯ, КОТОРАЯ БЫСТРО ПРОШЛА ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ПРЕПАРАТА. ВИДОМ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ, ПО КОТОРОМУ РАЗВИЛОСЬ ЭТО ОСЛОЖНЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ цитотоксический

Блок: Блок 37 | № 3673

3673. КРАТНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ОДНОМ ВИЗИТЕ К ВРАЧУ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 2

Блок: Блок 37 | № 3674

3674. ИЗ ВСЕГО ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ В ГЕМОГЛОБИН ВКЛЮЧАЕТСЯ (%)

☐ 70-73

Блок: Блок 37 | № 3675

3675. ТЯЖЕЛЫЙ НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ МИОЗИТ С РАСПАДОМ МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ПАТОГНОМОНИЧЕН ДЛЯ

☐ дерматомиозита

Блок: Блок 37 | № 3676

3676. «ШТАМПОВАННЫЕ» ДЕФЕКТЫ В ЭПИФИЗАХ КОСТЕЙ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ СУСТАВА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ подагры

Блок: Блок 37 | № 3677

3677. ПРИНЦИП СНИЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО АД ПРИ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

☐ денервации почечных артерий

Блок: Блок 37 | № 3678

3678. ПРИ ТЯЖЕЛОМ ТЕЧЕНИИ СИНДРОМА РЕЙНО ОПРАВДАНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ТЕРАПИИ

☐ синтетических простагландинов

Блок: Блок 37 | № 3679

3679. ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ

☐ снижает заболеваемость контактных лиц

Блок: Блок 37 | № 3680

3680. ВОЗНИКНОВЕНИЕ СИНДРОМА ДИССЕМИНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ОСТРОГО ____ ЛЕЙКОЗА

☐ промиелоцитарного

Блок: Блок 37 | № 3681

3681. ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ДЕФИЦИТА ФАКТОРА VIII ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ Октанат

Блок: Блок 37 | № 3682

3682. С МОМЕНТА ПОСЛЕДНЕГО ПРИЕМА ПИЩИ ДО ПРОВЕДЕНИЯ ОРАЛЬНОГО ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА ДОЛЖНО ПРОЙТИ НЕ МЕНЕЕ (В ЧАСАХ)

☐ 8

Блок: Блок 37 | № 3683

3683. СИМПТОМАТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ В ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ В2-агонисты адренорецепторов

Блок: Блок 37 | № 3684

3684. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ ВЫЯВЛЕННОЕ ОТСУТСТВИЕ ПЕРИСТАЛЬТИКИ В ДИСТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ПИЩЕВОДА ПРИ НОРМАЛЬНОЙ МОТОРИКЕ В ПРОКСИМАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ системной склеродермии

Блок: Блок 37 | № 3685

3685. РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА НАИБОЛЕЕ ВЫСОК ПРИ

☐ дефекте межжелудочковой перегородки

Блок: Блок 37 | № 3686

3686. ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ БОЛЬНОГО ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО УХОДУ ЗА ВЗРОСЛЫМ ЧЛЕНОМ СЕМЬИ ВЫДАЕТСЯ

☐ участковым врачом на 3 дня, КЭК с 4-го по 7-й день

Блок: Блок 37 | № 3687

3687. ИЗ СУЛЬФАНИЛАМИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ПРОСВЕТЕ КИШЕЧНИКА, НЕ ВСАСЫВАЯСЬ В КРОВЬ

☐ фталзол

Блок: Блок 37 | № 3688

3688. МУЖЧИНЕ С ХОБЛ И ЖАЛОБАМИ НА ЗАТРУДНЕННОЕ МОЧЕИСПУСКАНИЕ НЕЛЬЗЯ НАЗНАЧАТЬ

☐ атровент

Блок: Блок 37 | № 3689

3689. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ КАЖДОМУ ВЗРОСЛОМУ ГРАЖДАНИНУ 1 РАЗ В

☐ 3 года

Блок: Блок 37 | № 3690

3690. ДИВЕРТИКУЛОМ ЦЕНКЕРА ЯВЛЯЕТСЯ ДИВЕРТИКУЛ

☐ глоточно-пищеводный

Блок: Блок 37 | № 3691

3691. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СТОЛБНЯКА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ антитоксическая сыворотка

Блок: Блок 37 | № 3692

3692. ПОСЛЕ ПОСТАНОВКИ ВНУТРИКОЖНОЙ ПРОБЫ С ПРЕПАРАТОМ АЛЛЕРГЕНОМ ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ РЕКОМБИНАНТНЫМ В СТАНДАРТНОМ РАЗВЕДЕНИИ (ДИАСКИНТЕСТ) РЕЗУЛЬТАТ ОЦЕНИВАЮТ ЧЕРЕЗ (В ЧАСАХ)

☐ 72

Блок: Блок 37 | № 3693

3693. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ИПРАТРОПИЯ БРОМИДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ глаукома

Блок: Блок 37 | № 3694

3694. СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПРИЗНАКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНОЙ И НАЗЫВАЕТСЯ

☐ средним арифметическим

Блок: Блок 37 | № 3695

3695. К КАТЕГОРИИ СОБСТВЕННО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ

☐ антракоз, вибрационную болезнь

Блок: Блок 37 | № 3696

3696. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ СИНДРОМАМ ПРИ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЁЗ ОТНОСЯТ

☐ синдром внутригрудной лимфаденопатии, синдром диссеминации, синдром плеврального выпота

Блок: Блок 37 | № 3697

3697. ПОКАЗАТЕЛЕМ ОПТИМАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ГЛИКЕМИИ НАТОЩАК У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ISPAD ОТ 2014 Г. ЯВЛЯЕТСЯ ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ (В ММОЛЬ/Л)

☐ 4-8

Блок: Блок 37 | № 3698

3698. ДОЗУ ИНСУЛИНА ПО КОЛИЧЕСТВУ ХЛЕБНЫХ ЕДИНИЦ В РАЦИОНЕ РАССЧИТЫВАЮТ ДЛЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

☐ тип 1

Блок: Блок 37 | № 3699

3699. ПРИ СОХРАНЯЮЩЕЙСЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ БОЛЕЕ 48 ЧАСОВ ДО ПРОВЕДЕНИЯ КАРДИОВЕРСИИ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН ПОЛУЧАТЬ ЭФФЕКТИВНУЮ АНТИКОАГУЛЯНТНУЮ ТЕРАПИЮ НЕ МЕНЕЕ (НЕДЕЛЯ)

☐ 3

Блок: Блок 37 | № 3700

3700. ГРУППОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ШКОЛЫ ПАЦИЕНТОВ) ОРГАНИЗУЕТСЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

☐ III групп здоровья

Блок 38

Блок: Блок 38 | № 3701

3701. СОЧЕТАНИЕ СИНДРОМА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТОНИИ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМ СНИЖЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПОЧЕК И АСИММЕТРИЧНЫМ ПОЛИНЕВРИТОМ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ узелкового полиартериита

Блок: Блок 38 | № 3702

3702. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нарушение ритма

Блок: Блок 38 | № 3703

3703. ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИНОГОРОДНИМ ОФОРМЛЯЕТ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ, ЗАВЕРЯЕТСЯ ГЕРБОВОЙ ПЕЧАТЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ ВИЗИРУЕТСЯ

☐ главным врачом (или его заместителем)

Блок: Блок 38 | № 3704

3704. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГ В СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ В-адреноблокаторы

Блок: Блок 38 | № 3705

3705. КРАТКОЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЗАНИМАЕТ (МИН.)

☐ 10

Блок: Блок 38 | № 3706

3706. ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ зидовудин

Блок: Блок 38 | № 3707

3707. ГРУППОВОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ (ШКОЛА ПАЦИЕНТОВ) ОРГАНИЗУЕТСЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ____ ГРУППЫ/ГРУПП ЗДОРОВЬЯ

☐ II и III

Блок: Блок 38 | № 3708

3708. ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ СТРЕПТОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ РЕВМАТИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА ВОЗНИКАЕТ ЧЕРЕЗ

☐ 2 недели

Блок: Блок 38 | № 3709

3709. ВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

☐ развития осложненных форм туберкулеза

Блок: Блок 38 | № 3710

3710. ПРОБУ МАНТУ ОЦЕНИВАЮТ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ 2 ТЕ СПУСТЯ (В ЧАСАХ)

☐ 72

Блок: Блок 38 | № 3711

3711. ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ (НОРМЕРГИЧЕСКОЙ) РЕАКЦИЕЙ НА ТУБЕРКУЛИН ЯВЛЯЕТСЯ

☐ папула 5-16 мм

Блок: Блок 38 | № 3712

3712. В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ФОРМЫ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ЧАЩЕ НАБЛЮДАЮТСЯ

☐ тошнота, рвота, жидкий водянистый стул зеленоватого цвета, диффузные боли в животе, высокая температура

Блок: Блок 38 | № 3713

3713. ТРОМБОЛИЗИС ПРИ ОИМ ЭФФЕКТИВЕН В ПЕРВЫЕ (ЧАС)

☐ 6

Блок: Блок 38 | № 3714

3714. ХРОНИЗАЦИЕЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ИСХОДОМ В ЦИРРОЗ ЧАЩЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ

☐ С

Блок: Блок 38 | № 3715

3715. ОЧАГОМ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ жилище больного, выделяющего микобактерии туберкулеза

Блок: Блок 38 | № 3716

3716. ПРИ МИЛИАРНОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ РАЗМЕРЫ ОЧАГОВ ДО (ММ)

☐ 3

Блок: Блок 38 | № 3717

3717. ПРИ МАССОВОЙ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКЕ ОБЩЕПРИНЯТЫМ МЕТОДОМ ВВЕДЕНИЯ ТУБЕРКУЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ внутрикожный

Блок: Блок 38 | № 3718

3718. К НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНОМУ ПРОЯВЛЕНИЮ КОЖНОГО СИНДРОМА ПРИ ДЕРМАТОМИОЗИТЕ ОТНОСЯТ

☐ фоточувствительную эритематозную сыпь на лице и груди

Блок: Блок 38 | № 3719

3719. САККАДИРОВАННОЕ ДЫХАНИЕ НЕ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ

☐ гипервентиляции

Блок: Блок 38 | № 3720

3720. НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ПАРЦИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ CO₂ СОСТАВЛЯЕТ (ММ РТ.СТ.)

☐ 35-45

Блок: Блок 38 | № 3721

3721. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ТЕРАПИИ ДИАБЕТА 2 ТИПА ПРИ НЕДОСТИЖЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ НА ФОНЕ ПРИЕМА ПЕРОРАЛЬНЫХ САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инсулин

Блок: Блок 38 | № 3722

3722. ПАЦИЕНТЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ В ОТСУТСТВИЕ ИЗВЕСТНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ РИСКА

☐ очень высокого

Блок: Блок 38 | № 3723

3723. ДИУРЕТИЧЕСКУЮ ТЕРАПИЮ БОЛЬНЫМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НАЧИНАЮТ НА СТАДИИ

☐ IIA

Блок: Блок 38 | № 3724

3724. УЧЕТ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ ВЕДЕТСЯ ПО МЕСТУ

☐ жительства ребенка

Блок: Блок 38 | № 3725

3725. МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫ К

☐ ультрафиолетовому солнечному излучению

Блок: Блок 38 | № 3726

3726. ПИЩЕВОД БАРРЕТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ МЕТАПЛАЗИЕЙ

☐ многослойного плоского неороговевающего эпителия пищевода с развитием цилиндрического эпителия с железами кишечного типа

Блок: Блок 38 | № 3727

3727. МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ДИАМЕТРА ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ПРОТОКА В ОБЛАСТИ ГОЛОВКИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ СОСТАВЛЯЕТ (В ММ)

☐ 2

Блок: Блок 38 | № 3728

3728. ПЕРЕД ИЗМЕРЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЬ КУРЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ (ЧАС)

☐ 0,5

Блок: Блок 38 | № 3729

3729. СИНДРОМ ТРАХЕИТА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ гриппа

Блок: Блок 38 | № 3730

3730. СЕКРЕЦИЯ ГОРМОНА РОСТА СТИМУЛИРУЕТСЯ ПРИ

☐ гипогликемии

Блок: Блок 38 | № 3731

3731. ЗАБОЛЕВАНИЯ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ В ГРУППУ ДИСSEМИНИРОВАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ СИНДРОМОМ

☐ рентгенологический синдром диссеминации

Блок: Блок 38 | № 3732

3732. ОТЕК КЛЕТЧАТКИ ШЕИ ПРИ НАЛИЧИИ ТОНЗИЛЛИТА ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ дифтерии

Блок: Блок 38 | № 3733

3733. СРЕДСТВОМ ВЫБОРА ДЛЯ АНТИАНГИНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СЛУЖАТ

☐ бензотиазепиновые антагонисты кальция

Блок: Блок 38 | № 3734

3734. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВЕДЕНИЕ СПЛЕНЭКТОМИИ ПРИ

☐ идиопатической тромбоцитопенической пурпуре

Блок: Блок 38 | № 3735

3735. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПУТЕМ ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ воздушно-капельный

Блок: Блок 38 | № 3736

3736. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ С НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И СОХРАННОЙ ФУНКЦИЕЙ ПОЧЕК ОТНОСЯТ

☐ тромбозы и эмболии

Блок: Блок 38 | № 3737

3737. ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДО ОТЪЕЗДА В САНАТОРИЙ РАБОТНИК ПРЕДОСТАВЛЯЕТ

☐ путевку в санаторий

Блок: Блок 38 | № 3738

3738. ПРИ СНИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ОФВ1<50% ОТ ДОЛЖНОГО СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ОЦЕНИВАЕТСЯ КАК

☐ тяжелая

Блок: Блок 38 | № 3739

3739. ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ, ЯВЛЯЮТСЯ ОФВ1/ФЖЕЛ<70% И

☐ ОФВ1 = 50-80%

Блок: Блок 38 | № 3740

3740. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ПОЯВЛЕНИЕМ «ВОДЯНИСТОЙ» ДИАРЕИ НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ НЕ ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ антибактериальных препаратов

Блок: Блок 38 | № 3741

3741. ИЗМЕНЕНИЕМ В ЛИКВОРЕ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ОСТРОГО МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нейтрофилия (до 80-90%)

Блок: Блок 38 | № 3742

3742. ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА ПОРАЖАЮТСЯ

☐ все слои кишечника

Блок: Блок 38 | № 3743

3743. ПРИ НЕФРОБИОПСИИ ДИАГНОЗУ «УЗЕЛКОВЫЙ ПОЛИАРТЕРИИТ, ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ, С ПОРАЖЕНИЕМ ПОЧЕК» В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ БУДУТ СООТВЕТСТВОВАТЬ

☐ множественные инфаркты

Блок: Блок 38 | № 3744

3744. ЖЕЛУДОЧКОВУЮ ТАХИКАРДИЮ ТИПА «ПИРУЭТ» СПОСОБЕН СПРОВОЦИРОВАТЬ

☐ соталол

Блок: Блок 38 | № 3745

3745. ЦИТОЛИЗ ПЕЧЕНОЧНЫХ КЛЕТОК ПРИ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТАХ ОТРАЖАЕТ УРОВЕНЬ

☐ аланинаминотрансферазы и аспарагинаминотрансферазы

Блок: Блок 38 | № 3746

3746. НЕФРОТОКСИЧНОСТЬ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ВОЗРАСТАЕТ ПРИ ИХ СОЧЕТАНИИ С

☐ цефалоспорины

Блок: Блок 38 | № 3747

3747. МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МОКРОТЫ НА НАЛИЧИЕ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДИТСЯ ЛАБОРАТОРИЯМИ

☐ медицинских организаций

Блок: Блок 38 | № 3748

3748. ПРИ ГРИППЕ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ

☐ геморрагического отека легких

Блок: Блок 38 | № 3749

3749. МЕЖФАЛАНГОВЫЕ СУСТАВЫ ПАЛЬЦЕВ ПО ФОРМЕ СУСТАВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ блоковидными

Блок: Блок 38 | № 3750

3750. ДОСТОВЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ ЯВЛЯЮТСЯ ____ И БОЛЕЕ % ПЛАЗМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В КОСТНОМ

☐ 10

Блок: Блок 38 | № 3751

3751. НАЧИНАТЬ МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ РЕКОМЕНДУЮТ ПРИ РИСКЕ ПО ШКАЛЕ SCORE РАВНОМ (%)

☐ 2

Блок: Блок 38 | № 3752

3752. К ПРЕПАРАТАМ, УСИЛИВАЮЩИМ СОКРАТИТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ ДИАФРАГМЫ, ОТНОСЯТ

☐ эуфиллин

Блок: Блок 38 | № 3753

3753. ФИЗИКАЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ запаздывание каротидной пульсации

Блок: Блок 38 | № 3754

3754. К ПРИЗНАКАМ ДВС-СИНДРОМА ОТНОСИТСЯ

☐ гематомно-петехиальный

Блок: Блок 38 | № 3755

3755. ДЛЯ НЕФРОГЕННОЙ АНЕМИИ

☐ анемия пропорциональна тяжести хронической почечной недостаточности и обусловлена снижением синтеза эритропоэтина почками

Блок: Блок 38 | № 3756

3756. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТАЛАССЕМии ПРИМЕНЯЮТ

☐ Десферал

Блок: Блок 38 | № 3757

3757. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ первичная задержка натрия вследствие иммунного поражения базальной мембраны клубочка

Блок: Блок 38 | № 3758

3758. ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ НАПРАВЛЯЕТ БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТУБЕРКУЛЕЗ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ (ДЕНЬ)

☐ 3

Блок: Блок 38 | № 3759

3759. ДЛЯ РАСЧЁТА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕОБХОДИМЫ ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ____ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

☐ зарегистрированных впервые в данном году

Блок: Блок 38 | № 3760

3760. К СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ОТНОСИТСЯ

☐ вакцинация БЦЖ

Блок: Блок 38 | № 3761

3761. КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КРИТЕРИЕМ СИНДРОМА ЧАРГА-СТРОССА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бронхиальная астма (на момент осмотра или в анамнезе)

Блок: Блок 38 | № 3762

3762. У БОЛЬНЫХ ИДИОПАТИЧЕСКИМ ЛЕГОЧНЫМ ФИБРОЗОМ ПРИ СПИРОМЕТРИИ ВЫЯВЛЯЮТ

☐ рестриктивные нарушения

Блок: Блок 38 | № 3763

3763. НА НАЛИЧИЕ АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ УКАЗЫВАЕТ

☐ снижение пульсового артериального давления

Блок: Блок 38 | № 3764

3764. ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ КОНТАКТ

☐ семейный

Блок: Блок 38 | № 3765

3765. ОСНОВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИ КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ЯВЛЯЮТСЯ

☐ полнота охвата диспансерным учетом, своевременность выявления заболеваний, своевременность взятия на диспансерный учет

Блок: Блок 38 | № 3766

3766. НАИЛУЧШУЮ ПЕРЕНОСИМОСТЬ С ВЫРАЖЕННЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ

☐ Метилпреднизолон

Блок: Блок 38 | № 3767

3767. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ЗАДНЕБАЗАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ высокий зубец R в V1, V2, смещение сегмента ST вниз и увеличение амплитуды зубца T в этих же отведениях

Блок: Блок 38 | № 3768

3768. НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ГЕПАРИНЫ ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НАЗНАЧАЮТСЯ

☐ для профилактики тромбообразования

Блок: Блок 38 | № 3769

3769. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ОСТРОГО ПОДАГРИЧЕСКОГО АРТРИТА НЕ НАЗНАЧАЕТСЯ

☐ аллопуринол

Блок: Блок 38 | № 3770

3770. ДИАГНОЗ «СКРЫТОЙ» АГ МОЖНО ИСКЛЮЧИТЬ ПРИ УРОВНЕ (В ММ РТ.СТ.)

☐ дневного амбулаторного АД <135 /85

Блок: Блок 38 | № 3771

3771. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ДИСКИНЕЗИИ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ биохимическое исследование желчи

Блок: Блок 38 | № 3772

3772. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПОДАГРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ «симптом пробойника»

Блок: Блок 38 | № 3773

3773. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АМИЛОИДОЗА КОЛХИЦИН: НАЗНАЧАЮТ В ДОЗЕ (МГ В СУТКИ)

☐ 2

Блок: Блок 38 | № 3774

3774. ТЕРМОМЕТРИЮ НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ (В МИН)

☐ 5-10

Блок: Блок 38 | № 3775

3775. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ локализацией в правой подвздошной области

Блок: Блок 38 | № 3776

3776. СИМПТОМОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА, ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ ПОЗЖЕ ОСТАЛЬНЫХ В ДЕБЮТЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ субхондральный остеопороз

Блок: Блок 38 | № 3777

3777. КЛИНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, ПРИ КОТОРОЙ ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ ДИАКАРБА (АЦЕТАЗОЛАМИДА), ЯВЛЯЕТСЯ

☐ метаболический алкалоз

Блок: Блок 38 | № 3778

3778. ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ ПОЛНОЙ КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО БЛАСТОВ В СТЕРНАЛЬНОМ ПУНКТАТЕ МЕНЕЕ (%)

☐ 5

Блок: Блок 38 | № 3779

3779. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ возраст старше 65 лет

Блок: Блок 38 | № 3780

3780. ПЕРСИСТИРУЮЩИЙ ОДНОСТОРОННИЙ САКРОИЛЕИТ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ синдрома Рейтера

Блок: Блок 38 | № 3781

3781. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ПРИЕМА ХОНДРОПРОТЕКТОРОВ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ СОСТАВЛЯЕТ (В МЕСЯЦАХ)

☐ 4-6

Блок: Блок 38 | № 3782

3782. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ДИЕТЕ ТИПА DASH (ДИЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРЕКРАЩЕНИЮ ГИПЕРТОНИИ)

☐ снижает риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий

Блок: Блок 38 | № 3783

3783. В СЛУЧАЕ СОХРАНЯЮЩЕГОСЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА НА ФОНЕ ПАРОКСИЗМА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНОГО С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОКАЗАНО

☐ проведение электроимпульсной терапии

Блок: Блок 38 | № 3784

3784. К ГРУППЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОТНОСЯТСЯ ЛИЦА

☐ находящиеся в контакте с больными активным туберкулезом

Блок: Блок 38 | № 3785

3785. ПРИ РАСЩЕПЛЕНИИ 1 ГРАММА ЖИРА ВЫДЕЛЯЕТСЯ (В ККАЛ)

☐ 9

Блок: Блок 38 | № 3786

3786. К ОСНОВНОМУ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМУ ЭФФЕКТУ СТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОТНОСЯТ

☐ иммуносупрессивный

Блок: Блок 38 | № 3787

3787. АДАПТАЦИОННОЕ СНИЖЕНИЕ ВНУТРИКЛЕТОЧНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТАБОЛИЗМА ПУТЕМ УГНЕТЕНИЯ СОКРАТИТЕЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КАРДИОМИОЦИТА В ОТВЕТ НА УМЕНЬШЕНИЕ КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК _____ МИОКАРДА

☐ «гибернация»

Блок: Блок 38 | № 3788

3788. ПЕРФУЗИЯ ____ ЗОН ЛЁГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОНИЖЕННОЙ

☐ верхних

Блок: Блок 38 | № 3789

3789. ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ БЕРЕМЕННАЯ

☐ осматривается врачом-терапевтом трижды за беременность

Блок: Блок 38 | № 3790

3790. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ МЫШЕЧНОГО ПОРАЖЕНИЯ ПРИ ПОЛИМИОЗИТЕ У МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ затруднение при расчесывании волос

Блок: Блок 38 | № 3791

3791. ФИЗИКАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНОГО С ПОДОЗРЕНИЕМ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ВЫЯВЛЯЕТ

☐ скудную клиническую симптоматику

Блок: Блок 38 | № 3792

3792. КРИТЕРИЕМ ТЯЖЕЛОГО ТЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ЧСС ≥ 120 в минуту

Блок: Блок 38 | № 3793

3793. ПРИМЕНЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТА С ОСТРЫМ МУЧИТЕЛЬНЫМ НЕПРОДУКТИВНЫМ КАШЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ОПРАВДАНЫМ ПРИ

☐ подозрении на коклюш

Блок: Блок 38 | № 3794

3794. ЗАПОРЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ хронического энтерита

Блок: Блок 38 | № 3795

3795. ПРИЧИНАМИ АЛИМЕНТАРНОГО ГЕНЕЗА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ недостаточное употребление мясной пищи

Блок: Блок 38 | № 3796

3796. АКТИВНОСТЬ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДЕСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ БЛОКИРУЕТ ПЕТЛЕВОЙ ДИУРЕТИК

☐ Торасемид

Блок: Блок 38 | № 3797

3797. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРОВОТОК В СОСУДАХ

☐ коронарных

Блок: Блок 38 | № 3798

3798. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ морфологический метод

Блок: Блок 38 | № 3799

3799. К ПАТОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЯМ, ТРЕБУЮЩИМ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ГИПЕРТЕРМИИ, ОТНОСЯТ

☐ пневмонию, лихорадку лекарственного происхождения, туберкулёз

Блок: Блок 38 | № 3800

3800. ЦИАНОЗ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ PaO_2 (мм рт.ст.)

☐ 60

Блок 39

Блок: Блок 39 | № 3801

3801. КЛАССИФИКАЦИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ВКЛЮЧАЕТ СТАДИЮ

☐ альбуминурии

Блок: Блок 39 | № 3802

3802. КРУГЛЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ДЕФЕКТЫ В ЭПИФИЗАХ КОСТЕЙ НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ

☐ подагре

Блок: Блок 39 | № 3803

3803. ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЕ ОПТИМАЛЬНАЯ ДОЗА ИНСУЛИНА КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВОГО ЧАСА ЛЕЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (ЕД/ ЧАС НА КГ МАССЫ ТЕЛА)

☐ 0,15

Блок: Блок 39 | № 3804

3804. НА ЭКГ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПАУЗЫ, В КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ВОЛНЫ Р И АССОЦИИРОВАННЫЕ С НИМИ КОМПЛЕКСЫ QRS-T, УДЛИНЕННЫЙ ИНТЕРВАЛ RR РАВЕН УДВОЕННОМУ ОСНОВАНИЮ ИНТЕРВАЛА RR, КАКОЙ ХАРАКТЕР НАРУШЕНИЯ ПРОВОДИМОСТИ?

☐ синоаурикулярная блокада без периодов Самойлова-Венкебаха

Блок: Блок 39 | № 3805

3805. ПАНЦИТОПЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ БИЛИРУБИНА И УВЕЛИЧЕНИЕ СЕЛЕЗЕНКИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ аутоиммунной панцитопении

Блок: Блок 39 | № 3806

3806. ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО МИКРОСФЕРОЦИТОЗА (БОЛЕЗНИ МИНКОВСКОГО – ШОФФАРА) И ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ (СИНДРОМ ЖИЛЬБЕРА) ОСНОВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ морфология эритроцитов

Блок: Блок 39 | № 3807

3807. ДОСТОВЕРНЫМ КРИТЕРИЕМ НАСТУПЛЕНИЯ РЕМИССИИ ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ НЕГРОПИЧЕСКОЙ СПРУ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ абсорбционный тест

Блок: Блок 39 | № 3808

3808. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА

☐ выявление заболевания на ранних стадиях, предупреждение его прогрессирования и возможных осложнений

Блок: Блок 39 | № 3809

3809. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБУСЛОВЛЕННЫ

☐ повышением катехоламинов в крови

Блок: Блок 39 | № 3810

3810. ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У БОЛЬНОГО РАКОМ ЛЕГКОГО ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ синдромом Мари - Бамбергера

Блок: Блок 39 | № 3811

3811. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРЕ НА ДОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

☐ только инвалидам

Блок: Блок 39 | № 3812

3812. ПРИ ОЧЕВИДНОМ НЕБЛАГОПРИЯТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ И ТРУДОВОМ ПРОГНОЗЕ ПАЦИЕНТ НАПРАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕ ПОЗДНЕЕ ____ МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ НАЧАЛА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

☐ 4

Блок: Блок 39 | № 3813

3813. ИНФАРКТ МИОКАРДА КАКОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЧАЩЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ РАЗРЫВОМ СОСОЧКОВОЙ МЫШЦЫ

☐ заднедиафрагмальный

Блок: Блок 39 | № 3814

3814. НЕКАЗЕОЗНЫЙ ГРАНУЛЕМАТОЗ, ПОРАЖАЮЩИЙ ЛИМФОУЗЛЫ И ТКАНЬ ЛЁГКИХ С ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИЕЙ КВЕЙМА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ саркоидоз

Блок: Блок 39 | № 3815

3815. АСЦИТ РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ПОЯВЛЕНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОТЕКОВ ПРИ

☐ прогрессировании сердечной недостаточности

Блок: Блок 39 | № 3816

3816. ОСЛОЖНЕНИЕ ХОЛЕРЫ МОЖЕТ БЫТЬ

☐ гиповолемический шок

Блок: Блок 39 | № 3817

3817. ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ПУЛЬС ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВЫЗВАН

☐ перерастяжением легкого

Блок: Блок 39 | № 3818

3818. ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ В РФ ЗАНИМАЮТ

☐ болезни системы кровообращения

Блок: Блок 39 | № 3819

3819. К ФАКТОРАМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА, ОТНОСЯТ

☐ аномалии развития клапанов сердца, экстракцию зубов, протезированные клапаны сердца

3820. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ СИНДРОМА МАРФАНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аневризма аорты

3821. НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОЗДНЕЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПРИ ЗАКРЫТИИ ДМПП ЯВЛЯЕТСЯ

☐ возраст пациента на момент хирургического вмешательства

3822. ПАЦИЕНТ 52 ЛЕТ, НЕКУРЯЩИЙ, СТРАДАЮЩИЙ УМЕРЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, У КОТОРОГО ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ВЫЯВЛЕН 40% СТЕНОЗ ПРАВОЙ ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ РИСКА

☐ очень высокого

3823. ПРИ СОЧЕТАНИИ АСЦИТА И ОТЕКОВ ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СУТОЧНОГО ДИУРЕЗА СОСТАВЛЯЕТ (МЛ/СУТ)

☐ 500-1000

3824. ДЛЯ КАКОГО ИЗ ДЗСТ ХАРАКТЕРНЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ: УСКОРЕНИЕ СОЭ, АНЕМИЯ, ЛИМФОПЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИНУКЛЕАРНОГО ФАКТОРА, АНТИ SM – АНТИТЕЛА, ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА?

☐ системная красная волчанка

3825. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ СРЕДИ H2-БЛОКАТОРОВ ВЫЗЫВАЕТ

☐ Циметидин

3826. ХАРАКТЕРНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ медиастинальная эмфизема

3827. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ НАДЖЕЛУДОЧКОВЫХ ТАХИКАРДИЙ ПРИ СИНДРОМЕ ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-ВАЙТА НАИЛУЧШИМ СРЕДСТВОМ СЧИТАЕТСЯ

☐ Амiodарон

3828. ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ В ПОСТОЯННОМ КОНТАКТЕ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ АЭРОЗОЛЯМИ ХАРАКТЕРНЫ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ _____ ХАРАКТЕРА

☐ атрофического

Блок: Блок 39 | № 3829

3829. В ДИАГНОСТИКЕ АКРОМЕГАЛИИ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ УРОВЕНЬ В КРОВИ

☐ инсулиноподобного фактора роста-1

Блок: Блок 39 | № 3830

3830. К ПРИЧИНАМ АЛИМЕНТАРНОГО ГЕНЕЗА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ОТНОСЯТ

☐ недостаточное употребление мясной пищи

Блок: Блок 39 | № 3831

3831. ВНУТРИКЛЕТОЧНЫЙ ГЕМОЛИЗ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ наследственного сфероцитоза

Блок: Блок 39 | № 3832

3832. ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ

☐ мужчины

Блок: Блок 39 | № 3833

3833. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНОГО ХОБЛ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ

☐ непрерывно

Блок: Блок 39 | № 3834

3834. ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ

☐ мутации клетки-предшественницы лимфо- или миелопоэза

Блок: Блок 39 | № 3835

3835. ОСЛАБЛЕННОЕ ВЕЗИКУЛЯРНОЕ ДЫХАНИЕ НЕ ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ

☐ бронхиолите

Блок: Блок 39 | № 3836

3836. ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕЙСЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ХАРАКТЕРНО ВОЗНИКНОВЕНИЕ

☐ микроальбуминурии

Блок: Блок 39 | № 3837

3837. ПОСЛЕ СПЛЕНЭКТОМИИ У БОЛЬНОГО С НАСЛЕДСТВЕННЫМ СФЕРОЦИТОЗОМ

☐ могут возникнуть тромбозы легочных и мезентериальных сосудов

Блок: Блок 39 | № 3838

3838. ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ ПРИ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗАХ ПРОВОДЯТ _____ ВВЕДЕНИЕМ ХИМИОПРЕПАРАТОВ

☐ эндолюмбальным

Блок: Блок 39 | № 3839

3839. ВНУТРИСОСУДИСТЫЙ ГЕМОЛИЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ гемоглобинурией

3840. ПРИЧИНОЙ НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ _____ ГОРМОНА

☐ дефицит антидиуретического

3841. ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИАГНОЗА ОСТРОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ) НАПРАВЛЯЕТСЯ В УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В ТЕЧЕНИЕ (ЧАС)

☐ 24

3842. ДИАСКИНТЕСТ ОСНОВАН НА

☐ реакции гиперчувствительности замедленного типа к антигену двух белков (ESAT6/CFP10), синтез которых кодируется в геноме *M. tuberculosis humanus* и некоторых условно-патогенных микобактерий

3843. АКТИВНЫМ МЕТАБОЛИТОМ, БЛОКАТОРОМ H1-ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Дезлоратадин

3844. У ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО СОКА (Л)

☐ 1,5-2,0

3845. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЁЗОМ С МАССИВНЫМ БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЕМ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В КВАРТИРЕ С ДЕТЬМИ, ПО СТЕПЕНИ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ДАННЫЙ ОЧАГ ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ К ____ ГРУППЕ

☐ 1

3846. НАИБОЛЕЕ ДОСТОВЕРНЫМ КРИТЕРИЕМ МЕНИНГОКОККОВОГО МЕНИНГИТА ЯВЛЯЕТСЯ ____ В ЛИКВОРЕ

☐ обнаружение возбудителя

3847. ПОД СТАНДАРТОМ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОНИМАЮТ

☐ формализованную модель ведения больного, предусматривающую объем и последовательность лечебно-диагностических мероприятий

3848. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА РАКОВОЕ ПЕРЕРОЖДЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭЗОФАГИТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дисфагия

3849. РЕАБСОРБЦИЯ ПРОФИЛЬТРОВАВШЕГОСЯ БЕЛКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ОСНОВНОМ В

☐ проксимальном канальце

Блок: Блок 39 | № 3850

3850. АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ НА СОРНЫЕ ТРАВЫ ВОЗНИКАЮТ В

☐ августе-сентябре

Блок: Блок 39 | № 3851

3851. МОЛНИЕНОСНАЯ ФОРМА АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА РАЗВИВАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (МИН.)

☐ 10

Блок: Блок 39 | № 3852

3852. ВИТАМИН В12 РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ БОЛЬНЫМ С ЕГО ДЕФИЦИТОМ ПО СХЕМЕ

☐ месяц непрерывного лечения, далее повторные профилактические курсы 1-2 раза в год

Блок: Блок 39 | № 3853

3853. ЙОД ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ГОРМОНОВ

☐ щитовидной железы

Блок: Блок 39 | № 3854

3854. К СОЧЕТАНИЮ СИМПТОМОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ХОЛЕРЫ, ОТНОСЯТ

☐ обильный водянистый стул без запаха, отсутствие болей в животе, отсутствие тошноты

Блок: Блок 39 | № 3855

3855. ГАПТЕНОВЫЙ АГРАНУЛОЦИТОЗ ВЫЗЫВАЕТСЯ

☐ анальгетиками и сульфаниламидными препаратами

Блок: Блок 39 | № 3856

3856. ДЛЯ ХОБЛ ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ ХАРАКТЕРНЫ

☐ ОФВ1/ФЖЕЛ < 0,70; ОФВ1 < 30% от должного или ОФВ1 < 50% от должного в сочетании с хронической дыхательной недостаточностью

Блок: Блок 39 | № 3857

3857. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОКАЗАНЫ ____ ФЕРМЕНТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

☐ высокодозовые микрогранулированные

Блок: Блок 39 | № 3858

3858. ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ иммунокомплексным поражением

Блок: Блок 39 | № 3859

3859. ОБЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ДЛЯ ЭМФИЗЕМАТОЗНОГО И БРОНХИТИЧЕСКОГО ФЕНОТИПОВ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ одышка

Блок: Блок 39 | № 3860

3860. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПРЕПАРАТОВ В12 У БОЛЬНЫХ С В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ БУДЕТ СЛУЖИТЬ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ____ К ____ НЕДЕЛИ ТЕРАПИИ

☐ ретикулоцитов; 1

Блок: Блок 39 | № 3861

3861. К ПРЕПАРАТАМ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ПРИ РАЗВИТИИ ОСТРОЙ СКЛЕРОДЕРМИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ОТНОСЯТ

☐ ингибиторы АПФ

Блок: Блок 39 | № 3862

3862. ЕСЛИ У БОЛЬНОГО ПОЯВЛЯЕТСЯ ЧЕРНАЯ МОЧА, ТО МОЖНО ДУМАТЬ О/ОБ

☐ анемии Маркиафавы-Микели

Блок: Блок 39 | № 3863

3863. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПРЕПАРАТОВ В12 У БОЛЬНЫХ С В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ОЦЕНКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ БУДЕТ СЛУЖИТЬ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ____ К ____ НЕДЕЛИ ТЕРАПИИ

☐ гемоглобина; 3

Блок: Блок 39 | № 3864

3864. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ У ВЗРОСЛЫХ ПРИ МАССОВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ флюорография

Блок: Блок 39 | № 3865

3865. АНТИАРИТМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ С НАИМЕНЕЕ БЕЗОПАСНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТАХИАРИТМИЙ, ВЫЗВАННЫХ ДИГИТАЛИСНОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Лидокаин

Блок: Блок 39 | № 3866

3866. ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ И РЕВАКЦИНАЦИЯ БЦЖ ЯВЛЯЕТСЯ _____ ПРОФИЛАКТИКОЙ ТУБЕРКУЛЁЗА

☐ специфической

Блок: Блок 39 | № 3867

3867. ДЛЯ ОСТРОГО МОНОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА ПО ДАННЫМ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯХАРАКТЕРНА

☐ резко положительная реакция на альфа-нафтилацетатэстеразу

Блок: Блок 39 | № 3868

3868. В АКТИВНОЙ ФАЗЕ АКРОМЕГАЛИИ В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ

☐ инсулиноподобного фактора роста-1

3869. НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БОЛЕЗНИ ВИЛЬСОНА – КОНОВАЛОВА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение уровня экскреции меди с мочой, снижение уровня церулоплазмينا, полиморфизм гена АТФазы Р, наличие кольца Кайзера-Флейшера на роговице при исследовании щелевой лампой

3870. КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЕЙ ТИРЕОИДНЫХ И ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНОВ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО МАНИФЕСТНОГО ГИПОТИРЕОЗА?

☐ Т4 – снижен; ТТГ – повышен

3871. ФЕНОТИП ХОБЛ С ЧАСТЫМИ ОБОСТРЕНИЯМИ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ У ПАЦИЕНТОВ С ____ И БОЛЕЕ ОБОСТРЕНИЕМ/ОБОСТРЕНИЯМИ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА

☐ 2

3872. ПРИ ВТОРИЧНОМ АМИЛОИДОЗЕ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА ЯВЛЯЕТСЯ БИОПСИЯ

☐ почки

3873. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 1 ПЕРВОГО ТИПА СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ

☐ инсулином

3874. У БЕРЕМЕННЫХ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОНИИ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ левофлоксацина

3875. ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА ВХОДИТ В СОСТАВ ПРЕПАРАТА

☐ матерна

3876. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМИСЯ В КЛИНИКЕ ИММУННЫМИ ТРОМБОЦИТОПЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ аутоиммунные, при которых антитела вырабатываются против собственного неизмененного антигена

3877. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ У БОЛЬНОГО С ГЕМОМРАГИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ, РАЗВИВШИМСЯ НА ФОНЕ НАРАСТАЮЩЕЙ ЖЕЛТУХИ, КОЖНОГО ЗУДА, ОБЕСЦВЕЧЕННОГО СТУЛА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ удлинение протромбинового времени (снижение протромбинового индекса)

Блок: Блок 39 | № 3878

3878. СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК МОЖЕТ ВЫДАВАТЬ ЕДИНОЛИЧНО ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДО ____ ДНЕЙ

☐ 10

Блок: Блок 39 | № 3879

3879. ПРИ ПНЕВМОНИЯХ, ВЫЗВАННЫХ ПНЕВМОКОККОМ, МИКОПЛАЗМОЙ И ЛЕГИОНЕЛЛОЙ, ОДИНАКОВО ЭФФЕКТИВНО ДЕЙСТВУЕТ

☐ левофлоксацин

Блок: Блок 39 | № 3880

3880. ТЕНЯМИ БОТКИНА-ГУМПРЕХТА НАЗЫВАЮТСЯ

☐ разрушенные ядра лимфоцитов

Блок: Блок 39 | № 3881

3881. МАССОВУЮ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКУ СРЕДИ ДЕТЕЙ СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ 1 РАЗ В

☐ год

Блок: Блок 39 | № 3882

3882. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРИ АУТОИММУННОМ ГЕПАТИТЕ ПРИМЕНЯЮТ

☐ преднизолон

Блок: Блок 39 | № 3883

3883. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АСУНАПРЕВИРА СНИЖАЕТ ПРИЕМ

☐ дексаметазон

Блок: Блок 39 | № 3884

3884. К ХИМИЧЕСКИМ КАНЦЕРОГЕННЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТ

☐ нитросоединения

Блок: Блок 39 | № 3885

3885. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ ДО 60 ЛЕТ БЕЗ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЧИТАЮТ

☐ ингибиторозащищённые пенициллины

Блок: Блок 39 | № 3886

3886. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БРОНХОСПАЗМА С ПОМОЩЬЮ СПИРОГРАФИИ, ПНЕВМОТАХОГРАФИИ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРОБУ С ИНГАЛЯЦИЕЙ

☐ β2-адреностимулятора

Блок: Блок 39 | № 3887

3887. В КАЧЕСТВЕ МОНОТЕРАПИИ ПРОТИВОПОКАЗАН

☐ асунапревир

Блок: Блок 39 | № 3888

3888. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К РЕВАКЦИНАЦИИ БЦЖ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ туберкулеза в анамнезе

Блок: Блок 39 | № 3889

3889. ПЕПСИНОГЕН ВЫРАБАТЫВАЕТСЯ КЛЕТКАМИ

☐ главными

Блок: Блок 39 | № 3890

3890. ТРОМБОЭНДОКАРДИТ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

☐ развитии аневризмы левого желудочка

Блок: Блок 39 | № 3891

3891. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРЯМЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ В ЛЕЧЕБНЫХ ДОЗАХ НЕОБХОДИМО КОНТРОЛИРОВАТЬ

☐ активированное парциальное тромбиновое время

Блок: Блок 39 | № 3892

3892. ФАКТОРОМ АГРЕССИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гипертонус n. vagus

Блок: Блок 39 | № 3893

3893. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КРАТКОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ (МИН.)

☐ 10

Блок: Блок 39 | № 3894

3894. ПРИ НАЛИЧИИ ДИАРЕИ И ОТСУТСТВИИ СИНДРОМА МАЛЬАБСОРБЦИИ МОЖНО ДУМАТЬ О

☐ синдроме раздраженной кишки

Блок: Блок 39 | № 3895

3895. СИНДРОМ ТИТЦЕ КАК ПРИЧИНА БОЛЕЙ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ ОБУСЛОВЛЕН ВОСПАЛЕНИЕМ

☐ грудинно-реберных хрящей

Блок: Блок 39 | № 3896

3896. ВРАЧИ ПОЛИКЛИНИКИ ВЫПОЛНЯЮТ

☐ диагностику и лечение заболеваний, профилактическую работу, санитарно-просветительную работу, противоэпидемическую работу, ведение оперативно-учетной документации

Блок: Блок 39 | № 3897

3897. НАЛИЧИЕ ОЧАГА ГОННА СООТВЕТСТВУЕТ ФАЗЕ

☐ обызвествления первичного туберкулезного комплекса

Блок: Блок 39 | № 3898

3898. НАИБОЛЕЕ РАННИМ ПРИЗНАКОМ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ никтурия

Блок: Блок 39 | № 3899

3899. У БОЛЬНОГО С ЧАСТЫМИ ОБОСТРЕНИЯМИ ХОБЛ И ПОСТБРОНХОДИЛАТАЦИОННЫМ ОФВ1<50% ОТ ДОЛЖНОГО ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ пролонгированных бронхолитиков + ингаляционных глюкокортикостероидов

Блок: Блок 39 | № 3900

3900. К МЕДЛЕННО ДЕЙСТВУЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ, МОДИФИЦИРУЮЩИМ СИМПТОМЫ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ, ОТНОСИТСЯ

☐ глюкозамина сульфат

Блок 40

Блок: Блок 40 | № 3901

3901. РАЗОВАЯ ДОЗА КЕТОРОЛАКА СОСТАВЛЯЕТ (В МГ)

☐ 10-30

Блок: Блок 40 | № 3902

3902. РАЗВИТИЮ ПНЕВМОНИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРЕДРАСПОЛАГАЕТ

☐ постельный режим

Блок: Блок 40 | № 3903

3903. ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ РАЗВИВАЕТСЯ

☐ сустав Шарко

Блок: Блок 40 | № 3904

3904. ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОЧАГЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ предупреждение новых случаев заболевания туберкулезом

Блок: Блок 40 | № 3905

3905. ГЛАВНЫМ ОТЛИЧИЕМ ДИАСКИН-ТЕСТА ОТ ПРОБЫ МАНТУ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кожная реакция только при инфицировании вирулентными микобактериями туберкулеза

Блок: Блок 40 | № 3906

3906. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ОСТРОГО ПРИСТУПА ГИПОПАРАТИРЕОЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ

☐ 10% раствор хлорида кальция

Блок: Блок 40 | № 3907

3907. В ДИАГНОСТИКЕ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ РЕШАЮЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эластометрия

Блок: Блок 40 | № 3908

3908. ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИОННО-ТОКСИЧЕСКИМ ШОКОМ, НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ БОЛЬНОМУ СЛЕДУЕТ ВВЕСТИ

☐ глюкокортикостероиды, левомецитина сукцинат

Блок: Блок 40 | № 3909

3909. ТЕКУЩУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В ОЧАГЕ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРОВОДИТ

☐ больной с членами его семьи

Блок: Блок 40 | № 3910

3910. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ иммунизация вакциной БЦЖ и БЦЖ-М

Блок: Блок 40 | № 3911

3911. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИЗЕНТЕРИИ ПРИМЕНЯЮТ

☐ фторхинолоны

Блок: Блок 40 | № 3912

3912. КАКИЕ СИМПТОМЫ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ «ВОРОТНИКА СТОКСА»?

☐ одутловатое цианотичное лицо, резко набухание вен шеи, выраженный цианоз и отек шеи

Блок: Блок 40 | № 3913

3913. САМЫМ БЫСТРЫМ ТЕМПОМ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

☐ аутоиммунном (люпоидном) гепатите

Блок: Блок 40 | № 3914

3914. К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРАМ ПРОГНОЗА ПРИ ОСТРОМ ЛИМФОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ ОТНОСИТСЯ

☐ исходный лейкоцитоз выше $100 \times 10^9/\text{л}$

Блок: Блок 40 | № 3915

3915. В КВАРТИРНЫХ ОЧАГАХ МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КОНТАКТНЫМИ С БОЛЬНЫМИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ (ДЕНЬ)

☐ 7

Блок: Блок 40 | № 3916

3916. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО НЕЙРОЛЕЙКЕМИЯ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ОСТРОМ _____ ЛЕЙКОЗЕ

☐ лимфобластном

Блок: Блок 40 | № 3917

3917. К СЛАБИТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ, ОБЛАДАЮЩИМ РАЗДРАЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ НА НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЙ АППАРАТ ТОЛСТОЙ КИШКИ И УСИЛИВАЮЩИМ ЕЕ ПЕРИСТАЛЬТИКУ, НЕ ОТНОСИТСЯ

☐ Сорбит

Блок: Блок 40 | № 3918

3918. ПРИЗНАКОМ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА У ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ усиление одышки и выделения мокроты

Блок: Блок 40 | № 3919

3919. ДЛЯ СИНДРОМА МАЛЬАБСОРБЦИИ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ диарея

Блок: Блок 40 | № 3920

3920. ПРИ ИММУННОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРЕ В КОСТНОМ МОЗГЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ

☐ гиперплазия мегакариоцитарного ростка

Блок: Блок 40 | № 3921

3921. ИНСУЛИН УЛЬТРАКОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ ОКАЗЫВАЕТ ЛЕЧЕБНЫЙ ЭФФЕКТ В ТЕЧЕНИЕ (ЧАС)

☐ 2

Блок: Блок 40 | № 3922

3922. ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЛЕЕ (НЕДЕЛЯ)

☐ 2-4

Блок: Блок 40 | № 3923

3923. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА УЧЕТУ И РЕГИСТРАЦИИ ПОДЛЕЖАТ

☐ граждане России, иностранные граждане и лица без гражданства

Блок: Блок 40 | № 3924

3924. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ТУБЕРКУЛЁМЫ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

☐ фокуса с четкими контурами, с краевым просветлением

Блок: Блок 40 | № 3925

3925. В ЛИСТКЕ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИСПРАВЛЕНИЯ

☐ не допускаются

Блок: Блок 40 | № 3926

3926. К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ, ОТНОСЯТ

☐ нитраты

Блок: Блок 40 | № 3927

3927. ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗМЕРОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ ультразвуковое исследование

Блок: Блок 40 | № 3928

3928. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫЗЫВАЕТ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

☐ Хлорохин

Блок: Блок 40 | № 3929

3929. СНИЖЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ ПИЩЕВОГО РАЦИОНА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ

☐ жиров

Блок: Блок 40 | № 3930

3930. ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В ОСАДКЕ МОЧИ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ЦИЛИНДРЫ

☐ гиалиновые

Блок: Блок 40 | № 3931

3931. ТИОТРОПИЯ БРОМИД ОБЛАДАЕТ СЕЛЕКТИВНОСТЬЮ К _____ БРОНХОВ

☐ М3-холинорецепторам

Блок: Блок 40 | № 3932

3932. ОЧАГОВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ малосимптомным или бессимптомным течением

Блок: Блок 40 | № 3933

3933. К ГЛАВНЫМ РЕСУРСАМ УПРАВЛЕНИЯ ОТНОСЯТ

☐ кадры

Блок: Блок 40 | № 3934

3934. НЕХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ РЕВМАТИЧЕСКОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стойкая деформация суставов

Блок: Блок 40 | № 3935

3935. КРИТЕРИЕМ НЕЙРОЛЕЙКЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ В ЛИКВОРЕ ЦИТОЗА ЗА СЧЕТ

☐ бластоа

Блок: Блок 40 | № 3936

3936. ЭФФЕКТИВНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА АЛЛАПИНИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ)

☐ 75-150

Блок: Блок 40 | № 3937

3937. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗОМ С МОМЕНТА ДОСТИЖЕНИЯ РЕМИССИИ СОСТАВЛЯЕТ (ГОД)

☐ 5

Блок: Блок 40 | № 3938

3938. ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТА С ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 3 СТЕПЕНИ И ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ С УКАЗАНИЯМИ НА АЛЛЕРГИЧЕСКУЮ РЕАКЦИЮ НА ПЕНИЦИЛЛИН ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Левофлоксацин

Блок: Блок 40 | № 3939

3939. В ЛЕЧЕНИИ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЭФФЕКТИВНЫ

☐ глюкокортикоиды

Блок: Блок 40 | № 3940

3940. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ФАКТОРОМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕСТРУКЦИЙ В ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аспирация

Блок: Блок 40 | № 3941

3941. ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЗ СТАЦИОНАРА БОЛЬНОЙ, ПЕРЕНЕСШИЙ НЕОСЛОЖНЕННЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ

☐ бета-адреноблокаторы

Блок: Блок 40 | № 3942

3942. К ТРЕТЬЕМУ ЭТАПУ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ОТНОСЯТ

☐ амбулаторно-поликлинический

Блок: Блок 40 | № 3943

3943. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ antiHAV IgM

Блок: Блок 40 | № 3944

3944. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ПРИЗНАКАМИ ДОСТАТОЧНО НАДЕЖЕН ПРОЦЕНТ ЛИМФОЦИТОВ В МИЕЛОГРАММЕ, СОСТАВЛЯЮЩИЙ БОЛЕЕ

☐ 30

Блок: Блок 40 | № 3945

3945. ПРИ НАЛИЧИИ У БОЛЬНОГО ПРОТЕИНУРИИ 7 Г/СУТКИ, АНЕМИИ, ГИПОАЛЬБУМИНЕМИИ И ПОВЫШЕНИИ СОЭ ДО 68 ММ/ЧАС НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ

☐ миеломную болезнь

Блок: Блок 40 | № 3946

3946. УСЛОВИЕМ РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ неправильный образ жизни

Блок: Блок 40 | № 3947

3947. В ОСНОВЕ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ЛЕЖИТ

☐ инсулинотерапия

3948. ЧАЩЕ ПЕРЕХОДИТ В ХРОНИЧЕСКУЮ ФОРМУ ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ

☐ C

3949. МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЕЛЬСКОГО ВРАЧЕБНОГО УЧАСТКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фельдшерско-акушерский пункт

3950. БЕЗБОЛЕВАЯ МАКРОГЕМАТУРИЯ, ЛИХОРАДКА В ТЕЧЕНИЕ 4 МЕСЯЦЕВ, УРОВЕНЬ ГЕМОГЛОБИНА 170 Г/Л ЛИБО АНЕМИЯ, СОЭ 60 ММ/Ч У БОЛЬНОГО СТАРШЕ 45 ЛЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О НАЛИЧИИ

☐ рака почки

3951. ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИИ КОНТИНГЕНТОВ ДИСПАНСЕРИЗИРОВАННЫХ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ выделение групп, однородных по состоянию здоровья и степени активности патологического процесса

3952. ДИАГНОСТИКА ПЫЛЕВОГО БРОНХИТА ВКЛЮЧАЕТ

☐ бронхоскопию, исследования функции внешнего дыхания, обзорную рентгенографию легких

3953. ТАКТИКА ВРАЧА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГРИППА, ВЫЗВАННОГО ВЫСОКОПАТОГЕННЫМ ВИРУСОМ А (H1N1), ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В НАЗНАЧЕНИИ ____ МГ ОСЕЛЬТАМИВИРА 2 РАЗА В ДЕНЬ В ТЕЧЕНИЕ ____ ДНЕЙ

☐ 75, 5

3954. НАГРУЗОЧНАЯ ДОЗА АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ СОСТАВЛЯЕТ (МГ)

☐ 250

3955. ПНЕВМОНИЯ СЧИТАЕТСЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ, ЕСЛИ ОНА ДИАГНОСТИРОВАНА СПУСТЯ ____ ПОСЛЕ ВЫПИСКИ ИЛИ ДО 48 ЧАСОВ ПОСЛЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

☐ 4 недели

3956. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ВОЛЧАНОЧНОГО НЕФРИТА ОТНОСЯТ

☐ фибриноидный некроз капиллярных петель, кариорексис

3957. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СТЕРНАЛЬНОЙ ПУНКЦИИ СЛЕДУЕТ

☐ объяснить больному ход процедуры и ее значение

Блок: Блок 40 | № 3958

3958. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГРУППЕ СЕРОНЕГАТИВНЫХ СПОНДИЛОАРТРИТОВ, ВРАЧУ АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА СЛЕДУЕТ ПРОВЕСТИ ТИПИРОВАНИЕ НА АНТИГЕН

☐ HLA B27

Блок: Блок 40 | № 3959

3959. ДАТА ЗАКРЫТИЯ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПАЦИЕНТА, ЯВИВШЕГОСЯ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ ТРУДОСПОСОБНЫМ С ОПОЗДАНИЕМ НА 5 ДНЕЙ, БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ДНЮ

☐ когда он должен был явиться на прием с отметкой о нарушении режима

Блок: Блок 40 | № 3960

3960. ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ НА ОБЛАСТЬ СРЕДОСТЕНИЯ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К

☐ кальцификации створок клапанов

Блок: Блок 40 | № 3961

3961. ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ БЕНЗАТИН БЕНЗИЛПЕНИЦИЛЛИН НАЗНАЧАЕТСЯ 1 РАЗ В (ДЕНЬ)

☐ 21

Блок: Блок 40 | № 3962

3962. ФАКТОРОМ, СПОСОБСТВУЮЩИМ РАЗВИТИЮ ЖЕЛЧНО-КАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ беременность

Блок: Блок 40 | № 3963

3963. К ФОРМЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ РЕЗЕРВУАР ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ, ОТНОСЯТ ____ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

☐ фиброзно-кавернозный

Блок: Блок 40 | № 3964

3964. ПРИ ОБОСТРЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ХОЛЕЦИСТИТА ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ антибиотиков

Блок: Блок 40 | № 3965

3965. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ САХАРНОГО ДИАБЕТА ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

☐ гликированного гемоглобина

Блок: Блок 40 | № 3966

3966. УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ИСТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИИ ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ

☐ опухолевой природы

Блок: Блок 40 | № 3967

3967. ПЕРКУТОРНО ПЛЕВРАЛЬНЫЙ ЭКССУДАТ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ЕГО ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ (В МЛ)

☐ 500

Блок: Блок 40 | № 3968

3968. БОЛЬНЫЕ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ I СТЕПЕНИ ПРИГЛАШАЮТСЯ К ВРАЧУ-ТЕРАПЕВТУ ДЛЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ В ГОД (РАЗ)

☐ 2

Блок: Блок 40 | № 3969

3969. КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОТНОСЯТСЯ К НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ ХАРАКТЕРА

☐ обязательного

Блок: Блок 40 | № 3970

3970. НАЧАЛЬНАЯ ДОЗА ВВЕДЕНИЯ ДОПАМИНА У БОЛЬНОГО ИНФАРКТОМ МИОКАРДА СОСТАВЛЯЕТ

☐ 5 мкг/кг/мин

Блок: Блок 40 | № 3971

3971. ПРИ ОЧЕВИДНОМ БЛАГОПРИЯТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ И ТРУДОВОМ ПРОГНОЗЕ ПОСЛЕ ТРАВМ И РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПАЦИЕНТ НАПРАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НЕ ПОЗДНЕЕ ____ МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ НАЧАЛА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

☐ 10

Блок: Блок 40 | № 3972

3972. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ I ТИПА СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ

☐ инсулином на фоне диетотерапии

Блок: Блок 40 | № 3973

3973. МИНИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА СОСТАВЛЯЕТ (МЕС.)

☐ 6

Блок: Блок 40 | № 3974

3974. ПО ХАРАКТЕРУ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ

☐ частичной и полной

Блок: Блок 40 | № 3975

3975. НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСНЫМ БРОНХОЛИТИКОМ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ИБС ЯВЛЯЕТСЯ

☐ атровент

Блок: Блок 40 | № 3976

3976. К КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ ПАЦИЕНТА, У КОТОРОГО ГЕМОДИНАМИКА НЕ НАРУШЕНА, ИМЕЕТ МЕСТО СКРЫТАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ, БЕССИМПТОМНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

☐ I стадия ХСН (по классификации ОССН)

Блок: Блок 40 | № 3977

3977. ПО КРИТЕРИЯМ ВОЗ ДЛЯ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 40-59 ЛЕТ ПОРОВОЙ ЧАСТОТОЙ ПУЛЬСА ЯВЛЯЕТСЯ (УДАРОВ В МИНУТУ)

☐ 140

Блок: Блок 40 | № 3978

3978. ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВОЙ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

☐ городской поликлиникой

Блок: Блок 40 | № 3979

3979. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ФОРМОЙ НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ВЗРОСЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ первичный мембранозный гломерулонефрит

Блок: Блок 40 | № 3980

3980. КРИСТАЛЛЫ ПИРОФОСФАТА КАЛЬЦИЯ НАКАПЛИВАЮТСЯ В СУСТАВНЫХ ТКАНЯХ ПРИ

☐ псевдоподагре

Блок: Блок 40 | № 3981

3981. ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ФАКТОРОМ В ПАТОФИЗИОЛОГИИ НАРУШЕНИЙ ГЕМОДИНАМИКИ ПРИ ТЕТРАДЕ ФАЛЛО ЯВЛЯЕТСЯ

☐ степень обструкции в выходном тракте правого желудочка

Блок: Блок 40 | № 3982

3982. ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (ПРИКАЗ МЗиСР РФ ОТ 22.11.2004 Г. № 255) В СХЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАТРОНАЖ УЧАСТКОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В (МЕС.)

☐ 3

Блок: Блок 40 | № 3983

3983. САМЫМ РАННИМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ РАБОТЫ ПОЧЕК ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиперфльтрация

Блок: Блок 40 | № 3984

3984. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАРЕИ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ОТВАР

☐ ольховых шишек

Блок: Блок 40 | № 3985

3985. О ОСТРЫЙ АБСЦЕСС ЛЕГКОГО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПНЕВМОНИИ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ С АБСЦЕДИРОВАНИЕМ

☐ преобладанием некротических изменений в лёгких над воспалительными

Блок: Блок 40 | № 3986

3986. БРОНХИ 1-2 ПОРЯДКА ОТ ДРУГИХ БРОНХИАЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ ОТЛИЧАЮТСЯ

☐ внелегочной их локализацией

Блок: Блок 40 | № 3987

3987. ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЕЖЕДНЕВНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ 2016 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ (Г/СУТ)

☐ 5

Блок: Блок 40 | № 3988

3988. У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ ЧАСТО ВЫЯВЛЯЕТСЯ

☐ ДИСЛИПИДЕМИЯ

Блок: Блок 40 | № 3989

3989. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЫ ИЕРСИНИОЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ аминогликозиды

Блок: Блок 40 | № 3990

3990. АНТИАГРЕГАЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ БЛОКИРУЕТ

☐ Ибупрофен

Блок: Блок 40 | № 3991

3991. ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИНЫ БЦЖ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПРОВОДИТСЯ

☐ внутривенно на границе верхней и средней третей плеча

Блок: Блок 40 | № 3992

3992. СРОК ПОЛНОГО ПЕРВИЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНТАКТНЫХ ЛИЦ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ (ДНЕЙ)

☐ 7

Блок: Блок 40 | № 3993

3993. ПРИРОДНО-ОЧАГОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЧИТАЮТ

☐ болезнь Лайма

Блок: Блок 40 | № 3994

3994. МОНОТЕРАПИЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНА

☐ пациентам с АГ I степени с низким или средним риском сердечно-сосудистых осложнений

Блок: Блок 40 | № 3995

3995. ВАКЦИНАЦИЯ ПНЕВМОКОККОВОЙ ВАКЦИНОЙ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В

☐ 5 лет

Блок: Блок 40 | № 3996

3996. ПРАВИЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ГЛЮКОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ прием 75 грамм глюкозы, растворенных в воде

Блок: Блок 40 | № 3997

3997. СОСТОЯНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ возможностью отменить инсулинотерапию

Блок: Блок 40 | № 3998

3998. НАИБОЛЕЕ БЫСТРОЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ смешанном нефрите

Блок: Блок 40 | № 3999

3999. ПОЗИТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ физическое развитие

Блок: Блок 40 | № 4000

4000. К ОПАСНЫМ ОЧАГАМ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ

☐ бактериовыделители с наличием в окружении его детей или лиц с асциальным поведением

Блок 41

Блок: Блок 41 | № 4001

4001. ПРИ ЗАЩИТЕ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ОТ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРЕОБЛАДАЕТ

☐ клеточный фактор иммунитета

Блок: Блок 41 | № 4002

4002. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ ХСН ПРИ ИБС

☐ эксцентрическая гипертрофия миокарда

Блок: Блок 41 | № 4003

4003. ПРЕДНИЗОН ПРИ ИММУННЫХ ГЕМОЛИТИЧЕСКИХ АНЕМИЯХ НАЗНАЧАЮТ ВНУТРЬ В ДОЗЕ (МГ/КГ В СУТКИ)

☐ 1-2

Блок: Блок 41 | № 4004

4004. РЕЗИСТЕНТНАЯ ФОРМА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА КОНСТАТИРУЕТСЯ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОЛНОЙ КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ КУРСОВ ИНДУКЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

☐ двух

Блок: Блок 41 | № 4005

4005. ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЮТСЯ СУСТАВЫ

☐ проксимальные межфаланговые

4006. КОНКОРДАНТНЫЙ ПОДЪЕМ СЕГМЕНТА ST ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ

☐ сухого перикардита

4007. ТЕХНИКА ПОСТАНОВКИ ВНУТРИКОЖНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОБЫ С ПРЕПАРАТОМ ДИАСКИНТЕСТ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ТЕХНИКИ ПОСТАНОВКИ

☐ реакции Манту

4008. ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ набуханием шейных вен, увеличивающимся в вертикальном положении

4009. ДЛЯ ОСТРОГО ЛИМФОБЛАСТНОГО ЛЕЙКОЗА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЦИТОХИМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРНА ВЫРАЖЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА _____ В ОПУХОЛЕВОЙ КЛЕТКЕ

☐ гликоген в гранулярной форме

4010. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ТУБЕРКУЛЁЗА УЧЕТУ И РЕГИСТРАЦИИ ПОДЛЕЖАТ БОЛЬНЫЕ

☐ туберкулёзом любой локализации с обострениями и рецидивами

4011. НАИБОЛЬШУЮ СКЛОННОСТЬ К МЕТАСТАЗИРОВАНИЮ В СЕРДЦЕ ИМЕЕТ

☐ меланома

4012. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

☐ федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы

4013. ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ МОЖЕТ ЕДИНОЛИЧНО И ЕДИНОВРЕМЕННО ВЫДАВАТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА СРОК ДО (В ДНЯХ)

☐ 15

4014. ДЛЯ ПАЦИЕНТА ОЧЕНЬ ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ПРИ ЗНАЧЕНИИ ОХС 9 ММОЛЬ/Л, ЛПНП 5,4 ММОЛЬ/Л И ТРИГЛИЦЕРИДОВ 3 ММОЛЬ/Л ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ статины

4015. К НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ИСТОЧНИКАМ ИНФЕКЦИИ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ ОТНОСЯТ

☐ больных туберкулёзом легких с бактериовыделением

Блок: Блок 41 | № 4016

4016. АСТМА ФИЗИЧЕСКОГО УСИЛИЯ ВОЗНИКАЕТ

☐ после физической нагрузки

Блок: Блок 41 | № 4017

**4017. ВАРИАНТОМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ____ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ**

☐ краткое

Блок: Блок 41 | № 4018

4018. ДЛЯ ПОЛИМИОЗИТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ проксимальная мышечная слабость

Блок: Блок 41 | № 4019

4019. ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ

☐ формирование здорового образа жизни на уровне всего населения и обеспечение для этого соответствующих условий

Блок: Блок 41 | № 4020

4020. ПРИ СИНДРОМЕ ТИТЦЕ НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пальпация

Блок: Блок 41 | № 4021

4021. ИСТИННАЯ ПОЛИЦИТЕМИЯ ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ВОЗРАСТЕ (ГОД)

☐ 60 и старше

Блок: Блок 41 | № 4022

4022. ТОКСИЧНОСТЬ АСУНАПРЕВИРА ПОВЫШАЕТ

☐ дилтиазем

Блок: Блок 41 | № 4023

**4023. ПРОБУ МАНТУ С 2 ТЕ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СЧИТАЮТ ГИПЕРЕРГИЧЕСКОЙ ПРИ
МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ПАПУЛЫ (ММ)**

☐ 17

Блок: Блок 41 | № 4024

4024. К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

☐ тетрада Фалло

Блок: Блок 41 | № 4025

4025. ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ НАЗНАЧАЮТСЯ ПРИ

☐ III-IV степени тяжести и частых обострениях

Блок: Блок 41 | № 4026

4026. К СИСТЕМНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА, ВХОДЯЩИМ В ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ АСР (1987 Г.), ОТНОСЯТ

☐ ревматоидные узелки

Блок: Блок 41 | № 4027

4027. УСИЛИВАЮТ ДИАРЕЮ ПРИ ЦЕЛИАКИИ СПРУ

☐ белые сухари

Блок: Блок 41 | № 4028

4028. УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЮТ ФАКТОРЫ

☐ интоксикационные

Блок: Блок 41 | № 4029

4029. ПРИ БРЮШНОМ ТИФЕ ПЕРВИЧНОЕ ПОЯВЛЕНИЕ СЫПИ НАБЛЮДАЕТСЯ НА ДЕНЬ БОЛЕЗНИ

☐ 8-10

Блок: Блок 41 | № 4030

4030. К СОЦИАЛЬНО ОТЯГОЩЕННЫМ ОЧАГАМ ОТНОСЯТ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

☐ органов дыхания, выделяющих микобактерии туберкулеза

Блок: Блок 41 | № 4031

4031. ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ЕЖЕГОДНОЙ МАССОВОЙ ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ выявление первичного инфицирования

Блок: Блок 41 | № 4032

4032. ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВЫДАЕТСЯ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 15 ЛЕТ ПРИ АМБУЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ ПО КАЖДОМУ СЛУЧАЮ ЗАБОЛЕВАНИЯ НА СРОК ДО (ДЕНЬ)

☐ 15

Блок: Блок 41 | № 4033

4033. НАИБОЛЕЕ ВЫСОКАЯ ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ОПУХОЛЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ синдроме Шегрена

Блок: Блок 41 | № 4034

4034. КРИТЕРИЕМ ПОЛНОЙ КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОЙ РЕМИССИИ ПРИ ОСТРОМ ЛЕЙКОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО БЛАСТОВ В СТЕРНАЛЬНОМ ПУНКТАТЕ МЕНЕЕ (%)

☐ 5

Блок: Блок 41 | № 4035

4035. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕСТИ ОЦЕНКУ

☐ среднего уровня гликемии за 2-3 месяца

4036. К СНИЖЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ АСУНАПРЕВИРА ПРИВОДИТ ПРИЕМ

☐ фенитоин

4037. СОСУДИСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, СВЯЗАННЫМ ТОЛЬКО С АГ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нефросклероз

4038. ПРОБУ МАНТУ С 2 ТЕ СЧИТАЮТ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ПРИ МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ПАПУЛЫ (В ММ)

☐ 5

4039. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГАПТЕНОВОГО АГРАНУЛОЦИТОЗА ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ антибиотики

4040. БАКТЕРИОВЫДЕЛИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНОЙ АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ

☐ у которого микобактерии туберкулеза были обнаружены хотя бы один раз любым методом

4041. ПРЕСИСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ У БОЛЬНЫХ МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ

☐ исчезает

4042. МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (МЕДЬ, МАРГАНЕЦ) ВХОДЯТ В СОСТАВ ПРЕПАРАТА

☐ тотема

4043. НАЛИЧИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК (КУРЕНИЕ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ) У ПАЦИЕНТА

☐ повышает вероятность развития туберкулеза

4044. ПРИ СОЧЕТАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И ПАРОКСИЗМОВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПРОТИВОПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ пропранолола

4045. ВЛИЯНИЕ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА НА ФУНКЦИЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

☐ по принципу обратной связи с уровнем йодтиронинов в крови

Блок: Блок 41 | № 4046

4046. ПРИ АКТИВНОЙ АКРОМЕГАЛИИ В ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ В ПЛАЗМЕ КРОВИ

☐ соматотропного гормона и инсулиноподобного фактора роста-1

Блок: Блок 41 | № 4047

4047. ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИНЫ НА СРОКЕ 36 НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ И НАРАСТАНИЕМ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО СИНДРОМА ВКЛЮЧАЕТ

☐ назначение кортикостероидов или иммуноглобулина

Блок: Блок 41 | № 4048

4048. ДЛЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ____ ТИП КРОВОТОЧИВОСТИ

☐ пятнисто-петехиальный

Блок: Блок 41 | № 4049

4049. БИОХИМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ РАННЕЙ СТАДИИ ОСТРОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ протромбиновый индекс

Блок: Блок 41 | № 4050

4050. ПРИ СКВ С ВТОРИЧНЫМ АНТИФОСФОЛИПИДНЫМ СИНДРОМОМ, ПРОЯВЛЯЮЩИМСЯ АРТЕРИАЛЬНЫМ ТРОМБОЗОМ, К ПОСТОЯННОЙ ТЕРАПИИ СКВ ПОКАЗАНО ДОБАВЛЕНИЕ

☐ оральных антикоагулянтов

Блок: Блок 41 | № 4051

4051. К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ САНАЦИИ ОЧАГА ИНФЕКЦИИ ПРИ РЕАКТИВНОМ АРТРИТЕ ОТНОСЯТ

☐ тетрациклины

Блок: Блок 41 | № 4052

4052. К АССОЦИИРОВАННЫМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ИЛИ ПОЧЕЧНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ОТНОСЯТСЯ

☐ стенокардия и сердечная недостаточность, включая сердечную недостаточность с сохраненной фракцией выброса

Блок: Блок 41 | № 4053

4053. ЗАДЕРЖКУ НАТРИЯ И ВОДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИЁМЕ ВЫЗЫВАЕТ

☐ Клонидин

Блок: Блок 41 | № 4054

4054. АНТИФИБРОЗНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИФфуЗНОЙ ФОРМЫ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Пеницилламин

Блок: Блок 41 | № 4055

4055. ПРИЗНАКОМ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИМ О НЕБЛАГОПРИЯТНОМ ПРОГНОЗЕ ПРИ ТЕСТЕ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ отсутствие подъема систолического АД выше 120 мм рт.ст.

Блок: Блок 41 | № 4056

4056. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ У БЕРЕМЕННОЙ В 1 ТРИМЕСТРЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ амоксициллин

Блок: Блок 41 | № 4057

4057. ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАКРЫТ

☐ при наступлении клинической ремиссии

Блок: Блок 41 | № 4058

4058. ДЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ИНГАЛЯЦИОННЫМИ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ ПОКАЗАНА БОЛЬНЫМ ХОБЛ ПРИ

☐ тяжелом течении частых обострениях

Блок: Блок 41 | № 4059

4059. ПРОТИВОВИРУСНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕПАТИТА В ЯВЛЯЕТСЯ

☐ асунапревир

Блок: Блок 41 | № 4060

4060. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ПРИ ПРОБЕ МАНТУ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 2 ТЕ в 0,1 мл

Блок: Блок 41 | № 4061

4061. К УРОВНЯМ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТ

☐ общественное, групповое, индивидуальное

Блок: Блок 41 | № 4062

4062. СРЕДСТВОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ СИМПТОМОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ β 2-агонисты короткого действия

Блок: Блок 41 | № 4063

4063. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ КАРЦИНОИДА КИШКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аппендикс

Блок: Блок 41 | № 4064

4064. РАЗОВАЯ ДОЗА МЕЛОКСИКАМА СОСТАВЛЯЕТ (В МГ)

☐ 7,5-15

Блок: Блок 41 | № 4065

4065. В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ

☐ больные активной формой туберкулеза любой локализации

Блок: Блок 41 | № 4066

4066. ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОКАЗАНА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРИ СТЕАТОРЕЕ БОЛЕЕ (Г/СУТКИ)

☐ 15

Блок: Блок 41 | № 4067

4067. ОСЕЛЬТАМИВИР ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ПРИНИМАЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 5 ДНЕЙ ПО ____ МГ ____ РАЗА В СУТКИ

☐ 75; 2

Блок: Блок 41 | № 4068

4068. ПОКАЗАТЕЛЬ RDW ОТРАЖАЕТ

☐ анизоцитоз эритроцитов

Блок: Блок 41 | № 4069

4069. СРЕДСТВОМ ВЫБОРА ДЛЯ АНТИАНГИНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ β -адреноблокаторы

Блок: Блок 41 | № 4070

4070. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ПОКАЗАН

☐ левофлоксацин

Блок: Блок 41 | № 4071

4071. ДЛЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ ХОБЛ ЗНАЧЕНИЕ ОФВ1 СООТВЕТСТВУЕТ

☐ $30\% \leq \text{ОФВ1} < 50\%$

Блок: Блок 41 | № 4072

4072. К ГРУППЕ НАСЕЛЕНИЯ С ВЫСОКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОТНОСЯТСЯ

☐ мужчины

Блок: Блок 41 | № 4073

4073. К ВИТАМИН К-ЗАВИСИМЫМ ФАКТОРАМ СВЕРТЫВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

☐ второй, седьмой, девятый, десятый

Блок: Блок 41 | № 4074

4074. ПРОТИВОГЕРПЕТИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ, ПРОТИВОПОКАЗАННЫМ ДЕТЯМ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ валацикловир

Блок: Блок 41 | № 4075

4075. ФОНД ОМС ФОРМИРУЕТСЯ ЗА СЧЁТ

☐ страховых взносов на ОМС со стороны работодателей

Блок: Блок 41 | № 4076

4076. СЕЛЕКТИВНАЯ ПРОТЕИНУРИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ потере отрицательного заряда клубочкового фильтра

Блок: Блок 41 | № 4077

4077. БОЛЬНЫМ С АСПИРИНОВОЙ АСТМОЙ ИЗ-ЗА СОДЕРЖАНИЯ ТАРТРАЗИНА ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ТАБЛЕТИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ____ ЦВЕТА

☐ желтого

Блок: Блок 41 | № 4078

4078. ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОРАЖАЕТСЯ КИШКА

☐ прямая

Блок: Блок 41 | № 4079

4079. В ТЕРАПИЮ СИНДРОМА РАЗДРАЖЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ СЛЕДУЕТ ВКЛЮЧИТЬ

☐ пшеничные отруби

Блок: Блок 41 | № 4080

4080. ОБЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ДЛЯ ЭМФИЗЕМАТОЗНОГО И БРОНХИТИЧЕСКОГО ТИПОВ ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ одышка

Блок: Блок 41 | № 4081

4081. ОСНОВНЫМ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аллергическое воспаление дыхательных путей

Блок: Блок 41 | № 4082

4082. ДЛЯ ОЦЕНКИ АКТИВНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ПО DISEASE ACTIVITY SCORE 28 (DAS28) НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ

☐ ревматоидный фактор

Блок: Блок 41 | № 4083

4083. К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ФИКСИРОВАННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ОТНОСЯТ

☐ недостаточность терапии ингаляционными глюкокортикоидами

Блок: Блок 41 | № 4084

4084. КАКОЙ ВАРИАНТ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО НЕФРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ?

☐ мезангиокапиллярный

Блок: Блок 41 | № 4085

4085. ПРИ ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ ПРИМЕНЯЮТ

☐ Метформин

Блок: Блок 41 | № 4086

4086. ПРИ СРЕДНЕЙ И ТЯЖЕЛОЙ ФОРМАХ ПЕРВИЧНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НЕ НАЗНАЧАЮТ

☐ мочегонные препараты

Блок: Блок 41 | № 4087

4087. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЁГКИХ ЛЁГКОЙ СТЕПЕНИ ВКЛЮЧАЕТ ИНГАЛЯЦИЮ

☐ холинолитиков или бета-2 агонистов короткого действия по требованию

Блок: Блок 41 | № 4088

4088. ДЛЯ БРОНХОЭКТАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ХАРАКТЕРНЫ

☐ симптом «баранных палочек», кашель с гнойной мокротой, кровохарканье

Блок: Блок 41 | № 4089

4089. СИНДРОМ РЕЙНО ЧАЩЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ

☐ системной склеродермии

Блок: Блок 41 | № 4090

4090. ВЫСОКИЙ РИСК СПОНТАННЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИМЕЕТСЯ ПРИ КОЛИЧЕСТВЕ ТРОМБОЦИТОВ МЕНЕЕ ($\times 10^9/\text{л}$)

☐ 20

Блок: Блок 41 | № 4091

4091. К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ ПРИ УЗЕЛКОВОЙ ФОРМЕ СИЛИКОЗА ОТНОСЯТ

☐ узелковые тени размером от 1,5 до 10 мм

Блок: Блок 41 | № 4092

4092. ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С КАЛЬЦИНИРОВАННЫМ ОТКРЫТЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ПРОТОКОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ закрытие дефекта методом с использованием катетеризации

Блок: Блок 41 | № 4093

4093. ОСЛОЖНЕНИЕМ СО СТОРОНЫ ОРГАНОВ ЖКТ ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ полипоз

Блок: Блок 41 | № 4094

4094. ПРОГНОСТИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ФАКТОРОМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ желудочковая аритмия

Блок: Блок 41 | № 4095

4095. ПОД ТЕРМИНОМ «АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ» ПОНИМАЮТ

☐ пневмонию, вызванную легионеллами, хламидиями или микоплазмами

Блок: Блок 41 | № 4096

4096. ПОРТАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ

- ☐ циррозе печени

Блок: Блок 41 | № 4097

4097. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАРЕИ В ПЕРИОД РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИИ ПРИ СТИХАНИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СЛИЗИСТОЙ КИШЕЧНИКА МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ОТВАР

- ☐ ольховых шишек

Блок: Блок 41 | № 4098

4098. КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

- ☐ относится к диагностическому отделению поликлиники

Блок: Блок 41 | № 4099

4099. СТРАТЕГИЯ ВЫСОКОГО РИСКА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В

- ☐ своевременном выявлении лиц с повышенным уровнем факторов риска и проведение мероприятий по их коррекции

Блок: Блок 41 | № 4100

4100. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ВВОДЯТ

- ☐ морфин внутривенно

Блок 42

Блок: Блок 42 | № 4101

4101. ДЛЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ МОЧИ ХАРАКТЕРНО

- ☐ снижение удельного веса

Блок: Блок 42 | № 4102

4102. ОСНОВНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ В ДИАГНОСТИКЕ ТИРЕОТОКСИКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ определение гормонов ТТГ, Т3, Т4

Блок: Блок 42 | № 4103

4103. ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ ДЛЯ НЕОТЛОЖНОЙ ТЕРАПИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИНГИБИТОР АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА

- ☐ каптоприл

Блок: Блок 42 | № 4104

4104. МАРКЕРОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В, ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ HBsAg

Блок: Блок 42 | № 4105

4105. ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПИЕЛОНЕФРИТА ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ энтеробактерия

Блок: Блок 42 | № 4106

4106. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ латентный

Блок: Блок 42 | № 4107

4107. ПОЧЕЧНЫЙ КРОВОТОК СПОСОБЕН УЛУЧШАТЬ

☐ Допамин

Блок: Блок 42 | № 4108

4108. К ОСНОВНОМУ КРИТЕРИЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ И СТОЙКОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОТНОСЯТ

☐ клинический и трудовой прогноз

Блок: Блок 42 | № 4109

4109. ПЕРВИЧНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ ОЧАГА ТУБЕРКУЛЁЗА ПРОВОДИТСЯ С МОМЕНТА РЕГИСТРАЦИИ НЕ ПОЗДНЕЕ (СУТКИ)

☐ 3

Блок: Блок 42 | № 4110

4110. ПРИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВОЗНИКШЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ, ВЫДАЕТСЯ

☐ листок нетрудоспособности на все дни с отметкой о факте опьянения

Блок: Блок 42 | № 4111

4111. ПНЕВМОКОНИОЗЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ОТ ВДЫХАНИЯ ПЫЛИ, СОДЕРЖАЩЕЙ АСБЕСТ, ТАЛЭК, ЦЕМЕНТ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ

☐ силикатозов

Блок: Блок 42 | № 4112

4112. БРОНХИ, БРОНХИОЛЫ И ЛЕГКИЕ ПОРАЖАЮТСЯ ПРИ

☐ респираторно-синцитиальной инфекции

Блок: Блок 42 | № 4113

4113. ГУМОРАЛЬНЫМ ФАКТОРОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ТОНУС СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ эндотелин

Блок: Блок 42 | № 4114

4114. БОЛЬНЫЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПОДЛЕЖАТ ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ 1 РАЗ В МЕС.

☐ 6

Блок: Блок 42 | № 4115

4115. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ УЧЕТНАЯ ФОРМА

☐ 030/y

Блок: Блок 42 | № 4116

4116. ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА РЕЖЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЮТ НА ФОНЕ ПРИЕМА

☐ целекоксиба

Блок: Блок 42 | № 4117

4117. ЧИСЛО БРОНХИАЛЬНЫХ ГЕНЕРАЦИЙ У ВЗРОСЛЫХ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 24

Блок: Блок 42 | № 4118

4118. КАКОЙ ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ХОЛЕРЫ?

☐ дегидратационный

Блок: Блок 42 | № 4119

4119. МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ УМЕРЕННОЙ АЭРОБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ЗДОРОВЫХ ЛИЦ СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА КАРДИОЛОГОВ 2016 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ ____ МИНУТ В НЕДЕЛЮ

☐ 150

Блок: Блок 42 | № 4120

4120. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НА ТУБЕРКУЛЕЗ 1 РАЗ В ГОД ПРОХОДЯТ

☐ Больные, страдающие сахарным диабетом

Блок: Блок 42 | № 4121

4121. АТЕРОГЕННЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЮТ

☐ В-адреноблокаторы

Блок: Блок 42 | № 4122

4122. НАИБОЛЕЕ ДОКАЗАННЫМ ЭФФЕКТОМ АНТИКОАГУЛЯНТОВ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТМ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение частоты тромбоэмболических осложнений

Блок: Блок 42 | № 4123

4123. АСЦИТ ПОЯВЛЯЕТСЯ РАНЬШЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ОТЕКОВ ПРИ

☐ циррозе печени

Блок: Блок 42 | № 4124

4124. ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНА ПРИ

☐ гипогликемических состояниях

Блок: Блок 42 | № 4125

4125. У ЖЕНЩИНЫ 21 ГОДА С ПОСТОЯННЫМ СУБФЕБРИЛИТЕТОМ, ЖАЛОБАМИ НА ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ, ШУМ В УШАХ, МЕЛЬКАНИЕ МУШЕК ПЕРЕД ГЛАЗАМИ, С АД НА РУКАХ 110/70 ММ РТ.СТ. НЕОБХОДИМО ИСКЛЮЧИТЬ СИМПТОМАТИЧЕСКУЮ АГ, ОБУСЛОВЛЕННУЮ

☐ болезнью Такаясу

Блок: Блок 42 | № 4126

4126. ПРИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВОЗНИКШЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ, ВЫДАЁТСЯ

☐ листок нетрудоспособности с отметкой

Блок: Блок 42 | № 4127

4127. С РАСПРОСТРАНЁННОЙ ФОРМОЙ ДИФТЕРИИ РОТОГЛОТКИ ЧАЩЕ ПРИХОДИТСЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ

☐ ожог слизистой ротоглотки (термический, химический)

Блок: Блок 42 | № 4128

4128. В ОСНОВЕ ЛЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ЛЕЖИТ

☐ регидратационная терапия полиионными растворами

Блок: Блок 42 | № 4129

4129. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ФОРМИРУЮТ

☐ 3 группы

Блок: Блок 42 | № 4130

4130. КАКОЙ ФОРМЕ ТУБЕРКУЛЁЗА РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИ СООТВЕТСТВУЕТ ОДНОСТОРОННЕЕ ЗАТЕНЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ НА УРОВНЕ РЕБРА С ЧЁТКОЙ НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕЙ?

☐ перисциссуриту

Блок: Блок 42 | № 4131

4131. В III СТАДИИ ДВС-СИНДРОМА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ тромбоцитопения

Блок: Блок 42 | № 4132

4132. ГЛИКЕМИЯ ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ ЕДЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ В НОРМЕ КОНСТАТИРУЕТСЯ ПРИ УРОВНЕ ГЛЮКОЗЫ ДО (ММОЛЬ/Л)

☐ 7,8

Блок: Блок 42 | № 4133

4133. ХЕЛИКОБАКТЕР, ВЫЯВЛЕННЫЙ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО КОЛОНИЗИРУЕТСЯ В

☐ пилорическом отделе желудка

Блок: Блок 42 | № 4134

4134. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ГЕТЕРОЗИГОТНОЙ ФОРМЫ СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ уровень холестерина липопротеинов низкой плотности более 8,5 ммоль/л

Блок: Блок 42 | № 4135

4135. В СОСТАВ ЛИПОПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ ВХОДИТ АПОЛИПОПРОТЕИН

☐ B-100

Блок: Блок 42 | № 4136

4136. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАЗНАЧЕНИЯ СИСТЕМНЫХ (ПЕРОРАЛЬНЫХ) ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ ПРИ ХОБЛ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 10-14 дней

Блок: Блок 42 | № 4137

4137. ПРИ СНИЖЕНИИ СКФ <30 МЛ/МИН/1,73 М2 ГИПЕРКАЛИЕМИЮ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ НАЗНАЧЕНИЕ

☐ спиронолактона

Блок: Блок 42 | № 4138

4138. АТРОВЕНТ ПРИ ХОБЛ НАЗНАЧАЮТ ПО __ ИНГАЛЯЦИИ __ РАЗА В ДЕНЬ

☐ 2; 4

Блок: Блок 42 | № 4139

4139. ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ

☐ шейного отдела позвоночника

Блок: Блок 42 | № 4140

4140. МОЩНОСТЬ ПОЛИКЛИНИКИ ОЦЕНИВАЕТСЯ

☐ количеством посещений кабинетов врачебного приема в смену

Блок: Блок 42 | № 4141

4141. БОЛИ В МЫШЦАХ, СУСТАВАХ, ПОВТОРНЫЕ ОЗНОБЫ, ПОТЫ, ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ ОБЩЕМ САМОЧУВСТВИИ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ И СЕЛЕЗЕНКИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ бруцеллеза

Блок: Блок 42 | № 4142

4142. ПРАВО НА ВЫДАЧУ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ИМЕЮТ

☐ врачи амбулаторно-поликлинических учреждений, врачи стационарных учреждений, частнопрактикующие врачи, имеющие лицензию

Блок: Блок 42 | № 4143

4143. ХАРАКТЕРНОЙ ТРИАДОЙ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

☐ боль в животе, метеоризм, диарея

Блок: Блок 42 | № 4144

4144. БРОНХОЭКТАТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ЧАСТО СОЧЕТАЕТСЯ С

☐ хроническим синуситом, аденоидами

Блок: Блок 42 | № 4145

4145. КОЛИЧЕСТВО ЕЖЕГОДНЫХ ОСМОТРОВ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ, ВХОДЯЩИХ В ДИСПАНСЕРНУЮ ГРУППУ НАБЛЮДЕНИЯ, СОСТАВЛЯЕТ

☐ 2

Блок: Блок 42 | № 4146

4146. К В-СИМПТОМАМ ПРИ ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ГЕМОБЛАСТОЗАХ ОТНОСЯТ

☐ похудание, слабость

Блок: Блок 42 | № 4147

4147. К ПОЗДНИМ ПРИЗНАКАМ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ОТНОСИТСЯ

☐ хорея

Блок: Блок 42 | № 4148

4148. В СОСТАВЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ГЕПАТИТА С ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ асунапревир

Блок: Блок 42 | № 4149

4149. В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

☐ препараты инсулина

Блок: Блок 42 | № 4150

4150. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА ПРИ ТЕРАПИИ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПОЖИЛЫХ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ диуретики и антагонисты кальция

Блок: Блок 42 | № 4151

4151. НЕГАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инвалидность

Блок: Блок 42 | № 4152

4152. СРЕДНЯЯ ПРИБАВКА ВЕСА ЗА БЕРЕМЕННОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ (В КГ)

☐ 8-10

Блок: Блок 42 | № 4153

4153. К САНИТАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ОТНОСЯТ

☐ изоляцию и лечение больных, санитарное просвещение, работу в очаге туберкулезной инфекции

Блок: Блок 42 | № 4154

4154. ЯВНЫМ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АКРОМЕГАЛИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ увеличение размеров турецкого седла

Блок: Блок 42 | № 4155

4155. К ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКАМ СЕРДЦА ОТНОСИТСЯ

☐ открытый артериальный проток

Блок: Блок 42 | № 4156

4156. ТОКСИЧНОСТЬ АСУНАПРЕВИРА ПОВЫШАЕТ

☐ верапамил

Блок: Блок 42 | № 4157

4157. РЕЖЕ ДРУГИХ ВЫЗЫВАЕТ ЯЗВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

☐ мелоксикам

Блок: Блок 42 | № 4158

4158. ПОЗИТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ рождаемость

Блок: Блок 42 | № 4159

4159. ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЮТСЯ СУСТАВЫ

☐ проксимальные межфаланговые

Блок: Блок 42 | № 4160

4160. БАЗИСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ингаляционные глюкокортикостероиды

Блок: Блок 42 | № 4161

4161. К ПЕРВИЧНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТ

☐ стресс

Блок: Блок 42 | № 4162

4162. НЕГАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ смертность

Блок: Блок 42 | № 4163

4163. СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПРИЗНАКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНОЙ И НАЗЫВАЕТСЯ

☐ модой

Блок: Блок 42 | № 4164

4164. НЕГАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ травматизм

Блок: Блок 42 | № 4165

4165. СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ПРИЗНАКА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНОЙ И НАЗЫВАЕТСЯ

☐ медианой

Блок: Блок 42 | № 4166

4166. ТЕМНАЯ И ЖЕЛТОВАТАЯ ОКРАСКА КОЖИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЗАВИСИТ ОТ

☐ нарушения выделения урохромов

Блок: Блок 42 | № 4167

4167. НЕГАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОЦЕНКИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ заболеваемость

Блок: Блок 42 | № 4168

4168. ВРАЧЕБНАЯ КОМИССИЯ МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ДО 12 МЕСЯЦЕВ ПРИ БЛАГОПРИЯТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ И ТРУДОВОМ ПРОГНОЗЕ, ПРИ

☐ туберкулезе

Блок: Блок 42 | № 4169

4169. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АГ В СОЧЕТАНИИ С ИБС, ЦВБ ИЛИ ХЛП ПРОВОДИТСЯ С ЧАСТОТОЙ НЕ МЕНЕЕ 1 РАЗА В (В МЕСЯЦАХ)

☐ 6

Блок: Блок 42 | № 4170

4170. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА РАЗРАБОТАНА ТОЛЬКО ДЛЯ

☐ гриппа

Блок: Блок 42 | № 4171

4171. ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗОЙ АСПИРИНА В СУТКИ В КАЧЕСТВЕ АНТИАГРЕГАНТА БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ (В МГ)

☐ 100

Блок: Блок 42 | № 4172

4172. РАЗВИТИЕ ГИПЕРТЕРМИИ С ОЗНОБОМ В ПЕРВЫЕ ЧАСЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТИПИЧНО ДЛЯ ____ ПНЕВМОНИИ

☐ пневмококковой

Блок: Блок 42 | № 4173

4173. ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТЕСТА С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДОБРАННОЙ СХЕМЫ ЛЕЧЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДИАГНОСТИРОВАННОЙ ИБС ОЦЕНИВАЕТСЯ

☐ на фоне приема препаратов

Блок: Блок 42 | № 4174

4174. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПНЕВМОНИИ У БЕРЕМЕННОЙ НЕЛЬЗЯ ПРИМЕНЯТЬ

☐ ципрофлоксацин

Блок: Блок 42 | № 4175

4175. НАИБОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫМ ПУТЁМ ВВЕДЕНИЯ САЛЬБУТАМОЛА ПРИ ЗАТЯНУВШЕМСЯ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ингаляционный через небулайзер

Блок: Блок 42 | № 4176

4176. К ДАННЫМ, ПОЛУЧЕННЫМ ПРИ ОБЩЕМ ОСМОТРЕ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА АНЕМИЮ, ОТНОСЯТСЯ:

☐ бледность видимых слизистых и кожного покрова

Блок: Блок 42 | № 4177

4177. ДЕЙСТВИЕ РАБЕПРАЗОЛА СВЯЗАНО С

☐ ингибированием протонной помпы

Блок: Блок 42 | № 4178

4178. ИБС В МОЛОДЫЕ ГОДЫ ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ У ЛИЦ С ГИПЕРЛИПИДЕМИЕЙ ____ ТИПА

☐ II, III

Блок: Блок 42 | № 4179

4179. ОСНОВНЫМ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИМСЯ ФАКТОРОМ РИСКА ХОБЛ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ табакокурение

Блок: Блок 42 | № 4180

4180. ПРИЧИНОЙ ПОДКЛАПАННОГО СТЕНОЗА УСТЬЯ АОРТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гипертрофия межжелудочковой перегородки при гипертрофической кардиомиопатии

Блок: Блок 42 | № 4181

4181. ДЛЯ МАССИВНОГО АТЕЛЕКТАЗА ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ смещение средостения в пораженную сторону

Блок: Блок 42 | № 4182

4182. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СЕЗОННОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ

☐ интраназальные глюкокортикостероиды

Блок: Блок 42 | № 4183

4183. СПЕЦИФИЧЕСКИМ АНТИДОТОМ ПРИ РАЗВИТИИ ОПИАТНОЙ КОМЫ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ НАРКОТИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ налоксон

Блок: Блок 42 | № 4184

4184. ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧИНОЙ ПУЛЬСАЦИИ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ недостаточность трехстворчатого клапана

Блок: Блок 42 | № 4185

4185. ЦИТОПРОТЕКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ В ОТНОШЕНИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ОБЛАДАЕТ

☐ висмута трикалия дицитрат

Блок: Блок 42 | № 4186

4186. НЕСТЕРОИДНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ целекоксиб

Блок: Блок 42 | № 4187

4187. ЧЕТВЕРТЫЙ ТОН НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫСЛУШИВАЕТСЯ ПРИ

☐ аортальном стенозе

Блок: Блок 42 | № 4188

4188. ОСЛОЖНЕНИЕМ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, СВЯЗАННЫМ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ишемический инсульт

Блок: Блок 42 | № 4189

4189. ПРИМЕНЕНИЕ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ У БОЛЬНЫХ С ИБС МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ

☐ брадикардию и снижение АД

Блок: Блок 42 | № 4190

4190. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ФГС с биопсией

Блок: Блок 42 | № 4191

4191. В ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИИ H. PYLORI ПРИ ГАСТРИТЕ ПРИМЕНЯЮТ

☐ омепразол

Блок: Блок 42 | № 4192

4192. ПОДОЗРЕНИЕ НА ИНФАРКТ МИОКАРДА НА ФОНЕ БЛОКАДЫ ЛЕВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА ВОЗНИКАЕТ, ЕСЛИ

☐ имеются комплекс QR или зазубрины в начале восходящего колена зубца R в отведениях V5-V6

Блок: Блок 42 | № 4193

4193. СОВРЕМЕННЫМ ПРОСТЕЙШИМ ПРИБОРОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пикфлоуметр

Блок: Блок 42 | № 4194

4194. ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ИНФЕКЦИОННОМ МИОКАРДИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОЗРАСТАЕТ УРОВЕНЬ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА

☐ IgG

Блок: Блок 42 | № 4195

4195. ЭПИЗОДЫ БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА ЧАЩЕ ВЫЯВЛЯЮТСЯ У ЛИЦ СТРАДАЮЩИХ

☐ сахарным диабетом

Блок: Блок 42 | № 4196

4196. НАЗНАЧЕНИЕ СТАТИНОВ ПОКАЗАНО ПРИ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ ТИПА

☐ IIA

Блок: Блок 42 | № 4197

4197. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО БОЛЬНОЙ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗОМ ОБРАЩАЕТСЯ К ВРАЧУ В СВЯЗИ С

☐ увеличением размеров периферических лимфоузлов

Блок: Блок 42 | № 4198

4198. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТОСКОПИИ У ВЗРОСЛЫХ УШНУЮ РАКОВИНУ ОТЯГИВАЮТ

☐ вверх и кзади

Блок: Блок 42 | № 4199

4199. ГИПЕРХРОМИЯ ЭРИТРОЦИТОВ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ _____ АНЕМИИ

☐ В12-дефицитной

Блок: Блок 42 | № 4200

4200. ТОФУСЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ОТЛОЖЕНИЕ _____ В ТКАНИ

☐ мочевой кислоты

Блок 43

Блок: Блок 43 | № 4201

4201. АСИММЕТРИЯ АД НА РУКАХ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ неспецифического аортоартериита

Блок: Блок 43 | № 4202

4202. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА СЧИТАЕТСЯ ХОРОШО КОНТРОЛИРУЕМОЙ, ЕСЛИ ПАЦИЕНТ ОТРИЦАЕТ НАЛИЧИЕ СИМПТОМОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 НЕДЕЛИ И В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ ИСПОЛЬЗУЕТ САЛЬБУТАМОЛ НЕ БОЛЕЕ

☐ 1 раза

Блок: Блок 43 | № 4203

4203. МЕТОДИКА ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ РАХИТЕ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИСКЛЮЧАЕТ

☐ длительные статические напряжения мышц

Блок: Блок 43 | № 4204

4204. ЗАДАЧИ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В

☐ снижении дыхательной недостаточности

Блок: Блок 43 | № 4205

4205. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛФК ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ физические упражнения

Блок: Блок 43 | № 4206

4206. ИНСОЛЯЦИИ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПРИ

☐ системной красной волчанке

Блок: Блок 43 | № 4207

4207. К ОСОБЕННОСТЯМ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЁЛОЙ ФОРМОЙ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСЯТ

☐ тренировку стабилизационного аппарата позвоночника

Блок: Блок 43 | № 4208

4208. НАИБОЛЕЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ АДЕКВАТНЫМИ ПРИ ОЖИРЕНИИ ЯВЛЯЮТСЯ УПРАЖНЕНИЯ

☐ циклического характера, тренирующие выносливость

Блок: Блок 43 | № 4209

4209. К ЗАДАЧАМ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНСУЛЬТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ОТНОСЯТ

☐ повышение толерантности к физической нагрузке

Блок: Блок 43 | № 4210

4210. ПРОФИЛАКТИКА ОБОСТРЕНИЙ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА ИСКЛЮЧАЕТ

☐ поднятие тяжестей

Блок: Блок 43 | № 4211

4211. ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОГО ВЫБОРА ПРИ ОСТРОМ ОТРАВЛЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ РТУТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ сукцимер

Блок: Блок 43 | № 4212

4212. К АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА ОТНОСЯТ

☐ кровотечение

Блок: Блок 43 | № 4213

4213. ПРИ ЭКСУДАТИВНОМ ПЛЕВРИТЕ ДЛЯ РАСТЯЖЕНИЯ СПАЕК ПРИМЕНЯЮТ

☐ динамические дыхательные упражнения с подъемом руки на больной стороне

Блок: Блок 43 | № 4214

4214. ПРИ ГИПОТОНИИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ изометрические

Блок: Блок 43 | № 4215

4215. К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПЛАВАНИЕМ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОТНОСЯТ

☐ гнойничковые поражения кожи

Блок: Блок 43 | № 4216

4216. В ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКЕ ПРИ СПАСТИЧЕСКИХ ЗАПОРАХ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ УПРАЖНЕНИЯ

☐ с выраженным усилием мышц брюшного пресса

Блок: Блок 43 | № 4217

4217. К ОСНОВНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ ОТНОСЯТ

☐ общее тяжелое состояние пациента

Блок: Блок 43 | № 4218

4218. ОСНОВНЫМ ДЕЙСТВУЮЩИМ СУБСТРАТОМ СПИРИВА ХАНДИХАЛЕР ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тиотропия бромид

Блок: Блок 43 | № 4219

4219. К ОСНОВНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ ОТНОСЯТ

☐ инфекционные и кожно-венерические заболевания

Блок: Блок 43 | № 4220

4220. К СТУПЕНЧАТОЙ ТЕРАПИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ ОТНОСЯТ

☐ двухэтапное применение антибактериальных препаратов: переход с парентерального на пероральный путь введения

Блок: Блок 43 | № 4221

4221. К ОСНОВНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ В БАССЕЙНЕ ОТНОСЯТ

☐ острые воспалительные процессы

Блок: Блок 43 | № 4222

4222. ДИАРЕЕЙ И КИШЕЧНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ МАНИФЕСТИРУЕТ

☐ неспецифический язвенный колит

Блок: Блок 43 | № 4223

4223. ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ МАССАЖА В ПОЛОЖЕНИИ СИДЯ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ одышка

Блок: Блок 43 | № 4224

4224. ЕСЛИ У БОЛЬНОГО НАБЛЮДАЮТ НОРМОХРОМНУЮ, ГИПЕРГЕНЕРАТОРНУЮ АНЕМИЮ, ТО ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ ЯВЛЯЕТСЯ ____ АНЕМИЯ

☐ гемолитическая

Блок: Блок 43 | № 4225

4225. ДЛЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ К МАЛОЗНАЧИМЫМ ОТНОСЯТ УПРАЖНЕНИЯ

☐ на внимание

Блок: Блок 43 | № 4226

4226. НОРМОЦИТАРНАЯ НОРМОХРОМНАЯ ГИПОРЕГЕНЕРАТОРНАЯ АНЕМИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ апластической анемии

Блок: Блок 43 | № 4227

4227. К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА ПРИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ РАДИКУЛИТЕ ОТНОСЯТ

☐ стадию неполной ремиссии

Блок: Блок 43 | № 4228

4228. ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИМИ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С

☐ переломом лучевой кости в типичном месте

Блок: Блок 43 | № 4229

4229. МАЛООЖИДАЕМЫМ КЛИНИКО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ОТ ЗАНЯТИЙ ЛФК ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ активизация противосвертывающей системы крови

Блок: Блок 43 | № 4230

4230. БОЛЬНОГО В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ СЛЕДУЕТ ЛЕЧИТЬ

☐ всю его жизнь

Блок: Блок 43 | № 4231

4231. ПРОФИЛАКТИКА РАЗВИТИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ СПОНДИЛОАРТРОЗА ВКЛЮЧАЕТ

☐ индивидуальный подбор матраца и подушки

Блок: Блок 43 | № 4232

4232. К ВЕДУЩИМ КРИТЕРИЯМ ОТБОРА ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ОТНОСЯТ

☐ состояние здоровья

Блок: Блок 43 | № 4233

4233. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ПРИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тахикардия

Блок: Блок 43 | № 4234

4234. ПРИ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОМ ПЕРИАРТРИТЕ ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ восстановление движения в плечевом суставе

Блок: Блок 43 | № 4235

4235. ПРИ ЗАНЯТИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ИСКЛЮЧАЮТСЯ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

☐ на сгибание туловища с большой амплитудой

Блок: Блок 43 | № 4236

4236. К СПЕЦИАЛЬНЫМ ФИЗИЧЕСКИМ УПРАЖНЕНИЯМ ПРИ ГИПОТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСЯТ

☐ упражнения со статическим и динамическим усилием

Блок: Блок 43 | № 4237

4237. SMART-ТЕРАПИЯ ПОЗВОЛЯЕТ

☐ сократить количество обострений и общую дозу используемых ИГКС

Блок: Блок 43 | № 4238

4238. К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНОГО НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ПЛЕВРИТА ОТНОСЯТ

☐ формирование массивного плевропневмофиброза после эффективного лечения

Блок: Блок 43 | № 4239

4239. СТАБИЛИЗАЦИЯ КРОВО- И ЛИМФООБРАЩЕНИЯ В ПОЗДНЕМ ПЕРИОДЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ ПОЗВОЛЯЕТ

☐ увеличить общую физическую нагрузку

Блок: Блок 43 | № 4240

4240. НЕБОЛЬШОЕ УРЕЖЕНИЕ ПУЛЬСА ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ ПОДРАЗУМЕВАЕТ

☐ положительное воздействие лечебной гимнастики на организм больного

Блок: Блок 43 | № 4241

4241. ПАЦИЕНТУ С ОБОСТРЕНИЕМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА НАЗНАЧАЕТСЯ РЕЖИМ

☐ строгий постельный

Блок: Блок 43 | № 4242

4242. ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ АКТИВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тромбоз

Блок: Блок 43 | № 4243

4243. НАИБОЛЕЕ РАСШИРЕННЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ РЕЖИМОМ В САНАТОРИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тренирующий

Блок: Блок 43 | № 4244

4244. РЕФЛЕКС БЕЦОЛЬДА-ЯРИША ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ____ АД И

☐ снижением; брадикардией

Блок: Блок 43 | № 4245

4245. ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ В МАЛОМ КРУГЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ПОРОКАМИ СЕРДЦА ПРИМЕНЯЮТ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

☐ с удлиненным выдохом

Блок: Блок 43 | № 4246

4246. К ПОКАЗАНИЯМ К НАЗНАЧЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ В ВОДЕ ОТНОСЯТ

☐ артриты и артрозы

Блок: Блок 43 | № 4247

4247. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО ТОНУСА ИСПОЛЬЗУЮТ УПРАЖНЕНИЯ

☐ с пассивными движениями в отдельных суставах

Блок: Блок 43 | № 4248

4248. БОЛЬНОМУ БОЛЕЗНЬЮ БЕХТЕРЕВА В РАМКАХ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ РЕКОМЕНДУЮТ

☐ наклоны, повороты, сгибания, вращения туловища

Блок: Блок 43 | № 4249

4249. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОМУ ДЫХАНИЮ ПРИ ХОРЕЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОБУЧЕНИЕ

☐ раздельному дыханию

Блок: Блок 43 | № 4250

4250. ПРИ ГАСТРИТАХ С ПОНИЖЕННОЙ СЕКРЕЦИЕЙ В ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ

☐ значительно повышающих внутрибрюшное давление

Блок: Блок 43 | № 4251

4251. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ КОМПОНЕНТОМ ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ

☐ кальция и витамина д

Блок: Блок 43 | № 4252

4252. ПРИ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОВ С ДОРСОПАТИЕЙ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ

☐ применение валиков под коленными суставами в исходном положении лежа на спине

Блок: Блок 43 | № 4253

4253. К ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЕРМАТОМИОЗИТА ОТНОСЯТ

☐ гелиотропный параорбитальный отёк

Блок: Блок 43 | № 4254

4254. К ПОКАЗАНИЯМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛФК У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЧЕК И МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ОТНОСЯТ

☐ хронический гломерулонефрит и мочекаменную болезнь

Блок: Блок 43 | № 4255

4255. ПАТОГНОМОНИЧНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ДЕРМАТОМИОЗИТА СЛУЖИТ

☐ параорбитальный отёк с лиловой эритемой верхнего века

Блок: Блок 43 | № 4256

4256. ПРИ СКОЛИОЗЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ деторсионные

Блок: Блок 43 | № 4257

4257. К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ К НАЗНАЧЕНИЮ ЛФК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ ОТНОСЯТ

☐ панкреатит

Блок: Блок 43 | № 4258

4258. ПАЦИЕНТАМ, ПЕРЕНЕСШИМ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ПО ПОВОДУ ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА, ПРОТИВОПОКАЗАНО ПОЛОЖЕНИЕ

☐ сидя

Блок: Блок 43 | № 4259

4259. К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА ЛИЦА ОТНОСЯТ

☐ неврит тройничного нерва

Блок: Блок 43 | № 4260

4260. ПРИ АРТЕРИИТЕ ТАКАЯСУ РЕДКО ПОРАЖАЕТСЯ

☐ подвздошная артерия

Блок: Блок 43 | № 4261

4261. ПРИ ЛЕЧЕНИИ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НЕФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ ГЕПАРИН НАЗНАЧАЕТСЯ В ВИДЕ ИНФУЗИИ С УВЕЛИЧЕНИЕМ АЧТВ В ____ ВЫШЕ КОНТРОЛЬНОГО

☐ 1,5-2,5 раза

Блок: Блок 43 | № 4262

4262. СОЧЕТАНИЕ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ГЕМАНГИОБЛАСТОМЫ ЦНС, АНГИОМ СЕТЧАТКИ, КАРЦИНОМЫ ПОЧКИ И ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ болезни Гиппеля — Линдау

Блок: Блок 43 | № 4263

4263. МЕТОД ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПО ОБЩЕПРИНЯТОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ОТНОСЯТ К РАЗДЕЛУ

☐ фототерапия

Блок: Блок 43 | № 4264

4264. СОЧЕТАНИЕ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ГЕМАНГИОБЛАСТОМЫ ЦНС, АНГИОМ СЕТЧАТКИ, ПАПИЛЛЯРНОЙ ЦИСТАДЕНОМЫ ПРИДАТКА ЯИЧКА И ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ болезни Гиппеля — Линдау

Блок: Блок 43 | № 4265

4265. МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТОТЕРАПИИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПАЦИЕНТАМ С

☐ имплантированным электрокардиостимулятором

Блок: Блок 43 | № 4266

4266. СОЧЕТАНИЕ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ГЕМАНГИОБЛАСТОМЫ ЦНС, АНГИОМ СЕТЧАТКИ, ПАПИЛЛЯРНОЙ ЦИСТАДЕНОМЫ ШИРОКОЙ СВЯЗКИ И ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ болезни Гиппеля — Линдау

Блок: Блок 43 | № 4267

4267. ЗВУКОВАЯ ГИМНАСТИКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ

☐ снятия бронхоспазма

Блок: Блок 43 | № 4268

4268. СОЧЕТАНИЕ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ГЕАНГИОБЛАСТОМЫ ЦНС, АНГИОМ СЕТЧАТКИ, ОПУХОЛИ ВНУТРЕННЕГО УХА И ФЕОХРОМОЦИТОМЫ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ болезни Гиппеля — Линдау

Блок: Блок 43 | № 4269

4269. К НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ВИДАМ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА ОТНОСЯТ

☐ плавание и ходьбу

Блок: Блок 43 | № 4270

4270. «СТУПЕНЧАТОЙ ТЕРАПИЕЙ» ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИИ СЧИТАЮТ

☐ первоначальное введение антибиотика внутривенно, а затем прием этого же препарата внутрь

Блок: Блок 43 | № 4271

4271. ПРИ ШЕЙНОМ ОСТЕОХОНДРОЗЕ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ОСОБЕННОСТЬЮ МЕТОДИКИ ЛФК ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧЕНИЕ

☐ активных движений головой во все стороны

Блок: Блок 43 | № 4272

4272. МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ПУЛЬС ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО

☐ результатам велоэргометрического теста

Блок: Блок 43 | № 4273

4273. ЗАДАЧИ МАССАЖА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НАПРАВЛЕННЫ НА

☐ предупреждение мышечных атрофий и контрактур

Блок: Блок 43 | № 4274

4274. ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ (БЛИЖНИЙ ТУРИЗМ) РАЗРЕШЕНЫ ПРИ ДВИГАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ

☐ тренирующем

Блок: Блок 43 | № 4275

4275. СОХРАНЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЙ ОСАНКИ ВОЗМОЖНО С ПОМОЩЬЮ

☐ укрепления мышц шеи, спины, поясницы

Блок: Блок 43 | № 4276

4276. НА СТОРОНЕ РЕБЕРНОГО ГОРБА ПРИМЕНЯЮТ

☐ поглаживание, разминание

Блок: Блок 43 | № 4277

4277. ДЛЯ ЛИМИТИРОВАННОЙ ФОРМЫ СКЛЕРОДЕРМИИ ХАРАКТЕРНО ОБНАРУЖЕНИЕ

☐ антицентромерных антител

4278. ДЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ ПОКАЗАНЫ ПРИ

☐ мелкоочаговом инфаркте миокарда с единичными приступами стенокардии без изменения электрокардиограммы

4279. К ОПТИМАЛЬНЫМ ИСХОДНЫМ ПОЛОЖЕНИЯМ ДЛЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ОТНОСЯТ ПОЛОЖЕНИЕ

☐ сидя на стуле или стоя

4280. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДИАГНОЗА ОСТЕОПОРОЗА ПРИ НАЛИЧИИ НИЗКОТРАВМАТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ КРУПНЫХ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА (БЕДРА, ТЕЛ ПОЗВОНКОВ, МНОЖЕСТВЕННЫХ ПЕРЕЛОМОВ)

☐ достаточно данных рентгенографического исследования

4281. ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ заболеваемость

4282. НУЖДАЕТСЯ ЛИ БОЛЬНОЙ, КОТОРОМУ ПО ПОВОДУ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ВЫПОЛНЕНА РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА, В ДИСПАНСЕРНОМ НАБЛЮДЕНИИ В ГРУППЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА?

☐ да, по прошествии 10 лет после операции

4283. ОСНОВНЫМИ ГРУППАМИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ показатели инвалидности, заболеваемости, физического развития, демографические показатели

4284. ИЗМЕНЕНИЯ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА 30 ММ.РТ.СТ. И БОЛЕЕ ОТ ИСХОДНОГО, А ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА 10 ММ.РТ.СТ. И БОЛЕЕ ГОВОРIT О _____ РЕАКЦИИ

☐ гипертонической

4285. ДОЗИРОВАННАЯ ХОДЬБА ПОКАЗАНА ПРИ

☐ артериальной гипертензии I-II степени

4286. ЭВАКУАЦИИ СОДЕРЖИМОГО БРОНХОВ СПОСОБСТВУЕТ

☐ дренажное упражнение

Блок: Блок 43 | № 4287

4287. МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА, РАССМАТРИВАЮЩАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ОТ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

☐ экология человека

Блок: Блок 43 | № 4288

4288. К УПРАЖНЕНИЯМ УМЕРЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТНОСЯТ

☐ дыхательные упражнения динамического характера

Блок: Блок 43 | № 4289

4289. СОЧЕТАНИЕ МЕДУЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ФЕОХРОМОЦИТОМЫ И МАРФАНОПОДОБНОГО ФЕНОТИПА ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СИНДРОМА МНОЖЕСТВЕННОЙ ЭНДОКРИННОЙ НЕОПЛАЗИИ

☐ тип 2б

Блок: Блок 43 | № 4290

4290. К УПРАЖНЕНИЯМ УМЕРЕННОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКОЙ ОТНОСЯТ

☐ упражнения для средних мышечных групп в среднем и быстром темпе

Блок: Блок 43 | № 4291

4291. СОЧЕТАНИЕ МЕДУЛЛЯРНОГО РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ФЕОХРОМОЦИТОМЫ И НЕВРИНОМ СЛИЗИСТЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СИНДРОМА МНОЖЕСТВЕННОЙ ЭНДОКРИННОЙ НЕОПЛАЗИИ

☐ тип 2б

Блок: Блок 43 | № 4292

4292. ПРИ ПЛОСКОСТОПИИ К ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИМ ОТНОСЯТ УПРАЖНЕНИЯ

☐ для укрепления мышц тазового дна

Блок: Блок 43 | № 4293

4293. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛЕЙ ПАЦИЕНТУ СО СТЕНОКАРДИЕЙ ПРИНЦМЕТАЛА ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧАТЬ

☐ антагонисты кальция

Блок: Блок 43 | № 4294

4294. К СПЕЦИАЛЬНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ ПРИ ПЛОСКОСТОПИИ ОТНОСЯТ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ

☐ поддерживающих свод стопы

Блок: Блок 43 | № 4295

4295. НОРМАТИВ ПРОБЫ ШТАНГЕ У ВЗРОСЛЫХ МУЖЧИН, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ, СОСТАВЛЯЕТ (В СЕКУНДАХ)

☐ 50-60

Блок: Блок 43 | № 4296

4296. К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ МАССАЖА ПРИ ОСТРЫХ ТРАВМАХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОТНОСЯТ

☐ растяжение сухожилий

Блок: Блок 43 | № 4297

4297. НОРМАТИВ ПРОБЫ ШТАНГЕ У ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН, НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ, СОСТАВЛЯЕТ (В СЕКУНДАХ)

☐ 40-50

Блок: Блок 43 | № 4298

4298. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ГЛЮКОЗА ПЛАЗМЫ НАТОЩАК/ДО ЕДЫ/НА НОЧЬ МЕНЕЕ ____ ММОЛЬ/Л

☐ 6,1

Блок: Блок 43 | № 4299

4299. НАЗНАЧЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ У БОЛЬНОГО С ПРИЗНАКАМИ СПОНТАННОЙ РЕМИССИИ САРКОИДОЗА

☐ не целесообразно

Блок: Блок 43 | № 4300

4300. СИМПТОМ «КИСЕТНОГО РТА» ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ системной склеродермии

Блок 44

Блок: Блок 44 | № 4301

4301. К АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА ОТНОСЯТ

☐ гемофилию

Блок: Блок 44 | № 4302

4302. ОПУХОЛЬ, СОКРАЩАЮЩАЯСЯ В ОБЪЕМЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЛЕЧЕНИЯ ДО 10 КУБ.СМ (ДИАМЕТРОМ 2,7 СМ), ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ЧАСТИЧНОЙ РЕМИССИИ, СОДЕРЖИТ ____ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК

☐ 1010

Блок: Блок 44 | № 4303

4303. НОРМАЛЬНЫЙ I ТОН СЕРДЦА ПО СРАВНЕНИЮ СО II ТОНОМ

☐ громче, продолжительнее и ниже

Блок: Блок 44 | № 4304

4304. ЗАДАЧИ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ВКЛЮЧАЮТ

☐ тренировку экстракардиальных и кардиальных факторов кровообращения

Блок: Блок 44 | № 4305

4305. НОРМАЛЬНЫЙ II ТОН СЕРДЦА ПО СРАВНЕНИЮ С I ТОНОМ

☐ громче, короче и выше

Блок: Блок 44 | № 4306

4306. ПРИ ГИПОТОНИИ МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

☐ дыхательную гимнастику

Блок: Блок 44 | № 4307

4307. ЗАДАЧИ МАССАЖА ПРИ ПАРАЛИЧАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВКЛЮЧАЮТ

☐ снижение рефлекторной возбудимости спастических мышц

Блок: Блок 44 | № 4308

4308. ЗАДАЧИ МАССАЖА ПРИ ПАРАЛИЧАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ

☐ повышение рефлекторной возбудимости спастических мышц

Блок: Блок 44 | № 4309

4309. К ЗАДАЧАМ МАССАЖА ПРИ ПАРАЛИЧАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСЯТ

☐ снижение рефлекторной возбудимости спастических мышц

Блок: Блок 44 | № 4310

4310. ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА ХАРАКТЕРНО ОБНАРУЖЕНИЕ

☐ эозинофильно-базофильной ассоциации

Блок: Блок 44 | № 4311

4311. ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОЛЕЙКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ

☐ наличие филадельфийской хромосомы

Блок: Блок 44 | № 4312

4312. ИНСУЛИН КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПЕРВОГО ТИПА ОБЫЧНО ВВОДИТСЯ

☐ за 30-40 минут до приема пищи

Блок: Блок 44 | № 4313

4313. РЕФЛЕКС ГАЛАНТА У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА УГАСАЕТ К ____ МЕСЯЦАМ ЖИЗНИ

☐ 4

Блок: Блок 44 | № 4314

4314. МАССАЖ НОСА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОЭТАПНОГО МАССАЖА ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ ____ ЭТАПОМ

☐ 2

Блок: Блок 44 | № 4315

4315. В ХРОНИЧЕСКОЙ СТАДИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

☐ прыжков и подскоков

Блок: Блок 44 | № 4316

4316. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ КИШЕЧНИКА НАИБОЛЬШУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИМЕЕТ

☐ сегментарный массаж

Блок: Блок 44 | № 4317

4317. ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ В РАМКАХ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ уменьшение воспаления в бронхах

Блок: Блок 44 | № 4318

4318. ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПОКАЗАНЫ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОСТРЫХ БОЛЕЙ НА ____ ДЕНЬ

☐ на 2-5

Блок: Блок 44 | № 4319

4319. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НАГРУЗКИ, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ВЕЛОЭРГОМЕТРИИ БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, СОСТАВЛЯЕТ ____ ВТ/КГ МАССЫ ТЕЛА

☐ 0,5

Блок: Блок 44 | № 4320

4320. ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ МАССАЖА УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МИМИЧЕСКИХ МЫШЦ И ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ АРТИКУЛЯЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ

☐ неврите лицевого нерва

Блок: Блок 44 | № 4321

4321. ПРИ ГАСТРИТАХ С ПОВЫШЕННОЙ СЕКРЕЦИЕЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ МЫШЦ ЖИВОТА С НАГРУЗКОЙ

☐ умеренной

Блок: Блок 44 | № 4322

4322. К УПРАЖНЕНИЯМ НА РАВНОВЕСИЕ В ОБЛЕГЧЕННЫХ УСЛОВИЯХ ОТНОСЯТ УПРАЖНЕНИЯ

☐ на большой площади опоры или устойчивой площади опоры

Блок: Блок 44 | № 4323

4323. ОДНОЙ ИЗ СИСТЕМ ОЦЕНКИ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ПУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ Bethesda

Блок: Блок 44 | № 4324

4324. БОЛЕЗНЬ ГОШЕ И ПОРФИРИЯ

☐ являются редкими болезнями, мало знакомыми врачам-терапевтам

Блок: Блок 44 | № 4325

4325. О СОЧЕТАНИИ БЛОКАДЫ ПРАВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА И ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

☐ увеличение амплитуды зубца R в V6 (16 мм)

Блок: Блок 44 | № 4326

4326. МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН НОРМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА СООТВЕТСТВУЕТ ____ УДАРАМ В МИНУТУ

☐ 60-90

Блок: Блок 44 | № 4327

4327. ПРИ ТАХИКАРДИИ ЧАСТОТА РИТМА СЕРДЦА СОСТАВЛЯЕТ ____ УДАРОВ В МИНУТУ

☐ более 80

Блок: Блок 44 | № 4328

4328. РАЗГРУЗКЕ ПОЗВОНОЧНИКА СПОСОБСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЕ

☐ коленно-локтевое

Блок: Блок 44 | № 4329

4329. ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ АОРТИТА И АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ

☐ артериит Такаясу

Блок: Блок 44 | № 4330

4330. К ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ХАНТАВИРУСНОГО КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТ

☐ рибавирин

Блок: Блок 44 | № 4331

4331. СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОГО ЗАПОРА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ гипотиреоза

Блок: Блок 44 | № 4332

4332. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, СПОСОБНЫМ ВЫЗВАТЬ СИНДРОМ РЕЙЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ацетилсалициловая кислота

Блок: Блок 44 | № 4333

4333. ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ПРИМЕНЯТЬ

☐ дозированную ходьбу

Блок: Блок 44 | № 4334

4334. ПРИЗНАК ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ НОРМАЛЬНЫХ РАЗМЕРАХ И ОТСУТСТВИИ ВЕРХУШЕЧНОГО ТОЛЧКА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ констриктивного перикардита

Блок: Блок 44 | № 4335

4335. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РОЖЕЙ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧЕНИЕ ПЕРОРАЛЬНО

☐ азитромицина

Блок: Блок 44 | № 4336

4336. ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ФЛУКОНАЗОЛА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение трансаминаз

Блок: Блок 44 | № 4337

4337. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИЕРСИНИОЗОВ ИСПОЛЬЗУЮТ РЕАКЦИЮ

☐ коаггутинации

Блок: Блок 44 | № 4338

4338. ПРОЯВЛЕНИЕМ СИДЕРОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ вогнутость ногтей

Блок: Блок 44 | № 4339

4339. КУРЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ СПОСОБСТВУЕТ ФОРМИРОВАНИЮ У ПЛОДА

☐ задержки внутриутробного развития

Блок: Блок 44 | № 4340

4340. БОЛЬНОЙ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ НА ФЛЮОРОГРАММЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К ДООБСЛЕДОВАНИЮ В ТЕЧЕНИЕ (В ДНЯХ)

☐ 10

Блок: Блок 44 | № 4341

4341. ПРЕПАРАТАМИ ВЫБОРА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ НЕДАВНО ИНФАРКТ МИОКАРДА, ЯВЛЯЮТСЯ

☐ β -адреноблокаторы

Блок: Блок 44 | № 4342

4342. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕТЛЕВЫХ ДИУРЕТИКОВ ПРИ ХСН ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие симптомов задержки жидкости в организме

Блок: Блок 44 | № 4343

4343. ТИПИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ГИПОТИРЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ сухость кожных покровов

Блок: Блок 44 | № 4344

4344. БОЛЬНОМУ 59 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕМУ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ III ФК, С НАЛИЧИЕМ НА ЭКГ НА ФОНЕ СИНУСОВОГО РИТМА ПОСТЕПЕННОГО УДЛИНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА PQ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫПАДЕНИЕМ КОМПЛЕКСА QRS, В КАЧЕСТВЕ АНТИАНГИНАЛЬНОГО СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ

☐ амлодипин

Блок: Блок 44 | № 4345

4345. ПРИ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ АД У ПАЦИЕНТОВ С НЕОСЛОЖНЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ

☐ головная боль и головокружение

Блок: Блок 44 | № 4346

4346. К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ БУБОННОЙ ФОРМЫ ЧУМЫ ОТНОСИТСЯ ЛИХОРАДКА И

☐ лимфопролиферативные изменения во всех группах лимфоузлов

Блок: Блок 44 | № 4347

4347. ЛАНРЕОТИД ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

☐ аналогов соматостатина

Блок: Блок 44 | № 4348

4348. К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТСЯ

☐ метилксантины

Блок: Блок 44 | № 4349

4349. В КАЧЕСТВЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕТЯЖЕЛОЙ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

☐ муколитики

Блок: Блок 44 | № 4350

4350. ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТИРЕОТОКСИКОЗА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение массы тела

Блок: Блок 44 | № 4351

4351. ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПРИ ИБС ЯВЛЯЕТСЯ ИХ СПОСОБНОСТЬ

☐ уменьшать потребность миокарда в кислороде

Блок: Блок 44 | № 4352

4352. ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА 40 ЛЕТ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧАТЬ С ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ

☐ почек

Блок: Блок 44 | № 4353

4353. ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ГРИЗЕОФУЛЬВИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ понижение активности трансаминаз

Блок: Блок 44 | № 4354

4354. МОКРОТА ПРИ ЛЕГОЧНОМ АМЕБИАЗЕ

☐ обильная, с примесью гноя и крови

Блок: Блок 44 | № 4355

4355. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ ингибиторы АПФ

Блок: Блок 44 | № 4356

4356. К ПРИЗНАКАМ ЛИМФАТИЧЕСКИХ ОТЕКОВ ОТНОСЯТ

☐ отсутствие ямки при надавливании

Блок: Блок 44 | № 4357

4357. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕПАРИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кровотечение

Блок: Блок 44 | № 4358

4358. НАИБОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДИФТЕРИЙНОГО ЭКЗОТОКСИНА ОБУСЛОВЛЕННЫ ПОРАЖЕНИЕМ

☐ миокарда

Блок: Блок 44 | № 4359

4359. К ОСНОВНОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НЕ ОТНОСЯТ

☐ а-блокаторы

Блок: Блок 44 | № 4360

4360. В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ СИСТЕМНОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА В СТАДИИ РАННЕЙ ДИССЕМНИРОВАННОЙ ИНФЕКЦИИ ТИПИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ

☐ синдрома Баннварта

Блок: Блок 44 | № 4361

4361. ПРИЗНАКОМ ТЯЖЕЛОГО ОБОСТРЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ появление участков «немного легкого»

Блок: Блок 44 | № 4362

4362. ПРИ ХОЛЕРЕ ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОИЗВОДЯТ ЗАБОР

☐ испражнений

Блок: Блок 44 | № 4363

4363. ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАПРАВЛЕНО НА

☐ облегчение страдания и улучшение качества жизни пациентов и их семей в терминальной стадии заболеваний

Блок: Блок 44 | № 4364

4364. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДИУРЕТИКОВ БОЛЬНОМУ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ отечный синдром

Блок: Блок 44 | № 4365

4365. НА ПЕРВОМ ГОДУ НАБЛЮДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫЕ АМБУЛАТОРНЫЕ ОСМОТРЫ ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ ИБС РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ 1 РАЗ В

☐ 4-6 месяцев

Блок: Блок 44 | № 4366

4366. СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПОДПЕЧЁНОЧНОЙ (МЕХАНИЧЕСКОЙ) ЖЕЛТУХИ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ультразвуковое исследование печени и желчевыводящих путей

Блок: Блок 44 | № 4367

4367. ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЙОДА В РЕГИОНЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ экскреция йода с мочой в группах риска

Блок: Блок 44 | № 4368

4368. ПРИ МЕНИНГОКОККОВОМ МЕНИНГИТЕ В ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ВЫЯВЛЯЕТСЯ

☐ высокий уровень лактата

Блок: Блок 44 | № 4369

4369. РЕАКЦИЯ НА ТУБЕРКУЛИН ПО ПРОБЕ МАНТУ С 2 ТЕ ППД-Л МОЖЕТ БЫТЬ

☐ положительной, отрицательной, сомнительной

Блок: Блок 44 | № 4370

4370. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С БАКТЕРИАЛЬНЫМ ПИЩЕВЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ И II -ОЙ СТЕПЕНЬЮ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ НАЗНАЧАЮТ

☐ регидрон

Блок: Блок 44 | № 4371

4371. В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ПРИ ОСТРОМ БРУЦЕЛЛЁЗЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ

☐ лейкопения

Блок: Блок 44 | № 4372

4372. РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ ОТНОСИТСЯ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ СУСТАВОВ ____ ПРИРОДЫ

☐ аутоиммунной

Блок: Блок 44 | № 4373

4373. К ПРИЧИНАМ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НЕ ОТНОСЯТ

☐ диспансеризацию

Блок: Блок 44 | № 4374

4374. В ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ БЛОКАТОР АНТИЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ

☐ монтелукаст

Блок: Блок 44 | № 4375

4375. ПОКАЗАНИЕМ К АМБУЛАТОРНОМУ ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ИБС ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стабильная стенокардия II ФК

Блок: Блок 44 | № 4376

4376. К НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНОМУ ПРИЗНАКУ ЭКГ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ОТНОСЯТ

☐ высокий зубец R в отведениях V5-6 (сумма амплитуд зубца SV1-2 и зубца RV5-6 > 35 мм)

Блок: Блок 44 | № 4377

4377. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИГОДНОСТИ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

☐ врачебная комиссия медицинской организации

Блок: Блок 44 | № 4378

4378. У ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ УСИЛЕНИЮ СИМПТОМОВ МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ПРИЁМ

☐ изосорбида моонитрата

Блок: Блок 44 | № 4379

4379. У БОЛЬНОГО 70 ЛЕТ, СТРАДАЮЩЕГО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ, НА ЭКГ НА ФОНЕ СИНУСОВОГО РИТМА С ЧСС 60 УД/МИН ВЫЯВЛЕНО ПОСТЕПЕННОЕ УДЛИНЕНИЕ ИНТЕРВАЛА PQ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВЫПАДЕНИЕМ КОМПЛЕКСА QRS, В СВЯЗИ С ЧЕМ В КАЧЕСТВЕ АНТИАНГИНАЛЬНОГО СРЕДСТВА ЕМУ МОЖЕТ БЫТЬ РЕКОМЕНДОВАН

☐ амлодипин

Блок: Блок 44 | № 4380

4380. ДИАГНОЗ «МАЛЯРИЯ» ПОДТВЕРЖДАЕТ

☐ микроскопическое исследование препаратов крови

Блок: Блок 44 | № 4381

4381. ПРИЧИНОЙ АОРТАЛЬНОГО СТЕНОЗА У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

☐ «возрастной» кальциноз

Блок: Блок 44 | № 4382

4382. КРИТЕРИЙ «65» ПРИ ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ПНЕВМОНИИ ПО ШКАЛЕ CRB-65 ОБОЗНАЧАЕТ

☐ возраст

Блок: Блок 44 | № 4383

4383. ПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ ДОКСОРУБИЦИНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ саркома мягких тканей

Блок: Блок 44 | № 4384

4384. ВЫЯВЛЕНИЕ У БОЛЬНОГО НА ПРИЕМЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ ПРИЗНАКОВ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ТРЕБУЕТ

☐ экстренной госпитализации с приема в сосудистый центр

Блок: Блок 44 | № 4385

4385. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА ДЛЯ ЛИЦ ИЗ КОНТАКТА С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА СОСТАВЛЯЕТ (В МЕСЯЦАХ)

☐ 6

Блок: Блок 44 | № 4386

4386. ВТОРИЧНАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

- ☐ неадекватном режиме терапии у ранее лечившихся больных

Блок: Блок 44 | № 4387

4387. ДИЕТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ДОЛЖНА БЫТЬ

- ☐ безбелковой и низкокалорийной

Блок: Блок 44 | № 4388

4388. ПРИ МЕЛКООЧАГОВОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НАЗНАЧАЕТСЯ ДВОЙНАЯ АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ ТЕРАПИЯ (АСПИРИН ПЛЮС КЛОПИДОГРЕЛЬ)

- ☐ на 12 месяцев всем больным, независимо от вида лечения в остром периоде

Блок: Блок 44 | № 4389

4389. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АГРАНУЛОЦИТОЗА СЛЕДУЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ

- ☐ асептические условия

Блок: Блок 44 | № 4390

4390. РЕАБИЛИТАЦИЮ БОЛЬНОГО ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛЬЮ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ

- ☐ с момента постановки диагноза

Блок: Блок 44 | № 4391

4391. ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ РАКА ЖЕЛУДКА ПРИ ГЛАДКОМ ТЕЧЕНИИ И ОТСУТСТВИИ ЖАЛОБ БОЛЬНОМУ НЕОБХОДИМО ЯВИТЬСЯ НА КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР ЧЕРЕЗ (В МЕСЯЦАХ)

- ☐ 3

Блок: Блок 44 | № 4392

4392. К МЕТОДАМ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ОПУХОЛЯМИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА НЕ ОТНОСИТСЯ

- ☐ плазмаферез

Блок: Блок 44 | № 4393

4393. К ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ В ОНКОЛОГИИ ОТНОСЯТ

- ☐ выживаемость, качество жизни

Блок: Блок 44 | № 4394

4394. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ РАННИХ ФОРМ РАКА ДОСТИГАЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

- ☐ 90-100

Блок: Блок 44 | № 4395

4395. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОПАРАТИРЕОЗА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- ☐ кальцитриол

Блок: Блок 44 | № 4396

4396. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ТИРЕОТОКСИКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ УРОВЕНЬ

☐ тиреотропного гормона

Блок: Блок 44 | № 4397

4397. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННОГО ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПИЩЕВОДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ одинофагия (боль при глотании)

Блок: Блок 44 | № 4398

4398. К ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ СТЕНОКАРДИИ ОТНОСЯТ

☐ блокаторы кальциевых каналов

Блок: Блок 44 | № 4399

4399. ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ ОПРАВДАНО ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ ЖЕЛЕЗА В СЛУЧАЕ РАЗВИТИЯ АНЕМИИ ПРИ

☐ хронической болезни почек С3-С5 стадии

Блок: Блок 44 | № 4400

4400. КРИТЕРИЕМ II СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК ЯВЛЯЕТСЯ СКФ (МЛ/МИН)

☐ 60-89

Блок 45

Блок: Блок 45 | № 4401

4401. ТЕРАПИЯ АНЕМИИ, ВОЗНИКШЕЙ НА ФОНЕ ХБП, ВКЛЮЧАЕТ НАЗНАЧЕНИЕ

☐ эритропоэз-стимулирующих средств

Блок: Блок 45 | № 4402

4402. К ВИДАМ НАРУШЕНИЙ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ ПРИ СИСТЕМНОМ НАЗНАЧЕНИИ КОРТИКОСТЕРОИДОВ ОТНОСЯТ

☐ гипергликемию

Блок: Блок 45 | № 4403

4403. СРЕДСТВОМ ПЕРВОГО ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ лидокаин

Блок: Блок 45 | № 4404

4404. ДИАГНОЗ «ОСТРЫЙ ЛЕЙКОЗ» МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДПОЛОЖЕН ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БОЛЕЕ ____ % БЛАСТНЫХ КЛЕТОК В КОСТНОМ МОЗГЕ ИЛИ МАЗКАХ КРОВИ

☐ 20

Блок: Блок 45 | № 4405

4405. ТРЕХРОСТКОВАЯ ЦИТОПЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ апластической анемии

Блок: Блок 45 | № 4406

4406. ПРИ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ СИНДРОМ ГИПЕРСПЛЕНИЗМА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижением количества ретикулоцитов

Блок: Блок 45 | № 4407

4407. НАИБОЛЕЕ ПРОСТОЙ И БЕЗОПАСНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ВЫЯВЛЕНИЯ АМИЛОИДОЗА ЯВЛЯЕТСЯ БИОПСИЯ

☐ подкожной жировой клетчатки

Блок: Блок 45 | № 4408

4408. ТРАНСТОРАКАЛЬНАЯ ЭХОКАРДИОГРАФИЯ (ЭХОКГ) В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОППЛЕРОВСКИХ РЕЖИМОВ РЕКОМЕНДОВАНА

☐ всем пациентам с подозрением на ИБС

Блок: Блок 45 | № 4409

4409. ВИЗУАЛИЗИРУЮЩИМ СТРЕСС-МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПУТЕМ ОЦЕНКИ НАРУШЕНИЙ ЛОКАЛЬНОЙ СОКРАТИМОСТИ СТЕНКИ, НАРЯДУ СО СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стресс-магнитно-резонансная томография (МРТ)

Блок: Блок 45 | № 4410

4410. СИНДРОМОМ, ОТЛИЧАЮЩИМ ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ ОТ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ портальная гипертензия

Блок: Блок 45 | № 4411

4411. ДЛЯ ОСТРОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА ХАРАКТЕРНО

☐ повышение титров АТ к АГ стрептококка

Блок: Блок 45 | № 4412

4412. ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА МОРГАНЬИ-АДАМСА-СТОКСА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ брадиартимия

Блок: Блок 45 | № 4413

4413. ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ

☐ углеводдефицитного (десиализированного) трансферрина

Блок: Блок 45 | № 4414

4414. ПРИЧИНОЙ ПАРАДОКСАЛЬНОГО ПУЛЬСА У БОЛЬНЫХ С ПЕРИКАРДИТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение систолического АД более чем на 10 мм рт. ст. на вдохе

Блок: Блок 45 | № 4415

4415. ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие нефротического синдрома более 2 недель

Блок: Блок 45 | № 4416

4416. ПРИ ОСТРОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ПОЧЕК РЕКОМЕНДУЕТСЯ

☐ ограничение потребления хлорида натрия

Блок: Блок 45 | № 4417

4417. К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ ПРИ ОСТРОМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТЕ ОТНОСЯТ

☐ нефротический синдром

Блок: Блок 45 | № 4418

4418. ДЛЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ НАЗНАЧАЮТСЯ

☐ макролиды

Блок: Блок 45 | № 4419

4419. К ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ ОТНОСЯТ

☐ ототоксичность

Блок: Блок 45 | № 4420

4420. ПРИ РАЗВИТИИ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОПАСНО НАЗНАЧАТЬ

☐ гентамицин

Блок: Блок 45 | № 4421

4421. ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АСЦИТА ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ ЭФФЕКТЕ ВЕРОШПИРОНА БОЛЬНОМУ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ СЛЕДУЕТ ДОБАВИТЬ

☐ фуросемид

Блок: Блок 45 | № 4422

4422. К ПРЕПАРАТАМ ВЫБОРА ПРИ ФАРМАКОТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ОТНОСЯТ

☐ ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы

Блок: Блок 45 | № 4423

4423. ПОКАЗАНИЕМ К ВВЕДЕНИЮ БИКАРБОНАТА НАТРИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КЕТОАЦИДОТИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ЗНАЧЕНИЕ PH

☐ < 7,0

Блок: Блок 45 | № 4424

4424. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ двусторонний стеноз почечных артерий

Блок: Блок 45 | № 4425

4425. ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ НАИБОЛЕЕ МОЩНЫМ УГНЕТАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ НА ЖЕЛУДОЧНУЮ СЕКРЕЦИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ омепразол

4426. ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ НАЗНАЧАЮТ

☐ 40% раствор глюкозы внутривенно

4427. К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ, УЛУЧШАЮЩИМ ПРОГНОЗ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС, ОТНОСЯТ

☐ статины

4428. НАИБОЛЕЕ НЕФРОТОКСИЧНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ аминогликозиды

4429. К ИНГАЛИРУЕМЫМ КОРТИКОСТЕРОИДАМ ОТНОСЯТ

☐ будесонид

4430. К НЕСТЕРОИДНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСЯТ

☐ мелоксикам, напроксен

4431. БОЛЕЕ ТОЧНО ХАРАКТЕРИЗУЕТ СКОРОСТЬ ВЫВЕДЕНИЯ ЛС ИЗ ОРГАНИЗМА

☐ общий клиренс

4432. ПРЕПАРАТОМ, СЕЛЕКТИВНО ИНГИБИРУЮЩИМ ЦИКЛООКСИГЕНАЗУ 2, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ целекоксиб

4433. К САХАРОСНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ ГРУППЫ БИГУАНИДОВ ОТНОСИТСЯ

☐ метформин

4434. АНТИДОТОМ ДЛЯ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ атропин

4435. К H₂-ГИСТАМИНОБЛОКАТОРАМ ОТНОСИТСЯ

☐ фамотидин

4436. ПАЦИЕНТУ, ИМЕЮЩЕМУ В АНАМНЕЗЕ ЯЗВЕННУЮ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА, СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ ДЛЯ КУРСОВОГО ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

☐ мелоксикам

Блок: Блок 45 | № 4437

4437. ДИУРЕТИКОМ, ПОКАЗАННЫМ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ОТЕКА ЛЁГКИХ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фуросемид

Блок: Блок 45 | № 4438

4438. ОГРАНИЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТАМИЗОЛА НАТРИЯ СВЯЗАНО С

☐ опасностью развития агранулоцитоза

Блок: Блок 45 | № 4439

4439. ОСНОВНЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ЭФФЕКТАМИ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЮТСЯ: ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ

☐ обезболивающий и жаропонижающий

Блок: Блок 45 | № 4440

4440. ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ И ПАРАЦЕТАМОЛА УВЕЛИЧИВАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ

☐ гепатотоксичности

Блок: Блок 45 | № 4441

4441. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНОЙ ТАХИКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ верапамил

Блок: Блок 45 | № 4442

4442. БОЛЬНОМУ С НЕОСЛОЖНЁННЫМ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗОМ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ ПРОТИВОПОКАЗАН

☐ пропранолол

Блок: Блок 45 | № 4443

4443. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПРОФИЛАКТИКИ КАРДИОГЕННОГО ШОКА ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ морфина гидрохлорид

Блок: Блок 45 | № 4444

4444. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ИСПОЛЬЗУЮТ

☐ бета2-агонисты короткого действия

Блок: Блок 45 | № 4445

4445. ОСНОВНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ метотрексат

Блок: Блок 45 | № 4446

4446. ДЛЯ ТЕРАПИИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ

☐ диазепам

4447. ПЕНИЦИЛЛИНЫ ЧАЩЕ ВСЕГО МОГУТ ВЫЗЫВАТЬ

- ☐ аллергические реакции

4448. ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО ВВЕДЕНИЯ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫЗЫВАЮЩИМИ АНАФИЛАКТИЧЕСКИЙ ШОК, ЯВЛЯЮТСЯ

- ☐ бета-лактамы антибиотики

4449. ПАЦИЕНТАМ С ОБОСТРЕНИЕМ ХОБЛ НАЗНАЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОКАЗАНО В СЛУЧАЕ

- ☐ увеличения объёма и степени гнойности мокроты

4450. К ПРЕПАРАТАМ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ОТНОСЯТ

- ☐ ингаляционные глюкокортикоиды

4451. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- ☐ ингаляционные глюкокортикостероиды и бета-2-агонисты

4452. ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ГИПОФУНКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- ☐ левотироксин

4453. БРОНХОСПАЗМ МОЖЕТ СПРОВОЦИРОВАТЬ

- ☐ пропранолол

4454. ПРЕПАРАТ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ФИКСИРОВАННУЮ КОМБИНАЦИЮ БЕТА-2-АГОНИСТА И М-ХОЛИНОБЛОКАТОРА, СОДЕРЖИТ

- ☐ фенотерол + ипратропия бромид

4455. К ОСНОВНОЙ ГРУППЕ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЁГКИХ ОТНОСЯТ

- ☐ ингаляционные пролонгированные М-холиноблокаторы

4456. ЧАСТОТА ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 1 ТИПА СОСТАВЛЯЕТ

- ☐ 1 раз в 3 месяца

Блок: Блок 45 | № 4457

4457. БЕТА-2-АГОНИСТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ салметерол

Блок: Блок 45 | № 4458

4458. ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЭНДОКРИННОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ

☐ инсулин

Блок: Блок 45 | № 4459

4459. АМОКСИЦИЛЛИН ПО СРАВНЕНИЮ С АМПИЦИЛЛИНОМ

☐ имеет более высокую биодоступность при приёме внутрь

Блок: Блок 45 | № 4460

4460. К БЕТА-2-АГОНИСТАМ КОРОТКОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

☐ сальбутамол

Блок: Блок 45 | № 4461

4461. ВОЗМОЖНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПРИ ПЕРЕДОЗИРОВКЕ БЕТА-2-АГОНИСТОВ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ тахикардия, нарушения ритма

Блок: Блок 45 | № 4462

4462. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ двухсторонний стеноз почечных артерий

Блок: Блок 45 | № 4463

4463. ОСЛАБЛЕНИЕ ЭФФЕКТА ПРИ ПОВТОРНЫХ ВВЕДЕНИЯХ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ привыкания

Блок: Блок 45 | № 4464

4464. МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ

☐ тормозить переход ангиотензина I в ангиотензин II

Блок: Блок 45 | № 4465

4465. ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ сухой кашель

Блок: Блок 45 | № 4466

4466. РИСК ТОКСИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ПРИ КОМБИНАЦИИ ГЕНТАМИЦИНА С ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

☐ фуросемид

Блок: Блок 45 | № 4467

4467. К НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ СРЕДИ ОСЛОЖНЕНИЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ ГМГ-КОА РЕДУКТАЗЫ ОТНОСЯТ

☐ рабдомиолиз

Блок: Блок 45 | № 4468

4468. ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ОГРАНИЧИВАЮТ УПРАЖНЕНИЯ

☐ для крупных мышечных групп

Блок: Блок 45 | № 4469

4469. ЦЕЛЮЮ НАПРАВЛЕНИЯ ПАЦИЕНТА НА СТАЦИОНАРНЫЙ ЭТАП РАННЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ восстановление трудоспособности или снижение степени ограничения трудоспособности

Блок: Блок 45 | № 4470

4470. НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ПРИМЕНЯЮТ

☐ дозированную тренировочную ходьбу

Блок: Блок 45 | № 4471

4471. ПОД МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ ПОНИМАЮТ

☐ комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций

Блок: Блок 45 | № 4472

4472. ПРИ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ, СВОБОДНОМ РЕЖИМЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ УПРАЖНЕНИЯ

☐ динамические дыхательные

Блок: Блок 45 | № 4473

4473. ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ

☐ увеличивается

Блок: Блок 45 | № 4474

4474. ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДАМ СОСТАВЛЯЮТ

☐ эксперты медико-реабилитационной экспертной комиссии

Блок: Блок 45 | № 4475

4475. УВЕЛИЧЕНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА 60 И БОЛЕЕ % ОТ ИСХОДНЫХ ВЕЛИЧИН ГОВОРIT О _____ РЕАКЦИИ ПРИ ПРОБЕ С ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ

☐ гипертонической

Блок: Блок 45 | № 4476

4476. ЖИЗНЕННАЯ ЕМКОСТЬ ЛЁГКИХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПРИ ПОМОЩИ

☐ спирометра

Блок: Блок 45 | № 4477

4477. ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЕСА ПРИ ОЖИРЕНИИ К ОСНОВНЫМ НАЗНАЧЕНИЯМ ОТНОСЯТ

☐ физическую активность и рациональную диету

Блок: Блок 45 | № 4478

4478. КРИТЕРИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ МАССАЖА ПРИ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нормализация температуры

Блок: Блок 45 | № 4479

4479. К ПРОТИВПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ОТНОСЯТ

☐ приступ удушья

Блок: Блок 45 | № 4480

4480. ВАЖНЕЙШИМ ФУНКЦИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ жизненная емкость легких

Блок: Блок 45 | № 4481

4481. ВЫПОЛНЕНИЕ ДВИЖЕНИЙ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ ИСПОЛЬЗУЮТ В УПРАЖНЕНИЯХ

☐ на координацию

Блок: Блок 45 | № 4482

4482. УМЕНЬШЕНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА 10 ММ.РТ.СТ. И БОЛЕЕ ОТ ИСХОДНОГО, А ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА 10 ММ.РТ.СТ. И БОЛЕЕ ГОВОРIT О _____ РЕАКЦИИ

☐ гипотонической

Блок: Блок 45 | № 4483

4483. К ДЫХАТЕЛЬНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ ОТНОСЯТ _____ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ

☐ динамические

Блок: Блок 45 | № 4484

4484. ПАССИВНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ УПРАЖНЕНИЯ

☐ выполняемые с помощью инструктора

Блок: Блок 45 | № 4485

4485. УПРАЖНЕНИЯ НА РАССЛАБЛЕНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ релаксационными

Блок: Блок 45 | № 4486

4486. ХРОНИЧЕСКИЙ БОЛЕВОЙ СИНДРОМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ МЕТАСТАЗАХ В

☐ кости

Блок: Блок 45 | № 4487

4487. НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО РАЗВИТИЕ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ НАЛИЧИИ

☐ ворсинчатого полипа

Блок: Блок 45 | № 4488

4488. ОСНОВНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ РАКА КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инсоляция

Блок: Блок 45 | № 4489

4489. НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ МАЛИГНИЗАЦИИ _____ ПОЛИПЫ ЖЕЛУДКА

☐ аденоматозные

Блок: Блок 45 | № 4490

4490. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РАК КОЖИ ВОЗНИКАЕТ В ВОЗРАСТЕ (В ГОДАХ)

☐ старше 65

Блок: Блок 45 | № 4491

4491. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ФОРМОЙ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ РАК

☐ узловой

Блок: Блок 45 | № 4492

4492. ОДНИМ ИЗ КОМПОНЕНТОВ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ воспаление бронхов

Блок: Блок 45 | № 4493

4493. ПЕРВОЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ПРИЧИН ЛЕГОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ

☐ туберкулезу легких

Блок: Блок 45 | № 4494

4494. ДЛЯ АУТОИММУННОГО ГАСТРИТА ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ других аутоиммунных заболеваний

Блок: Блок 45 | № 4495

4495. ПРИ ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА ИЗБЫТОЧНОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО РОСТА В ОТСУТСТВИЕ ПРИЗНАКОВ ТРАНСЛОКАЦИИ КИШЕЧНЫХ БАКТЕРИЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ рифаксимин

Блок: Блок 45 | № 4496

4496. К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ МИОТРОПНОГО (ВАЗОДИЛАТИРУЮЩЕГО) ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТ

☐ дигидропиридины

Блок: Блок 45 | № 4497

4497. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ В КЛИНИКЕ СТОЙКОГО ЗУДА КОЖИ И ЖЕЛТУХИ СЛЕДУЕТ ПРЕДПОЛОЖИТЬ РАК

☐ головки поджелудочной железы

Блок: Блок 45 | № 4498

4498. К КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ПЕЧЕНОЧНО-КЛЕТОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОТНОСЯТ

☐ геморрагический синдром

Блок: Блок 45 | № 4499

4499. ПРОФИЛАКТИКУ ОСТЕОПОРОЗА СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПРИЁМА ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ БОЛЕЕ

☐ 3 месяцев

Блок: Блок 45 | № 4500

4500. ПРИ ПЕРВИЧНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ДИАГНОЗА «ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ» НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ

☐ иммунодиагностику туберкулеза

Блок 46

Блок: Блок 46 | № 4501

4501. АНТАГОНИСТЫ АЛЬДОСТЕРОНА РЕКОМЕНДУЮТСЯ ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ С ХСН

☐ II-IV ФК и ФВ ЛЖ $\geq 40\%$

Блок: Блок 46 | № 4502

4502. ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ травматизм

Блок: Блок 46 | № 4503

4503. СУБЭНДОКАРДИАЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ НА ЭКГ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

☐ выраженной горизонтальной депрессией сегмента ST

Блок: Блок 46 | № 4504

4504. ПРИ ГЕМОФИЛИИ ТИПА В НАБЛЮДАЕТСЯ НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДЕФИЦИТ ____ ФАКТОРА СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

☐ IX

Блок: Блок 46 | № 4505

4505. ПРИЧИНОЙ АНЕМИИ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ хроническое воспаление

Блок: Блок 46 | № 4506

4506. ДЛЯ ДИАРЕИ ТОЛСТОКИШЕЧНОГО ТИПА ХАРАКТЕРНО

☐ наличие слизи крови в испражнениях

Блок: Блок 46 | № 4507

4507. ВОЗМОЖНОЙ ПРИЧИНОЙ АНЕМИИ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ хроническое воспаление

Блок: Блок 46 | № 4508

4508. ПРИ ОСТРЫХ ФОРМАХ ИНФЕКЦИОННОГО МИОКАРДИТА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВОЗРАСТАЕТ УРОВЕНЬ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА

☐ IgM

Блок: Блок 46 | № 4509

4509. РАК ЛЁГКОГО ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ У БОЛЬНЫХ С

☐ хроническим неспецифическим заболеванием лёгких

Блок: Блок 46 | № 4510

4510. В12-ДЕФИЦИТНУЮ АНЕМИЮ ХАРАКТЕРИЗУЕТ

☐ мегалобластический эритропоэз

Блок: Блок 46 | № 4511

4511. 74-ЛЕТНЕМУ ПАЦИЕНТУ С ОСТЕОАРТРИТОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА, С СОПУТСТВУЮЩИМ ДИАГНОЗОМ «ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ» И ПОЛУЧАЮЩЕМУ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ПЕРОРАЛЬНО АНТИКОАГУЛЯНТЫ, В КАЧЕСТВЕ ТЕРАПИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРОТИВОПОКАЗАНЫ

☐ нестероидные противовоспалительные препараты

Блок: Блок 46 | № 4512

4512. ОСТЕОЛИЗ НОГТЕВЫХ ФАЛАНГ КИСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМОМ

☐ склеродермии

Блок: Блок 46 | № 4513

4513. СТЕНОКАРДИЯ НАПРЯЖЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ СИМПТОМОМ

☐ аортального стеноза

Блок: Блок 46 | № 4514

4514. У БОЛЬНОГО С ЖАЛОБАМИ НА БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ, БОЛИ В ДИСТАЛЬНЫХ МЕЖФАЛАНГОВЫХ СУСТАВАХ КИСТЕЙ, С МНОЖЕСТВЕННЫМИ РОЗОВЫМИ БЛЯШКАМИ НА КОЖЕ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

☐ псориатический артрит

Блок: Блок 46 | № 4515

4515. ПРИ ПРИСТУПЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НАД ЛЕГКИМИ СЛЫШИТСЯ ПЕРКУТОРНЫЙ ЗВУК

☐ с коробочным оттенком

Блок: Блок 46 | № 4516

4516. МОНОАРТРИТ, КАК ПРАВИЛО, ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ подагре

Блок: Блок 46 | № 4517

4517. ПРИ БОЛЕЗНИ ВЕРЛЬГОФА НАБЛЮДАЕТСЯ ____ СРОКА ЖИЗНИ

☐ уменьшение; тромбоцитов

Блок: Блок 46 | № 4518

4518. КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕЙКОЗОВ НА ОСТРЫЕ И ХРОНИЧЕСКИЕ ОСНОВАНА НА

☐ степени зрелости клеточного субстрата заболевания

Блок: Блок 46 | № 4519

4519. ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ СМЕЩЕНИЕ СЕГМЕНТА ST НА ФИЗИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ ишемической болезни сердца

Блок: Блок 46 | № 4520

4520. ПОРАЖЕНИЕ КОЖИ В ВИДЕ ПЛОТНОГО ОТЕКА ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ системной склеродермии

Блок: Блок 46 | № 4521

4521. ИЗОФЕРМЕНТ ЦИТОХРОМА P-450, МЕТАБОЛИЗИРУЮЩИЙ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЛС, НАЗЫВАЕТСЯ

☐ СУР 3A4

Блок: Блок 46 | № 4522

4522. ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОГО ЛИМФОЛЕЙКОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ

☐ увеличение абсолютного и относительного содержания лимфоцитов

Блок: Блок 46 | № 4523

4523. УСИЛЕНИЕ ЗВУЧНОСТИ 2 ТОНА НА ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ легочной гипертензии

Блок: Блок 46 | № 4524

4524. У БОЛЬНОЙ 16 ЛЕТ, С ЖАЛОБАМИ НА СЛАБОСТЬ, МИГРИРУЮЩИЕ БОЛИ В МЕЛКИХ СУСТАВАХ КИСТЕЙ, ИЗБЫТОЧНОЕ ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС, ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ДО 37,5°C ЭРИТЕМАТОЗНЫМИ ВЫСЫПАНИЯМИ НА КОЖЕ ЛИЦА ПО ТИПУ «БАБОЧКИ» И ИЗЪЯЗВЛЕНИЯМИ НА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ РТА, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ

☐ системная красная волчанка

Блок: Блок 46 | № 4525

4525. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ влажность кожных покровов

Блок: Блок 46 | № 4526

4526. ТОТАЛЬНАЯ МЕЛКООЧАГОВАЯ РАВНОМЕРНАЯ ДИССЕМИНАЦИЯ В ЛЕГКИХ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ милиарного туберкулеза легких

Блок: Блок 46 | № 4527

4527. ФАКТОРОМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аллергический ринит

Блок: Блок 46 | № 4528

4528. ПРИ СИНДРОМЕ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА ОТМЕЧАЕТСЯ

☐ абдоминальная боль с изменением частоты и формы стула

Блок: Блок 46 | № 4529

4529. ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ высокий цветовой показатель

Блок: Блок 46 | № 4530

4530. ВИДОМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО СКРИНИНГА, ДЛЯ КОТОРОГО ДОСТАТОЧНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ обязательный скрининг новорожденных на наследственные болезни обмена веществ

Блок: Блок 46 | № 4531

4531. АНТИГИСТАМИННЫЕ СРЕДСТВА ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

☐ седативным эффектом

Блок: Блок 46 | № 4532

4532. В КАЧЕСТВЕ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ СУСТАВА ПО ПОВОДУ ОСТЕОАРТРИТА РЕКОМЕНДОВАНО

☐ назначение не прямых оральных антикоагулянтов

Блок: Блок 46 | № 4533

4533. ПРОЯВЛЕНИЕМ СИДЕРОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ койлонихия

Блок: Блок 46 | № 4534

4534. ДЛЯ II СТАДИИ (ДЕКОМПЕНСАЦИИ) АСТМАТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ развитие «немного легкого»

Блок: Блок 46 | № 4535

4535. ПАЦИЕНТУ 69 ЛЕТ С МНОГОЛЕТНИМ АНАМНЕЗОМ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ТЕРАПИИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ОСТЕОАРТРИТЕ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ НАЗНАЧЕНИЯ

☐ эторикоксиба

Блок: Блок 46 | № 4536

4536. ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ВЫСОКОЙ БОКОВОЙ ОБЛАСТИ ХАРАКТЕРНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТВЕДЕНИЯХ

☐ I, aVL

Блок: Блок 46 | № 4537

4537. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПРИ БОЛИ В СПИНЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ магнитно-резонансная томография

Блок: Блок 46 | № 4538

4538. БИВАЛИРУДИН ЯВЛЯЕТСЯ

☐ прямым ингибитором тромбина

Блок: Блок 46 | № 4539

4539. БОЛЬНОМУ С ПЕРНИЦИОЗНОЙ АНЕМИЕЙ НЕОБХОДИМО НАЗНАЧАТЬ

☐ витамин В12

Блок: Блок 46 | № 4540

4540. ГЛИКОПРОТЕИН Р ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ

☐ выведения лекарственных средств из энтероцитов в просвет кишечника

Блок: Блок 46 | № 4541

4541. ОСНОВНЫМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ОСТЕОПОРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ двухэнергетическая рентгеновская денситометрия (DXA)

Блок: Блок 46 | № 4542

4542. КРЕПИТАЦИЯ ОБРАЗУЕТСЯ В

☐ альвеолах

Блок: Блок 46 | № 4543

4543. КОНТРОЛЬНЫМ ТЕСТОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ВАРФАРИНОМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ международное нормализованное отношение (МНО)

Блок: Блок 46 | № 4544

4544. ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ физическое развитие

Блок: Блок 46 | № 4545

4545. К ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ СИНУСОВОЙ БРАДИКАРДИИ ОТНОСЯТ

☐ сохранение правильного синусового ритма с частотой менее 50 в минуту

Блок: Блок 46 | № 4546

4546. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ СИМПТОМОМ МИТРАЛЬНОГО СТЕНОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ одышка

Блок: Блок 46 | № 4547

4547. БЫСТРЫЙ ПОДЪЕМ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ С ПОСЛЕДУЮЩИМ БЫСТРЫМ ЕЕ СПАДОМ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ аортальной недостаточности

Блок: Блок 46 | № 4548

4548. ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ И ВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ ПАТОЛОГИЮ КИШЕЧНИКА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В КАЛЕ

☐ эритроцитов и лейкоцитов

Блок: Блок 46 | № 4549

4549. К НЕОБРАТИМЫМ КОМПОНЕНТАМ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ОТНОСЯТ

☐ облитерацию просвета бронхов

Блок: Блок 46 | № 4550

4550. ПРИ ПЕРВИЧНОМ БИЛИАРНОМ ЦИРРОЗЕ ПЕЧЕНИ НАИБОЛЕЕ РАНО ПОЯВЛЯЕТСЯ

☐ кожный зуд

Блок: Блок 46 | № 4551

4551. ПРЯМАЯ РЕАКЦИЯ КУМБСА ПОЗИТИВНА ПРИ

☐ аутоиммунном гемолизе

Блок: Блок 46 | № 4552

4552. К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КРИТЕРИЯМ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ НЕ ОТНОСИТСЯ

☐ неполная блокада правой ножки Гиса

Блок: Блок 46 | № 4553

4553. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ РАВНОВЕСНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАБОР КРОВИ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ

☐ перед приёмом очередной дозы препарата

Блок: Блок 46 | № 4554

4554. ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ С ДЕТСТВА СИСТОЛО-ДИАСТОЛИЧЕСКИЙ ШУМ ПОД ЛЕВОЙ КЛЮЧИЦЕЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ открытого артериального протока

Блок: Блок 46 | № 4555

4555. НАИБОЛЕЕ АТЕРОГЕННЫМИ ЛИПОПРОТЕИДАМИ СЧИТАЮТСЯ

☐ липопротеиды низкой плотности

Блок: Блок 46 | № 4556

4556. АБСОЛЮТНЫМ ПОКАЗАНИЕМ К БРОНХОСКОПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ кашель, продолжающийся свыше 4-6 недель

Блок: Блок 46 | № 4557

4557. НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО ГЕМОГЛОБИНА В ПЛАЗМЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ внутрисосудистого типа гемолиза

Блок: Блок 46 | № 4558

4558. ДЛЯ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ развитие тромбоцитопении

Блок: Блок 46 | № 4559

4559. УРОВЕНЬ ГЛЮКОЗЫ В КРОВИ РАВЕН (В ММОЛЬ/Л)

☐ 3,3-5,5

Блок: Блок 46 | № 4560

4560. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ, КОТОРОЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТ РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ анемия

Блок: Блок 46 | № 4561

4561. К СИМПТОМУ ПЕРФОРАЦИИ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА ИЛИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ОТНОСЯТ

☐ «кинжальную» боль в подложечной области

Блок: Блок 46 | № 4562

4562. К ИСТОЧНИКАМ ЗАРАЖЕНИЯ ПРИ БРУЦЕЛЛЕЗЕ ОТНОСЯТ

☐ домашний рогатый скот

Блок: Блок 46 | № 4563

4563. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ДРЕНИРОВАНИЕ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ПОКАЗАНО ПРИ

☐ эмпиеме плевры

Блок: Блок 46 | № 4564

4564. ПРИ ПОДАГРЕ НЕ СЛЕДУЕТ В КАЧЕСТВЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО СРЕДСТВА ПРИМЕНЯТЬ

☐ гидрохлоротиазид

Блок: Блок 46 | № 4565

4565. БОЛЬНОМУ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПЕРАЛЬДОСТЕРОНИЗМОМ ДЛЯ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ

☐ спиронолактон

Блок: Блок 46 | № 4566

4566. ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХЕ В ЛАБОРАТОРНЫХ АНАЛИЗАХ РЕГИСТРИРУЕТСЯ

☐ увеличение в крови неконъюгированного билирубина

Блок: Блок 46 | № 4567

4567. ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ СИМПТОМ

☐ утренней скованности

Блок: Блок 46 | № 4568

4568. ПАРАПРОТЕИНЕМИЧЕСКИЕ ГЕМОБЛАСТОЗЫ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

☐ секрецией моноклональных иммуноглобулинов

Блок: Блок 46 | № 4569

4569. ЛЕЧЕНИЕ АУТОИММУННОЙ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ АНЕМИИ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С НАЗНАЧЕНИЯ

☐ глюкокортикостероидов

Блок: Блок 46 | № 4570

4570. НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ГЛАЗ ПРИ СЕРОНЕГАТИВНЫХ СПОНДИЛОАРТРИТАХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ увеит

Блок: Блок 46 | № 4571

4571. МЕТОДОМ ОЦЕНКИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пикфлоуметрия

Блок: Блок 46 | № 4572

4572. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ У ПАЦИЕНТА КИСТЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ГЕАНГИОБЛАСТОМЫ ЦНС, АНГИОМ СЕТЧАТКИ, КАРЦИНОМЫ ПОЧКИ И НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ ОПУХОЛИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ СЛЕДУЕТ ПОДОЗРЕВАТЬ

☐ Болезнь Гиппеля — Линдау

Блок: Блок 46 | № 4573

4573. ПОКАЗАНИЕМ К СРОЧНОМУ ПЕРЕЛИВАНИЮ ЭРИТРОЦИТАРНОЙ МАССЫ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ СЧИТАЮТ

☐ угрозу анемической комы

Блок: Блок 46 | № 4574

4574. ТЕЛЬЦА ЖОЛЛИ И КОЛЬЦА КЕБОТА ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ ____ АНЕМИИ

☐ В12-дефицитной

Блок: Блок 46 | № 4575

4575. ПОЛНАЯ НЕРЕГУЛЯРНОСТЬ РИТМА ЖЕЛУДОЧКОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

☐ мерцания предсердий

Блок: Блок 46 | № 4576

4576. ПЕРИОРБИТАЛЬНЫЙ ОТЕК С ПУРПУРНО-ЛИЛОВОЙ ЭРИТЕМОЙ ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ дерматомиозита

Блок: Блок 46 | № 4577

4577. АНЕМИЮ СЛЕДУЕТ НАЗВАТЬ ГИПЕРХРОМНОЙ ПРИ ЦВЕТНОМ ПОКАЗАТЕЛЕ

☐ 1,2

Блок: Блок 46 | № 4578

4578. В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПОД ДИСФАГИЕЙ ПОНИМАЮТ

☐ дискомфорт продвижения пищи от ротовой полости до желудка

Блок: Блок 46 | № 4579

4579. ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ КРЕАТИНФОСФОКИНАЗЫ (КФК) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ дерматомиозита

Блок: Блок 46 | № 4580

4580. КОНЪЮГИРОВАННЫЙ БИЛИРУБИН ПОВЫШАЕТСЯ ВСЛЕДСТВИЕ

☐ нарушения экскреции билирубина печенью

Блок: Блок 46 | № 4581

4581. ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ЛЕГКИХ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ТИПИЧНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ жесткое дыхание, рассеянные сухие хрипы

Блок: Блок 46 | № 4582

4582. КРИТЕРИЯМИ ВОЗ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА «ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ» ЯВЛЯЕТСЯ КАШЕЛЬ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ НЕ МЕНЕЕ ____ МЕСЯЦЕВ В ГОДУ В ТЕЧЕНИЕ ____ ЛЕТ ПОДРЯД

☐ 3; 2

Блок: Блок 46 | № 4583

4583. У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ПРИ УСПЕШНОМ ЛЕЧЕНИИ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДЯТ

☐ пожизненно

Блок: Блок 46 | № 4584

4584. ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИЧЕСКИЙ КРИЗ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ТЯЖЕЛОГО ПЕРВИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ВНЕЗАПНЫМ РАЗВИТИЕМ

☐ гипотонии, рвоты, боли в животе

Блок: Блок 46 | № 4585

4585. У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В АНАМНЕЗЕ ЦЕЛЕВЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА ЛИПОПРОТЕИНОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ (В ММОЛЬ Л)

☐ 1,3

Блок: Блок 46 | № 4586

4586. Для терапии подострого тиреоидита используется

☐ Напроксен

Блок: Блок 46 | № 4587

4587. ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ НЕОБХОДИМО ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВРАЧА

☐ фтизиатра

Блок: Блок 46 | № 4588

4588. ОБЩЕМОЗГОВОЙ СИНДРОМ ПРИ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИИ ОБУСЛОВЛЕН ПОРАЖЕНИЕМ

☐ вещества головного мозга

Блок: Блок 46 | № 4589

4589. ДОСТОВЕРНО ПОДТВЕРЖДАЕТ ДИАГНОЗ «ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С» ОБНАРУЖЕНИЕ В КРОВИ

☐ HCVcore Ag

Блок: Блок 46 | № 4590

4590. ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДИТСЯ МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕ МЕНЕЕ ____ ПРОБ МОКРОТЫ

☐ двух

Блок: Блок 46 | № 4591

4591. МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК, ПРОВОДЯЩИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР, ДОЛЖЕН ОРГАНИЗОВАТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА В ТЕЧЕНИЕ ____ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

☐ двух

Блок: Блок 46 | № 4592

4592. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО БОЛЬНОГО АКТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ВРАЧ ДОЛЖЕН ОФОРМИТЬ

☐ извещение и отправить его в территориальный орган Госсанэпиднадзора

Блок: Блок 46 | № 4593

4593. У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ЧАЩЕ ОСЛОЖНЯЕТ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

☐ инфильтративный и фиброзно-кавернозный

Блок: Блок 46 | № 4594

4594. ПРИ КЛИНИЧЕСКИ ЗНАЧИМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОМ МАКУЛЯРНОМ ОТЕКЕ ТЕРАПИЕЙ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза

Блок: Блок 46 | № 4595

4595. К МЕНИНГЕАЛЬНЫМ СИМПТОМАМ ОТНОСЯТ

☐ гиперестезии

Блок: Блок 46 | № 4596

4596. ЦЕЛЮ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ГЕСТАЦИОННОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ЯВЛЯЕТСЯ УДЕРЖАНИЕ УРОВНЯ ГЛЮКОЗЫ НАТОЩАК МЕНЕЕ (В ММОЛЬ/Л)

☐ 5,1

Блок: Блок 46 | № 4597

4597. Характерными признаками гиперкалиемии на ЭКГ являются

☐ укорочение интервала Q-T, удлинение интервалов P-R и QRS

4598. ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО ОБСЛЕДОВАТЬ НА ВИЧ-ИНФЕКЦИЮ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ

☐ внелегочного туберкулеза

4599. Для лечения сахарного диабета 2 типа у пациентов с хронической сердечной недостаточностью наиболее рациональным выбором являются препараты из группы

☐ ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа

4600. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ВКЛЮЧАЕТ

☐ флюорографию органов грудной клетки, тест с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, анализ мокроты на кислотоустойчивые микобактерии методом микроскопии

Блок 47

4601. МАРКЕРОМ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБНАРУЖЕНИЕ

☐ антител к топоизомеразе I

4602. ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ КАРЦИНОМАТОЗА ЛЕГКИХ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ упорный сухой кашель и некупируемая одышка

4603. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОТОРАКСА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ рентгено-томографическое исследование

4604. ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ КАВЕРНА, ОГРАНИЧЕННАЯ ОТ ПРИЛЕЖАЩЕЙ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ТРЕХСЛОЙНОЙ СТЕНКОЙ, СОДЕРЖИТ СЛОЙ КАЗЕОЗНОГО НЕКРОЗА И

☐ слой специфических грануляций и фиброзной ткани

4605. У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 65 ЛЕТ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ЦЕЛЕВЫМ УРОВНЕМ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ (В ММ РТ. СТ)

☐ 135

4606. Родильнице, больной активной туберкулёзом, для перевода в туберкулезный стационар в течение суток после родов проводится :

☐ Рентген исследование органов дыхания

Блок: Блок 47 | № 4607

4607. НА ОБЗОРНОЙ РЕНТГЕНОГРАММЕ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ МЕТАСТАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЛЕГКИХ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ НАЛИЧИЕМ

☐ симптома «разменной монеты»

Блок: Блок 47 | № 4608

4608. ПРЕПАРАТЫ С ПРЯМЫМ ПРОТИВОВИРУСНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ балоксавир марбоксил и занамивир

Блок: Блок 47 | № 4609

4609. НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА, ТИПИЧНАЯ ДЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗА, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ мелкими очагами неинкапсулированной казеификации и нагноения, выраженной лейкоцитарной реакцией в очагах казеозного некроза, придающая сходство с пневмическими очагами, содержащими обилие микобактерий

Блок: Блок 47 | № 4610

4610. ПРИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОМ ПОВЫШЕНИИ УРОВНЯ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА НЕОБХОДИМО

☐ определить уровень свободного Т4

Блок: Блок 47 | № 4611

4611. ОСНОВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПНЕВМОТОРАКСА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аспирация воздуха из плевральной полости

Блок: Блок 47 | № 4612

4612. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ ТИПА В

☐ не зависят от дозы препарата

Блок: Блок 47 | № 4613

4613. ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕВОТИРОКСИНА НАТРИЯ УРОВЕНЬ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА ОПТИМАЛЬНО ИССЛЕДОВАТЬ ЧЕРЕЗ

☐ 6-8 недель

Блок: Блок 47 | № 4614

4614. ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛИ CLOSTRIDIUM DIFFICILE В РАЗВИТИИ АНТИБИОТИКО-АССОЦИИРОВАННОЙ ДИАРЕИ НЕОБХОДИМО

☐ определить токсины микроба в копрофильtrate

Блок: Блок 47 | № 4615

4615. ОПТИМАЛЬНЫМ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ преднизолон

Блок: Блок 47 | № 4616

4616. ПОВЫШЕНИЕ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА (ТТГ) И СНИЖЕНИЕ СВОБОДНОГО ТИРОКСИНА (Т4) ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ первичном манифестном гипотиреозе

Блок: Блок 47 | № 4617

4617. ПРИ ГРИППЕ ПАЦИЕНТАМ С СУХИМ НЕПРОДУКТИВНЫМ НАДРЫВНЫМ КАШЛЕМ ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ КАШЛЕВОГО РЕФЛЕКСА ВОЗМОЖНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ бутамирата

Блок: Блок 47 | № 4618

4618. ПРЕПАРАТЫ ЛЕВОТИРОКСИНА НАТРИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИНИМАТЬ

☐ утром натощак не менее чем за 30 минут до еды

Блок: Блок 47 | № 4619

4619. РАЗВИТИЕ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ ОТНОСЯТ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РЕАКЦИЯМ ТИПА

☐ С

Блок: Блок 47 | № 4620

4620. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ГИПОГЛИКЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ БЕЗ СОЗНАНИЯ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ

☐ внутривенно струйно 80 мл 40% раствора глюкозы

Блок: Блок 47 | № 4621

4621. ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКОМ ГИПОТИРЕОЗЕ ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЛЕВОТИРОКСИНОМ ПОКАЗАНА

☐ при беременности и планировании беременности

Блок: Блок 47 | № 4622

4622. СИМПТОМОКОМПЛЕКС ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ, КОТОРЫЙ В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ

☐ васкулит

Блок: Блок 47 | № 4623

4623. ИЗМЕНЕНИЯ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ В ВИДЕ ДВУСТОРОННЕГО РАСШИРЕНИЯ ТЕНИ СРЕДОСТЕНИЯ И КОРНЕЙ ЛЕГКИХ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ СИМПТОМОМ ПОЛИЦИКЛИЧНОСТИ ИХ КОНТУРА, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ саркоидоза медиастинальной формы

Блок: Блок 47 | № 4624

4624. ПРИ САРКОИДОЗЕ В ЦИТОГРАММЕ ЖИДКОСТИ БРОНХОАЛЬВЕОЛЯРНОГО ЛАВАЖА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ

☐ лимфоцитов

Блок: Блок 47 | № 4625

4625. К ХАРАКТЕРНЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ПРИЗНАКАМ ПОДОСТРОГО ТИРЕОИДИТА ОТНОСЯТ

☐ мигрирующие «облаковидные» зоны пониженной эхогенности в одной или обеих долях

Блок: Блок 47 | № 4626

4626. К ТИРЕОТОКСИКОЗУ, СОПРОВОЖДАЮЩЕМУСЯ СНИЖЕНИЕМ ЗАХВАТА РАДИОФАРМПРЕПАРАТА ПРИ СЦИНТИГРАФИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОТНОСИТСЯ

☐ амиодарон-индуцированный тиреотоксикоз 2 типа

Блок: Блок 47 | № 4627

4627. К ПОЗДНИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТ

☐ остеопороз

Блок: Блок 47 | № 4628

4628. МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ ДЛЯ ЛЕГОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЮТ АНЕВРИЗМАТИЧЕСКИ РАСШИРЕННЫЕ И ИСТОНЧЕННЫЕ ВЕТВИ

☐ легочной или бронхиальной артерии, а также легочные вены

Блок: Блок 47 | № 4629

4629. РАЗВИТИЕ ДИАРЕИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ АНТИБИОТИКОВ ЗА СЧЕТ ПОДАВЛЕНИЯ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ ОТНОСЯТ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РЕАКЦИЯМ ТИПА

☐ А

Блок: Блок 47 | № 4630

4630. ПОД ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКОЙ КРИВОЙ ПОНИМАЮТ

☐ зависимость концентрации препарата в крови от времени

Блок: Блок 47 | № 4631

4631. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННОГО ГРИППА БАЛОКСАВИР НАЗНАЧАЕТСЯ ПАЦИЕНТАМ С МАССОЙ ТЕЛА ДО 80 КГ В ДОЗИРОВКЕ

☐ 40 мг однократно

Блок: Блок 47 | № 4632

4632. САМОЙ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ туберкулезная каверна

Блок: Блок 47 | № 4633

4633. ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ ПРОФУЗНЫМ ПРИ ПОТЕРЕ КРОВИ В ОБЪЕМЕ МЛ И БОЛЕЕ

☐ 500

Блок: Блок 47 | № 4634

4634. С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ ОТХОЖДЕНИЯ МОКРОТЫ ПРИ ПРОДУКТИВНОМ КАШЛЕ У ПАЦИЕНТОВ, БОЛЬНЫХ ГРИППОМ, НАЗНАЧАЮТ

☐ гвайфенезин

Блок: Блок 47 | № 4635

4635. ПРИ ДИАГНОСТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА УРОВЕНЬ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА ЛОЖНО ЗАНИЖЕН В СЛУЧАЕ

☐ беременности

Блок: Блок 47 | № 4636

4636. НА ЭТИОЛОГИЮ ЛЕГОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ В АНАЛИЗАХ МОКРОТЫ МОГУТ УКАЗЫВАТЬ

☐ микобактерии туберкулеза

Блок: Блок 47 | № 4637

4637. ТРАНСПОРТИРОВАТЬ БОЛЬНОГО ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМО В

☐ сидячем или полусидячем положении

Блок: Блок 47 | № 4638

4638. ПРИ ДИАГНОСТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА УРОВЕНЬ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА ЛОЖНО ЗАВЫШЕН В СЛУЧАЕ

☐ гемолитическая анемия

Блок: Блок 47 | № 4639

4639. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗБУДИТЕЛЕМ АНТИБИОТИК-АССОЦИИРОВАННЫХ ДИАРЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ *Clostridium difficile*

Блок: Блок 47 | № 4640

4640. ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ПРИ МЕНИНГЕАЛЬНОМ СИНДРОМЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ

☐ рвотой «фонтаном», не приносящей облегчения

Блок: Блок 47 | № 4641

4641. К ТИРЕОТОКСИКОЗУ, СОПРОВОЖДАЮЩЕМУСЯ ПОВЫШЕНИЕМ ЗАХВАТА РАДИОФАРМПРЕПАРАТА ПРИ СЦИНТИГРАФИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ОТНОСИТСЯ

☐ болезнь Грейвса

Блок: Блок 47 | № 4642

4642. МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ВКЛЮЧАЕТ ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ

☐ гемостатических и гипотензивных

Блок: Блок 47 | № 4643

4643. У ДЕТЕЙ ДО ГОДА ПРИ МЕНИНГИТЕ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАТЕЛЕН СИМПТОМ

☐ подвешивания (Лесажа)

Блок: Блок 47 | № 4644

4644. ИДИОСИНКРАЗИЮ ОТНОСЯТ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РЕАКЦИЯМ ТИПА

☐ B

Блок: Блок 47 | № 4645

4645. У ПАЦИЕНТОВ 70 ЛЕТ И БОЛЕЕ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ИНФАРКТМ МИОКАРДА В АНАМНЕЗЕ ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЕЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

☐ 8,0

Блок: Блок 47 | № 4646

4646. У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА БЕЗ СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ ГЛИКИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА ДОЛЖЕН БЫТЬ МЕНЕЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

☐ 6,5

Блок: Блок 47 | № 4647

4647. АНАЛИЗ КРОВИ НА ТЕСТОСТЕРОН НЕОБХОДИМО СДАВАТЬ

☐ натошак утром между 7.00 и 11.00 часами

Блок: Блок 47 | № 4648

4648. НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЯ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И _____ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

☐ культуральные

Блок: Блок 47 | № 4649

4649. РАЗВИТИЕ АНАФИЛАКСИИ ПРИ ПРИЕМЕ ПЕНИЦИЛЛИНОВ ЗА СЧЕТ ИММУННЫХ МЕХАНИЗМОВ ОТНОСЯТ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РЕАКЦИЯМ ТИПА

☐ B

Блок: Блок 47 | № 4650

4650. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ левотироксин

Блок: Блок 47 | № 4651

4651. ПРИ ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НА 3 СТУПЕНИ В КАЧЕСТВЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИМЕНЯЮТ ИНГАЛЯЦИОННЫЕ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ В КОМБИНАЦИИ С

☐ длительнодействующими β_2 -агонистами

Блок: Блок 47 | № 4652

4652. АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОПРОВОЖДАЮТСЯ

☐ эозинофилией

Блок: Блок 47 | № 4653

4653. К ПРИЧИНАМ ИСТИННОЙ ГИНЕКОМАСТИИ У МУЖЧИН ОТНОСИТСЯ

☐ синдром Клайнфельтера

4654. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В СЛУЧАЕ ТЯЖЕЛОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА НЕОБХОДИМО НАЗНАЧИТЬ

☐ пробную противотуберкулезную тест-терапию с применением четырех противотуберкулезных препаратов

4655. В СЛУЧАЯХ ПРОВЕДЕНИЯ СЛОЖНЫХ УРОЛОГИЧЕСКИХ, ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ, ПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, МАНИПУЛЯЦИЙ, ПРОЦЕДУР, МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ

☐ по решению врачебной комиссии на дни проведения исследования (манипуляции, процедуры, медицинского вмешательства)

4656. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ОЧАГАХ ТУБЕРКУЛЕЗА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ РЕЖЕ

☐ 1 раза в год

4657. ДЛЯ ТЕРАПИИ АМИОДАРОН-ИНДУЦИРОВАННОГО ТИРЕОТОКСИКОЗА 2 ТИПА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

☐ преднизолон 40 мг

4658. ТРАДИЦИОННО В КАЧЕСТВЕ «ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА» ВЫЯВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРИМЕНЯЮТ

☐ молекулярно-генетические методы ПЦР в режиме реального времени

4659. АНКИЛОЗИРУЮЩИЙ СПОНДИЛИТ У МУЖЧИН ЧАЩЕ НАЧИНАЕТСЯ С

☐ крестцово-копчикового сочленения

4660. К САНИТАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ОТНОСЯТ ИЗОЛЯЦИЮ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫЕ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ ТУБЕРКУЛЕЗА, САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И

☐ ограничение допуска лиц, больных туберкулезом, к работе в некоторых профессиях

4661. ГЛЮКОЗА ВЕНОЗНОЙ КРОВИ НАТОЩАК 6.4 ММОЛЬ/Л И ЧЕРЕЗ 2 ЧАСА ПОСЛЕ ПЕРОРАЛЬНОГО ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНОГО ТЕСТА 7.6 ММОЛЬ/Л СООТВЕТСТВУЕТ

☐ нарушенной гликемии натощак

4662. К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ АНЕМИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТ

☐ снижение функции почек и развивающейся вследствие этого дефицит эритропоэтина

Блок: Блок 47 | № 4663

4663. ПРОЯВЛЕНИЕМ СИНДРОМА ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ

☐ себорейный дерматит

Блок: Блок 47 | № 4664

4664. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК СЗБ А2 НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕПАРАТЫ ИЗ ГРУППЫ

☐ ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа

Блок: Блок 47 | № 4665

4665. КРОВОХАРКАНЬЕМ СЧИТАЕТСЯ ВЫДЕЛЕНИЕ КРОВИ С КАШЛЕМ В ВИДЕ ПРОЖИЛОК В ОБЪЕМЕ ____ МЛ В СУТКИ

☐ не более 50

Блок: Блок 47 | № 4666

4666. БОЛЬНЫМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ТОЛЬКО С ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА В12 НАЗНАЧЕНИЕ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ

☐ нежелательно в связи с усугублением неврологической симптоматики

Блок: Блок 47 | № 4667

4667. ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБНАРУЖИВАЕТСЯ

☐ симметричный полиартрит

Блок: Блок 47 | № 4668

4668. ВОЗМОЖНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАМИВИРА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГРИППА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бронхоспазм

Блок: Блок 47 | № 4669

4669. В СТРУКТУРЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРЕОБЛАДАЕТ

☐ множественная лекарственная устойчивость

Блок: Блок 47 | № 4670

4670. В12-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ РАЗВИВАЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО

☐ в возрасте старше 60 лет

Блок: Блок 47 | № 4671

4671. К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ОТНОСЯТ

☐ синдром поликистозных яичников

Блок: Блок 47 | № 4672

4672. Диагноз железодефицитной анемии правомочен при концентрации ферритина ____ нг/мл

☐ < 10

4673. Наличие анемии у пациентов пожилого возраста

☐ усугубляет состояние больных и ассоциируется с повышением смертности независимо от степени выраженности

4674. К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ОТНОСЯТ

☐ хроническую кровопотерю из желудочно-кишечного тракта вследствие опухолевых и неопухолевых заболеваний

4675. ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ПРОФУЗНОМ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ асфиксия

4676. ИЗВЕЩЕНИЕ О БОЛЬНОМ, У КОТОРОГО ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ УСТАНОВЛЕН ДИАГНОЗ «ТУБЕРКУЛЕЗ», СОСТАВЛЯЕТСЯ

☐ в медицинской организации независимо от ведомственной подчиненности

4677. С ЦЕЛЬЮ СВОЕВРЕМЕННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ ЛИЦ, КОНТАКТИРОВАВШИХ С БОЛЬНЫМ, В ОЧАГЕ ПРОВОДИТСЯ ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ

☐ 14

4678. ПОКАЗАТЕЛЬ ____ НЕ ПОЗВОЛЯЕТ СУДИТЬ О СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

☐ наличия амилоидоза почек

4679. ПОД БИОЭКВИВАЛЕНТНОСТЬЮ ПОНИМАЮТ

☐ сравнительную фармакокинетику (биодоступность) оригинального и генерического препаратов

4680. К признаку развития тиреотоксического криза относится

☐ гипертермия

4681. У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ В12-ДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО СОЧЕТАЕТСЯ С

☐ железодефицитной анемией

4682. К ОСЛОЖНЕНИЯМ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ ОТНОСЯТ

☐ легочное кровотечение, спонтанный пневмоторакс, ателектаз, легочно-сердечную недостаточность

Блок: Блок 47 | № 4683

4683. ГИПОТИРЕОЗ, РАЗВИВШИЙСЯ ВСЛЕДСТВИЕ ПОРАЖЕНИЯ САМОЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ первичным

Блок: Блок 47 | № 4684

4684. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНТИРОВАНИЕМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ В АНАМНЕЗЕ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕПАРАТЫ ИЗ ГРУППЫ

☐ агонистов рецепторов ГПП-1

Блок: Блок 47 | № 4685

4685. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ ТИПА А

☐ зависят от дозы препарата

Блок: Блок 47 | № 4686

4686. НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ АНЕМИЙ НЕОБХОДИМО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА

☐ средний объем эритроцита

Блок: Блок 47 | № 4687

4687. ОСНОВНОЙ МЕНИНГЕАЛЬНЫЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС ВКЛЮЧАЕТ

☐ гиперестезии, головную боль

Блок: Блок 47 | № 4688

4688. ЗАБОЛЕВАНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ПОЯВЛЕНИЕМ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ «СВЕЖИХ» ОЧАГОВО-ИНФИЛЬТРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЛЕГКИХ СПУСТЯ 48 ЧАСОВ ПОСЛЕ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ, НАЗЫВАЮТ

☐ нозокомиальной пневмонией

Блок: Блок 47 | № 4689

4689. ЭТИОТРОПНЫМ ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОГО ВЫБОРА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА АНТИБИОТИК-АССОЦИИРОВАННУЮ ДИАРЕЮ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ метронидазол

Блок: Блок 47 | № 4690

4690. ТИПИЧНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РАМКАХ СИДЕРОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ангулярный стоматит

Блок: Блок 47 | № 4691

4691. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ МАКРОЦИТОЗА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение всасывания витамина В12

Блок: Блок 47 | № 4692

4692. ПЕРВИЧНАЯ ВРАЧЕБНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ВРАЧАМИ

☐ терапевтами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами)

Блок: Блок 47 | № 4693

4693. ПРИЧИНОЙ ОБРАТИМОГО АНДРОГЕНОДЕФИЦИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ вирусный орхит

Блок: Блок 47 | № 4694

4694. К НАИБОЛЕЕ РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ДЕФИЦИТА ТЕСТОСТЕРОНА ОТНОСЯТ

☐ снижение либидо

Блок: Блок 47 | № 4695

4695. К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ РАЗВИТИЯ В12-ДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОТНОСЯТ

☐ нарушение всасывания вследствие отсутствия внутреннего фактора Кастла и заболеваний тонкого кишечника

Блок: Блок 47 | № 4696

4696. ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ ЛИЦАМ ПРОВОДЯТ РЕНТГЕНОГРАФИЮ ЛЕГКИХ ПРИ ВЗЯТИИ НА УЧЕТ И ДАЛЕЕ

☐ 2 раза в год

Блок: Блок 47 | № 4697

4697. ОСНОВНЫМИ ФЕНОТИПИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ВЫЯВЛЕНИЯ МИКОБАКТЕРИЙ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ культуральные (посевы на плотных и жидких питательных средах)

Блок: Блок 47 | № 4698

4698. ПРИ БИОХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ДЛЯ СИНДРОМА ГИПОТИРЕОЗА ХАРАКТЕРНА

☐ гиперхолестеринемия

Блок: Блок 47 | № 4699

4699. КРИТЕРИЕМ СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ олигоменорея

Блок: Блок 47 | № 4700

4700. ТУБЕРКУЛЕЗ, РАЗВИВАЮЩИЙСЯ У ПАЦИЕНТОВ ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИММУНОСУПРЕССИИ (УРОВЕНЬ CD4+ ЛИМФОЦИТОВ МЕНЕЕ 200 КЛЕТОК/МКЛ), ЧАСТО НОСИТ

☐ генерализованный характер с одновременным поражением нескольких систем и органов

Блок 48

Блок: Блок 48 | № 4701

4701. РАЗВИТИЕ ПЕЧЕНОЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПАРАЦЕТАМОЛА В ВЫСОКИХ ДОЗАХ ОТНОСЯТ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РЕАКЦИЯМ ТИПА

☐ A

Блок: Блок 48 | № 4702

4702. СИНДРОМ ОТМЕНЫ НА КЛОНИДИН, ОПИАТЫ, БЕТА-БЛОКАТОРЫ ОТНОСЯТ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РЕАКЦИЯМ ТИПА

☐ C

Блок: Блок 48 | № 4703

4703. ИНДИВИДУАЛЬНУЮ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОТНОСЯТ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РЕАКЦИЯМ ТИПА

☐ B

Блок: Блок 48 | № 4704

4704. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДЯТСЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ

☐ флюорографии легких или рентгенографии органов грудной клетки (легких)

Блок: Блок 48 | № 4705

4705. К САХАРОСНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ С НИЗКИМ РИСКОМ ГИПОГЛИКЕМИИ ПРИ ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ОТНОСЯТСЯ

☐ ингибиторы дипептидилпептидазы 4 типа

Блок: Блок 48 | № 4706

4706. ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ОТБОРА КРОВИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСТАТОЧНОЙ РАВНОВЕСНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИГОКСИНА ЧЕРЕЗ ____ ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО ПРИЕМА ПРЕПАРАТА И ПОЗЖЕ

☐ 6 часов

Блок: Блок 48 | № 4707

4707. ДИАГНОЗ «АНЕМИЯ» У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА СТАВИТСЯ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА МЕНЕЕ

☐ 130 г/л у мужчин, менее 120 г/л у женщин

Блок: Блок 48 | № 4708

4708. У БОЛЬНЫХ С АОРТАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СИСТОЛИЧЕСКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ____, А ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ____

☐ повышается; снижается

Блок: Блок 48 | № 4709

4709. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТИПИЧНОЙ СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ (В МИНУТАХ)

☐ 2-5

Блок: Блок 48 | № 4710

4710. ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНОГО С РАСШИРЕНИЕМ СРЕДОСТЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

☐ компьютерную томографию органов грудной полости

Блок: Блок 48 | № 4711

4711. ГИПЕРЕРГИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТОМ НА ТУБЕРКУЛИН У ВЗРОСЛЫХ СЧИТАЕТСЯ ПАПУЛА РАЗМЕРОМ (В ММ)

☐ 21

Блок: Блок 48 | № 4712

4712. ОСНОВНЫМ ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиперреактивность бронхов

Блок: Блок 48 | № 4713

4713. ОБЪЕКТИВНЫМИ КРИТЕРИЯМИ ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ЧД > 30 в мин, ЧСС > 120 в мин, АД < 90/60 мм рт. ст., SaO₂ < 90%

Блок: Блок 48 | № 4714

4714. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ТУБЕРКУЛЕЗ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ВКЛЮЧАЕТ

☐ флюор-ю грудн. клетки, тест с аллергеном туб-ным рекомб., анализ мокроты на кислотоуст-ые микобакт

Блок: Блок 48 | № 4715

4715. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕОСЛОЖНЕННОГО ГРИППА БАЛОКСАВИР НАЗНАЧАЕТСЯ ПАЦИЕНТАМ С МАССОЙ ТЕЛА БОЛЕЕ 80 КГ В ДОЗИРОВКЕ

☐ 80 мг однократно

Блок: Блок 48 | № 4716

4716. ПОВЫШЕНИЕ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА (ТТГ) ПРИ НОРМАЛЬНОМ УРОВНЕ СВОБОДНОГО ТИРОКСИНА (Т4) ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ первичном субклиническом гипотиреозе

Блок: Блок 48 | № 4717

4717. ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГАЛЬНОМ РЕФЛЮКСЕ НЕОБХОДИМО

☐ снижение массы тела при ее избытке

Блок: Блок 48 | № 4718

4718. ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА НОРМАЛЬНЫМ СЧИТАЮТ ПОКАЗАТЕЛЬ ЛОДЫЖЕЧНО-ПЛЕЧЕВОГО ИНДЕКСА

☐ 1,1

Блок: Блок 48 | № 4719

4719. ИЗ ПОРАЖЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нарушение ритма и проводимости

Блок: Блок 48 | № 4720

4720. ФОРМОЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О БОЛЬНОМ С ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ УСТАНОВЛЕННОМ ДИАГНОЗОМ АКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЕТСЯ ФОРМА

☐ 089/у-туб

Блок: Блок 48 | № 4721

4721. ПРИ ТРАНСМУРАЛЬНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ МИОКАРДА ОТМЕЧАЮТ

☐ подъем сегмента ST над изолинией выпуклостью вверх

Блок: Блок 48 | № 4722

4722. ОБСЛЕДОВАНИЕМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ ВЕРИФИЦИРОВАТЬ ДИАГНОЗ ПРИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНОМ ЛЕГОЧНОМ ФИБРОЗЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ морфологическое обследование

Блок: Блок 48 | № 4723

4723. ВЕДУЩИМ МЕТОДОМ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ЛЕГОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бронхоскопия

Блок: Блок 48 | № 4724

4724. ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ инвалидность

Блок: Блок 48 | № 4725

4725. ВЕДУЩИМИ КЛИНИЧЕСКИМИ СИНДРОМАМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ ОБОЛОЧЕК ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЯВЛЯЮТСЯ ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ И

☐ менингеальный

Блок: Блок 48 | № 4726

4726. ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ БРАДИКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ хроническая ишемия миокарда

Блок: Блок 48 | № 4727

4727. ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ ХАРАКТЕРНО

☐ выявление M-градиента

Блок: Блок 48 | № 4728

4728. У ПАЦИЕНТА 60 ЛЕТ, КУРИЛЬЩИКА СО СТАЖЕМ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ, КОТОРЫЙ ЖАЛУЕТСЯ НА УПОРНЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ АРТРАЛГИИ В КОЛЕННЫХ, ГОЛЕНОСТОПНЫХ И ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВАХ, ПОХУДЕНИЕ ЗА 3 МЕСЯЦА НА 8 КГ, СНИЖЕНИЕ АППЕТИТА, СЛАБОСТЬ, ВЯЛОСТЬ, ПОНИЖЕННОЕ НАСТРОЕНИЕ, ПЛОХОЙ СОН, ПРИПУХЛОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ СУСТАВОВ, ДОЛЖНА БЫТЬ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

☐ обследование для выявления опухолевого процесса

4729. ПРИЗНАКОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ симметричный артрит проксимальных межфаланговых и пястно-фаланговых суставов кисти

4730. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СТАТИНОВ ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ (В МЕСЯЦАХ)

- ☐ 3-4

4731. МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ, НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ бодиплетизмография

4732. ПРИ ТРАНСМУРАЛЬНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ОТМЕЧАЮТ

- ☐ подъем сегмента ST над изолинией выпуклостью кверху

4733. ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ БРАДИКАРДИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ хроническая ишемия миокарда

4734. У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА РЕДКО ВСТРЕЧАЕТСЯ ____ АНЕМИЯ

- ☐ гемолитическая

4735. УЗЕЛКИ ГЕБЕРДЕНА ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЗНАКОМ

- ☐ остеоартрита

4736. ТОФУС ЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ

- ☐ подагры

4737. ПОЯВЛЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ КОМПЛЕКСОВ QS В V1-V3 НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ____ ЛОКАЛИЗАЦИИ

- ☐ передне-перегородочной

4738. «СТЕКЛОВИДНАЯ» МОКРОТА ХАРАКТЕРНА ДЛЯ

- ☐ бронхиальной астмы

Блок: Блок 48 | № 4739

4739. К НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПРИЧИНАМ СМЕРТИ ПРИ ПОДОСТРОМ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ ОТНОСЯТ

☐ сердечную недостаточность

Блок: Блок 48 | № 4740

4740. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ ИБС ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бронхиальная астма

Блок: Блок 48 | № 4741

4741. ПРИ СИНДРОМЕ КОННА ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕНО УВЕЛИЧЕННОЙ ВЫРАБОТКОЙ

☐ альдостерона

Блок: Блок 48 | № 4742

4742. ДЛЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНО-ЭРОЗИВНОЙ ФОРМЫ ОСТЕОАРТРИТА ХАРАКТЕРНО

☐ поражение дистальных и проксимальных межфаланговых суставов кистей

Блок: Блок 48 | № 4743

4743. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ПЕРВИЧНОГО ГИПОТИРЕОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ аутоиммунный тиреоидит

Блок: Блок 48 | № 4744

4744. ПРИ ОСТРОМ РАЗДРАЖЕНИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ БРОНХОВ НАБЛЮДАЮТ

☐ сильный сухой кашель

Блок: Блок 48 | № 4745

4745. У БОЛЬНОЙ С ЖАЛОБАМИ НА ПОХОЛОДАНИЕ И ОНЕМЕНИЕ КИСТЕЙ, С УПЛОТНЕНИЕМ КОЖИ РУК В «ЗОНЕ ДЕКОЛЬТЕ», У КОТОРОЙ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ ВЫЯВЛЕНЫ ПЛОТНЫЙ ОТЕК КИСТЕЙ, УПЛОТНЕНИЕ КОЖИ В ОБЛАСТИ ГРУДИ, РУБЧИКИ НА ПОДУШЕЧКАХ ПАЛЬЦЕВ МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ ДИАГНОЗ

☐ системная склеродермия

Блок: Блок 48 | № 4746

4746. ГИПОРЕГЕНЕРАТОРНЫЙ ХАРАКТЕР АНЕМИИ УКАЗЫВАЕТ НА

☐ аплазию кроветворения

Блок: Блок 48 | № 4747

4747. ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ У БОЛЬНОГО С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О

☐ холестаза

Блок: Блок 48 | № 4748

4748. ДИАГНОЗ «АТИПИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ» АССОЦИИРУЕТСЯ С

☐ хламидиями

Блок: Блок 48 | № 4749

4749. КАКОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕСТА 6-МИНУТНОЙ ХОДЬБЫ СООТВЕТСТВУЕТ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 1 ФК

☐ 426-550 м

Блок: Блок 48 | № 4750

4750. ЭКВИВАЛЕНТОМ СТЕНОКАРДИИ МОЖЕТ БЫТЬ

☐ одышка

Блок: Блок 48 | № 4751

4751. ПРИ ЛЮПУС-НЕФРИТЕ РЕЖЕ ВСЕГО РАЗВИВАЕТСЯ СИНДРОМ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК

☐ дизурический

Блок: Блок 48 | № 4752

4752. РАННЕЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕСС ИЛЕОСАКРАЛЬНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ, ТУГОПОДВИЖНОСТЬ ПОЗВОНОЧНИКА, СИНДЕСМОФИТЫ И КВАДРАТИЗАЦИЯ ПОЗВОНКОВ ПРИ РЕНТГЕНОГРАФИИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ анкилозирующего спондилита

Блок: Блок 48 | № 4753

4753. СТЕПЕНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 1 СООТВЕТСТВУЕТ УРОВЕНЬ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (ММ РТ.СТ.)

☐ 90-98

Блок: Блок 48 | № 4754

4754. ДЛЯ РЕАКТИВНОГО АРТРИТА ХАРАКТЕРНО

☐ преимущественное поражение суставов нижних конечностей

Блок: Блок 48 | № 4755

4755. ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ИЗ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ

☐ ревматоидного фактора или АЦЦП

Блок: Блок 48 | № 4756

4756. НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ДВС-СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

☐ Д-димера

Блок: Блок 48 | № 4757

4757. МАЛОХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ОСТЕОАРТРИТА ВАРИАНТАМИ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЮТСЯ БОЛИ

☐ в суставах в ранние утренние часы

Блок: Блок 48 | № 4758

4758. НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ЯВЛЯЮТСЯ АНТИТЕЛА

☐ к Smith-антигену

Блок: Блок 48 | № 4759

4759. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ биопсия

Блок: Блок 48 | № 4760

4760. ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ II СТЕПЕНИ II ТИПА (ПО МОБИТЦУ) ЯВЛЯЕТСЯ

☐ выпадение отдельных комплексов QRS при сохранности зубца Р и фиксированного интервала PQ

Блок: Блок 48 | № 4761

4761. К ПРОФЕССИЯМ, СЧИТАЮЩИМСЯ РЕДКИМИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОКОНИОЗОВ, ОТНОСЯТ

☐ скульптора и зубного техника

Блок: Блок 48 | № 4762

4762. ПРИ ЯЗВЕННОМ КОЛИТЕ ПОРАЖАЕТСЯ

☐ изолированно толстая кишка

Блок: Блок 48 | № 4763

4763. ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ смертность

Блок: Блок 48 | № 4764

4764. ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ рождаемость

Блок: Блок 48 | № 4765

4765. ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ заболеваемость

Блок: Блок 48 | № 4766

4766. К РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ, НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА, ОТНОСЯТ

☐ краевые костные эрозии

Блок: Блок 48 | № 4767

4767. К ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ ЭГДС ОТНОСЯТ

☐ острый бронхообструктивный синдром

Блок: Блок 48 | № 4768

4768. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВИЧНОГО ЧКВ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА НАЗНАЧАЕТСЯ ПАЦИЕНТАМ, В ПРЕДШЕСТВУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ РЕГУЛЯРНО НЕ ПРИНИМАВШИХ ДАННЫЙ ПРЕПАРАТ В НАГРУЗОЧНОЙ ДОЗЕ (В МГ)

☐ 150-325

Блок: Блок 48 | № 4769

4769. ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ПРОРЫВА АБСЦЕССА ЛЕГКОГО В БРОНХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ внезапное выделение обильной гнойной мокроты

Блок: Блок 48 | № 4770

4770. У БОЛЬНЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЕТСЯ

☐ фибрилляция предсердий

Блок: Блок 48 | № 4771

4771. ДЛЯ ОСТРОГО ПОДАГРИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СУСТАВОВ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ

☐ асимметричного моноартрита

Блок: Блок 48 | № 4772

4772. ОПТИМАЛЬНОЙ ДОЗОЙ АСПИРИНА В СУТКИ В КАЧЕСТВЕ АНТИАГРЕГАНТА БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ (В МГ)

☐ 75-100

Блок: Блок 48 | № 4773

4773. СОВРЕМЕННЫМ ПОРТАТИВНЫМ ПРИБОРОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пикфлоуметр

Блок: Блок 48 | № 4774

4774. ПУЛЬС-ТЕРАПИЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДАМИ ПРИ МИАСТЕНИИ И РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ ЧАЩЕ ПРОВОДИТСЯ

☐ метилпреднизолоном

Блок: Блок 48 | № 4775

4775. ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСКЛЮЧЕНИЕ СИНДРОМА ГИПЕРКАЛЬЦИЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ С

☐ дефицитом витамина D

Блок: Блок 48 | № 4776

4776. ПРОГНОСТИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТЕН

☐ стеноз основного ствола левой коронарной артерии

Блок: Блок 48 | № 4777

4777. ПРОТИВОВИРУСНЫМ ПРЕПАРАТОМ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГРИППА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ осельтамивир

Блок: Блок 48 | № 4778

4778. К ВАЗОМОТОРНЫМ СИМПТОМАМ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА ОТНОСЯТ

☐ приливы жара

Блок: Блок 48 | № 4779

4779. К ПРИЗНАКУ РАЗВИТИЯ ГИПОТИРЕОИДНОЙ КОМЫ ОТНОСИТСЯ

☐ гипотермия

Блок: Блок 48 | № 4780

4780. ПРИМЕРОМ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА СЧИТАЮТ ОБНАРУЖЕНИЕ У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО БОЛЬНОГО

☐ очагового туберкулеза в фазе инфильтрации

Блок: Блок 48 | № 4781

4781. СЕДАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РЕАКЦИЯМ ТИПА

☐ А

Блок: Блок 48 | № 4782

4782. К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ФОЛИЕВОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ОТНОСЯТ

☐ анемический синдром

Блок: Блок 48 | № 4783

4783. РЕТИКУЛОЦИТАРНЫЙ КРИЗ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ВИТАМИНА В12 НАБЛЮДАЕТСЯ НА (В ДНЯХ)

☐ 4-8

Блок: Блок 48 | № 4784

4784. ПОВЫШЕННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ В СУСТАВАХ ВЫЯВЛЯЕТСЯ ПРИ

☐ синдроме Марфана

Блок: Блок 48 | № 4785

4785. ГИПОТИРЕОЗ, РАЗВИВШИЙСЯ ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ вторичным

Блок: Блок 48 | № 4786

4786. БОЛЬ ПРИ САКРОИЛЕИТЕ У БОЛЬНОГО АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛИТОМ

☐ возникает в ягодицах, области крестцово-подвздошных суставов с иррадиацией в ягодичную складку

Блок: Блок 48 | № 4787

4787. О НАЛИЧИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ВЫЯВЛЕНИЕ У ПАЦИЕНТА

☐ кандидоза пищевода

Блок: Блок 48 | № 4788

4788. Диагнозом пациентки 30 лет, поступившей в стационар с жалобами на общую слабость, отсутствие аппетита, наличие темной мочи, выраженной желтушностью склер и кожных покровов и гепатомегалией, является

☐ вирусный гепатит

Блок: Блок 48 | № 4789

4789. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫЗВАНО

- ☐ злоупотреблением алкоголя

Блок: Блок 48 | № 4790

4790. ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДЯТ

- ☐ диагностические и лечебно-профилактические учреждения общей лечебной сети

Блок: Блок 48 | № 4791

4791. ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ НАЗНАЧЕНИИ ПАЦИЕНТУ 5 И БОЛЕЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ТЕЧЕНИЕ ОДНИХ СУТОК ИЛИ СВЫШЕ 10 НАИМЕНОВАНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО МЕСЯЦА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ НЕОБХОДИМО

- ☐ решение врачебной комиссии

Блок: Блок 48 | № 4792

4792. ДИАГНОЗ «ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ» ВЕРИФИЦИРУЮТ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ С ПОМОЩЬЮ

- ☐ культурального исследования с дифференциацией микобактерий туберкулезного комплекса от нетуберкулезных микобактерий

Блок: Блок 48 | № 4793

4793. ПРОГНОСТИЧЕСКИ НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТЕН

- ☐ Дистальный стеноз огибающей артерии

Блок: Блок 48 | № 4794

4794. У БОЛЬНЫХ СТАРШЕ 60 ЛЕТ АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ дегенеративно-склеротическим

Блок: Блок 48 | № 4795

4795. МЕТОД КАЛИПЕРОМЕТРИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- ☐ измерение толщины кожной складки

Блок: Блок 48 | № 4796

4796. РЕГЕНЕРАТОРНЫЙ (ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ) ОТВЕТ КОСТНОГО МОЗГА НА АНЕМИЮ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ В АНАЛИЗЕ КРОВИ

- ☐ ретикулоцитов

Блок: Блок 48 | № 4797

4797. ТЕРАТОГЕННОСТЬ ОТНОСЯТ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РЕАКЦИЯМ ТИПА

- ☐ D

Блок: Блок 48 | № 4798

4798. ИСТОЧНИКОМ ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ЯВЛЯЕТСЯ

- ☐ шпинат, оливковое масло

Блок: Блок 48 | № 4799

4799. ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ (GOLD) ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «ОФВ1/ФЖЕЛ» ХАРАКТЕРНО ЗНАЧЕНИЕ < 70%, ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ «ОФВ1» ХАРАКТЕРНО ЗНАЧЕНИЕ (В ПРОЦЕНТАХ)

☐ 30-50

Блок: Блок 48 | № 4800

4800. ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОСТРОГО ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА В НИЖНЕЙ СТЕНКЕ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНО ПОЯВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЭКГ В ОТВЕДЕНИЯХ

☐ II, III, aVF

Блок: Блок 48 | №

. ПРИ ОСТРОМ РАЗДРАЖЕНИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ БРОНХОВ НАБЛЮДАЮТ

☐ сильный сухой кашель

Блок 49

Блок: Блок 49 | № 4801

4801. РИСК РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ВЕЛИК ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОМ ПОВЫШЕНИИ В ПЛАЗМЕ КРОВИ

☐ триглицеридов

Блок: Блок 49 | № 4802

4802. В КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ У БОЛЬНЫХ С ВРОЖДЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ А1- АНТИТРИПСИНА НАРЯДУ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ ПРИСУТСТВУЕТ

☐ хроническая обструктивная болезнь легких

Блок: Блок 49 | № 4803

4803. ДИАГНОСТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ повышение уровня амилазы крови более 3 норм

Блок: Блок 49 | № 4804

4804. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛЮ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ миксома

Блок: Блок 49 | № 4805

4805. НАИБОЛЕЕ ВЫРАЖЕННОЙ АНТИСЕКРЕТОРНОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОБЛАДАЮТ

☐ ингибиторы протоновой помпы

Блок: Блок 49 | № 4806

4806. К АЛЬВЕОЛИТАМ ОТНОСИТСЯ

☐ хронический бериллиоз

Блок: Блок 49 | № 4807

4807. К ФАКТОРАМ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИНСУЛЬТА У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ, ПО ШКАЛЕ CHA2DS2-VASC ОТНОСЯТ

☐ хроническую сердечную недостаточность

Блок: Блок 49 | № 4808

4808. РАЗВИТИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА ВОЗМОЖНО ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ

☐ системных глюкокортикостероидов

Блок: Блок 49 | № 4809

4809. ИЗ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нарушение моторики пищевода

Блок: Блок 49 | № 4810

4810. ФОТОСЕНСИБИЛИЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ

☐ ципрофлоксацин

Блок: Блок 49 | № 4811

4811. ПОВЫШЕНИЕ АДРЕНOKОРТИКОТРОПНОГО ГОРМОНА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ болезни Иценко-Кушинга

Блок: Блок 49 | № 4812

4812. ПРЕОБЛАДАЮЩИМ СИМПТОМОМ ЭМФИЗЕМАТОЗНОГО ФЕНОТИПА ХОБЛ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ экспираторная одышка

Блок: Блок 49 | № 4813

4813. ПРИЧИНОЙ ЯТРОГЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ПРИМЕНЕНИЕ

☐ симпатомиметиков

Блок: Блок 49 | № 4814

4814. ОПТИМАЛЬНАЯ СХЕМА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ХСН IIA СТ., III ФК У ПАЦИЕНТА С СИНУСОВЫМ РИТМОМ И ФВ 38% ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ: ИНГИБИТОРЫ АПФ, БЕТА-БЛОКАТОРЫ, ДИУРЕТИКИ, АНТАГОНИСТЫ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ И

☐ блокаторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа

Блок: Блок 49 | № 4815

4815. ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиперпластический гастрит

Блок: Блок 49 | № 4816

4816. ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ АДЕНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ ринофарингит и конъюнктивит

Блок: Блок 49 | № 4817

4817. НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ С НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПАЦИЕНТАМ С

☐ АГ 1 степени, относящимся к категориям низкого/умеренного риска без признаков поражения органов-мишеней

Блок: Блок 49 | № 4818

4818. ПОЯВЛЕНИЕ СИМПТОМОВ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У РАННЕ ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА БЕРЕМЕННОСТИ ИЛИ 5 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ РОДОВ, ПОЛУЧИЛО НАЗВАНИЕ

☐ перипартальная кардиомиопатия

Блок: Блок 49 | № 4819

4819. ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В КАЧЕСТВЕ СТАРТ-ТЕРАПИИ ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ ДИУРЕТИКА И

☐ ингибитора ангиотензинпревращающего фермента

Блок: Блок 49 | № 4820

4820. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДЕЗАГРЕГАНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ геморрагический инсульт

Блок: Блок 49 | № 4821

4821. ЛЕЙКОПЕНИЯ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ СЛЕДСТВИЕМ

☐ цирроза печени

Блок: Блок 49 | № 4822

4822. В ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ ПАРАНЕОПЛАСТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО ЛЕЖИТ

☐ гиперпродукция гормонов

Блок: Блок 49 | № 4823

4823. СКРИНИНГ НА ДИСЛИПИДЕМИЮ ПОКАЗАН

☐ женщинам в постменопаузе

Блок: Блок 49 | № 4824

4824. КАРДИОСПЕЦИФИЧНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МАРКЁРОМ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ тропонин I

Блок: Блок 49 | № 4825

4825. НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ИДИОПАТИЧЕСКОГО ЛЕГОЧНОГО ФИБРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ одышка

Блок: Блок 49 | № 4826

4826. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ табакокурение

Блок: Блок 49 | № 4827

4827. ОСТРО ВОЗНИКШАЯ БЛОКАДА ЛЕВОЙ НОЖКИ ПУЧКА ГИСА ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ

☐ инфаркте миокарда

Блок: Блок 49 | № 4828

4828. ВАЖНЕЙШИМ ПРИНЦИПОМ ДИЕТОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ

☐ простых углеводов

Блок: Блок 49 | № 4829

4829. ПРИ ОБСТРУКТИВНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ ВЫЯВЛЯЮТ

☐ асимметричную гипертрофию межжелудочковой перегородки

Блок: Блок 49 | № 4830

4830. ДЛЯ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ХАРАКТЕРНЫ

☐ отек стопы и тупые боли в ноге, появляющиеся к концу рабочего дня

Блок: Блок 49 | № 4831

4831. ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ОСТРОГО ПРИСТУПА ПОДАГРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ колхицин

Блок: Блок 49 | № 4832

4832. ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ПЕРВИЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ 13С-дыхательный уреазный тест

Блок: Блок 49 | № 4833

4833. БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ В СОЧЕТАНИИ С ВНЕЗАПНО ПОЯВИВШЕЙСЯ ОДЫШКОЙ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ пневмоторакса

Блок: Блок 49 | № 4834

4834. БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ ИМЕЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С

☐ сердечной недостаточностью

Блок: Блок 49 | № 4835

4835. ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАГРУЗОЧНОГО ТРЕДМИЛ-ТЕСТА НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ТАХИКАРДИЯ С ШИРОКИМИ КОМПЛЕКСАМИ, ПОЭТОМУ НЕОБХОДИМО

☐ прекратить исследование

Блок: Блок 49 | № 4836

4836. РЕПАГЛИНИД ОТНОСИТСЯ К ПЕРОРАЛЬНЫМ САХАРОСНИЖАЮЩИМ ПРЕПАРАТАМ КЛАССА

☐ меглитинидов

Блок: Блок 49 | № 4837

4837. НЕВРИТ СЛУХОВОГО НЕРВА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К НАЗНАЧЕНИЮ

☐ аминогликозидов

Блок: Блок 49 | № 4838

4838. К САНИТАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ОТНОСЯТ СОЦИАЛЬНЫЕ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ, ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗОЛЯЦИЮ БОЛЬНЫХ И ОЧАГЕ ТУБЕРКУЛЕЗА

☐ санитарное просвещение

Блок: Блок 49 | № 4839

4839. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ ДИФТЕРИИ СОСТАВЛЯЕТ (В СУТКАХ)

☐ 2-12

Блок: Блок 49 | № 4840

4840. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

☐ 1-10 суток

Блок: Блок 49 | № 4841

4841. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ХИМИОПРОФИЛАКТИКА МАЛЯРИИ МЕФЛОХИНОМ НАЗНАЧАЕТСЯ

☐ в течение всего времени пребывания в эндемичном районе и 4 недели после выезда из очага

Блок: Блок 49 | № 4842

4842. «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ» ПУТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПЕРЕДАЧУ

☐ от ВИЧ-инфицированной матери ребенку

Блок: Блок 49 | № 4843

4843. ОСНОВОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ РОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ комплексное полноценное лечение первичной рожи

Блок: Блок 49 | № 4844

4844. С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ПРИМЕНЯЮТ

☐ изоляцию людей с симптомами заболевания

Блок: Блок 49 | № 4845

4845. СХЕМОЙ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ (КОКАВ) ПРИ УКУСЕ ЖИВОТНЫМ С ПОДОЗРЕНИЕМ НА БЕШЕНСТВО ЯВЛЯЕТСЯ (В ДНЯХ)

☐ 0 – 3 – 7 – 14 – 30 – 90

Блок: Блок 49 | № 4846

4846. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 РЕКОМЕНДУЮТ

☐ соблюдение масочного режима

Блок: Блок 49 | № 4847

4847. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ НАЧИНАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ

☐ 3 месяцев

4848. СРОКИ КАРАНТИНА ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЧУМУ СОСТАВЛЯЮТ (В ДНЯХ)

☐ 6

4849. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИММУНИЗАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСА ГЕПАТИТА В КОНТРОЛИРУЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕМ В КРОВИ КОЛИЧЕСТВА АНТИТЕЛ К

☐ HBs антигену

4850. ОСНОВНЫМ СРЕДСТВОМ ПРОФИЛАКТИКИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 ЯВЛЯЕТСЯ

☐ введение вакцины

4851. МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БОЛЬНОГО, ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО НА ОСОБО ОПАСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

☐ изолируется вместе с больным, извещает руководителя своего учреждения о выявленном случае

4852. НАИБОЛЬШУЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

☐ кровь

4853. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ У ПАЦИЕНТА ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ

☐ экстренное извещение об инфекционном заболевании

4854. ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ болезни системы кровообращения

4855. К ДЕКРЕТИРОВАННОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТСЯ

☐ работники в сфере бытового обслуживания

4856. БАКТЕРИОВЫДЕЛИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬНОЙ АКТИВНОЙ ФОРМОЙ ТУБЕРКУЛЕЗА, У КОТОРОГО В ПАТОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОБНАРУЖЕНЫ

☐ многократно

4857. НАИБОЛЬШУЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ ОБЛАДАЮТ ОЧАГИ, СФОРМИРОВАННЫЕ БОЛЬНЫМИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

☐ с бактериовыделением, имеющими в окружении детей и подростков, не соблюдающими санитарно-противоэпидемические правила и условия проживания

Блок: Блок 49 | № 4858

4858. ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ НА МЕДИЦИНСКУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ В САНАТОРНО-КУРОРТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ В ПЕРИОД ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ФОРМИРУЕТСЯ

☐ медицинской организацией, направившей гражданина на медицинскую реабилитацию

Блок: Блок 49 | № 4859

4859. ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ МАКРОЦИТОЗА У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение всасывания витамина В12

Блок: Блок 49 | № 4860

4860. ФОЛИЕВОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гиперхромной

Блок: Блок 49 | № 4861

4861. БОЛЬНЫМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ТОЛЬКО С ДЕФИЦИТОМ ВИТАМИНА В12 НАЗНАЧЕНИЕ ФОЛИЕВОЙ КИСЛОТЫ

☐ нежелательно в связи с усугублением неврологической симптоматики

Блок: Блок 49 | № 4862

4862. У МУЖЧИН ДИАГНОЗ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОГО СОСТОЯНИЯ ПРАВОМОЧЕН ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ ФЕРРИТИНА (В НГ/МЛ)

☐ < 40

Блок: Блок 49 | № 4863

4863. К ХАРАКТЕРНЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ПРИЗНАКАМ ПОДОСТРОГО ТИРЕОИДИТА ОТНОСЯТ

☐ зоны повышенной и пониженной эхогенности с усилением линейного кровотока

Блок: Блок 49 | № 4864

4864. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НАИБОЛЕЕ РАЦИОНАЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕПАРАТЫ ИЗ ГРУППЫ

☐ ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа

Блок: Блок 49 | № 4865

4865. К ГЕНАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА РАЗВИТИЕ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО ЭЗОФАГИТА, ОТНОСЯТСЯ

☐ TSLP

Блок: Блок 49 | № 4866

4866. ВЕРОЯТНЫМ ДИАГНОЗОМ, У ЖЕНЩИНЫ 22 ЛЕТ С АСИММЕТРИЕЙ ПУЛЬСА И АД НА РУКАХ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ артериит Такаясу

Блок: Блок 49 | № 4867

4867. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НАСЕЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДЯТСЯ

☐ 2 раза в год

Блок: Блок 49 | № 4868

4868. В РЕКОМЕНДОВАННЫХ СХЕМАХ ЛЕЧЕНИЯ COVID-19 В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ СТАРТОВАЯ РАЗОВАЯ ДОЗА ФАВИПИРАВИРА У ПАЦИЕНТОВ С МАССОЙ ТЕЛА БОЛЕЕ 75 КГ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ)

☐ 1800

Блок: Блок 49 | № 4869

4869. С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ПОСЛЕ КОНТАКТА С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ МАТЕРИАЛОМ НАЗНАЧАЮТ

☐ антиретровирусные препараты

Блок: Блок 49 | № 4870

4870. ИММУНИЗАЦИЯ ПРОТИВ КОРИ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ЛИЦ, ИМЕВШИХ КОНТАКТ С БОЛЬНЫМ, ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ ____ ЧАСОВ С МОМЕНТА ВЫЯВЛЕНИЯ БОЛЬНОГО

☐ 72

Блок: Блок 49 | № 4871

4871. ДЛЯ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ В ОЧАГАХ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИМЕНЯЮТ

☐ ципрофлоксацин

Блок: Блок 49 | № 4872

4872. ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРОТИВОКЛЕЩЕВЫМ ИММУНОГЛОБУЛИНОМ ДОЛЖНА ПРОВОДИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ ____ ПОСЛЕ ПРИСАСЫВАНИЯ КЛЕЩА

☐ 72 часов

Блок: Блок 49 | № 4873

4873. ХРОНИЧЕСКИЙ БРОНХИТ МОЖНО ДИАГНОСТИРОВАТЬ ПРИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ КАШЛЯ В ТЕЧЕНИЕ

☐ 3 месяцев на протяжении 2 лет

Блок: Блок 49 | № 4874

4874. ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ РЕКОМЕНДУЮТ СНИЖАТЬ ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ (В МИЛЛИМЕТРАХ РТУТНОГО СТОЛБА)

☐ 70-79

Блок: Блок 49 | № 4875

4875. ПРИ ПОДБОРЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТАМ РЕКОМЕНДУЮТ ПРОВОДИТЬ ПЛАНОВЫЕ ВИЗИТЫ К ВРАЧУ С ИНТЕРВАЛОМ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В ____ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

☐ 4 недели

Блок: Блок 49 | № 4876

4876. К ПЕРОРАЛЬНЫМ АНТИКОАГУЛЯНТАМ ОТНОСЯТ

☐ апиксабан

Блок: Блок 49 | № 4877

4877. СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ИШЕМИИ МИОКАРДА НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ депрессия сегмента ST

Блок: Блок 49 | № 4878

4878. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ишемическая болезнь сердца

Блок: Блок 49 | № 4879

4879. ДЛЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ХАРАКТЕРНА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ____ МИНУТ И БОЛЕЕ

☐ 20

Блок: Блок 49 | № 4880

4880. СЕДАТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ АНТИГИСТАМИННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСЯТ К НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ РЕАКЦИЯМ ТИПА

☐ А

Блок: Блок 49 | № 4881

4881. ДИАГНОЗОМ ПАЦИЕНТКИ 30 ЛЕТ, ПОСТУПИВШЕЙ В СТАЦИОНАР С ЖАЛОБАМИ НА ОБЩУЮ СЛАБОСТЬ, ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА, НАЛИЧИЕ ТЕМНОЙ МОЧИ, ВЫРАЖЕННОЙ ЖЕЛТУШНОСТЬЮ СКЛЕР И КОЖНЫХ ПОКРОВОВ И ГЕПАТОМЕГАЛИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ вирусный гепатит

Блок: Блок 49 | № 4882

4882. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ПРИ ГРИППЕ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пневмония

Блок: Блок 49 | № 4883

4883. ПАЦИЕНТАМ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ И ВАРИКОЗНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА I СТЕПЕНИ РЕКОМЕНДОВАНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ бета-адреноблокаторов

Блок: Блок 49 | № 4884

4884. ОПТИМАЛЬНАЯ СУТОЧНАЯ ДОЗА ОМЕПРАЗОЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВА ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ СОСТАВЛЯЕТ (В МГ)

☐ 20

Блок: Блок 49 | № 4885

4885. ЖЕНЩИНАМ ДЕТОРОДНОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И РИСКОМ НАСТУПЛЕНИЯ НЕЗАПЛАНИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ

☐ блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы

Блок: Блок 49 | № 4886

4886. СНИЖЕНИЕ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА (ТТГ) ПРИ НОРМАЛЬНОМ УРОВНЕ СВОБОДНОГО ТИРОКСИНА (Т4) ОТМЕЧАЕТСЯ ПРИ

☐ первичном субклиническом тиреотоксикозе

Блок: Блок 49 | № 4887

4887. К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ОТНОСЯТ

☐ симметричность поражения мелких суставов кистей и стоп

Блок: Блок 49 | № 4888

4888. 4888 МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СВЕЧЕЙ НАИБОЛЕЕ ПОКАЗАНО ПРИ

☐ проктите

Блок: Блок 49 | № 4889

4889. 4889 ГЕПАТОМЕГАЛИЯ, ГИПЕРГЛИКЕМИЯ, ГИПЕРПИГМЕНТАЦИЯ КОЖИ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЖЕЛЕЗА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ гемохроматоза

Блок: Блок 49 | № 4890

4890. 4890 ЧУВСТВО «КОМА В ГОРЛЕ» ПРИ ГЛОТАНИИ МОЖЕТ БЫТЬ СИМПТОМОМ

☐ гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Блок: Блок 49 | № 4891

4891. 4891 ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

☐ натрийуретический пептид

Блок: Блок 49 | № 4892

4892. 4892 НАЛИЧИЕ КРОВОИЗЛИЯНИЙ, ЭКСУДАТОВ ИЛИ ОТЕКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ МОЖЕТ УКАЗЫВАТЬ НА

☐ бессимптомное поражение органов-мишеней

Блок: Блок 49 | № 4893

4893. 4893 ДИАГНОЗ «ГАСТРИТ» ОСНОВАН НА _____ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА

☐ гистологическом выявлении атрофии

Блок: Блок 49 | № 4894

4894. 4894 ВСЕМ ПАЦИЕНТАМ С АТРОФИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ТЕСТИРОВАНИЯ НА ИНФЕКЦИЮ *HELICOBACTER PYLORI* ДЛЯ _____ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

☐ предотвращения прогрессирования атрофии

Блок: Блок 49 | № 4895

4895. 4895 ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, НЕ ДОСТИГШИМ ЦЕЛЕВОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ФОНЕ ТРОЙНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДОБАВЛЕНИЕ

☐ спиронолактона

Блок: Блок 49 | № 4896

4896. 4896 СОЧЕТАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 1 СТЕПЕНИ И САХАРНОГО ДИАБЕТА С ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ РАСЦЕНИВАЮТ КАК _____ РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

☐ очень высокий

Блок: Блок 49 | № 4897

4897. 4897 ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СТОЙКОЕ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ увеличение сердечного выброса

Блок: Блок 49 | № 4898

4898. 4898 ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ КОМБИНАЦИИ ДВУХ БЛОКАТОРОВ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ ВСЛЕДСТВИЕ ПОВЫШЕННОГО РИСКА РАЗВИТИЯ

☐ гиперкалиемии

Блок: Блок 49 | № 4899

4899. 4899 ПРЕПАРАТОМ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дилтиазем

Блок: Блок 49 | № 4900

4900. 4900 ПРИЕМ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИВОДИТ К СНИЖЕНИЮ

☐ агрегации тромбоцитов

Блок: Блок 49 | №

. ...симметричность поражения мелких суставов кистей и стоп

☐ симметричность поражения мелких суставов кистей и стоп

Блок 50

Блок: Блок 50 | № 4901

4901. К КАТЕГОРИИ ДЛИТЕЛЬНО И ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ОТНОСЯТСЯ ПАЦИЕНТЫ, ИМЕЮЩИЕ

☐ 4 случая и 60 дней временной нетрудоспособности в год по одному заболеванию

Блок: Блок 50 | № 4902

4902. ПРИНИМАТЬ ПРОЦЕДУРУ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН

☐ через 30 минут после легкого завтрака, через 2-3 часа после обеда

Блок: Блок 50 | № 4903

4903. МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ВКЛЮЧАЕТ

☐ магнитно-лазерную терапию

Блок: Блок 50 | № 4904

4904. СТИЛЬ РУКОВОДСТВА, ПРИ КОТОРОМ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ПРИНЦИПОВ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА, ЧЛЕНЫ КОЛЛЕКТИВА ПООЩРЯЮТСЯ К ТВОРЧЕСКОМУ САМОВЫРАЖЕНИЮ — ЭТО

☐ либеральный

Блок: Блок 50 | № 4905

4905. ПЕРВИЧНЫЙ ПАТРОНАЖ НОВОРОЖДЕННОГО В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

☐ фельдшером фельдшерско-акушерского пункта

Блок: Блок 50 | № 4906

4906. СЖИГАТЬ ЛИСТВУ НА ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ФАП

☐ запрещено

Блок: Блок 50 | № 4907

4907. РАБОТАЮЩИМ РОДИТЕЛЯМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ПО УХОДУ ЗА НИМИ ДО ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЛЬГОТЫ

☐ 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц

Блок: Блок 50 | № 4908

4908. СЕЗОННУЮ ИММУНОПРОФИЛАКТИКУ ГРИППА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАКОНЧИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА ____ ДО НАЧАЛА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО СЕЗОНА (Пороговое значение)

☐ 2-3 недели

Блок: Блок 50 | № 4909

4909. С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРИ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ КОНТАКТНЫМ ЛИЦАМ ПРИ НАЛИЧИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ВАКЦИНАЦИИ ПРИМЕНЯЕТСЯ

☐ иммуноглобулин человека нормальный

Блок: Блок 50 | № 4910

4910. С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПОСЛЕ КОНТАКТА С ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ МАТЕРИАЛОМ ПРИЕМ АНТИРЕТРОВИРУСНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАЧАТ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ__ ПОСЛЕ АВАРИИ:

☐ 2 часов

Блок: Блок 50 | № 4911

4911. ПАЦИЕНТ С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ НУЖДАЕТСЯ В КОНСУЛЬТАЦИИ

☐ кардиолога

4912. СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ ВРАЧОМ ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИЦАМИ ПО ГЕПАТИТУ Е

☐ 40 дней

4913. С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ИЛИ ДРУГИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО НА КОЖУ НЕОБХОДИМА ОБРАБОТКА РАСТВОРОМ (В ПРОЦЕНТАХ)

☐ этанола 70

4914. ЛИЦАМ, НЕ ПРИВИТЫМ РАНЕЕ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, ПОСЛЕ СЛУЧАЙНОГО ЗАРАЖЕНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТАКТА С ИНФИЦИРОВАННЫМ МАТЕРИАЛОМ СЛЕДУЕТ НАЧАТЬ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В ПО СХЕМЕ

☐ 0-1-2-12 месяцев

4915. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫРАЖЕННОСТИ АЛЬБУМИНУРИИ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК ЯВЛЯЮТСЯ

☐ блокаторы РААС

4916. У СТАБИЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ЧЕРЕЗ 12-24 ЧАСА ОТ НАЧАЛА СИМПТОМОВ РЕКОМЕНДУЮТ

☐ первичное ЧКВ

4917. ПРИ ЭКСТРЕННОЙ ХИМИОПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА (ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМ) ЗНАМИВИР МОЖЕТ НАЗНАЧАТЬСЯ В ТЕЧЕНИЕ (В ДНЯХ)

☐ 10

4918. С ЦЕЛЬЮ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АНТИРАБИЧЕСКИЙ ИММУНОГЛОБУЛИН ДОЛЖЕН ВВОДИТЬСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ____ ПОСЛЕ УКУСА

☐ 3 суток

4919. ПОСТКОНТАКТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА (АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ) НЕОБХОДИМА ПРИ ПОПАДАНИИ НА СЛИЗИСТЫЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ____ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА

☐ грудного молока

4920. ЭКСТРЕННАЯ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОЛБНЯКА У НЕПРИВИТЫХ ЛИЦ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

☐ введение столбнячного анатоксина в комбинации с гетерогенной противостолбнячной сывороткой

Блок: Блок 50 | № 4921

4921. НИТРОГЛИЦЕРИН В ЛЕЧЕНИИ СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ

☐ купирования приступа стенокардии

Блок: Блок 50 | № 4922

4922. НОРМОЦИТАРНАЯ АНЕМИЯ ВОЗМОЖНА ПРИ

☐ аутоиммунной гемолитической анемии

Блок: Блок 50 | № 4923

4923. КОЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ МАКУЛОПАПУЛЕЗНЫМИ ВЫСЫПАНИЯМИ НА ЛИЦЕ, В ОБЛАСТИ СКУЛОВЫХ ДУГ И СПИНКИ НОСА, ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ системной красной волчанки

Блок: Блок 50 | № 4924

4924. ПРИЗНАКАМИ ПОЛНОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДЫ ПРОКСИМАЛЬНОГО УРОВНЯ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ нормальный по ширине комплекс QRS, равные интервалы P-P и R-R, независимое положение P по отношению к QRS

Блок: Блок 50 | № 4925

4925. ПРИ ОСТРОМ ТРАХЕИТЕ К ТИПИЧНЫМ СИМПТОМАМ ОТНОСЯТ

☐ сильный сухой кашель

Блок: Блок 50 | № 4926

4926. ДИАГНОСТИКА РАСПРОСТРАНЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ПЕРЕДНЕЙ СТЕНКИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРОВОДИТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПО ОТВЕДЕНИЯМ

☐ V1 - V6

Блок: Блок 50 | № 4927

4927. С ЦЕЛЬЮ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА АНТИРАБИЧЕСКИЙ ИММУНОГЛОБУЛИН ДОЛЖЕН ВВОДИТЬСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ____ ПОСЛЕ УКУСА

☐ 3 суток

Блок: Блок 50 | № 4928

4928. К СИМПТОМАМ, НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ДЛЯ ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЛЕГКИХ, ОТНОСЯТ

☐ одышку инспираторного характера

Блок: Блок 50 | № 4929

4929. ПРЕПАРАТОМ ВЫБОРА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ НИЗКОЙ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ дигоксин

Блок: Блок 50 | № 4930

4930. ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ОСТЕОАРТРОЗА ХАРАКТЕРНО ОБНАРУЖЕНИЕ

☐ краевых остеофитов

Блок: Блок 50 | № 4931

4931. ОСНОВНЫМ СКРИНИНГОВЫМ СПИРОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ, ОТРАЖАЮЩИМ БРОНХИАЛЬНУЮ ПРОХОДИМОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ОФВ1

Блок: Блок 50 | № 4932

4932. ПРИ ЛЕЧЕНИИ «АСПИРИНОВОЙ» АСТМЫ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫ

☐ антагонисты лейкотриеновых рецепторов

Блок: Блок 50 | № 4933

4933. ЭОЗИНОФИЛИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ

☐ аллергических заболеваний

Блок: Блок 50 | № 4934

4934. ПРИ НАЛИЧИИ МЕХАНИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА КЛАПАНА СЕРДЦА ПОКАЗАНО ПОЖИЗНЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

☐ варфарина

Блок: Блок 50 | № 4935

4935. ТЕКУЩУЮ ДЕЗИНФЕКЦИЮ В КВАРТИРЕ БОЛЬНОГО ДИЗЕНТЕРИЕЙ, ОСТАВЛЕННОГО ДОМА ПРОВОДЯТ

☐ члены семьи больного

Блок: Блок 50 | № 4936

4936. ЭКСТРЕННУЮ ПРОФИЛАКТИКУ СТОЛБНЯКА ПРОВОДЯТ ДО ____ КАЛЕНДАРНОГО ДНЯ С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ

☐ 20

Блок: Блок 50 | № 4937

4937. К НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫМ ПРОЯВЛЕНИЯМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА В РАЗВЕРНУТОЙ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТНОСЯТ

☐ пальцы в виде «шеи лебедя»

Блок: Блок 50 | № 4938

4938. К ЛАБОРАТОРНЫМ ПРИЗНАКАМ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ОТНОСЯТ

☐ отложение гранул гемосидерина в ретикулоцитах

Блок: Блок 50 | № 4939

4939. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ГИПЕРАНДРОГЕНИИ У ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ

☐ поликистоз яичников

Блок: Блок 50 | № 4940

4940. ДЛЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ХАРАКТЕРНО ОБНАРУЖЕНИЕ

☐ антител к циклическому цитруллинированному пептиду

Блок: Блок 50 | № 4941

4941. К ПАТОГНОМОНИЧНЫМ СИМПТОМАМ РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТА ОТНОСЯТ

☐ изжогу

Блок: Блок 50 | № 4942

4942. ОБЪЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ДЛЯ РАСЧЕТА ____ ДОЗЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

☐ нагрузочной

Блок: Блок 50 | № 4943

4943. РАНЬШЕ ВСЕХ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ ПОРАЖАЮТСЯ ____ СУСТАВЫ

☐ проксимальные межфаланговые

Блок: Блок 50 | № 4944

4944. К ПОБОЧНЫМ ЯВЛЕНИЯМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТАТИНАМИ ОТНОСЯТ

☐ миопатии

Блок: Блок 50 | № 4945

4945. ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, С КОТОРЫМ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО СОЧЕТАТЬ В-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ верапамил

Блок: Блок 50 | № 4946

4946. ЗАГУСТИТЕЛЬ ГРУДНОГО МОЛОКА СОДЕРЖИТСЯ В ____ СМЕСИ

☐ антирефлюксной

Блок: Блок 50 | № 4947

4947. К САМЫМ ЧАСТЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ АГЕНТАМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ (ХОБЛ), ОТНОСЯТ

☐ пневмококк и гемофильную палочку

Блок: Блок 50 | № 4948

4948. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ СООТВЕТСТВУЕТ

☐ боли в эпигастральной области, возникающей натощак или через 2-3 часа после приема пищи

Блок: Блок 50 | № 4949

4949. В ВЕРИФИКАЦИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА РЕШАЮЩИМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ коронароангиография

Блок: Блок 50 | № 4950

4950. К ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ 1 ЛИНИИ У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ, ОЖИРЕНИЕМ, ЛИБО ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОТНОСЯТ

☐ метформин

Блок: Блок 50 | № 4951

4951. ПРИЧИНОЙ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ И СПЛЕНОМЕГАЛИЕЙ МОЖЕТ БЫТЬ

☐ гемолиз

Блок: Блок 50 | № 4952

4952. К ОСОБЕННОСТЯМ КЛИНИКИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ОТНОСЯТ

☐ утреннюю скованность более часа

Блок: Блок 50 | № 4953

4953. ДЛЯ ТАЛАССЕМии И ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ гипохромия эритроцитов

Блок: Блок 50 | № 4954

4954. К КЛАССИФИКАЦИОННЫМ КРИТЕРИЯМ ДИАГНОЗА «СИСТЕМНАЯ КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА» ОТНОСЯТ

☐ серозит

Блок: Блок 50 | № 4955

4955. ХАРАКТЕРНОЙ СЫПЬЮ ПРИ МЕНИНГОКОККЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ геморрагическая, звездчатая, с некрозами

Блок: Блок 50 | № 4956

4956. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ПРОВЕДЕНИЕ САНАЦИОННОЙ БРОНХОСКОПИИ ПРИ

☐ хроническом гнойном бронхите с бронхоэктазами

Блок: Блок 50 | № 4957

4957. НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ СПОНТАННОЙ (ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ) СТЕНОКАРДИИ НА ЭКГ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ преходящий подъем сегмента ST

Блок: Блок 50 | № 4958

4958. К МАРКЕРАМ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ОТНОСЯТ

☐ антитела к двуспиральной ДНК

Блок: Блок 50 | № 4959

4959. ДЛЯ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

☐ синдрома Рейно

Блок: Блок 50 | № 4960

4960. ДЛЯ ОЦЕНКИ НАСЫЩЕНИЯ ДЕПО ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ОПРЕДЕЛЕНИЕ

☐ ферритина

Блок: Блок 50 | № 4961

4961. ДЛЯ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ ИЗ ПОРАЖЕНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ

☐ стриктур нижней трети пищевода

Блок: Блок 50 | № 4962

4962. НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ ТЕСТОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ ЯВЛЯЮТСЯ АНТИТЕЛА К

☐ ядерному антигену Sm (Anti-Sm)

Блок: Блок 50 | № 4963

4963. ВЫСОКОЙ СПЕЦИФИЧНОСТЬЮ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ОБЛАДАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

☐ антител к циклическому цитруллинированному пептиду

Блок: Блок 50 | № 4964

4964. РЕЖИМ ЕДИНОГО ИНГАЛЯТОРА В ЛЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ (SMART-ТЕРАПИЯ) ПОЗВОЛЯЕТ

☐ сократить количество обострений и общую дозу используемых ИГКС

Блок: Блок 50 | № 4965

4965. ДЛЯ ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩЕЙ АСТМЫ ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ развитие «немного легкого»

Блок: Блок 50 | № 4966

4966. ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ И ВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ ПАТОЛОГИЮ КИШЕЧНИКА ДИФФЕРЕНЦИРУЮТ С ПОМОЩЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ В КАЛЕ

☐ кальпротектина

Блок: Блок 50 | № 4967

4967. ЭХОКАРДИОГРАФИЯ У БОЛЬНЫХ С Q-ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫЯВИТЬ

☐ локальный акинез

Блок: Блок 50 | № 4968

4968. ЭЛЕВАЦИЯ СЕГМЕНТА ST ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ ПРИ ПРИСТУПЕ

☐ вазоспастической стенокардии

Блок: Блок 50 | № 4969

4969. НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ фракция выброса

Блок: Блок 50 | № 4970

4970. ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА РЕКОМЕНДУЮТ НАЧАТЬ ИЛИ ПРОДОЛЖИТЬ ЛЕЧЕНИЕ ____ ДОЗОЙ СТАТИНОВ

☐ высокой

Блок: Блок 50 | № 4971

4971. К ОСНОВНЫМ ПРИЧИНАМ АНЕМИИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТНОСЯТ

☐ дефицит эритропоэтина

Блок: Блок 50 | № 4972

4972. ЦЕЛЕВЫМ ЗНАЧЕНИЕМ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТМ МИОКАРДА ПРИ НАЗНАЧЕНИИ В-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ СЧИТАЮТ (В УДАРАХ В МИНУТУ)

☐ 50 - 60

Блок: Блок 50 | № 4973

4973. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ВЫБОР МЕТОДА РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ

☐ коронарографии

Блок: Блок 50 | № 4974

4974. ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ НОРМОХРОМНОЙ, НОРМОРЕГЕНЕРАТОРНОЙ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ хроническая болезнь почек

Блок: Блок 50 | № 4975

4975. РАЗВИТИЕ ПРИ ИНФАРКТ МИОКАРДА ПЛЕВРИТА, ПЕРИКАРДИТА И ПНЕВМОНИТА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ

☐ синдрома Дресслера

Блок: Блок 50 | № 4976

4976. ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ, УСУГУБЛЯЮЩЕЙ ТЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, ОЦЕНИВАЮТ КОНЦЕНТРАЦИЮ

☐ гемоглобина

Блок: Блок 50 | № 4977

4977. НАИБОЛЕЕ СПЕЦИФИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ритм галопа

Блок: Блок 50 | № 4978

4978. ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ облитерирующий атеросклероз

Блок: Блок 50 | № 4979

4979. К РЕДКОЙ ПРИЧИНЕ АНЕМИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ОТНОСЯТ

☐ наследственный микросфероцитоз

Блок: Блок 50 | № 4980

4980. ПОСТОЯННЫЙ ПРИЕМ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ РЕКОМЕНДОВАН ПАЦИЕНТАМ МУЖСКОГО ПОЛА С СУММОЙ БАЛЛОВ ПО CHA2DS2-VASc

☐ ≥ 2

Блок: Блок 50 | № 4981

4981. НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ СИМПТОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ одышка

Блок: Блок 50 | № 4982

4982. СИНУСОВАЯ БРАДИКАРДИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЯВЛЕНИЕМ

☐ дисфункции синусового узла

Блок: Блок 50 | № 4983

4983. С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, В СЛУЧАЕ ПОРЕЗОВ И УКОЛОВ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ РУКИ РАСТВОРОМ

☐ этанола 70%, смазать рану 5% спиртовым раствором йода

Блок: Блок 50 | № 4984

4984. ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА (БОЛЕЗНИ ХОДЖКИНА) СЛУЖИТ

☐ лимфаденопатия

Блок: Блок 50 | № 4985

4985. ГЛАВНЫМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ снижение смертности и количества госпитализаций

Блок: Блок 50 | № 4986

4986. НАГРУЗОЧНАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ЯВЛЯЕТСЯ НЕИНФОРМАТИВНОЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПРИ НАЛИЧИИ

☐ полной блокады левой ножки пучка Гиса

Блок: Блок 50 | № 4987

4987. ПОСТЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА ВКЛЮЧАЕТ ОДНОВРЕМЕННО СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ПРОФИЛАКТИКУ

☐ столбняка

Блок: Блок 50 | № 4988

4988. ПОСЛЕ КАРДИОВЕРСИИ АНТИКОАГУЛЯНТНУЮ ТЕРАПИЮ РЕКОМЕНДОВАНО НАЗНАЧАТЬ МИНИМУМ НА (В НЕДЕЛЯХ)

☐ 4

Блок: Блок 50 | № 4989

4989. ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА РЕКОМЕНДУЮТ ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРИЕМ

☐ бисопролола и периндоприла

Блок: Блок 50 | № 4990

4990. ВЗРОСЛЫМ АНТИРАБИЧЕСКУЮ ВАКЦИНУ (КОКАВ) ВВОДЯТ В

☐ дельтовидную мышцу

Блок: Блок 50 | № 4991

4991. ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ МУКОВИСЦИДОЗА У НОВОРОЖДЕННЫХ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ мекониевый илеус

Блок: Блок 50 | № 4992

4992. ПРИ ЛЕГКОМ ПЕРСИСТИРУЮЩЕМ ТЕЧЕНИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ НОЧНЫЕ СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТМЕЧАЮТСЯ НЕ ЧАЩЕ ____ РАЗ В МЕСЯЦ

☐ 2

Блок: Блок 50 | № 4993

4993. БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ПРЕЭКЛАМПСИИ С ЦЕЛЬЮ ЕЕ ПРОФИЛАКТИКИ РЕКОМЕНДУЮТ НАЗНАЧЕНИЕ МАЛЫХ ДОЗ

☐ аспирина

Блок: Блок 50 | № 4994

4994. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИМПТОМАМИ СТЕНОКАРДИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАЗНАЧЕНИЕ

☐ бисопролола

Блок: Блок 50 | № 4995

4995. ОТЕК ЛЕГКИХ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЯВЛЕНИЕМ ОСТРОЙ ____ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

☐ левожелудочковой

Блок: Блок 50 | № 4996

4996. В ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО ЗДОРОВЬЕМ ____ ПЕРЕСМОТРА

☐ X

Блок: Блок 50 | № 4997

4997. ПАЦИЕНТ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 2-Й СТЕПЕНИ И ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ИМЕЕТ ____ РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

☐ высокий

Блок: Блок 50 | № 4998

4998. ПАЦИЕНТАМ С ВЫРАЖЕННОЙ СИМПТОМНОЙ БРАДИКАРДИЕЙ С ЦЕЛЬЮ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПОКАЗАНО ВВЕДЕНИЕ

☐ атропин

Блок: Блок 50 | № 4999

4999. НАЛИЧИЕ ВЛАЖНЫХ ХРИПОВ В ЛЕГКИХ И ГЕПАТОМЕГАЛИИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ____ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

☐ IIБ

Блок: Блок 50 | № 5000

5000. ГОМОЛОГИЧНЫЙ АНТИРАБИЧЕСКИЙ ИММУНОГЛОБУЛИН ВВОДЯТ В ДОЗЕ ____ МЕ НА 1 КГ МАССЫ ТЕЛА ОДНОКРАТНО

☐ 20

Блок 51

Блок: Блок 51 | № 5001

5001. ОЦЕНКА КОНТРОЛЯ СИМПТОМОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ПРОВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ (В НЕДЕЛЯХ)

☐ 4

Блок: Блок 51 | № 5002

5002. С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРИ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ КОНТАКТНЫМ ЛИЦАМ/ДЕТЯМ, НЕ ДОСТИГШИМ ПРИВИВОЧНОГО ВОЗРАСТА, ВВОДИТСЯ ИММУНОГЛОБУЛИН ЧЕЛОВЕКА НОРМАЛЬНЫЙ НЕ ПОЗДНЕЕ ____ ДНЯ С МОМЕНТА ПЕРВОГО КОНТАКТА С БОЛЬНЫМ КОРЬЮ

☐ 5

Блок: Блок 51 | № 5003

5003. КУЛЬТУРАЛЬНАЯ ОЧИЩЕННАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ АНТИРАБИЧЕСКАЯ ВАКЦИНА (КОКАВ) ВВОДИТСЯ ВНУТРИМЫШЕЧНО НА ____ ДНИ ПОСЛЕ УКУСА

☐ 0, 3, 7, 14, 30 и 90

Блок: Блок 51 | № 5004

5004. АНТИАЛЬДОСТЕРОНОВЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ

☐ торасемид

Блок: Блок 51 | № 5005

5005. ПО ХАРАКТЕРУ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ МОЖЕТ БЫТЬ

☐ временной и стойкой

Блок: Блок 51 | № 5006

5006. НАИБОЛЕЕ РАННИМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нарушение активной релаксации

Блок: Блок 51 | № 5007

5007. ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТРОМБОТИЧЕСКОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПРИМЕНЯЮТ

☐ дабигатрана этексилат

Блок: Блок 51 | № 5008

5008. ДЛЯ ОЦЕНКИ ХРОНОТРОПНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ РЕКОМЕНДОВАНА

☐ электрокардиография с физической нагрузкой

Блок: Блок 51 | № 5009

5009. ОДНОЙ ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ безболевого ишемия миокарда

Блок: Блок 51 | № 5010

5010. В КАЧЕСТВЕ ЛИПИДСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПЕРВОЙ ЛИНИИ У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ИСПОЛЬЗУЮТ ИНГИБИТОРЫ

☐ гидроксигметилглутарилкоэнзим А-редуктазы

Блок: Блок 51 | № 5011

5011. В КАЧЕСТВЕ СТАРТОВОЙ ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ СОННЫХ АРТЕРИЙ РЕКОМЕНДУЮТ КОМБИНАЦИЮ

☐ рамиприла и амлодипина

Блок: Блок 51 | № 5012

5012. ПОТРЕБНОСТЬ МИОКАРДА В КИСЛОРОДЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

☐ частотой сердечных сокращений

Блок: Блок 51 | № 5013

5013. ДЛЯ КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПАЦИЕНТУ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ НАЗНАЧАЮТ

☐ биспролол

Блок: Блок 51 | № 5014

5014. ПАЦИЕНТУ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ВЫРАЖЕННОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА (ФРАКЦИЯ ВЫБРОСА ЛЖ < 40%) ПРОТИВОПОКАЗАН

☐ верапамил

Блок: Блок 51 | № 5015

5015. В КАЧЕСТВЕ ЭКСТРЕННОЙ ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА ОСЕЛЬТАМИВИР НАЗНАЧАЕТСЯ ПО ____ В СУТКИ

☐ 75 мг 1 раз

Блок: Блок 51 | № 5016

5016. ФИБРИЛЛЯЦИЯ, КОТОРАЯ ДЛИТСЯ БОЛЕЕ 10 СУТОК НАЗЫВАЕТСЯ

☐ персистирующая

Блок: Блок 51 | № 5017

5017. У ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДВОЙНУЮ АНТИТРОМБОЦИТАРНУЮ ТЕРАПИЮ, НАЗНАЧАЮТ

☐ пантопразола

Блок: Блок 51 | № 5018

5018. ЛИЦАМ, НЕ ПРИВИТЫМ РАНЕЕ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, ПОСЛЕ СЛУЧАЙНЫХ ЗАРАЖЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНТАКТА С ИНФИЦИРОВАННЫМ МАТЕРИАЛОМ НАЗНАЧАЮТ

☐ иммуноглобулин человека против гепатита В

Блок: Блок 51 | № 5019

5019. ЭКСТРЕННАЯ АКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ (КОКАВ) РАЗ В ДОЗЕ 1,0МЛ

☐ 6

Блок: Блок 51 | № 5020

5020. ДИАГНОЗ «ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ С» ДОСТОВЕРНО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В СЫВОРОТКЕ (ПЛАЗМЕ) КРОВИ

☐ RNA-HCV

Блок: Блок 51 | № 5021

5021. ПРИ НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО НАЗНАЧАТЬ

☐ дабигатран

Блок: Блок 51 | № 5022

5022. ДЕТЯМ АНТИРАБИЧЕСКУЮ ВАКЦИНУ (КОКАВ) ВВОДЯТ В

☐ мышцы бедра

Блок: Блок 51 | № 5023

5023. ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ДОЗЫ ПЕРОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ЗНАЧЕНИЯ

☐ международного нормализованного отношения

Блок: Блок 51 | № 5024

5024. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИЦАМИ В ОЧАГЕ ГЕПАТИТА Е СОСТАВЛЯЕТ ____ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ СО ДНЯ РАЗОБЩЕНИЯ С ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ

☐ 40

Блок: Блок 51 | № 5025

5025. ЭКСТРЕННАЯ СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА СТОЛБНЯКА У ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ ПОЛНЫЙ КУРС ИММУНИЗАЦИИ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ НАЗАД, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

☐ однократную ревакцинацию столбнячным анатоксином

5026. ХИМИОПРОФИЛАКТИКА ГРИППА ПРОТИВОВИРУСНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ИЗ ГРУППЫ СЕЛЕКТИВНЫХ ИНГИБИТОРОВ НЕЙРАМИНИДАЗЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, ЕСЛИ С МОМЕНТА ПЕРВОГО КОНТАКТА С БОЛЬНЫМ ГРИППОМ ПРОШЛО БОЛЕЕ (В ЧАСАХ)

☐ 72

5027. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ НАБЛЮДЕНИЯ ВРАЧОМ-ТЕРАПЕВТОМ ЗА КОНТАКТНЫМИ ЛИЦАМИ В ОЧАГЕ ГЕПАТИТА А СОСТАВЛЯЕТ ____ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ СО ДНЯ РАЗОБЩЕНИЯ С ИСТОЧНИКОМ ИНФЕКЦИИ

☐ 35

5028. ДЛЯ РАСЧЕТА ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НЕОБХОДИМЫ ДАННЫЕ О ЧИСЛЕ ____ И СРЕДНЕГОДОВОЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

☐ как острых, так и хронических заболеваний, выявленных в данном году

5029. С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРИ В ОЧАГЕ ИНФЕКЦИИ КОНТАКТНЫМ ЛИЦАМ ПРИ НЕИЗВЕСТНОМ ИНФЕКЦИОННОМ И ПРИВИВОЧНОМ АНАМНЕЗЕ ПРОВОДИТСЯ

☐ вакцинация

5030. СРОКИ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КОНТАКТНЫМИ ПО ГЕПАТИТУ А С ПЕРВОГО ДНЯ

☐ 35

5031. ЭКСТРЕННАЯ АКТИВНАЯ ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ АНТИРАБИЧЕСКОЙ ВАКЦИНЫ (КОКАВ) ____ РАЗ В ДОЗЕ 1,0 МЛ

☐ 6

5032. ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ТРОМБОТИЧЕСКОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПРИМЕНЯЮТ

☐ Дабигатрана этексилат

5033. ЛИЦАМ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ИНФИЦИРОВАНИЯ ГЕПАТИТОМ В ПОКАЗАНА ВАКЦИНАЦИЯ ПРИ УРОВНЕ ЗАЩИТНЫХ HBS-АНТИТЕЛ ОТ ____ МЕ/Л И НИЖЕ

☐ 10

5034. АНТАГОНИСТЫ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИ НАРУШЕНИИ ФУНКЦИИ ПОЧЕК С СКФ НИЖЕ (В МЛ/МИН/1,73М)

☐ 30

Блок: Блок 51 | № 5035

5035. С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ ПАССИВНОГО ИММУНИТЕТА ГЕТЕРОЛОГИЧНЫЙ АНТИРАБИЧЕСКИЙ ИММУНОГЛОБУЛИН ВВОДЯТ В ДОЗЕ МЕ НА 1 КГ МАССЫ ТЕЛА ОДНОКРАТНО

☐ 40

Блок: Блок 51 | № 5036

5036. ДОСТОВЕРНЫМ ИНТЕГРАЛЬНЫМ КРИТЕРИЕМ АКТИВНОСТИ АКРОМЕГАЛИИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ уровень инсулиноподобного фактора-1 (ИФР-1)

Блок: Блок 51 | № 5037

5037. ЭКВИВАЛЕНТОМ БОЛИ ПРИ СТЕНОКАРДИИ МОЖЕТ БЫТЬ

☐ одышка при физической нагрузке

Блок: Блок 51 | № 5038

5038. ПРИ МАНИФЕСТНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ ПОКАЗАНО НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ

☐ левотироксина в индивидуальной дозе

Блок: Блок 51 | № 5039

5039. К СРЕДСТВАМ С ИНКРЕТИНОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ ОТНОСЯТ САХАРОСНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ ГРУППЫ

☐ ингибиторов дипептидилпептидазы 4

Блок: Блок 51 | № 5040

5040. К НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ОСЛОЖНЕНИЯМ У ПАЦИЕНТА С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И АСЦИТОМ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ

☐ спонтанный бактериальный перитонит

Блок: Блок 51 | № 5041

5041. ЖИРОВАЯ ДИСТРОФИЯ ПЕЧЕНИ И СТЕАТОГЕПАТИТ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ

☐ сахарного диабета 2 типа

Блок: Блок 51 | № 5042

5042. К МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ АКТИВНОСТИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА ОТНОСЯТ

☐ инфильтрацию нейтрофилами слизистой оболочки кишки

Блок: Блок 51 | № 5043

5043. ПЕРВОЙ ЛИНИЕЙ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нейрохирургическая аденомэктомия

Блок: Блок 51 | № 5044

5044. У ПАЦИЕНТОВ С ИЗЖОГОЙ, РЕЗИСТЕНТНОЙ К ЭМПИРИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРОМ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ, ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С

☐ эзофагогастродуоденоскопии

Блок: Блок 51 | № 5045

5045. К СЕКРЕТАГОГАМ ОТНОСЯТ САХАРОСНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ ГРУППЫ

☐ производных сульфонилмочевины

Блок: Блок 51 | № 5046

5046. ПАЦИЕНТАМ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК С1-4 В КАЧЕСТВЕ ГИПОТЕНЗИВНЫХ И НЕФРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧЕНИЕ

☐ ингибиторов АПФ

Блок: Блок 51 | № 5047

5047. НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ полифекалия

Блок: Блок 51 | № 5048

5048. К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА ОТНОСЯТ

☐ рождение крупного плода в анамнезе

Блок: Блок 51 | № 5049

5049. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ стимуляция секреции инсулина

Блок: Блок 51 | № 5050

5050. ПАЦИЕНТАМ С РЕЗИСТЕНТНОЙ АГ И ХСН РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЗНАЧАТЬ

☐ спиронолактон

Блок: Блок 51 | № 5051

5051. У ПАЦИЕНТОВ С ЦЕЛИАКИЕЙ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ

☐ железодефицитная анемия

Блок: Блок 51 | № 5052

5052. ПРИ КВАШИОРКОРЕ ЧАЩЕ ВСЕГО НАБЛЮДАЮТ

☐ гипоальбуминемию

Блок: Блок 51 | № 5053

5053. ПРИ БОЛЕЗНИ КРОНА В ПРОЦЕСС ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДКА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОВЛЕКАЕТСЯ

☐ антральный отдел

Блок: Блок 51 | № 5054

5054. ПОРАЖЕНИЕМ СЕРДЦА, ТИПИЧНЫМ ДЛЯ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ продуктивный васкулит коронарных артерий

Блок: Блок 51 | № 5055

5055. ИССЛЕДОВАНИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ВНУТРИСЕКРЕТОРНУЮ ФУНКЦИЮ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ пероральный глюкозотолерантный тест

Блок: Блок 51 | № 5056

5056. ПОКАЗАНИЕМ К ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ (БА) В ОБЪЕМЕ 5 СТУПЕНИ ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ТЕЧЕНИЕ БА

☐ тяжелое

Блок: Блок 51 | № 5057

5057. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ I СТАДИИ САКРОИЛЕИТА ПРИ АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ (БОЛЕЗНИ БЕХТЕРЕВА) ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нечеткость контуров сустава

Блок: Блок 51 | № 5058

5058. РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ АНТИТЕЛА

☐ IgM, IgA, IgG изотипов, реагирующие с Fc-фрагментом IgG

Блок: Блок 51 | № 5059

5059. ОТВЕРГНУТЬ ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» ПОЗВОЛЯЕТ ОТСУТСТВИЕ ПОВЫШЕНИЯ

☐ мозгового и предсердного натрийуретических пептидов

Блок: Блок 51 | № 5060

5060. ОДНИМ ИЗ КРИТЕРИЕВ ДИАГНОСТИКИ ПЕРИКАРДИТА ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ НА ЭКГ

☐ распространенной элевации сегмента ST

Блок: Блок 51 | № 5061

5061. ХАРАКТЕРНАЯ СЕРОВАТО-КОРИЧНЕВАЯ ОКРАСКА КОЖИ ПРИ ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ОБУСЛОВЛЕНА

☐ задержкой выведения β -меланоцитостимулирующего гормона

Блок: Блок 51 | № 5062

5062. ЛЕКАРСТВЕННОЕ ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК ВЫЗЫВАЕТ

☐ острый тубулоинтерстициальный нефрит

Блок: Блок 51 | № 5063

5063. ДИАГНОЗ «ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК» УСТАНОВЛИВАЮТ, ЕСЛИ МАРКЕРЫ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПЕРСИСТИРУЮТ И БОЛЕЕ (В МЕСЯЦАХ)

☐ 3

Блок: Блок 51 | № 5064

5064. ИНСУЛИНОЗАВИСИМОЙ ТКАНЬЮ, НУЖДАЮЩЕЙСЯ В ИНСУЛИНЕ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ГЛЮКОЗЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ мышечная

Блок: Блок 51 | № 5065

5065. СНИЖЕНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОГО АД НА 20 ММ РТ. СТ. И БОЛЕЕ И/ИЛИ ДИАСТОЛИЧЕСКОГО АД НА 10 ММ РТ. СТ. И БОЛЕЕ В ПЕРВЫЕ 3 МИНУТЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ВЕРТИКАЛЬНОЕ НАЗЫВАЮТ ГИПОТЕНЗИЕЙ

☐ постуральной

Блок: Блок 51 | № 5066

5066. ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ОСТРОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ В-гемолитический стрептококк группы А

Блок: Блок 51 | № 5067

5067. ПЕТЛЕВЫЕ ДИУРЕТИКИ И АЛЬФА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ У ПОЖИЛЫХ И ОЧЕНЬ ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ УВЕЛИЧИВАЮТ РИСК

☐ падений

Блок: Блок 51 | № 5068

5068. ПАЦИЕНТАМ ОЧЕНЬ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА (>80 ЛЕТ) С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЧИНАТЬ ЛЕЧЕНИЕ С ____ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ

☐ монотерапии

Блок: Блок 51 | № 5069

5069. ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И СИМПТОМАМИ СТЕНОКАРДИИ РЕКОМЕНДОВАНЫ

☐ бета-адреноблокаторы и антагонисты кальция

Блок: Блок 51 | № 5070

5070. АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

☐ в качестве препарата резерва при резистентной гипертензии

Блок: Блок 51 | № 5071

5071. РЕЗИСТЕНТНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, КОГДА НАЗНАЧЕНИЕ ____ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВКЛЮЧАЯ ДИУРЕТИК В ОПТИМАЛЬНЫХ ДОЗАХ, НЕ ПРИВОДИТ К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

☐ 3

Блок: Блок 51 | № 5072

5072. НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ ПРИ ПЕРЕДНЕ-ПЕРЕГОРОДОЧНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕГМЕНТА ST ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В ОТВЕДЕНИИ

☐ V3

Блок: Блок 51 | № 5073

5073. К ГРУППЕ АНТАГОНИСТОВ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II ОТНОСИТСЯ

☐ валсартан

Блок: Блок 51 | № 5074

5074. ДЛЯ ДЕБЮТА РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНО ПОРАЖЕНИЕ

☐ проксимальных межфаланговых суставов кистей и пястно-фаланговых суставов

Блок: Блок 51 | № 5075

5075. МАРКЕРОМ НАРУШЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ

☐ альбумина

Блок: Блок 51 | № 5076

5076. ПРИ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ВОЗНИКШЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ АЛКОГОЛЬНОГО, НАРКОТИЧЕСКОГО ИЛИ ТОКСИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ, ВЫДАЕТСЯ

☐ листок нетрудоспособности с кодом 021

Блок: Блок 51 | № 5077

5077. ПРИ ОТСУТСТВИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ ЛИПОПРОТЕИДОВ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ НА ФОНЕ ПРИЕМА ИНГИБИТОРОВ ГМГ-КОА-РЕДУКТАЗЫ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА К ТЕРАПИИ НЕОБХОДИМО ДОБАВИТЬ

☐ эзетимиб

Блок: Блок 51 | № 5078

5078. К ЗАПРЕЩЕННЫМ КОМБИНАЦИЯМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ОТНОСИТСЯ КОМБИНАЦИЯ

☐ ингибитора ангиотензинпревращающего фермента и блокатора рецепторов ангиотензина

Блок: Блок 51 | № 5079

5079. СОЧЕТАНИЕ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРА С ____ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАПРЕЩЕННОЙ КОМБИНАЦИЕЙ

☐ недигидропиридиновым антагонистом кальция

Блок: Блок 51 | № 5080

5080. К МИКРОЦИТАРНЫМ АНЕМИЯМ ОТНОСЯТ АНЕМИЮ

☐ железодефицитную

Блок: Блок 51 | № 5081

5081. ПРИ АУСКУЛЬТАЦИИ ЛЕГКИХ ВО ВРЕМЯ ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ВЫСЛУШИВАЮТ

☐ сухие свистящие хрипы

Блок: Блок 51 | № 5082

5082. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ АНТАГОНИСТОВ АЛЬДОСТЕРОНА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ нарушение функции почек с СКФ <30 мл/мин/1,73 м²

Блок: Блок 51 | № 5083

5083. ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ПОМИМО АРНИ (АНГИОТЕНЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ И НЕПРИЛИЗИНА ИНГИБИТОР) РЕКОМЕНДОВАНЫ

☐ бета-адреноблокаторы, антагонисты минералокортикоидных рецепторов

Блок: Блок 51 | № 5084

5084. В КАЧЕСТВЕ ПРЕПАРАТОВ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПРИМЕНЯЮТ БЛОКАТОРЫ

☐ бета-адренергических рецепторов

Блок: Блок 51 | № 5085

5085. ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ПАЦИЕНТОВ НЕГРОИДНОЙ РАСЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА АНГИОНЕВРОТИЧЕСКОГО ОТЕКА ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОТДАВАТЬ

☐ блокатору рецепторов ангиотензина

Блок: Блок 51 | № 5086

5086. АНТИГИПЕРТЕНЗИВНУЮ ТЕРАПИЮ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 18-79 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧИНАТЬ ПРИ УРОВНЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (В ММ.РТ.СТ.)

☐ ≥ 140 и/или ≥ 90

Блок: Блок 51 | № 5087

5087. ПАЦИЕНТАМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ (КРОМЕ ПАЦИЕНТОВ НИЗКОГО РИСКА С АД<150/90 ММ РТ. СТ., ПАЦИЕНТОВ ≥ 80 ЛЕТ, ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ) В КАЧЕСТВЕ СТАРТОВОЙ ТЕРАПИИ РЕКОМЕНДОВАНА ____ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ

☐ сразу двойная комбинированная

Блок: Блок 51 | № 5088

5088. ЭКГ-ПРИЗНАКИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ВКЛЮЧАЮТ

☐ отсутствие зубцов Р

Блок: Блок 51 | № 5089

5089. ИНФАРКТ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НИЖНЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЫЯВЛЯЮТ В ОТВЕДЕНИЯХ

☐ V4-V6

Блок: Блок 51 | № 5090

5090. ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРАСТ ____ И СТАРШЕ

☐ 55

Блок: Блок 51 | № 5091

5091. НАЗНАЧЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА И БЛОКАТОРОВ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ ПАЦИЕНТАМ С

☐ высокой гиперкалиемией

Блок: Блок 51 | № 5092

5092. ЗАПРЕЩЕННОЙ КОМБИНАЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ АРНИ (АНГИОТЕНЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ И НЕПРИЛИЗИНА ИНГИБИТОР) С

☐ ингибитором ангиотензинпревращающего фермента

Блок: Блок 51 | № 5093

5093. У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ СТАРШЕ 80 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАЧИНАТЬ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНУЮ ТЕРАПИЮ ПРИ УРОВНЕ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ (В ММ.РТ.СТ.)

☐ ≥ 160

Блок: Блок 51 | № 5094

5094. КАКОЕ НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВОЗНИКАЕТ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ВОЛЬФА – ПАРКИНСОНА – УАЙТА?

☐ суправентрикулярная тахикардия

Блок: Блок 51 | № 5095

5095. ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ

☐ мероприятия, предупреждающие развитие осложнений и рецидивов заболеваний

Блок: Блок 51 | № 5096

5096. ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ АНТИХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ УМЕНЬШЕНИЕ

☐ частоты рецидивов

Блок: Блок 51 | № 5097

5097. ПРИ ВЫПИСЫВАНИИ ВРАЧОМ ОДНОМУ ПАЦИЕНТУ 5 И БОЛЕЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА НЕОБХОДИМО

☐ согласование с врачом-клиническим фармакологом или заведующим отделением

Блок: Блок 51 | № 5098

5098. ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЗУБЕЦ Q ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ

☐ некроза

Блок: Блок 51 | № 5099

5099. ПРИ ОДНОКРАТНОМ РАЗВИТИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ В ПЕРВЫЕ СУТКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ПАЦИЕНТУ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РЕЦИДИВОВ АРИТМИИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВЕДЕНИЕ

☐ β -адреноблокаторов

Блок: Блок 51 | № 5100

5100. ПРИЧИНОЙ ОБРАТИМОЙ ОБСТРУКЦИИ БРОНХОВ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ бронхоспазм

Блок: Блок 51 | №

. НАЧИНАТЬ С

☐ эзофагогастродуоденоскопии

Блок 52 37

Блок: Блок 52 37 | № 5101

5101. ОЧЕНЬ БЫСТРОЕ ПОВТОРНОЕ НАКОПЛЕНИЕ ЭКССУДАТА В ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ТИПИЧНЫМ ПРИЗНАКОМ

☐ мезотелиомы плевры

Блок: Блок 52 37 | № 5102

5102. У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 65 ЛЕТ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА ЦЕЛЕВЫМ УРОВНЕМ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ (В ММ РТ. СТ)

☐ 135

Блок: Блок 52 37 | № 5103

5103. ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЕЧЕНОЧНОЙ КОМЫ В ДИЕТЕ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ

☐ белки

Блок: Блок 52 37 | № 5104

5104. В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ С ПОКАЗАТЕЛЕМ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 40 И БОЛЕЕ СЛУЧАЕВ НА 100 ТЫСЯЧ НАСЕЛЕНИЯ В ГОД ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ НАСЕЛЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДЯТСЯ

☐ 1 раз в год

Блок: Блок 52 37 | № 5105

5105. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТЕНЗИИ У БЕРЕМЕННЫХ ПРИМЕНЯЮТ

☐ метилдопу

Блок: Блок 52 37 | № 5106

5106. ПОРАЖЕНИЕ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

☐ иммунокомплексным типом повреждения

Блок: Блок 52 37 | № 5107

5107. НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ МИТРАЛЬНОГО СТЕНОЗА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ревматизм

Блок: Блок 52 37 | № 5108

5108. РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ наличие эрозии

Блок: Блок 52 37 | № 5109

5109. ФОНД ОМС ФОРМИРУЕТСЯ ЗА СЧЁТ

☐ страховых взносов на обязательное медицинское страхование

Блок: Блок 52 37 | № 5110

5110. ПРИ ПОВЫШЕННОМ СОДЕРЖАНИИ РЕНИНА УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ

☐ ангиотензина I

Блок: Блок 52 37 | № 5111

5111. СЕЗОННУЮ ИММУНОПРОФИЛАКТИКУ ГРИППА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАКОНЧИТЬ НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА _____ ДО НАЧАЛА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО СЕЗОНА

☐ 2-3 недели

Блок: Блок 52 37 | № 5112

5112. ОСНОВНЫМИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ЯВЛЯЮТСЯ

☐ глюкокортикоиды

Блок: Блок 52 37 | № 5113

5113. ДОСТОВЕРНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ДЕСТРУКЦИИ ТКАНИ ЛЕГКОГО ОБНАРУЖЕНИЕ В МОКРОТЕ

☐ эластических волокон

Блок: Блок 52 37 | № 5114

5114. ТИАЗИДНЫЕ ДИУРЕТИКИ СТАНОВЯТСЯ НЕЭФФЕКТИВНЫМИ ПРИ СКФ МЕНЕЕ _____ МЛ/МИН/1.73 М2

☐ 30

Блок: Блок 52 37 | № 5115

5115. ДЛЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ ЦЕЛИАКИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОПРЕДЕЛЯЮТ УРОВЕНЬ

☐ антител к тканевой трансглутаминазе в крови

Блок: Блок 52 37 | № 5116

5116. СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ЭКСПЕРТОВ РОССИЙСКОГО КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 1 СТАДИЮ ХСН ХАРАКТЕРИЗУЮТ

☐ наличием симптомов и признаков ХСН в настоящем или прошлом, вызванных нарушением структуры и/или функции сердца

Блок: Блок 52 37 | № 5117

5117. ДЛЯ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЫ ХАРАКТЕРНО ПОЯВЛЕНИЕ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

☐ парапротеина

Блок: Блок 52 37 | № 5118

5118. СТЕРНАЛЬНАЯ ПУНКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ПРИ

☐ гемолитической анемии

Блок: Блок 52 37 | № 5119

5119. ВОЗМОЖНЫМ ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ ПСЕВДОМЕМБРАНОЗНОГО КОЛИТА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ *Enterococcus faecalis*

5120. ИНГИБИТОРЫ АНГИОТЕНЗИН ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА АБСОЛЮТНО ПРОТИВОПОКАЗАНЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У

☐ женщин в период беременности и лактации

5121. ЕСЛИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ВАРФАРИНОМ У БОЛЬНОГО С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРОТЕЗОМ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА УРОВЕНЬ МНО ПРИ КОНТРОЛЬНОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 3.0, ТО РАЦИОНАЛЬНОЙ ТАКТИКОЙ В ДАННОМ СЛУЧАЕ БУДЕТ

☐ пропуск 2-х приемов препарата

5122. СХЕМА ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИИ H. PYLORI ПРИ ГАСТРИТЕ ВКЛЮЧАЕТ

☐ ингибиторы протонной помпы

5123. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ АПФ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ ангионевротический отек в анамнезе

5124. ДЛЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ХАРАКТЕРНО

☐ развитие заболевания после длительного периода латентного железодефицита

5125. ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ЛЕЧЕНИЯ ХОЛЕРЫ, НАРАДУ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ регидратация

5126. НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНОЙ ТАКТИКОЙ ЛЕЧЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ НИЖНЕМ ТРАНСМУРАЛЬНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА, ОСЛОЖНИВШИМСЯ ПОЛНОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОЙ БЛОКАДОЙ С СОХРАНЕНИЕМ ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ СОКРАЩЕНИЙ 24 В МИНУТУ, ЯВЛЯЕТСЯ

☐ временная электрокардиостимуляция

5127. ОСНОВНЫМИ СИНДРОМАМИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ЗАПОДОЗРИТЬ ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ, ЯВЛЯЮТСЯ: ИНТОКСИКАЦИОННЫЙ

☐ гепатолиенальный и полилимфаденопатия

5128. ОДНИМ ИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ FACIES NEFRITICA ЯВЛЯЕТСЯ

☐ параорбитальный отек

5129. К АССОЦИИРОВАННЫМ КЛИНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЯМ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ОТНОСЯТ

☐ ХБП с рСКФ < 30мл/мин/1,73 м² или протеинурию > 300 мг в сутки

5130. ВЫЯВЛЕНИЕ У БОЛЬНОГО ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА 42% ПОЗВОЛЯЕТ ДИАГНОСТИРОВАТЬ ХСН С ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА

☐ умеренной сниженной

5131. СДВИГ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ ВЛЕВО ЯВЛЯЕТСЯ ХАРАКТЕРНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ

☐ септического состояния

5132. ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПРЕДПОЧТЕНИЕ СЛЕДУЕТ ОТДАВАТЬ

☐ прямым оральным антикоагулянтам

5133. ОДНИМ ИЗ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МАССАЖА ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ неврит лицевого нерва

5134. ОСЛОЖНЕНИЕМ ДИВЕРТИКУЛЯРНОЙ БОЛЕЗНИ КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЕТСЯ

☐ паракишечный инфильтрат

5135. ОДНИМ ИЗ МОДИФИЦИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

☐ курение

5136. УСИЛЕНИЕ БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА И ЕЕ ОСЛАБЛЕНИЕ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ТЕЛА ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

☐ гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

5137. ФАКТОРЫ, ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К ТЯЖЕЛОМУ ТЕЧЕНИЮ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19, ВКЛЮЧАЮТ: ВОЗРАСТ

☐ сахарный диабет, ожирение

Контроль качества

Всего вопросов: 5140

На проверку: 0