

Дозировки лекарств

veterinarka.ru/for-vet/dozirovki-lekarstv.html

Дозировки лекарственных препаратов для собак, кошек, хорьков, птиц, применяемых в ветеринарии.

Сокращения:

в/в - внутривенно; **п/к** - подкожно; **в/м** - внутримышечно; **п/о** - перорально; **г/кг** - грамм на килограмм веса животного; **мг/кг** - количество миллиграммов действующего вещества на 1 килограмм веса животного; **мкг/кг** - микрограммов на килограмм веса животного; **мл/кг** - миллилитров на килограмм веса животного.

(!) - важная информация

Действующее вещество	Название препарата	Форма выпуска	Область применения	Дозы	Кс
Аглепристон	<u>Ализин</u>	Инъекционный раствор 30 мг в 1 мл	Нежелательная беременность, терапевтическое лечение пиометры	<p>Собаки: 1. Прерывание беременности - 10 мг/кг п/к с интервалом 24 часа двукратно. 2. Лечение пиометры - 10 мг/кг п/к в 1-й, 2-й и 7-й день. Дополнительно можно в 14 и 21 день при неудовлетворительном ответе.</p> <p>Кошки: 1. Прерывание беременности - 15 мг/кг п/к с интервалом 24 ч двукратно. 2. Лечение пиометры - 15 мг/кг п/к в 1-й, 2-й и 7-й день. Дополнительно можно в 14 и 21 день при неудовлетворительном ответе. 3. Фиброаденоматозная гиперплазия - 20 мг/кг п/к один раз в 7 дней.</p>	Ср пр со щк де сп
Адеметионин (S-аденозилметионин)	Гептрал Гептор	Таблетки по 400, 500 мг, порошок для приготовления раствора 500 мг/фл	Дополнительная терапия при заболеваниях печени	Собаки, кошки: 20 мг/кг п/о, в/в с интервалом 24 часа	Игра пр не бо
Адреналин (Эпинефрин)	Адреналин Эпинефрин	Инъекционный раствор по 1 мг в мл и по 1,8 мг в мл	При реанимации, тяжелых случаях аллергических реакций, при астматическом статусе	Собаки, кошки: 20 мкг/кг, лучше в разведенном виде в соотношении 1:10000. Вводить в/в, можно внутрикостно и внутритрахеально, но в более высоких дозах	(!) до до вв ин ми не
Азитромицин	Зитромакс Азиклар Сумалек Сумамед	Таблетки и капсулы по 125, 250, 500 мг, суспензия пероральная 20 и 40 мг/мл	Макролидный антибиотик. Широкий спектр антимикробного действия	<p>Собаки: 5-10 мг/кг п/о с интервалом 24 часа. После 3-5 дней лечения можно увеличить интервал приема до 48 часов.</p> <p>Кошки: 5-10 мг/кг с интервалом 24 часа.</p>	
Активированный уголь		Таблетки по 250 мг	Адсорбент. Применяется при различных отравлениях	Собаки, кошки: 0,5-4 г/кг п/о в суспензии через зонд	
Аллопуринол	Зилорик	Таблетки 100, 300 мг	Ингибитор фермента ксантиноксидазы. Растворение и предупреждение образования уратных камней у собак	<p>Собаки: - при уратном уролитиазе - 10 мг/кг п/о с интервалом 8 часов на 1 месяц, потом 10-15 мг/кг с интервалом 12 часов. - при лейшманиозе - 10 мг/кг п/о с интервалом 12 часов на 6-12 мес совместно с другими препаратами.</p>	Оф фк оя ко пу во об кс: ка

Алюминия гидроксид гидрат (Алгелдрат) + Магния гидроксид	Альмагель Маалокс Альмокс	Суспензия для перорального применения, 218 мг алюминия оксида + 75 мг магния оксида в 5 мл суспензии	Антацидный препарат. Применяется как фосфатбиндер при ХПН, при гастритах и язвах желудка	Собаки, кошки: стартово 10-30 мг/кг с интервалом 6-8 ч или 0,5-1 мл/кг п/о с едой или сразу после еды. Дозы эмпирические.	
Амикацин		Инъекционный раствор 250 мг/мл	Антибиотик группы аминогликозидов. При инфекционных заболеваниях, вызванных чувствительными бактериями	Собаки: 15-30 мг/кг в/в, в/м, п/к с интервалом 24 часа. Кошки: 10-15 мг/кг в/в, в/м, п/к с интервалом 24 часа.	Не от
Амиодарон	Амиодарон Кордарон	Таблетки 100, 200 мг	Антиаритмический препарат. Лечение желудочковых и суправентрикулярных аритмий	Собаки: перорально 10-15 мг/кг с интервалом 12 часов на 7 дней, потом 5-7,5 мг/кг п/о с интервалом 12 часов на 14 дней, дальше 5-7,5 мг/кг с интервалом 24 часа	
Амитраз	Промерис дуо	Спот-он, а также жидкости с разной концентрацией действующего вещества	Противопаразитарный препарат. Активен против блох, демодекоза, саркоптоза	Собаки: генерализованный демодекоз - 0,05% раствор с интервалом 5-7 дней до 2 негативных соскобов, саркоптоз - 0,025% раствор еженедельно на 2-6 недель	
Амитриптилин		Таблетки по 10, 25 мг, раствор по 5 и 10 мг/мл	Трициклический антидепрессант. Для контроля компульсивных расстройств, гипервозбуждения, при идиопатическом цистите кошек, психогенных алопециях	Собаки: 1-2 мг/кг п/о с интервалом 12-24 часа. Кошки: 0,5-1 мг/кг п/о с интервалом 24 часа	
Амлодипин	Норваск, Амлотоп	Таблетки по 5, 10 мг	Блокатор кальциевых каналов. Лечение системной гипертензии у кошек, может использоваться у собак	Собаки: стартовая 0,05-0,1 мг/кг п/о с интервалом 12-24 часа. Дальше доза может меняться еженедельно, в зависимости от состояния, до 0,4 мг/кг. Кошки: 0,625-1,25 мг/кошку п/о с интервалом 24 часа. Доза может быть медленно повышена, или увеличена частота дачи препарата в два раза.	(!) ко да
Амоброксол	Лазолван, Халиксол, Амбровикс	Сироп 15мг/5 мл, 30 мг/5 мл, таблетки по 30 мг	Муколитик. Отхаркивающий препарат. Заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты	Собаки, кошки: 0,5 мг/кг с интервалом 12 часов п/о после еды.	
Амоксициллин	<u>Кламоксил ЛА</u> , <u>Бетамокс ЛА</u> , <u>Амоксициллин 15%</u> , <u>Амоксиол Ретард</u> , <u>Амоксилонг 150 ЛА</u> , <u>Амоксимаг</u> , <u>Амоксисан</u> , <u>Ветримоксин Л.А.</u>	Таблетки и капсулы по 250, 500, 1000 мг. Инъекционный раствор 150 мг/мл. Инъекционные в основном в виде амоксициллина тригидрата, пролонгированной формы	Антибиотик. Активен против ряда грамположительных и грамотрицательных аэробных организмов и многих облигатных анаэробов, но не действует на бактерии, продуцирующие β-лактамазу.	Собаки, кошки: 7 мг/кг в/м с интервалом 24 часа, или 15 мг/кг с интервалом 48 часов (для пролонгированных препаратов). Перорально: 10 мг/кг с интервалом 8-12 часов. Хорьки: 10-30 мг/кг п/к, п/о с интервалом 12 часов.	Дс из за со жи тя ин пр
Амоксициллин + клавулановая кислота	<u>Синулокс</u> , <u>Синулокс таблетки</u> , <u>Амоксигард</u> , <u>Клавасептин</u> , <u>Амоксиклав</u> , <u>Флемоклав</u> <u>солютаб</u> , <u>Аугментин</u>	Инъекционная суспензия, 140 мг в 1 мл. Таблетки ветеринарные 50, 250, 500 мг (соотношение амоксициллина и клавулановой кислоты 4:1). Медицинские аналоги в таблетках 250/125, 500/125, 875/125 мг. Порошки для в/в введения.	Антибиотик. Широкий спектр бактерицидной активности в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу.	Собаки, кошки: парентерально 8,75 мг/кг. в/в с интервалом 8 часов, в/м, п/к - с интервалом 24 часа. Перорально 12,5-25 мг/кг с интервалом 8-12 часов. Хорьки: 12,5-20 мг/кг в/м, п/к с интервалом 12 часов.	Де до пе до ин дл ме

Ампициллин		Таблетки, капсулы по 250 мг. Порошок для инъекций 1000 мг во флаконе.	Антибиотик пенициллинового ряда. При инфекционных заболеваниях, вызванных чувствительными бактериями. Не действует на бактерии, продуцирующие β-лактамазу.	Собаки: Обычные инфекции - 10-20 мг/кг в/в, в/м, п/к п/о с интервалом 6-8 часов. Тяжелые бактериальные инфекции или с поражением ЦНС - до 40 мг/кг в/в с интервалом 6 часов. Кошки: 10-20 мг/кг в/в, в/м, п/к , п/о с интервалом 6-8 часов.	
Аргинин	L-аргинин	Различные варианты таблеток и порошков	Аминокислота. При заболеваниях печени у кошек, особенно печеночном липидозе, в качестве добавки к диете.	Кошки: 1000 мг на кошку п/о с интервалом 24 часа.	
Аскорбиновая кислота	Витамин С	Инъекционный раствор по 50 мг/ мл, 100 мг/мл, различные варианты таблеток, драже и порошков.	Витамины. Метгемоглобинемия из-за отравления парацетамолом. Возможно кратковременное использование для кахексичных пациентов. В основном используется для морских свинок.	Собаки, кошки: метгемоглобинемия - 30-40 мг/кг п/к с интервалом 6 часов, на 7 введений. Кролики: 50-100 мг/кг с интервалом 12 часов. Морские свинки: суточная потребность 10-30 мг/кг или 200-400 мг/литр питьевой воды. При гиповитаминозе С - 100-200 мг/кг п/о с интервалом 24 часа.	Ко си ви са от св
Атипамезол	<u>Антиседан.</u> <u>Антимедин.</u> <u>Алзан</u>	Инъекционный раствор, 5мг/мл	Селективный антагонист α2-адренорецепторов. Устранение действия медетомидина, дексмедетомидина.	Собаки: доза атипамезола в мл равна дозе дексдомитора/медетомидина (если после введения медетомидина/дексдомитора прошел как минимум час, можно ввести половинный объем). Кошки: доза атипамезола в мл равна половине дозы дексдомитора/медетомидина.	
Атропин	Атропина сульфат	Инъекционный раствор, 1 мг/мл, капли глазные 1%	Предупреждение и контроль брадикардии и брадиаритмии. Для расширения зрачка. При отравлении органофосфатами и карбатами.	Собаки, кошки: - Брадиаритмия - 0,01-0,03 мг/кг в/в. - Отравление органофосфатами - 0,2-0,5 мг/кг (1/4 дозы в/в, 3/4 в/м, п/к) до эффекта. Повторить при необходимости. Или 0,1-0,2 мг/кг (1/2 в/в и 1/2 в/м), потом в/м с интервалом 6 часов. Хорьки: 0,04 мг/кг п/к, в/м, в/в.	
Афоксоланер	<u>Фронтлайн</u> <u>Нексгард</u>	Жевательные таблетки, в 1 таблетке 11,3 мг; 28,3 мг; 68 мг и 136 мг	Противопаразитарный препарат. Спектр действия включает иксодовых клещей, блох, клещей Demodex, Otodectes, Sarcoptes.	Собаки: минимальная доза 2,5 мг/кг 1 раз в месяц.	Вь та ве кг.
Афоксоланер + мильбемицина оксим	<u>Нексгард</u> <u>Спектра</u>	Жевательные таблетки, в 1 таблетке (афоксоланер+мильбемицин) 9,4 мг+1,9 мг; 18,8мг + 3,8 мг; 37,5 мг + 7,5 мг; 75 мг + 15 мг; 150 мг + 30 мг.	Комбинированный противопаразитарный препарат. См выше + действует на нематод и личинок диروفиларий (Dirofilaria immitis).	Собаки: минимальная доза 2,5 мг/кг по афоксоланеру + 0,5 мг/кг по мильбемицину 1 раз в месяц.	Вь та ве 7,! 15 кг.

Ацепромазин	<u>Ветранквил</u>	Инъекционный раствор 10 мг/мл, таблетки по 10,25 мг.	Производное фенотиазина с угнетающим эффектом на ЦНС. Для седации или премедикации.	Собаки, кошки: 0,01-0,02 мг/кг медленно в/в; 0,01-0,05 мг/кг в/м, п/к; 1-3 мг/кг п/о. Хорьки: 0,2-0,5 мг/кг в/м, п/к, п/о. Кролики: 0,1-1 мг/кг в/м, п/к. Морские свинки: 2,5-5 мг/кг в/м, п/к, п/о.	
Бромгексин	Бромгексин	Таблетки по 4 и 8 мг, капли для приема внутрь 8 мг/1 мл	Муколитик. Отхаркивающий препарат. Заболевания дыхательных путей с выделением вязкой мокроты	Собаки: 2 мг/кг п/о с интервалом 12 часов. Кошки: 1 мг/кг п/о с интервалом 24 часа.	
Ванкомицин	Ванкомицин	Порошок для приготовления раствора для инъекций по 500 мг и 1000 мг.	Антибиотик. При тяжелых, не поддающихся лечению инфекциях.	Собаки: 15 мг/кг в/в с интервалом 6-8 часов. Кошки: 12-15 мг/кг с интервалом 8 часов.	Ан-ре
Винбластин	Винбластин	Инъекционный раствор по 1 мг в мл	Цитостатический препарат. При лимфопролиферативных заболеваниях.	Собаки, кошки: 2-2,5 мг/м2 с интервалом 7-14 дней.	
Винкристин	Винкристин	Лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, раствор для внутривенного введения по 1, 2 и 5 мг.	Цитостатический препарат. Трансмиссивная венерическая саркома (ТВС), при ряде онкологических заболеваний.	Собаки, кошки: 1. Трансмиссивная венерическая саркома - 0,025 мг/кг в/в с интервалом 7 дней на 4 недели. 2. Другие неопластические заболевания - 0,5-0,75 мг/м2	
Витамин В ₁	Тиамин	Инъекционный раствор по 50 мг в мл.	При дефиците В ₁ , может использоваться дополнительно при лечении отравления этиленгликолем и свинцом.	Собаки: 1. Дефицит тиамина - 50-250 мг на собаку в/м, п/к, п/о с интервалом 12-24 часа. 2. При отравлении свинцом - 2 мг/кг в/м, п/к с интервалом 12 часов. 3. Отравление этиленгликолем - 100 мг на собаку в/м, п/к, п/о с интервалом 24 часа. Кошки: 1. Дефицит В ₁ - 10-25 мг на кошку в/м, п/к, п/о с интервалом 12-24 часа. 2. При отравлении свинцом - 2 мг/кг в/м, п/к с интервалом 12 часов. 3. Отравление этиленгликолем - 100мг на кошку в/м, п/к, п/о с интервалом 24 часа. Птицы: 10-30 мг/кг в/м с интервалом 24 часа.	
Витамин В ₆	Пиридоксин	Раствор в ампулах по 1 мл, 10 или 50 мг/мл для инъекций.	Витамин. При отравлении животного изониазидом.	Собаки: 71мг/кг в/в в течении 30-60 минут (если не известно количество съеденного изониазида). Или, если известно, в соотношении 1 мг изониазида к 1 мг пиридоксина. После введения В ₆ до прекращения судорог проходит 10-20 минут. Слабость в течении 1-1,5 суток после отравления.	

Витамин В ₁₂	Цианокобаламин	Инъекционный раствор по 0,5 мг в 1 мл.	Дефицит В ₁₂ , особенно связанный с заболеваниями кишечника. В составе комплексной терапии при железодефицитной и постгеморрагической анемии.	Собаки: 0,25-1 мг на собаку п/к, в/м с интервалом 7 дней в течение 4 недель. Кошки: 0,125-0,25мг на кошку п/к в/м с интервалом 7 дней в течение 4-6 недель.	
Витамин К ₁	Фитоменадион, Конакион, К-инжект	Раствор инъекционный 10 мг в 1 мл, таблетки по 50 мг	Витамин. При отравлении животного зоокумаридами, проблемах со свертываемостью крови, дефиците витамина К ₁	Собаки, кошки: 1. Отравление зоокумаридами 1-го поколения, дефиците витамина К ₁ - стартовая 2,5 мг/кг п/к, в/м, потом 1-2,5 мг/кг, разделяя дозу на несколько приемов п/о с интервалом 8-12 часов на 5-7 дней. 2. Отравление зоокумаридами 2-го поколения - стартовая 5 мг/кг п/к, в/м, потом 2,5 мг/кг п/о с интервалом 12 часов на 3 недели, потом оценить коагуляционный статус. 3. Отравление неизвестным зоокумарином - стартовая 2,5-5 мг/кг п/к, в/м, потом 2,5 мг/кг, разделяя на несколько приемов п/о с интервалом 8-12 часов на 3-4 недели.	Перед приемом
Габапентин	Габагамма, Тебантин	Капсулы по 100, 300 и 400 мг	Противосудорожный препарат. В комплексной терапии при судорогах, при нейропатической боли	Собаки: 10-60 мг/кг/день п/о, деля суточную дозу на интервал 8-12 часов. Кошки: 5-10 мг/кг п/о с интервалом 8-12 часов.	
Дексаметазон	<u>Дексакел 02</u> , Дексаметазон д/инъекций, Дексаметазон, <u>Дексаметазон 2 мг/см³</u>	Инъекционный раствор, таблетки	Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, глюкокортикоидное действие. Используют в терапии заболеваний, где требуются ГКС. Более сильный эффект, чем у преднизолона.	Собаки, кошки: 1. Противовоспалительное - 0,01-0,16 мг/кг в/м, п/к, п/о с интервалом 24 часа. 2. Анафилаксия - 0,5 мг/кг в/в. 3. Иммуносупрессия 0,3-0,64 мг/кг в/м ,п/к, п/о с интервалом 24 часа.	
Дексаметазон пролонгированного действия	<u>Дексафорт</u>	Раствор для инъекций, в 1 мл содержит 2,67 мг дексаметазона фенилпропионата и 1,32 мг дексаметазона натрий-фосфата.	Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, глюкокортикоидное действие. Используют в терапии заболеваний, где требуются ГКС. Более сильный эффект, чем у преднизолона. Действует длительно (до 7 дней).	Собаки - 0,5-1 мл, кошки - 0,25-0,5 мл на одно животное.	

Дексмететомидин	<u>Дексдомитор</u>	Инъекционный раствор 0,1 и 0,5 мг в 1 мл	α2-адреномиметик. Для седации и премедикации	Собаки, кошки: 3-5 мкг/кг в/в, в/м, п/к	От дл се эф ан со де 0,; пр сл со мл ко ме пр со де 0,; сл со мл ко ме
Денаверина гидрохлорид	<u>Сенсиблекс Вейкс</u>	Раствор 40 мг/мл, во флаконах разного объема	Антиспазматическое средство. Оказывает расслабляющее действие на гладкую мускулатуру шейки матки и способствует увеличению эластичности родовых путей. Назначают для регуляции родового процесса у коров и собак.	Средним и крупным собакам: 0,5-1,5 мл на одно животное (20-60 мг денаверина гидрохлорида) Мелким собакам: 0,3 - 0,5 мл на суку (чихуахуа, йоркширский терьер, той-терьер)	
Диазепам	Реланиум, Релиум, Валиум, Седуксен	Инъекционный раствор 5 мг/мл, таблетки по 5, 10 мг, свечи ректальные по 5, 10 мг.	Транквилизатор. Антikonвульсант, анксиолитик, миорелаксант. Для быстрого контроля тяжелых судорог у животных.	Собаки: 1. Как анксиолитик - 0,5-2 мг/кг п/о с интервалом 8 часов. 2. Седация и премедикация - 0,2-0,5 мг/кг в/в, в/м. 3. Расслабление скелетной мускулатуры 2-10 мг на собаку п/о с интервалом 8-12 часов. 4. Срочный контроль судорог - 0,5-1 мг/кг в/в или ректально. Кошки: 1. Как анксиолитик - 0,2-0,4 мг/кг п/о с интервалом 8 часов. 2. Как стимулятор аппетита - 0,5-1 мг/кг в/в однократно. 3. Срочный контроль судорог - 0,5-1 мг/кг в/в или ректально. 4. Изменение поведения для контроля мечения и мышечная релаксация - 1,25-5 мг/кошку п/о с интервалом 8 часов.	
Димедрол (дифенгидрамин гидрохлорид)	Аллервет	Аллервет раствор инъекционный 1 и 10% (10 и 100 мг/мл) - флаконы 50 мл, димедрол 1% (10мг/мл) в ампулах по 1 мл.	Антигистаминное. Блокатор H1-гистаминовых рецепторов. Легкий седативный эффект, незначительное подавление зуда.	Собаки: - для легкого седативного эффекта - 2-4 мг/кг с интервалом 6-8 часов; - подавление зуда -1-2 мг/кг с интервалом 8-12 часов п/о, п/к, в/м. Кошки: 2-4 мг/кг с интервалом 6-8 часов п/о, п/к, в/м. Птицы: 2-4 мг/кг п/о, с интервалом 12 часов.	

Доксициклин	Доксициклина гидрохлорид, Доксициклина моногидрат, Юнидокс, Вибрамицин	Капсулы по 100 мг. Таблетки по 100 мг.	Антибиотик тетрациклиновой группы. Широкий спектр антибактериальной активности. Действует на риккетсии, микоплазмы, хламидии.	Собаки, кошки: 10 мг/кг п/о с интервалом 24 часа или 5 мг/кг п/о с интервалом 12 часов вместе с едой.	(!) эз ос не пр
Допамин	Допамин	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 40 мг/мл.	Дофаминомиметик. Улучшение гемодинамического статуса. Используется при лечении шока, острой сердечной недостаточности, для поддержки кровяного давления во время анестезии.	Собаки: 2-10 мкг/кг/мин в/в как ИПС. Кошки: 1-5 мкг/кг/мин в/в как ИПС.	(!) вн Пс ра ок тк не
Дротаверина гидрохлорид	Дротаверина гидрохлорид, Но-шпа	Таблетки по 20, 40 и 80 мг. Инъекционный раствор 20 мг/мл.	Спазмолитик	Собаки, кошки: 1-2 мг/кг в/м с интервалом 24 часа.	Дс эм Пс ис со ко
Ивермектин	<u>Ивермек</u> , <u>Ивомек</u> , <u>Новомек</u> , <u>Баймек</u> , <u>Ганамектин</u> , <u>Ивермаг</u> , <u>Ивертин</u>	Инъекционный раствор 1%, 10 мг в 1 мл.	Противопаразитарный препарат. Активен в отношении клещей демодекс, саркоптез, нотоэдрез, отодекес, против хейлетиелл. Также действует на круглых гельминтов. Используется в лечении экто- и эндопаразитов у мелких млекопитающих и птиц.	Собаки: 0,3-0,6 мг/кг п/о ежедневно, длительно (демодекоз). 0,2-0,4 мг/кг п/о, п/к каждые 2 недели в течении 4-6 недель (саркоптоз, отодектоз). Кошки: 0,2-0,3 мг/кг п/к каждые 2 недели в течение 6-8 нед (нотоздроз, отодектоз). Мелкие млекопитающие: 0,2-0,5 мг/кг п/к, п/о с интервалом 7-14 дней. Птицы: 0,2 мг/кг в/м, п/к, п/о с интервалом 7-14 дней. Можно топикально, см. комментарии.	(!) чу по шк Пг ив то ос ми мг от ва Пт на на за че мг 0,(пр ил от ин дн
Имидкарб	<u>Фортикарб</u> , <u>Пиро-стоп</u> , <u>Бабезан</u> , <u>Имидосан</u> , <u>Дипрокарб</u>	Инъекционный раствор по 50 мг/мл, 100 мг/мл, 120 мг/мл	При бабезиозе (пироплазмозе), анаплазмозе	Собаки: 6,6 мг/кг в/м, п/к однократно, можно повторить через 2-3 недели.	Не Ве Дг за то пр не ин
Имипинем	Имипинем, Тиенам	Порошок инъекционный 500 мг	Широкий спектр антимикробного действия	Собаки, кошки: 5-10 мг/кг в/в с интервалом 8 часов.	(!) гр
Итраконазол	Орунгал, Текназол, Микотрокс	Капсулы по 100 мг, раствор для приема внутрь 10 мг в 1 мл	Производное триазола, синтетическое противогрибковое средство. Широкий спектр противогрибковой активности.	Собаки, кошки: 5 мг/кг, п/о, с интервалом 24 часа. Хорьки (дерматофития): 15 мг/кг или 25-33 мг на хорька п/о с интервалом 24 часа. Морские свинки: 5 мг/кг п/о с интервалом 24 часа. Кролики: 10 мг/кг п/о с интервалом 24 часа.	

Каберголин	<u>Галастоп</u> , <u>Лакто-стоп</u>	Раствор для перорального применения. В 1 мл 50 мкг каберголина.	Ингибитор пролактина. Контроль ложной щенности у сук, индукция эструса. Может использоваться для вызывания аборта у сук.	Собаки: - Ложная щенность - 5 мкг/кг п/о с интервалом 24 часа в течение 4-6 дней. - Для вызова аборта - 15 мкг/кг п/о между 30 и 42 днем щенности. Кошки: - Для вызова аборта - 15 мкг/кг п/о между 30 и 42 днем беременности.	Ес да ра ос ла те
Кальция соли	Борглюконат, карбонат, хлорид и проч.	Различные варианты в таблетках. Кальция хлорид и кальция глюконат растворы 10% - 100мг/мл. Кальция борглюконат - раствор 20% - по 200 мг/мл.	Микроэлементы. При послеродовой эклампсии и других состояниях с гипокальциемией.	Собаки: парентерально 50-150 мг кальция глюконата/кг медленно в/в в течении 20-30 мин (при использовании 10% раствора эквивалентно 0,5-1,5 мл/кг). Альтернатива - кальция хлорид, 5-10 мг/кг или 0,05-0,1мл/кг. Перорально 5-22мг/кг по кальцию п/о каждые 8 часов. Кошки: парентерально 95-140 мг кальция глюконата/кг медленно в/в (при использовании 10% раствора глюконата или борглюконата эквивалентно 1-1,5 мл/кг). Перорально: 10-20 мг по кальцию на кг п/о каждые 6-8 часов. Птицы: при гипокальциемии - 5-10 мг/кг кальция глюконата в/м каждые 12 часов.	(!) вв бр мс ос
Карбимазол	Видалта	Таблетки по 10, 15 мг.	Антитиреоидный препарат. При гипертиреозе у собак и кошек.	Собаки, кошки: стартово 15 мг/животное п/о с интервалом 24 часа, пока уровень концентрации тироксина не станет меньше 100 нмоль/л. Затем доза снижается до 10 мг на животное п/о с интервалом 24 часа. Далее поддерживающая доза 5 мг в сутки.	
Карпрофен	<u>Римадил</u> , <u>Карпродил</u> , <u>Рикарфа</u>	Инъекционный 5% раствор, 50 мг в 1 мл. Таблетки 20, 50, 100 мг.	НПВС. Противовоспалительный, анальгезирующий, жаропонижающий эффект.	Собаки: 4 мг/кг/день в/в, п/к, п/о. Рекомендуется разделить суточную дозу на 2 равные части. После 7 дней лечения, в зависимости от клинических показаний, суточную дозу можно уменьшить до 2 мг/кг массы тела. Кошки: 4 мг/кг в/в, п/к. Рекомендуется однократное введение.	

Кетопрофен	<u>Флекспрофен</u> , <u>Кетофен</u> , <u>Айнил</u> , <u>Кетоджект</u> , <u>Кетоквин</u>	Инъекционный 1% раствор 10 мг/мл; 2,5% - 25 мг/мл; 5% - 50 мг/мл, 10% - 100мг/мл. Таблетки по 5 мг, 20 мг.	НПВС. Противовоспалительный, анальгезирующий, жаропонижающий эффект.	Собаки: 2 мг/кг п/к, в/в, в/м с интервалом 24 часа, до 3 дней; 1 мг/кг п/о с интервалом 24 часа до 5 дней. Кошки: 2 мг/кг п/к с интервалом 24 часа до 3 дней; 1 мг/кг п/о с интервалом 24 часа до 5 дней. Хорьки: 1 мг/кг п/к, в/м, п/о с интервалом 24 часа. Кролики: 1-3 мг/кг п/к, в/м с интервалом 24 часа.	Пс ин мс пр ор пр ке до ра 3-
Клемастин	Тавегил	Таблетки по 1 мг, раствор инъекционный 0,1% - 1 мг в мл.	Антигистаминное. Иногда используется при контроле аллергических заболеваний.	Собаки: 0,05-0,1 мг/кг п/о с интервалом 12 часов. Кошки: 0,1 мг/кг п/о с интервалом 12 часов.	
Клиндамицин	Клиндамицин, Далацин Ц, Клиндацил, Клиндасептин	Капсулы 150, 300 мг. Раствор для инъекций, 150 мг/мл.	Антибиотик группы линкозамидов. Инфекции, чувствительные к данному антибиотику. Больше грамположительный спектр, действует на микоплазмы и токсоплазмы.	Собаки: 5,5 мг/кг п/о с интервалом 12 часов или 11 мг/кг с интервалом 24 часа. В случаях тяжелых инфекций можно увеличить до 11 мг/кг с интервалом 12 часов. При токсоплазмозе: 25 мг/кг/сутки п/о, в несколько приемов. Кошки: 5,5 мг/кг п/о с интервалом 12 часов или 11 мг/кг с интервалом 24 часа. При токсоплазмозе: 25 мг/кг/сутки п/о, в несколько приемов.	Де до ин ча
Клоназепам	Клоназепам, Клонекс, Антелепсин, Клонопин	Таблетки по 0,25, 0,5, 1 и 2 мг	Производное бензодиазепина. Противосудорожный, анксиолитический эффект, миорелаксант.	Собаки: 0,5 мг/кг п/о с интервалом 8-12 часов. Кошки: 0,5 мг/кг п/о с интервалом 12-24 часа.	
Клопидогрел	Клопидогрел, Плавикс	Таблетки по 75 мг	Антиагрегантное средство. Профилактика тромбообразования у кошек и собак.	Собаки: 2-4 мг/кг п/о с интервалом 24 часа. Кошки: 18,75 мг/кошку п/о с интервалом 24 часа.	
Колхицин	Колхицин	Таблетки по 0,5 мг	Алкалоид трополонового ряда. Контроль фиброзного гепатита и легочных заболеваний, стриктур пищевода и почечного амилоидоза (в том числе вызванного лихорадкой шарпеев).	Собаки: 0,03 мг/кг п/о с интервалом 24 часа.	Пр на ли се ре Вь по эф
Ксилазин	<u>Рометар</u> , <u>Ксила</u> , <u>Ксиланит</u> , Ксилазин 2%, Ксилавет, Зооксилазин	Инъекционный раствор 20 мг/мл	α2-адреномиметик. Седативный препарат. Иногда используется для вызова рвоты у кошек.	Собакам, кошкам для седации: 1-3 мг/кг в/м, п/к, в/в. Кошкам для вызова рвоты: 0,6 мг/кг в/м или 1мг/кг п/к	

Лактулоза	Дюфалак	Сироп, содержащий 3,1-3,75 мг лактулозы в 5 мл	Слабительное средство осмотического действия. При запорах, для снижения уровня аммиака в крови при лечении печеночной энцефалопатии.	Собаки: 1. Запор - 5-25 мл п/о с интервалом 8-12 часов. 2. Хроническая печеночная энцефалопатия - 5-25 мл п/о с интервалом 8-12 часов. 3. Острая печеночная энцефалопатия - 18-20 мл/кг в растворе из 3 частей лактулозы и 7 частей воды ректально. Кошки: 0,5-5 мл п/о с интервалом 8-12 часов. Хорьки: 0,15-0,75 мл/кг п/о с интервалом 12 часов.	
Линкомицин	<u>Линкомицин</u> , <u>Линкови</u>	Раствор для инъекций 10%, в 1 мл содержит 100 мг линкомицина, и медицинский вариант - 30% раствор (300 мг в 1 мл). Капсулы по 250 мг.	Антибиотик. При инфекциях, вызванных чувствительными микроорганизмами.	Собаки, кошки: 22 мг/кг в/м с интервалом 24 часа или 11 мг/кг в/м с интервалом 12 часов или 11-22 мг/кг медленно в/в с интервалом 12-24 часа. П/о по 22 мг/кг с интервалом 12 часов или 15 мг/кг п/о с интервалом 8 часов.	
Маннитол	Маннит	Инъекционный раствор 15% (150 мг/мл)	Осмотический диуретик. Для уменьшения интракраниального давления, лечение острой глаукомы, при почечной недостаточности с олигурией.	Собаки, кошки: 1. Повышенное интракраниальное давление - 0,25-2 г/кг в/в. Вводить в течение 20-30 минут. 2. Острая глаукома - 1-2 г/кг в/в в течение 30 минут. 3. Олигурическая почечная недостаточность - 0,25-0,5 г/кг в/в в течение 5-10 минут.	
Марбофлоксацин	<u>Марфлоксин</u> , <u>Марфлоксин</u> <u>таблетки</u>	Инъекционный раствор 20 мг/мл, флаконы 20, 50, 100 мл. Таблетки 5, 20, 80 мг.	Антибактериальный препарат группы фторхинолонов. Активен против микоплазм и многих грамположительных бактерий, частично против грамотрицательных.	Собаки, кошки: 2 мг/кг в/в, п/к, п/о с интервалом 24 часа.	Ре со ан ка ре (!) ан ме мс фл
Маропитант	<u>Серения</u> <u>раствор</u> , <u>Серения</u> <u>таблетки</u>	Инъекционный раствор 10 мг/мл. Таблетки 16, 24, 60, 160 мг.	Противорвотный препарат, обладает определенной висцеральной анальгезией, используется в терапии ИЦК. Предупреждение рвоты при транспортировке.	Собаки, кошки: 1 мг/кг п/к или 2 мг/кг п/о с интервалом 24 часа. Можно применять для усиления аппетита кошкам (за счет подавления тошноты и снятия дискомфорта в кишечнике). При ИЦК возможно использование в дозе 0,05 мг/кг.	
Медетомидин	<u>Домитор</u> , <u>Дорбен</u> , <u>Медитин</u>	Инъекционный раствор 1 мг/мл	α2-адреномиметик. Для седации и премедикации.	Собаки, кошки: Премедикация - 5-20 мкг/кг в/в, п/к, в/м в комбинации с анальгетиками. При в/в введении использовать ближе к минимальным дозам.	Дс пр Сс мг Ко мг
Мелатонин	Циркадин, Меласон	Таблетки по 2 мг, 3 мг	Гормон. Используется в лечении заболеваний собак, связанных с нарушением цикла развития волоса. В частности, при алопеции Х и сезонной фланговой алопеции.	Собаки: 3-6 мг п/о с интервалом 8 часов. Хорьки: 0,5 мг п/о с интервалом 24 часа.	

Мелоксикам	<u>Метакам,</u> <u>Мелоксидил,</u> <u>Мелоксивет,</u> <u>Локсиком</u>	Пероральная суспензия 0,5 мг/мл и 1,5 мг/мл. Инъекционный раствор 2мг/мл и 5 мг/мл.	НПВС. Противовоспалительный, жаропонижающий, обезболивающий эффект.	Собаки: стартовая инъекционная доза - 0,2 мг/кг, для дальнейшего курса - по 0,1 мг/кг п/о с интервалом 24 часа. Кошки: стартовая доза - 0,1 мг/кг, далее 0,05 мг/кг п/о с интервалом 24 часа. Профилактика боли перед операцией - 0,2 мг/кг (действует 24 часа), дальше эффективно 0,05 мг/кг перорально с интервалом 24 часа. Возможно применение однократно в дозе 0,3 мг/кг п/к для контроля послеоперационной боли. Кролики: 0,3-0,6 мг/кг п/к, п/о с интервалом 24 часа. Крысы, мыши: 1-2 мг/кг п/к, п/о с интервалом 24 часа.	
Метамизол натрия	Анальгин	Таблетки по 500 мг, инъекционный раствор 50%, по 500 мг в 1 мл.	НПВС. В случаях, требующих анальгезии и понижения температуры.	Собаки, кошки: 20-50 мг/кг в/в, в/м с интервалом 8-12 часов.	Лу бо НГ У и ги во
Метилпреднизолон	Метипред, Медрол, Метпрезон, Солу-Медрол	Таблетки, инъекции	Глюкокортикостероид. Более очищенный, чем преднизолон. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, глюкокортикогенетическое действие. Используют при гипoadренекортицизме, а также как иммуносупрессор.	Собаки, кошки: расчет по дозам преднизолона. 5 мг преднизолона эквивалентно 4 мг метилпреднизолона.	
Метимазол	Тиамазол	Таблетки по 1,25, 2,5 и 5 мг	Антитиреоидный препарат. Применяют при гипертиреозидизме.	Собаки: 2,5-5 мг на собаку (в зависимости от размера) п/о с интервалом 12 часов. Кошки: 2,5 мг на кошку п/о с интервалом 12 часов.	
Метионин	Метионин	Таблетки по 250 мг	Аминокислота. Закисление мочи. При отравлении парацетамолом.	Собаки: 1. Закисление мочи - 0,2-1 гр на собаку п/о с интервалом 8 часов. 2. Отравление парацетамолом - 2,5 гр на собаку п/о, дальше до 3 раз с интервалом в 4 часа. Кошки: 1. Закисление мочи - 200 мг на кошку п/о с интервалом 8 часов. 2. Отравление парацетамолом - 2,5 гр на кошку п/о, дальше до 3 раз с интервалом в 4 часа.	
Метоклопрамид	Церукал	Таблетки по 10 мг. Инъекционный раствор 5 мг/мл.	Как противорвотный препарат, при атонии и гипотонии желудка и кишечника, при рефлюкс-эзофагите и пр.	Собаки, кошки: 0,25-0,5 мг/кг в/в, в/м, п/к, п/о с интервалом 12 часов или 0,17-0,33 мг/кг в/в, в/м, п/к, п/о с интервалом 8 часов. Хорьки, кролики, морские свинки: 0,5-1 мг/кг п/к, п/о с интервалом 6-12 часов.	

Метронидазол	Метронидазол, Трихопол, Метрогил	Инъекционный 5 мг/мл для в/в введения. Таблетки по 250, 500 мг.	Антибактериальная и антипротозойная активность. Используется в лечении анаэробных инфекций, гiardioза (лямблиоза) и других протозойных инфекций.	Собаки: 15-25 мг/кг п/о с интервалом 12 часов, или 10 мг/кг медленно в/в с интервалом 12 часов. При протозойных инфекциях следует использовать более высокие дозы - 25-30 мг/кг п/о с интервалом 12 часов. Кошки: 8-10 мг/кг в/в, п/о с интервалом 12 часов. При протозойных инфекциях следует использовать более высокие дозы - 25-30 мг/кг п/о с интервалом 12 часов.	Оп эф им из кл Р вн вв ис ин пр
Миртазапин	Зиспин, Ремерон	Таблетки 15, 30, 45 мг	Трициклический антидепрессант. Как стимулятор аппетита у кошек и собак, можно в качестве противорвотного.	Собаки: 1,1-1,3 мг/кг п/о с интервалом 24 часа. Кошки: 1,88 мг/кошку п/о с интервалом 48 часов (если надо, можно увеличить в 2 раза либо дозу, либо частоту применения до 24 ч). Альтернативно: Собаки: 1/4 от таблетки в 15 мг для собак < 7 кг, 1/2 от 15 мг для 8-15 кг, 15 мг для 16-30 кг, 30 мг для собак > 30 кг. Кошки: 3,75 мг на кошку п/о, каждый 3-ий день.	М с е
Окситоцин	Окситоцин	Раствор для инъекций, в 1 мл содержит 5 или 10 ЕД.	Синтетический аналог полипептидного гормона. Стимуляция родовой деятельности. Профилактика и лечение гипотонических кровотечений после родов и аборта.	Собаки: - стимуляция родовой деятельности - 0,1-0,5 ЕД/кг в/м, п/к с интервалом 30 мин до 3 раз, - отсутствие молока - 2-20 ЕД на собаку в/м, п/к однократно. Кошки: - стимуляция родовой деятельности - 0,1-0,5 ЕД/кг в/м, п/к с интервалом 30 мин до 2 раз, - отсутствие молока - 1-10 ЕД на кошку в/м, п/к однократно.	
Омепразол	Омез, Ультоп, Лосек	Капсулы по 10, 20, 40 мг. Порошок для приготовления раствора для инфузий, 40 мг.	Ингибитор протонной помпы. Гастропротектор.	Собаки: 0,5-1,5 мг/кг в/в, п/о с интервалом 24 часа. Кошки: 0,75-1,0 мг/кг п/о, в/в с интервалом 24 часа.	В, ис 2 и су
Ондансетрон	Зофран, Латран	Таблетки по 4, 8 мг. Инъекционный раствор по 2 мг в 1 мл.	Противорвотный препарат	Собаки, кошки: 0,5 мг/кг в/в загрузочная доза, далее по 0,5 мг/кг/ч инфузия на 6 часов или 0,5-1 мг/кг п/о с интервалом 12-24 часа.	
Пентоксифиллин	Трентал	Раствор для инъекций 20 мг/мл.	Периферический вазодилатор. Лечение васкулитов и васкулопатий, лечение контактного дерматита.	Собаки: 15-20 мг/кг с интервалом 6-8 часов или с интервалом 12 часов.	
Пимобendan	Ветмедин, Хартмедин	Капсулы или таблетки по 1,25, 2,5, 5 и 10 мг.	Кардиотоник. Широкий спектр сердечных заболеваний. Эффективен при лечении ХСН и ДКМП.	Собаки, кошки: 0,1-0,3 мг/кг с интервалом 12 часов п/о за 1 час до еды. Предпочтительная доза - 0,25 мг/кг.	

Пипольфен	Прометазин, Дипразин	Драже по 25 мг, 2,5% (25мг/мл) инъекционный раствор в ампулах по 2 мл.	H1-гистаминоблокатор с седативным эффектом, противорвотный эффект у людей (у животных не доказан).	Кошки, собаки: 1 мг/кг, 2 р/д, п/о, в/м, в/в	Ка пр пр пр эф об се он
Прадофлораксин	Верафлокс	Таблетки по 15, 60 и 120 мг. Инъекционный раствор 25 мг/мл.	Антибактериальный препарат группы фторхинолонов. Широкий спектр антибактериальной активности.	Собаки, кошки: 3 мг/кг п/о с интервалом 24 часа.	В б ре
Празозин	Гиповаз	Таблетки по 0,5, 1, 2 и 5 мг	Гипотензивный альфа-адреноблокирующий препарат. Для снижения кровяного давления. Применяют при легочной гипертензии, а также как дополнительный препарат при лечении ХСН.	Собаки: 1 мг на собаку п/о с интервалом 8-12 часов (собаки до 15 кг), 2 мг на собаку с интервалом 8-12 часов (собаки более 15 кг). Кошки: 0,25-1,0 мг на кошку п/о с интервалом 8-12 часов.	
Преднизолон	Преднизолон, Преднивет	Таблетки по 5 мг, инъекционный раствор по 30 мг/мл (медицинский), Преднивет 2,5% по 25 мг/мл (ветеринарный).	Глюкокортикостероид. Оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, глюкокортикогенетическое действие. Используют при гипoadренокортицизме, а также как иммуносупрессор.	Собаки: 1. Гипoadренокортицизм - 0,2-0,3 мг/кг совместно с флудрокортизоном. 2. Противовоспалительное действие - 0,5 мг/кг п/о с интервалом 12-24 часа, уменьшать постепенно до 0,25-0,5 мг/кг с интервалом 48 часов. 3. Аллергические заболевания - 0,5-1 мг/кг п/о с интервалом 12 часов в начале, после стабилизации состояния - уменьшение дозы. 4. Иммуносупрессорные дозы - 1-2 мг/кг п/о с интервалом 24 часа, далее возможно постепенное уменьшение дозы. Кошки: противовоспалительные дозы - 0,5-1 мг/кг п/о с интервалом 12-24 часа, остальные - как у собак.	Дс се ва за си вь пр (!) ис НГ ри по
Рамиприл	<u>Вазотоп</u>	Таблетки 0,625, 1,25, 2,5 и 5 мг	Ингибитор АПФ. При ХСН и заболеваниях, где есть показания.	Собаки: 0,125 мг/кг п/о с интервалом 24 часа (можно постепенно повышать до 0,25 мг/кг после 2 недель приема, в зависимости от состояния). Кошки: 0,125 мг/кг п/о с интервалом 24 часа.	
Ранитидин	Зантак, Ранигаст	Инъекционный раствор 25 мг/мл. Таблетки 75, 150, 300 мг.	Антагонист H2-рецепторов. Гастропротектор.	Собаки: 2 мг/кг медленно в/в, п/к, п/о с интервалом 8-12 часов. Кошки: 2,5 мг/кг в/в медленно с интервалом 12 часов, 3,5 мг/кг п/о с интервалом 12 часов.	
Рифампицин	Рифампицин, Рифадин, Рифампин	Капсулы по 150, 200 мг	Антибиотик из группы рифамицинов. Широкий спектр антибактериальной активности, включает хламидии, риккетсии, микобактерии.	Собаки, кошки: 10-15 мг/кг п/о с интервалом 24 часа.	Пс ге Мс ок сл ор цв

Сальбутамол	Вентолин	Ингалятор, по 100 мкг на одно нажатие	Селективным агонист бета-2-адренорецепторов. При бронхоспазмах.	Собаки: 100-300 мкг на собаку с интервалом 4-6 часов или сколько требуется для снятия бронхоспазма. Кошки: 100 мкг/кошку с интервалом 4-6 часов или сколько требуется для снятия бронхоспазма.	
Сароланер	<u>Симпарика</u>	Жевательные таблетки 5, 10, 20, 40, 80, 120 мг	Инсекто-акарицидный препарат	Собаки: 2 мг/кг п/о однократно, повторный прием - через 30 дней.	
Селамектин	<u>Стронгхолд</u>	Раствор для наружного применения, капли на холку.	Противопаразитарный препарат. Действует на блох, отодектосов, саркоптов. Для дегельминтизации при токсокарозе, вызванном <i>Toxocara cati</i> , <i>Toxocara canis</i> , анкилостомозе, вызванном <i>Ancylostoma tubaeform</i> . Для профилактики диروفилариоза.	Собаки, кошки, хорьки, кролики, грызуны: минимум по 6 мг/кг.	
Силденафил	Виагра	Таблетки по 25, 50 и 100 мг.	Ингибиторы фосфодиэстеразы 5 типа. Вазодилататор, при легочной гипертензии.	Собаки: 0,5-2,7 мг/кг п/о с интервалом 8-24 часа. Рекомендуется медианная доза 3 мг/кг/день.	
Силибин	Денамарин, Карсил	Таблетки по 50, 100 мг	Гепатопротектор	Собаки, кошки: 50-250 мг/кг п/о с интервалом 24 часа длительно, 3-4 месяца.	
Смектит диоктаэдрический	Смекта, Диоктит, Неосмектин, Диосмектин	Порошок по 3,7 гр (в 1 порошке 3 гр диоктаэдрического смектита).	Антидиарейное средство. Энтеросорбент. Острая и хроническая диарея.	Варьирует от размера животного. На взрослую кошку и мелких собак 0,5-1 пакет за 2-3 приема. Средним и крупным собакам - больше.	Регулирует работу желудочно-кишечного тракта
Спиноналактор	Верошпирон	Таблетки, капсулы по 25, 50 и 100 мг.	Как диуретик. При ХСН, при лечении гиперальдостеронизма.	Собаки, кошки: 2-4 мг/кг п/о с интервалом 24 часа.	
Сукральфат	Вентер, Антепсин	Таблетки 1 гр	Обволакивающий препарат. Применяется в лечении эзофагиальных, желудочных и дуоденальных эрозий и язв.	Собаки: 500 мг на собаку п/о с интервалом 6-8 часов (собаки до 20 кг); 1-2 гр на собаку п/о с интервалом 6-8 часов (собаки более 20 кг). Кошки: 250 мг на кошку п/о с интервалом 8-12 часов.	
Деслорелин	<u>Супрелорин</u>	Имплант, содержащий 4,7 мг и 9,4 мг деслорелина. 9,4 мг не поставляется в Россию.	Антагонист гонадотропин-рилизинг гормона. Для химической кастрации самцов и самок собак, кошек и хорьков. Для лечения гиперплазии надпочечников у хорьков.	Собаки, кошки, хорьки: 1 имплант на животное.	Эффективно регулирует работу эндокринной системы

Тербинафин	Ламизил	Таблетки по 250 мг, крем 1%.	Противогрибковый препарат. При ряде грибковых заболеваний, включая дерматофитию.	Собаки, кошки: 20-40 мг/кг п/о с интервалом 24 часа (можно использовать пульс-терапию → неделя+/неделя-). Грызуны: 10-30 мг/кг п/о с интервалом 24 часа на 4-6 недель.	
Тиамазол	Метимазол	Таблетки по 1,25, 2,5 и 5 мг	При гипертиреозе	Собаки: 2,5-5 мг на собаку (в зависимости от размера) п/о с интервалом 12 часов. Кошки: 2,5 мг на кошку п/о с интервалом 12 часов.	
Транексамовая кислота	Транексам	Инъекционный раствор 50 мг в 1 мл, таблетки по 250 и 500 мг.	Обладает местным и системным гемостатическим действием при кровотечениях.	Собаки, кошки: 10-15 мг/кг в/в, п/к, в/м	Ес бь сп рв
Трилостан	Веторил	Капсулы по 10, 30, 60 и 120 мг	Блокатор синтеза ГКС. Лечение гиперандрокортицизма.	Собаки: 2-5 мг/кг п/о с интервалом 24 часа. Стартовать с минимальной дозы, постепенно повышать. Кошки: 30 мг на кошку п/о с интервалом 24 часа.	
Урсодезоксихолиевая кислота	Урсосан, Урсаклин, Урсофальк, Холудексан	Капсулы по 250 мг	Гепатопротектор. Пациентам с заболеваниями печени.	Собаки, кошки: 10-15 мг/кг п/о с интервалом 24 час.	
Фамотидин	Квамател, Ульфамид	Таблетки 20, 40 мг. Порошок для инъекций, 20 мг.	Антагонист H2-рецепторов. Гастропротектор.	Собаки, кошки: 0,5 -1 мг/кг п/о, в/в с интервалом 12-24 часа.	
Фамцикловир	Фамвир	Таблетки по 125 и 250 мг.	Противовирусный препарат. Используется при поражениях глаз, вызванных вирусом кошачьего герпеса.	Кошки: дозы варьируют. Высокоэффективна - 90 мг/кг с интервалом 8-12 часов, до клинического улучшения. Доза в 40 мг/кг с интервалом 8-12 часов также эффективна, но лечение будет длительное. Другие дозы: 62,5-125 мг на кошку с интервалом 8-24 часа.	
Феназепам	Элзипам, Фезипам	Таблетки по 0,5, 1 и 2,5 мг. Инъекционный раствор 1 мг/мл.	Транквилизатор. Для уменьшения агрессии, стресса. Противосудорожное средство.	Собаки, кошки: 0,05мг/кг с интервалом 12 часов.	
Фенбендазол	<u>Фебтал</u>	Таблетки 150 мг, порошок 20-22% для с/х животных.	Противопаразитарный препарат. Действует на круглых и ленточных гельминтов, лямблии (гиардии).	Собаки: 1. Круглые, ленточные гельминты: щенки до 6 мес - 50 мг/кг п/о с интервалом 24 часа, 3 дня подряд; щенки старше 6 мес - 100 мг/кг однократно п/о. 2. Лямблиоз - по 50 мг/кг п/о с интервалом 24 часа, 5 дней подряд. Кошки: 1. Круглые, ленточные гельминты: котята до 6 мес - 20 мг/кг п/о с интервалом 24 часа, 5 дней подряд; котята старше 6 мес -100 мг/кг однократно п/о. 2. Лямблиоз - 50 мг/кг п/о с интервалом 24 часа, 5-7 дней подряд.	

Фенилпропаноламин	<u>Пропалин</u>	Раствор для перорального применения. В 1 мл 50 мг.	Симпатомиметик. Собакам при недержании мочи, обусловленной функциональной недостаточностью сфинктера уретры.	Собаки: 0,8 мг/кг п/о с интервалом 8 часов или 1,2 мг/кг п/о с интервалом 12 часов. В дозе 3 капли на 4 кг веса животного 2 раза в день, или 1 капля на 2 кг веса животного 3 раза в день. Собакам массой тела 25 кг и больше пропалин задают в дозе 0,75 мл на 25 кг веса животного 2 раза в день, или 0,5 мл на 25 кг веса животного 3 раза в день.	Не Рд
Филграстим	Нейпоген, Лейкостим, Нейпомакс	Инъекционный 15 и 30 миллионов ЕД (150 и 300 мкг) в 1 мл раствора.	Используется при серьезных нейтропениях, особенно при применении цитостатических препаратов.	Собаки, кошки: 100-500 тысяч ЕД (1-5 мкг)/кг в день п/к на 3-5 дней.	
Фипронил	<u>Фронтлайн</u> , <u>Фиприст</u> , <u>Барс</u> , <u>Дана</u>	Раствор для наружного применения, капли на холку. Разные формы выпуска, часто в комбинации с другими веществами.	Противопаразитарный препарат. Действует на блох, иксодовых клещей, власоедов, вшей, а также на отодектозов и саркоптов, комаров.	Собаки: исходя из формы выпуска, минимум 6,7 мг/кг. Кошки, хорьки: исходя из формы выпуска, минимум 6,7 мг/кг. Грызуны: 7,5 мг/кг.	Не ра (!) дл
Фирококсиб	Превикокс	Таблетки по 57 и 227 мг.	НПВС. Оказывает анальгизирующее, противовоспалительное и жаропонижающее действие.	Собаки: 5 мг/кг с интервалом 24 часа не зависимо от приема пищи.	(!) ко бе ще не ме
Флураланер	<u>Бравекто</u>	Жевательные таблетки. В 1 таблетке 112,5, 250, 500, 1000 или 1400 мг.	Противопаразитарный препарат. Спектр действия включает иксодовых клещей, блох, клещей Demodex, Otodectes, Sarcoptes.	Собаки: 25-56 мг/кг, п/о, 1 раз в 12 недель.	
Хитозан	<u>Ипакитине</u>	Порошок, содержащий 8% хитозана, 10% кальция карбоната и 82% лактозы.	Адсорбент. Применяется для связывания фосфора и уремиических токсинов при ХПН.	Собаки, кошки: 200 мг/кг п/о с интервалом 12 часов (смешивая с едой).	
Хлорамбуцил	Лейкеран	Таблетки по 2 мг	Контроль злокачественных новообразований, ряда лимфо- и миелопролиферативных заболеваний, иммуносупрессивный эффект.	Собаки: 1. Лимфома - 15-20мг/м2 п/о с интервалом 2недели + преднизолон, или 2-6 мг/м2 с интервалом 24-48 часов. 2. Пемфигус - 0,1-0,2 мг/кг п/о с интервалом 24 часа стартово, до клинического улучшения. Далее каждый 2-ой день, часто продолжительно. 3. Другие аутоиммунные заболевания - 1-2 мг/м2. Кошки: 1. Аутоиммунные заболевания - кошки весом более 4 кг - 2 мг на животное п/о с интервалом 48 часов на 2-4 недели, дальше уменьшать дозу до минимально эффективной; кошки весом менее 4 кг - 2 мг на животное п/о с интервалом 72 часа. 2. Пемфигус - 0,1-0,2 мг/кг п/о с интервалом 24 часа стартово, до клинического улучшения. Далее каждый 2-ой день, часто продолжительно.	В : ис пр мс Се вь пр ле

Цетиризин	Зодак	Таблетки по 10 мг, раствор инъекционный 5 мг/5 мл.	Антигистаминное. При аллергических реакциях.	Собаки: 1 мг/кг п/о с интервалом 24 часа. Кошки: 5 мг на кошку п/о с интервалом 24 часа.	Сг эф
Цефазолин	Цефазолин	Порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения, по 500 мг и 1000 мг во флаконе.	Антибиотик цефалоспоринового ряда, 1 поколение. Болезни, вызванные чувствительными микроорганизмами.	Собаки, кошки: 20-35 мг/кг в/м, в/в с интервалом 8-12 часов.	Не со пе ди (ри не
Цефалексин	Цефалексин, Цефален, Кефлекс	Капсулы по 250, 500 мг. Порошок для приготовления суспензии 125 мг/5 мл и 250 мг/5 мл.	Антибиотик 1-ого поколения цефалоспоринов. Активен против некоторых грамположительных и грамотрицательных организмов. Pseudomonas и Proteus часто устойчивы.	Собаки, кошки: 10-25 мг/кг в/м, в/в с интервалом 24 часа.	Де до мг 12 дл ку]
Цефкином	<u>Кобактан</u>	Инъекционная суспензия, 1 мл содержит 25 мг.	Антибиотик 4-ого поколения цефалоспоринов. Широкий спектр антибактериального действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter spp., Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., Clostridium spp., Proteus spp., Salmonella spp., Corynebacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella spp. и др, включая штаммы, продуцирующие β-лактамазу.	Собаки, кошки: в/м по 2,5 мг/кг с интервалом 24 часа.	
Цефовецин	<u>Конвенция</u>	Лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора, 80 мг/мл.	Антибиотик цефалоспоринового ряда. Болезни, вызванные чувствительными микроорганизмами. Эффект после введения длится 14 дней.	Собаки, кошки: 8 мг/кг п/к, что эквивалентно 1 мл готового препарата на 10 кг. Действие - 14 дней.	
Цефотаксим натрия	Цефотаксим	Порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения, по 500,1000 и 2000 мг во флаконе.	Антибиотик цефалоспоринового ряда, 3-е поколение. Болезни, вызванные чувствительными микроорганизмами.	Собаки, кошки: 20-40 мг/кг в/м, в/в, п/к с интервалом 8-12 часов.	
Цефтазидим	Цефтазидим	Порошок для приготовления раствора, по 500,1000 и 2000 мг во флаконе.	Антибиотик цефалоспоринового ряда, 3-е поколение. Болезни, вызванные чувствительными микроорганизмами.	Собаки, кошки: 20-50 мг/кг в/м, в/в, п/к с интервалом 8-12 часов.	

Цефтиофур	Цефтонит, Цефтиосан	Суспензия 50 мг/мл	Антибиотик цефалоспоринового ряда, 3-е поколение. Болезни, вызванные чувствительными микроорганизмами.	Собаки: 2,2 мг/кг п/к с интервалом 24 часа.	
Цефтриаксон	Цефтриаксон	Порошок для приготовления раствора для внутримышечного и внутривенного введения, по 500 и 1000 мг во флаконе.	Антибиотик 3-его поколения цефалоспоринов. Хорошая активность против грамположительных и части грамотрицательных бактерий.	Собаки, кошки: 20-25 мг/кг с интервалом 12 часов в/в, в/м. Или 50 мг/кг с интервалом 24 часа.	(!) пр
Циклоспорин	Атопика, Экорал, Неорал	Капсулы по 25, 50, 100 мг	Селективный иммунодепрессант. Атопический дерматит, как иммунодепрессант при ряде аутоиммунных заболеваний.	Собаки: 5 мг/кг с интервалом 12-24 часа. При атопическом дерматите - обычно с интервалом 24 ч, можно увеличить интервал до 48 ч. Кошки: 7 мг/кг с интервалом 24 часа.	За на ви че по
Циметидин	Гистодил	Инъекционный раствор по 100 мг/мл. Таблетки по 200 мг.	Антагонист H2- рецепторов. Гастропротектор.	Собаки: 5-10 мг/кг п/о, в/в, в/м с интервалом 8 часов. Кошки: 2,5-5 мг/кг п/о, в/м, в/в с интервалом 12 часов. Хорьки: 5-10 мг/кг п/о, п/к, в/м с интервалом 8 часов.	
Цимикоксиб	Цималджекс	Таблетки по 8, 30, 80 мг	НПВС. Противовоспалительный и анальгезирующий эффект.	Собаки: 2 мг/кг п/о с интервалом 24 часа.	Не мс и т кг. Де ос жи 6 г
Эналаприл	Энап, Энал, Энакард	Таблетки по 5, 10, 20 мг	Ингибитор АПФ. При ХСН и заболеваниях, где есть показания, при артериальной гипертензии.	Собаки: 1. Сердечные заболевания - 0,5 мг/кг п/о с интервалом 24 часа, увеличивая до 0,5 мг/кг п/о с интервалом 12 часов после 2 недель лечения (при отсутствии клинического ответа). 2. Нефропатия с потерей белка - 0,25–1 мг/кг п/о с интервалом 12–24 часа. 3. Гипертензия - до 3 мг/кг до стабилизации давления. Кошки: сердечные заболевания, нефропатия с потерей белка: 0,25–0,5 мг/кг п/о с интервалом 12–24 часа.	

Энрофлоксацин	Байтрил 5% , Байтрил 2,5% , Энроксил 5% , Энромаг , Энросепт 5% и 10% , Энрофлокс 5% , Энрофлоксацин 50 , Энрофлон 5%	Инъекционный раствор 25 мг/мл, 50 мг/мл, 100 мг/мл. Таблетки 15, 150, 250 мг. Раствор для выпаивания 50 и 100 мг в 1 мл	Антибактериальный препарат группы фторхинолонов. Обладает противомикробным действием в отношении широкого спектра Гр+ и Гр- микроорганизмов, включая кишечную палочку, сальмонеллы, пастереллы, стрепто- и стафилококки, клебсиеллы, синегнойную палочку, бордетеллы и бруцеллы, протей, клостридии и микоплазмы.	Собаки, кошки: 5 мг/кг п/к с интервалом 24 часа, перорально 2,5 мг/кг с интервалом 12 часов или 5 мг/кг с интервалом 24 часа. Хорьки: 5-10 мг/кг п/о, п/к, в/м с интервалом 24 часа. Кролики: 10-30 мг/кг п/о, п/к с интервалом 24 часа. Грызуны: 5-10 мг/кг п/к, п/о с интервалом 12-24 часа.	(!) пр ос ос дл мс ре
Эритропозтин	Эпостим, Веро-эпозтин и др.	Инъекционный раствор по 2000 МЕ/мл, 4000 МЕ/мл, 10000 МЕ/мл, 30000 МЕ/мл	Стимулятор гемопоэза. Лечение анемии, связанной с ХПН и др заболеваниями (но не при гемолитической анемии, анемии из-за кровопотери).	Собаки, кошки: по 50 МЕ/кг в/в, п/к 3 раза в неделю, до нормализации гематокрита, далее уменьшать частоту введения. При неэффективности возможно повышение до 100 МЕ/кг. Изменения доз проводить с интервалом в 3 недели.	Де пр во

Просмотров: 305460

Смотрите также:

[Дозировка антибиотиков для собак и кошек](#)

В таблице в наглядном виде представлены дозировки современных антибиотиков для собак и кошек, а также способ и частота введения антимикробных препаратов.

Информация будет полезна для практикующих ветеринарных врачей.

СПРАВОЧНИК

- [Ветеринарные ВУЗы](#)
- [Ветеринарные препараты](#)
- [Болезни собак и кошек](#)
- [Болезни с/х животных](#)
- [Лечебные корма](#)
- [Гомеопатические средства в ветеринарии](#)
- [Ветеринарные клиники России](#)
 - [+ Добавить ветклинику](#)
 - [Москва](#)

- Московская область
 - Балашиха
 - Железнодорожный
 - Бронницы
 - Видное
 - Волоколамск
 - Воскресенск
 - Дмитров
 - Долгопрудный
 - Домодедово
 - Дубна
 - Жуковский
 - Коломна
 - Королёв
 - Красногорск
 - Лобня
 - Люберцы
 - Мытищи
 - Наро-Фоминск
 - Ногинск
 - Одинцово
 - Павловский Посад
 - Подольск
 - Пушкино
 - Раменское
 - Реутов
 - Сергиев Посад
 - Серпухов
 - Солнечногорск
 - Ступино
 - Фрязино
 - Химки
 - Чехов
 - Щёлково
 - Электросталь
- Санкт-Петербург
- Ленинградская область
- Адыгея
- Алтай
- Алтайский край
- Амурская область
- Архангельская область
- Астраханская область
- Башкортостан
- Белгородская область
- Брянская область
- Бурятия
- Владимирская область
- Волгоградская область
- Вологодская область
- Воронежская область
- Еврейская автономная область
- Забайкальский край
- Ивановская область
- Иркутская область
- Кабардино-Балкария
- Калининградская область
- Калмыкия
- Калужская область
- Камчатский край
- Карачаево-Черкесия
- Карелия
- Кемеровская область
- Кировская область
- Коми
- Костромская область
- Краснодарский край
- Красноярский край
- Крым
- Курганская область
- Курская область

- [Липецкая область](#)
- [Магаданская область](#)
- [Марий Эл](#)
- [Мордовия](#)
- [Мурманская область](#)
- [Ненецкий автономный округ](#)
- [Нижегородская область](#)
- [Новгородская область](#)
- [Новосибирская область](#)
- [Омская область](#)
- [Оренбургская область](#)
- [Орловская область](#)
- [Пензенская область](#)
- [Пермский край](#)
- [Приморский край](#)
- [Псковская область](#)
- [Ростовская область](#)
- [Рязанская область](#)
- [Самарская область](#)
- [Саратовская область](#)
- [Сахалинская область](#)
- [Свердловская область](#)
- [Северная Осетия](#)
- [Смоленская область](#)
- [Ставропольский край](#)
- [Тамбовская область](#)
- [Татарстан](#)
- [Тверская область](#)
- [Томская область](#)
- [Тульская область](#)
- [Тыва](#)
- [Тюменская область](#)
- [Удмуртия](#)
- [Ульяновская область](#)
- [Хабаровский край](#)
- [Хакасия](#)
- [Ханты-Мансийский автономный округ — Югра](#)
- [Челябинская область](#)
- [Чечня](#)
- [Чувашия](#)
- [Якутия](#)
- [Ямало-Ненецкий автономный округ](#)
- [Ярославская область](#)
- [Правила публикации отзывов](#)
- [Питомники собак и кошек](#)
 - + [Добавить питомник](#)

ПТИЦЫ

- [О птицах](#)
- [Лечение птицы](#)

ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

- [Поведение животных](#)
- [Советы зоопсихолога](#)

ЗАНИМАТЕЛЬНО

[Интересные факты](#)