

1. (a)

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{2 - 0}{2 - 1} = 2$$

$$f'(x) = 2x^3 - 5x + 2 \Rightarrow 2x^3 - 5x + 2 = 2$$

$$\Rightarrow 2x^3 - 5x = 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{\frac{5}{2}} \text{ or } 0$$

Only $\sqrt{\frac{5}{2}}$ in the interval $[1, 2]$

$$\therefore c = \sqrt{\frac{5}{2}} \text{ and } f'(\sqrt{\frac{5}{2}}) = 2 \#$$

(b)

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{-7 - (-1)}{4} = 0$$

$$f'(x) = 2x - 8 \Rightarrow 2x - 8 = 0$$

$$\Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$$

Ans $c = 4$ and $f'(4) = 0 \#$

2. $x^3 + 3x^2 + 5$

(1)

$$f'(x) = 3x^2 + 6x$$

$$\sqrt{3x^2 + 6x = 0 \Rightarrow x(3x + 6) = 0}$$

$$x = 0 \text{ or } -2$$

Interval	$(-\infty, -2)$	$[-2, 0]$	$(0, \infty)$
$f'(x)$	+	-	+
	increasing	decreasing	increasing

Ans: Increasing on $(-\infty, -2)$ and $(0, \infty)$

Decreasing on $[-2, 0]$

(2)

$$f''(x) = 6x + 6$$

$$\sqrt{6x + 6 = 0 \Rightarrow x = -1}$$

inflection point $(-1, 7)$

Interval	$(-\infty, -1)$	$(-1, \infty)$
$f''(x)$	-	+
	downward	upward

Ans: Concave upward on $(-1, \infty)$

Concave downward on $(-\infty, -1)$

(3)

point	$(0, 5)$	$(-2, 9)$
$f''(x)$	+	-
	minimum	maximum

Ans: relative maximum $(-2, 9)$
relative minimum $(0, 5)$

3 (a)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x^2 + 2x - 5}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x + 2 - \frac{5}{x}}{1} = -\infty \quad \#$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x^2 + 2x - 5}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4 - \frac{2}{x} - \frac{5}{x^2}}{1} = -4 \quad \#$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-4x^2 + 2x - 5}{x^3} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-\frac{4}{x} - \frac{2}{x^2} - \frac{5}{x^3}}{1} = 0 \quad \#$$