ferfoli®

hierro 90 mg + ácido fólico 1 mg

Durante el embarazo y la lactancia.[1]

Posologia
1 COMPRIMIDO AL DÍA[1]

Presentación
60 COMPRIMIDOS

INDICADO EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS ESTADOS DE CARENCIA DE HIERRO Y ÁCIDO FÓLICO EN EL EMBARAZO, LA LACTANCIA Y PUERPERIO.[1]

Bial

1. Resumen de las Características del Medicamento Ferfoli.
Nombre del medicamento: Ferfoli. **Composición cualitativa y cuantitativa:** Cada comprimido recubierto con película contiene: Hierro (en forma de sulfato ferroso) 90 mg y ácido fólico 1 mg. Excipiente(s): lactosa monohidrato: 373 mg, almidón de maíz: 50 mg. Es un comprimido de liberación modificada, constituido por un núcleo conteniendo 90 mg de hierro (sulfato ferroso) de liberación prolongada y una capa con 1 mg de ácido fólico de liberación inmediata. **Indicaciones terapéuticas:** la profilaxis y tratamiento de los estados de déficit de hierro y ácido fólico, en el embarazo, puerperio y lactancia prolongada. El hierro está indicado en todas las situaciones de carencia, sea por aporte insuficiente sea por necesidades aumentadas. Está particularmente indicado en la prevención y tratamiento de las anemias de la gestación y puerperio. El ácido fólico se utiliza para prevenir o tratar los déficits que pueden aparecer en algunos estados fisiológicos (por ejemplo, la gestación, la lactancia y el crecimiento), en diversas patologías (por ejemplo, anemias macrocíticas y megaloblásticas, síndromes de malabsorción: esprue, esteatorrea idiopática, enfermedad de Whipple), y en pacientes bajo terapéutica anticonvulsivante y alcohólicos. **Posología y forma de administración:** Excepto otra indicación médica, ingerir 1 comprimido de FERFOLI al día, entero, con agua o zumo de fruta (evitar la leche), preferentemente con el estómago vacío. En caso de intolerancia gástrica se recomienda la ingesta después de las comidas (almuerzo o cena). La duración del tratamiento será establecida por el médico. En caso de olvido de una o más dosis continuar normalmente el tratamiento, de acuerdo con la prescripción. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad conocida al producto. Sobrecarga de hierro en el organismo (hemocromatosis o hemólisis crónica). Anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12. **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** Excepcionalmente, puede aparecer hipersensibilidad al ácido fólico. Utilizar con precaución en caso de afecciones agudas del tracto digestivo. La eventual aparición de heces de color oscuro es normal. Esta especialidad contiene lactosa. **Reacciones adversas:** Posibilidad de intolerancia digestiva debida al hierro que se manifiesta por dolores abdominales, ardor epigástrico, náuseas, estreñimiento o diarrea relacionada con la ingesta de hierro. Muy raramente pueden observarse fenómenos de hipersensibilidad al ácido fólico que se manifiestan com broncospasmo, eritema, fiebre o prurito. La aparición de heces de color oscuro no tiene ningún significado patológico y está relacionado con la excreción de hierro. **Sobredosis:** La ingesta masiva, casi siempre en niños, puede ocasionar problemas graves resultantes de la sobredosis de hierro, ya que el ácido fólico no es tóxico. La sintomatología se manifiesta por irritación digestiva, náuseas, vómitos y shock. En caso de intoxicación, como medida inmediata, hacer lavado gástrico con bicarbonato sódico al 1%. **Fecha de revisión del texto**: Noviembre 2021. **Presentación**: Ferfoli, envase con 60 comprimidos. **Venta bajo receta médica**. Titular de la Autorización de Comercialización: BIAL-Portela & Cª, S.A. • A Av, da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado • Portugal. Información complementaria bajo pedido. DMgMA_PT220603

FO/AGO22/EM/034

bial.com