folicil®

ácido fólico 5 mg

Antes de la concepción y en el 1er trimestre del embarazo.[1]

Posología
1/2 A 1 COMPRIMIDO POR DÍA[1]

Presentación
60 COMPRIMIDOS

INDICADO EN EL TRATAMIENTO O PREVENCIÓN DEL DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO, ESPECIALMENTE EN EL EMBARAZO, LA LACTANCIA Y PERÍODOS DE CRECIMIENTO RÁPIDO.[1]

Bial

1. Resumen de las Características del Medicamento Folicil.
Nombre del medicamento: Folicil 5 mg comprimidos. **Composición cualitativa y cuantitativa:** Cada comprimido contiene ácido fólico, 5 mg. Excipiente(s): lactosa. **Indicaciones terapéuticas:** Folicil está indicado en el tratamiento y prevención de deficiencia de ácido fólico especialmente durante la gestación, lactancia y periodos de crecimiento más acentuado. El tratamiento con ácido fólico también está indicado en la prevención de malformaciones del tubo neural (espina bífida, meningocele, anencefalia), especialmente en mujeres con antecedentes de hijo (o feto) con estas deficiencias. Dado que la administración prolongada de barbitúricos, anticonvulsivantes, antimaláricos, laxantes, anovulatorios y algunos quimioterápicos puede causar deficiencia yatrogénica en ácido fólico, en estas situaciones está recomendada la administración de Folicil. **Posología:** La posología y la duración del tratamiento deben ser establecidas por el médico. Adultos: ½ a 1 comprimido, una o dos veces al día, de acuerdo con la situación clínica a tratar. En la prevención de malformaciones del tubo neural: ½ comprimido al día, un mes antes de la concepción y durante el primer trimestre de gestación. Niños: mitad de la dosis de adultos. **Forma de administración:** Ingerir los comprimidos con un poco de agua, después o en el intervalo entre comidas. **Contraindicaciones:** Hipersensibilidad al ácido fólico o a alguno de los excipientes. **Advertencias y precauciones especiales de empleo:** El ácido fólico no debe administrarse en caso de anemia cuya etiología sea desconocida, dado el riesgo de enmascaramiento de un cuadro de anemia perniciosa. Folicil contiene lactosa. Los pacientes con intolerancia hereditaria a galactosa, deficiencia total de lactasa o problemas de absorción de glucosa o galactosa no deben tomar este medicamento. **Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** Cloranfenicol: La administración simultánea de ácido fólico y cloranfenicol en pacientes con carencia de folatos, puede antagonizar la respuesta hematopoyética al ácido fólico. Fenitoína: En los pacientes epilépticos, tratados con fenitoína, la terapia con medicamentos conteniendo ácido fólico puede aumentar el metabolismo de la fenitoína, disminuir sus concentraciones séricas y aumentar la frecuencia de las crisis convulsivas. **Fertilidad, embarazo y lactancia:** El ácido fólico puede utilizarse con seguridad durante el embarazo y la lactancia. La deficiencia de ácido fólico aparece en estas situaciones, recomendándose Folicil como forma de prevención. **Sobredosis:** No se han notificado casos de sobredosis. Cuando se administran dosis elevadas, el ácido fólico es eliminado en la orina. **Fecha de revisión del texto**: Octubre 2021. **Presentación:** caja con 60 comprimidos. **Medicamento sujeto a receta médica (Rep. Dominicana, Panamá, Honduras y El Salvador). Producto de venta libre (Nicaragua).** Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento. En caso de duda, persistencia o aparecimiento de otros síntomas consulte a su médico o farmacéutico. Información complementaria bajo pedido al titular de la AIM: Bial - Portela & Cª S.A., À Av. da Siderurgia Nacional, 4745-457 S. Mamede do Coronado, Portugal. DMgMA_PT20220603

bial.com

FO/AG022/EM/025