

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

ZENAVAN GEL

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

ZENAVAN GEL

Anti-inflammatoire, anti-rhumatismale, analgésique

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

ZENAVAN GEL

1. Nom et Adresse du Laboratoire Pharmaceutique Fabricant

BIAL - Portela & C^a., S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

2. Nom et Adresse et Raison Sociale du Demandeur

BIAL - Portela & C^a., S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

3. Nom et Adresse du Représentant au Cameroun

Mr. FANSI TIENTCHEU Narcisse Raoul
Gsvpharma, Zone A Bonamoussadi Douala
BâtimentC37
BP 6451
Douala
Tel.: 00237 626 75 69
Port.: 00237 532 37 59
Email.: nfansi16@yahoo.fr

4. Nom et Adresse du Pharmacien Interlocuteur au Cameroun

Dr. Martin TENDA
Docteur en Pharmacie
Pharmacie Sainte marie
Situé à l'Axe lourd Douala – Yaoundé
Port.:00237 994 66 69
Dom.: 00237 994 35 30
Email.: drtenda@yahoo.fr

5. Nom du Produit

ZENAVAN GEL

6. Dénomination Commune Internationale

Etofénamate

7. Nom Chimique et Famille Pharmacologique

2-[[[3-triphluorometil]phenil]amine]benzoate de 2-(2-hydroxiétoxi)etil ; antiinflammatoire non stéroïdien.

8. Numéro d'autorisation de mise sur le marché au Portugal, valide et date d'obtention dans le pays fabricant et le pays demandeur

9418012 (tube 40 g) et 9418004 (tube 100 g).Date d'obtention: 1974-12-10

9. Lieu de Fabrication et de Conditionnement

BIAL - Portela & C^a., S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado
Portugal

10. Liste des substances vénéneuses

Ne pas applicable.

11. Form et Présentation

Gel, tube de 40 g.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

ZENAVAN GEL

12. Classe thérapeutique

Classification ATC : M02A A06. Anti-inflammatoires non stéroïdiens (pour usage topique).

13. Composition unitaire détaillée

<u>Nom générique</u>	<u>Quantité/g Gel</u>
Etofénamate -----	50 mg
Alcool isopropylique-----	381 mg
Carbopol 940 -----	13 mg
Eumulgin M8-----	60 mg
Hydroxyde de sodium -----	0,75 mg
Macrogol 400 -----	30 mg
Eau purifiée -----	465,25 mg

14. Propriétés

Anti-inflammatoire, anti-rhumatismale, analgésique.

Propriétés pharmacodynamiques :

L'etofénamate est un anti-inflammatoire non stéroïdien ayant des propriétés analgésiques. Son effet antiflogistique élevé, documenté dans des expériences chez l'animal et confirmé dans des plusieurs études chez l'Homme, est dû à des différentes actions individuelles. L'etofénamate agit sur plusieurs phases du processus inflammatoire : inhibition de la synthèse des prostaglandines, inhibition de la libération de l'histamine, effet antagoniste de la bradycinine et de la sérotonine, inhibition de l'activité du complément et inhibition de la libération de l'hyaluronidase.

L'etofénamate a des propriétés stabilisatrices des membranes, prévenant la libération des enzymes protéolytiques. Ce fait détermine l'inhibition de la réponse inflammatoire exsudative et proliférative et la diminution des réactions anaphylactiques et de réponse aux corps étrangers.

Propriétés pharmacocinétiques :

Concentration plasmatique: Après l'application topique de 300 mg d' etofénamate dans des volontaires sains, la concentration sanguine maximale de fénamates a été observée 12 à 24 heures après l'administration.

Liaison aux protéines plasmatiques: de 98 à 99%.

Métabolisme et élimination: L'etofénamate est excrété sous la forme de différents métabolites et leur conjugués : 35% par voie rénale et un grand pourcentage par voie biliaire et fécale. Probablement il y a de la circulation entéropathique.

Biodisponibilité : La biodisponibilité des produits contenant de l'etofénamate subit des oscillations inter et intra-individuelles, dépendant de l'endroit d'administration, des caractéristiques de la peau et d'autres facteurs. Après l'application topique cutanée, la biodisponibilité relative est d'environ 20%.

15. Indications

ZENAVAN GEL est indiqué dans les situations douloureuses associées à l'appareil locomoteur, quand la symptomatologie est confinée à des surfaces limitées, telles que:

- Arthropathies (périarthrite, arthrite, arthrose, polyarthrite, spondylose, ostéoarthrose);
- Myalgies;
- Bursites;
- Téo-synovites;
- Fibrosites;
- Névralgies (syndrome cervical, lombalgies, sciatalgies);
- Contusions, entorses, distensions (associées, par exemple, à des traumatismes sportifs).

16. Mode d'action

L'etofénamate est un antiinflammatoire non stéroïdien ayant des propriétés analgésiques. Son effet antiflogistique élevé, documenté dans des expériences chez l'animal et confirmé dans des plusieurs études chez l'Homme, est dû à des différentes actions individuelles. L'etofénamate agit sur plusieurs phases du processus inflammatoire : inhibition de la synthèse des prostaglandines, inhibition de la libération de l'histamine, effet antagoniste de la bradykinine et de la sérotonine, inhibition de l'activité du complément et inhibition de la libération de l'hyaluronidase.

L'etofénamate a des propriétés stabilisatrices des membranes, prévenant la libération des enzymes protéolytiques. Ce fait détermine l'inhibition de la réponse inflammatoire exsudative et proliférative et la diminution des réactions anaphylactiques et de réponse aux corps étrangers.

17. Mode d'emploi et posologie

Sauf indication médicale en contraire on utilisera ZENAVAN comme suit:

Appliquer 5 à 10 cm d'un cylindre de gel (correspondant environ 1,7-3,3 g de gel), selon la surface douloureuse.

On fera l'application 3 à 4 fois par jour en massant l'endroit affecté.

En cas de maladies rhumatismales, le traitement pendant 3- 4 semaines est généralement suffisant dans la plupart des cas. La durée du traitement dans les traumatismes aigus (par exemple, associés à la pratique sportive) peut se prolonger jusqu'à 2 semaines.

18. Contre-indications

On ne doit pas appliquer ZENAVAN Gel dans les situations suivantes :

- hypersensibilité à l'etofénamate, à l'acide flufénamique ou à d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens;
- sur une peau avec des lésions eczémateuses ou plaies ouvertes;
- grossesse;
- enfants et insuffisance rénale, car il n'existe pas de l'expérience clinique suffisante.

19. Précautions d'emploi et mise en garde

Ne pas appliquer sur les muqueuses ni sur les yeux.

Ne pas exposer au soleil la région traitée pendant le traitement et après les deux semaines suivantes.

20. Effets secondaires / Effets indésirables

Rarement, il peut survenir des rougeurs sur la peau. Très rarement, des réactions cutanées allergiques (démangeaison, peau rouge, éruption, oedème) peuvent apparaître.

21. Incompatibilités

On ne connaît pas.

22. Délai de péremption, condition de stockage e autres précautions

5 ans. Conserver à température non supérieure à 25°C.

23. Prix grossiste et Prix CAF Cameroun

PGHT: 1.639,9 FCFA

PGHT approximatif - CIF (voie maritime): 1.722,00 FCFA

PGHT approximatif - CIF (voie aérienne): 1.804,00 FCFA