

Rinialer®

RI/NOV22/EM/009

Evento

Local e data

Nome do palestrante

Bial

Keeping life
in mind.



ÍNDICE

➤ RINIALER em Pediatria (< 12 anos)

- Rinite alérgica: Eficácia clínica
- Urticária: Eficácia clínica
- Segurança e Tolerabilidade
- Conclusões
- Indicações terapêuticas



➤ RINIALER em Pediatria (< 12 anos)

- Rinite alérgica: Eficácia clínica

- Urticária: Eficácia clínica

- Segurança e Tolerabilidade

- Conclusões

- Indicações terapêuticas




Eficácia clínica da Rinialer em crianças com rinite alérgica: estudo de fase II

Rinialer em crianças dos 6 aos 11 anos de idade com rinite alérgica

Desenho/duração	Ensaio aberto de fase II Desenho em duas partes • Parte I: estudo farmacocinético de dose única ao longo de 24 horas • Parte 2: período de tratamento de 28 dias
Tratamentos/ Doentes (n)	11 crianças (5 do sexo masculino, 6 do sexo feminino) com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos sofrendo de rinite alérgica sazonal RUP solução oral: < 25 kg: 2,5 ml (2,5 mg) ≥ 25 kg: 5 ml (5 mg)

Estudo de Fase II: Resultados

Rinialer resulta numa melhoria dos sintomas de rinite alérgica em crianças (fase IIa) após 4 semanas de administração



* $p = 0,041$; ** $p = 0,021$, Rinialer (4 semanas) vs valor basal
TSS = total symptom score (pontuação total dos sintomas)

Estudo de Fase II: Principais conclusões

- ▶ **Rinialer** proporcionou um efeito anti-histamínico periférico significativo em crianças com rinite alérgica após 28 dias de tratamento.
- ▶ Foi obtida uma **melhoria nas pontuações dos sintomas** individuais e do total dos sintomas (TSS), revelando um efeito protector significativo da **Rinialer** ao longo dos 28 dias.


Estudo fundamental de fase III em crianças entre 6-11 anos de idade que sofrem de rinite alérgica (I)

Rinialer solução oral em crianças com rinite alérgica perene

Desenho/duração	Estudo de grupos paralelos aleatorizado com dois braços, em dupla ocultação, controlado por placebo 6 semanas (2 semanas de selecção prévia)
Tratamentos/ Doentes (n)	Número de doentes: 360 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos sofrendo de rinite alérgica perene Rinialer solução 1 mg/ml Dose ajustada ao peso corporal: 2,5 mg (equivalente a 2,5 ml) uma vez ao dia em crianças com peso < 25 kg 5 mg (equivalente a 5 ml) uma vez ao dia em crianças com peso ≥ 25 kg
Parâmetros de avaliação	Alteração da pontuação 4TSS (Four Total Symptom Score – pontuação total de 4 sintomas) Melhoria da qualidade de vida (Pediatric Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire, PRQLQ – avaliação da qualidade de vida num quadro de rinoconjuntivite) Avaliação da segurança: ECG e análises ao sangue; registo de eventos adversos

Estudo fundamental de fase III em crianças entre 6-11 anos de idade que sofrem de rinite alérgica (V)


Resultados: Rinialer melhora significativamente os sintomas nasais (T4SS) em crianças



* $p = 0,048$; ** $p = 0,018$, Rinialer vs placebo

Estudo fundamental de fase III em crianças entre 6-11 anos de idade que sofrem de rinite alérgica (VI)


Resultados: Rinialer melhora significativamente os sintomas nasais e não nasais (T5SS) em crianças



* $p = 0,03$, Rinialer vs placebo


Estudo fundamental de fase III em crianças entre 6-11 anos de idade que sofrem de rinite alérgica (VII)

Rinialer apresenta um rápido início de ação e efeito sustentado de redução dos sintomas



Estudo de Fase III: Resultados globais em relação à QoL (I)


Resultados: Rinialer melhora a qualidade de vida (QoL) às 4 semanas em crianças com rinite alérgica perene (RAP)



* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$, Rinialer vs placebo

Estudo de Fase III: Resultados globais em relação à QoL (II)


Resultados: Rinialer melhora a qualidade de vida às 6 semanas em crianças com RAP



* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$, Rinialer vs placebo

Estudo de Fase III: Sub-análise dos resultados de QoL (I)


Rinialer melhora a QoL em todos os domínios às 4 semanas em crianças com peso ≥ 25 kg



* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$, Rinialer vs placebo

Estudo de Fase III: Sub-análise dos resultados de QoL (II)

Rinialer melhora a QoL às 6 semanas em crianças com peso ≥ 25 kg



* $p < 0,05$; ** $p < 0,01$, Rinialer vs placebo

Estudo fundamental de fase III: Conclusões

- **Primeira evidência clínica** a partir de um estudo de grande escala de um antagonista do receptor H_1 em crianças (entre os 6 e os 11 anos de idade) sofrendo de **rinite alérgica perene**.
- **Rinialer solução oral** (1 mg/ml) é **eficaz** na melhoria significativa dos sintomas nasais e não nasais às 4 e 6 semanas (globalmente e em crianças com peso ≥ 25 kg).
- **Rinialer solução oral** (1 mg/ml) tem um **rápido início** de acção às 12 horas após a primeira dose.

Estudo fundamental de fase III: Conclusões

- **Rinialer melhorou significativamente a QoL** (benefício PRQLQ), em comparação com o placebo, às 4 e 6 semanas
- **Rinialer** obtém pontuações significativamente superiores em **todos os domínios da QoL**, em comparação com o placebo, após 4 semanas de tratamento em crianças com peso ≥ 25 kg


Farmacocinética de Rinialer em crianças entre os 2 e os 5 anos de idade sofrendo de rinite alérgica: estudo de fase II

Estudo farmacocinético em crianças entre os 2 e os 5 anos de idade que sofrem de rinite alérgica

Desenho/duração	Ensaio aberto de fase II período de tratamento de 28 dias
Parâmetro de Avaliação	Primário: Farmacocinética Secundário: Alteração em relação ao valor basal na pontuação dos sintomas dos doentes no dia 28.
Tratamentos/ Doentes (n)	44 crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 5 anos sofrendo de rinite alérgica RUP solução oral: < 25 kg: 2,5 ml (2,5 mg) ≥ 25 kg: 5 ml (5 mg)

Estudo de farmacocinética de fase II em crianças entre os 2 e os 5 anos de idade: Resultados de Eficácia

Rinialer resulta numa melhoria dos sintomas de rinite alérgica em crianças entre os 2 e os 5 anos de idade após 2 e 4 semanas de administração



Não foi realizada uma comparação estatística

➤ RINIALER em Pediatria (< 12 anos)

- Rinite alérgica: Eficácia clínica

- Urticária: Eficácia clínica

- Segurança e Tolerabilidade

- Conclusões

- Indicações Terapêuticas





Estudo de Fase III em urticária crónica espontânea: Materiais e métodos



Eficácia e segurança de Rinialer solução no tratamento de urticária crónica espontânea (UCE) em doentes entre os 2 e os 11 anos de idade

Desenho/duração	Estudo de Fase III, paralelo, multicêntrico, aleatorizado, em dupla ocultação, com 3 braços de tratamento, controlado por placebo e substância activa 6 semanas
Tratamentos/ Doentes (n)	Crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 11 anos de idade que sofrem de urticária crónica espontânea Rinialer 1 mg/ml solução ▪ Rinialer solução 1 mg/ml: 2,5 ml uma vez ao dia (peso corporal ≥ 10 kg a < 25 kg) ou 5,0 ml uma vez ao dia (peso corporal ≥ 25 kg) ▪ Desloratadina solução 0,5 mg/ml: 2,5 ml uma vez ao dia (peso corporal ≥ 10 kg a < 25 kg) ou 5,0 ml uma vez ao dia (peso corporal ≥ 25 kg) ▪ Solução de placebo
Parâmetros de avaliação	Eficácia e segurança da Rinialer no tratamento de sintomas de UCE

Estudo da Fase III em urticária crónica espontânea: Resultados



Pontuação máxima UAS7 → 42; MPS & MNW → 21; CDLQI → 30



NS: Estatisticamente não significativo

Estudo da Fase III em urticária crónica espontânea: Análise de subgrupos:

Análise da eficácia por categorias de dosagem




**Grupo que recebeu
2,5 ml (< 25 kg)**



**Grupo que recebeu
5 ml ($\geq$ 25 kg)**


Estudo de Fase III em urticária crônica espontânea: Resultados (I)

Rinialer é eficaz no alívio dos SINTOMAS DE URTICÁRIA (UAS7) após 6 semanas (42 dias) de tratamento




Estudo de Fase III em urticária crônica espontânea: Análise de subgrupos (I)

Dose 2,5 ml $\equiv$ < 25 kg



Dose 5 ml $\equiv$ $\geq$ 25 kg




$p < 0,001$

$p = \text{NS}$


Estudo da Fase III em urticária crónica espontânea: Resultados (II)

Rinialer reduz significativamente o NÚMERO DE PÁPULAS (MNW) após 6 semanas (42 dias) de tratamento, em maior medida que a desloratadina




Estudo de Fase III em urticária crónica espontânea: Resultados (III)

Rinialer (mas não desloratadina) reduz significativamente o PRURIDO (MPS) em comparação com o placebo após 6 semanas (42 dias) de tratamento




Estudo de Fase III em urticária crônica espontânea: Resultados (IV)

Rinialer reduz significativamente os sintomas de urticária a partir da semana 1 e ao longo do período do estudo



Estudo da Fase III em urticária crônica espontânea: Resultados (V)

Rinialer melhora significativamente a QoL em crianças com urticária após 6 semanas de tratamento



Significância estatística: **p = 0,003 Rinialer vs placebo *p = 0,012 desloratadina vs placebo

Estudo de Fase III em urticária crónica espontânea: Conclusões sobre eficácia e QoL

- Rinialer é **eficaz** no alívio dos sintomas de urticária com uma **acção sustentada**.
- Rinialer (mas não desloratadina) **reduz** significativamente o **prurido** (MPS), em comparação com o placebo, após 6 semanas (42 dias) de tratamento.
- Rinialer reduz significativamente o **número de pápulas** (MNW) após 6 semanas (42 dias) de tratamento em **maior medida que a desloratadina**.

Estudo de Fase III em urticária crónica espontânea: Conclusões sobre eficácia e QoL

- **Rinialer melhorou a QoL (CDQLI) significativamente, em comparação com o placebo, às 6 semanas.**
- **Os resultados de Eficácia estão em conformidade com os resultados obtidos em adolescentes/adultos.**

➤ RINIALER em Pediatria (< 12 anos)

➤ Rinite alérgica: Eficácia clínica

➤ Urticária: Eficácia clínica

➤ Segurança e Tolerabilidade


➤ Conclusões

➤ Indicações terapêuticas



Perfil de segurança em crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 11 anos

Rinialer é seguro e bem tolerado (semelhante ao placebo) em crianças entre os 2 e os 11 anos de idade



Reacções adversas mais comuns por nível de dosagem de Rinialer

Classe de Sistemas e Órgãos		Rinialer 2,5 mg	Rinialer 5 mg	Placebo
		(n=147)	(n=159)	(n=249)
Distúrbios do sistema nervoso				
<u>Frequentes</u>	Cefaleias	2 (1,36%)	4 (2,52%)	4 (1,61%)
	Sonolência	0	2 (1,26%)	0

➤ RINIALER em Pediatria (< 12 anos)

➤ Rinite alérgica: Eficácia clínica

➤ Urticária: Eficácia clínica

➤ Segurança e Tolerabilidade

➤ Conclusões

➤ Indicações terapêuticas



Perfil de segurança em crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 11 anos:

Conclusões

- A incidência de **reações adversas em crianças entre os 2 e os 11 anos de idade** tratadas com Rinialer em solução oral pediátrica é **MENOR** que **aquela relatada em doentes adultos**.
- **Rinialer foi bem tolerado**, de forma semelhante ao placebo.
- As RA mais frequentes foram dores de cabeça, porém, a sua incidência com **Rinialer** foi **semelhante àquela verificada com o placebo**.
- Não foram comunicadas RA graves.
- **Não se detectaram problemas relacionados com o ECG** (prolongamento do intervalo QTc).

➤ RINIALER em Pediatria (< 12 anos)

- Rinite alérgica: Eficácia clínica

- Urticária: Eficácia clínica

- Segurança e Tolerabilidade

➤ Conclusões

➤ Indicações terapêuticas



Indicações terapêuticas

- Rinialer solução oral 1 mg/ml está indicada para o **tratamento sintomático de rinite alérgica** (incluindo rinite alérgica perene) e **urticária** em crianças entre os 2 e os 11 anos de idade.
- **Posologia:**
 - Em crianças com **peso igual ou superior a 10 kg e inferior a 25 kg:** 2,5 ml (2,5 mg de Rinialer) em solução oral.
 - Em crianças com **peso igual ou superior a 25 kg:** 5 ml (5 mg de Rinialer) em solução oral.
- **Uma vez ao dia**, com ou sem alimentos.





Rinialer®

A receita
**PARA UMA VIDA
SEM
ALERGIAS.**

Indicado na
rinite alérgica
e urticária.^{1,2}

Bial

**Actua em apenas
15 minutos***

DUPLA AÇÃO^{1,3,4}

1x ao DIA^{1,2}



DUPLA AÇÃO
ANTI-HISTAMÍNICO
E ANTI-PAF^{1,3,4}

**NÃO
SEDATIVO***



**INGESTÃO
COM OU SEM
ALIMENTOS^{1,2}**



Bial

IEC (Informações essenciais compatíveis com o Resumo das Características do Medicamento)

RINIALER 1 mg/ml solução oral. Cada ml de solução oral contém: 1 mg de rupatadina (sob a forma de fumarato).

Indicações terapêuticas: Rinialer 1 mg/ml solução oral está indicado no tratamento sintomático da rinite alérgica (incluindo a rinite alérgica persistente) em crianças dos 2 aos 11 anos e da urticária em crianças dos 2 aos 11 anos.

Posologia e modo de administração: *Crianças de 2 a 11 anos de idade* - Dosagem para crianças com peso igual ou superior a 25 kg: 5 ml (5 mg de rupatadina) de solução oral uma vez por dia, com ou sem alimentos. Dosagem para crianças com peso igual ou superior a 10 kg e inferior a 25 kg: 2,5 ml (2,5 mg de rupatadina) de solução oral uma vez por dia, com ou sem alimentos. *Crianças com menos de 2 anos de idade:* A administração deste medicamento não está recomendada em crianças com menos de 2 anos devido à falta de dados nesta população. *Adultos e adolescentes (com mais de 12 anos de idade):* Em adultos e adolescentes (mais de 12 anos de idade), a administração de comprimidos de rupatadina 10 mg é mais adequada. *Doentes com insuficiência renal ou hepática:* Dada a inexistência de dados clínicos disponíveis em doentes com insuficiência renal ou hepática, o uso de rupatadina não está atualmente recomendada neste tipo de doentes.

Contraindicações: Hipersensibilidade à rupatadina ou a qualquer dos excipientes. **Efeitos indesejáveis:** A frequência de efeitos indesejáveis é definida da seguinte forma: *Frequentes* ($\geq 1/100$ a $<1/10$, *Pouco frequentes* ($\geq 1/1000$, a $<1/100$. A frequência dos efeitos adversos observados em doentes tratados com rupatadina solução oral durante os ensaios clínicos foi a seguinte: *Frequentes:* cefaleia, sonolência; *Pouco frequentes:* Gripe, nasofaringite, infeção do trato respiratório superior, eosinofilia, neutropenia, tontura, náusea, eczema, suores noturnos, fadiga. **Data da revisão do texto:** 08/2020. **Apresentação:** Frasco com 120 ml solução oral. **Não compartilhar** - Portugal -. **Medicamento sujeito a receita médica.**

Consultar o RCM completo para informação detalhada. *Para mais informações relacionadas com o medicamento e questões médicas contactar a Secção de Assuntos Médicos de BIAL - Portela & C^a, S.A: Tel.: +351 229866100. Em caso de suspeita de um acontecimento adverso ou de outra informação de segurança, contactar a Secção de Farmacovigilância de BIAL - Portela & C^a, S.A: Tel.: +351 229866100, email: farmacovigilancia@bial.com.*

Titular da AIM: -BIAL – Portela & C^a, S.A - À Av. da Siderurgia Nacional • 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugal • NIPC 500220913.

DMgMA_PT201022

IEC (Informações essenciais compatíveis com o Resumo das Características do Medicamento)

RINIALER 10 mg. Cada comprimido contém 10 mg de rupatadina (sob a forma de fumarato). **Indicações terapêuticas:** Tratamento dos sintomas de rinite alérgica e urticária em adultos e adolescentes (com mais de 12 anos de idade). **Posologia e modo de administração:** *Adultos e adolescentes (mais de 12 anos de idade):* A dose recomendada é de 10 mg (1 comprimido) uma vez por dia, administrada com ou sem alimentos. *Idosos:* Rupatadina deve ser usada com precaução nos doentes idosos. *Doentes pediátricos:* Rupatadina 10 mg comprimidos não é recomendado em crianças com idade inferior a 12 anos. Em crianças dos 2 aos 11 anos de idade, é recomendada a administração de rupatadina 1 mg/ml solução oral. *Doentes com insuficiência renal ou hepática:* Uma vez que não há experiência clínica em doentes com insuficiência hepática ou renal, não se recomenda presentemente a utilização de Rupatadina 10 mg comprimidos nestes doentes. **Contraindicações:** Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. **Efeitos indesejáveis:** As reações adversas mais frequentes nos ensaios clínicos controlados foram sonolência (9,4%), cefaleia (6,9%), fadiga (3,1%), astenia (1,5%), boca seca (1,2%) e tonturas (1,03%). A maioria das reações adversas observadas nos ensaios clínicos foram ligeiras a moderadas em gravidade e normalmente não conduziram à interrupção da terapia. As reações adversas listadas por frequência (*frequentes:* $\geq 1/100$ a $< 1/10$, *pouco frequentes:* $\geq 1/1.000$ a $< 1/100$, *raras:* $\geq 1/10.000$ a $< 1/1.000$) foram as seguintes: *Frequentes:* sonolência, cefaleias, tonturas, boca seca, fadiga, astenia; *Pouco frequentes:* aumento da creatinofosfoquinase no sangue, aumento da alanina aminotransferase, aumento da aspartato aminotransferase, teste da função hepática anormal, aumento de peso, perturbação da atenção, epistaxis, secura nasal, tosse, garganta seca, dor orofaríngea, faringite, rinite, náusea, dor abdominal superior, diarreia, dispepsia, vômitos, dor abdominal, obstipação, exantema, dor lombar, artralgia, mialgia, aumento do apetite, sede, indisposição, pirexia, irritabilidade. Adicionalmente, foram notificadas três reações adversas raras no período pós-autorização: taquicardia, palpitações e reações de hipersensibilidade (incluindo reações anafiláticas, angioedema e urticária) foram notificadas na experiência pós-comercialização com rupatadina comprimidos de 10 mg. **Data da revisão do texto:** 08/2020 **Apresentação:** cx. 20 comprimidos. **Comparticipação:** Portugal - 37% (RG); 95% (RE). **Medicamento sujeito a receita médica.**

Consultar o RCM completo para informação detalhada. *Para mais informações relacionadas com o medicamento e questões médicas contactar a Secção de Assuntos Médicos de BIAL - Portela & C^a, S.A: Tel.: +351 229866100. Em caso de suspeita de um acontecimento adverso ou de outra informação de segurança, contactar a Secção de Farmacovigilância de BIAL - Portela & C^a, S.A: Tel.: +351 229866100, email: farmacovigilancia@bial.com.*

Titular da AIM: BIAL – Portela & C^a, S.A.- À Av. da Siderurgia Nacional • 4745-457 S. Mamede do Coronado - Portugal • NIPC 500220913.

DMgMA_PT201022

RINIALER na Rinite Alérgica e Urticária

Obrigado.

Rinialer®

Bial

Keeping life
in mind.

